

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	1 db injekciós üveg + 1 db fecskendő + 2 db tű
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	2 db (2 x 1) injekciós üveg + 2 db (2 x 1) fecskendő + 4 db (2 x 2) tű (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	6 db (6 x 1) injekciós üveg + 6 db (6 x 1) fecskendő + 12 db (6 x 2) tű (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előtöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	1 db előtöltött fecskendő
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előtöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	2 db előtöltött fecskendő
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előtöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	6 db (3 x 2) előtöltött fecskendő (gyűjtőcsomagolás)