

Anhang A

| EU-Nummern | Phantasie-bezeichnung | Stärke | Darreichungs-form | Zieltier-art(en) | Art der Anwendung | Verpackung | Inhalt | Packungs-größe | Wartezeit |
|-----------------|-----------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| EU/2/18/227/001 | UBAC | --1 | Emulsion zur Injektion | Rinder. | Intramuskulären Anwendung | Durchstechflasche (Glas) | 1 Dosis (2 ml) | 20 Durchstechflaschen | Null Tage |
| EU/2/18/227/002 | UBAC | --1 | Emulsion zur Injektion | Rinder. | Intramuskulären Anwendung | Durchstechflasche (PET) | 5 Dosen (10 ml) | 1 Durchstechflasche | Null Tage |
| EU/2/18/227/003 | UBAC | --1 | Emulsion zur Injektion | Rinder. | Intramuskulären Anwendung | Durchstechflasche (PET) | 25 Dosen (50 ml) | 1 Durchstechflasche | Null Tage |
| EU/2/18/227/004 | UBAC | --1 | Emulsion zur Injektion | Rinder. | Intramuskulären Anwendung | Durchstechflasche (PET) | 50 Dosen (100 ml) | 1 Durchstechflasche | Null Tage |

--1 Lipoteichonsäure (LTA) aus Biofilm Adhesion Component (BAC) von *Streptococcus uberis*, Stamm 5616..... ≥ 1 RPU*

*Relative Potenz-Einheiten (ELISA)