

<u>ESB</u> <u>markaðsleyfis-</u> <u>númer</u>	<u>(Sér) heiti</u>	<u>Styrkleiki</u>	<u>Lyfiaform</u>	<u>Íkomuleið</u>	<u>Innri umbúðir</u>	<u>Innihald</u> <u>(þéttni)</u>	<u>Pakkningastærð</u>
EU/1/15/1079/001	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	1 áfillt sprauta
EU/1/15/1079/002	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	10 áfylltar sprautur
EU/1/15/1079/003	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	1 áfillt sprauta + 1 nál
EU/1/15/1079/004	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	1 áfillt sprauta + 2 nálar
EU/1/15/1079/005	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	10 áfylltar sprautur + 10 nálar
EU/1/15/1079/006	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	10 áfylltar sprautur + 20 nálar
EU/1/15/1079/007	Vaxelis	--1	Stungulyf, dreifa	Til notkunar í vöðva.	áfillt sprauta (gler)	0,5 ml	50 (5 x 10) áfylltar sprautur (fjölþakning)

--1 Einn skammtur (0,5 ml) inniheldur:

Barnaveikiafeitur <sup>1</sup>	ekki minna en 20 a.e.
Stífkrampaafeitur <sup>1</sup>	ekki minna en 40 a.e.
<i>Bordetella pertussis</i> mótefnavakar <sup>1</sup>	
Kíghóstaafeitur (PT)	20 míkrogrömm
Þráðlaga rauðkornakekkir (FHA)	20 míkrogrömm
Pertactin (PRN)	3 míkrogrömm
Festipræðir gerð 2 og 3 (FIM)	5 míkrogrömm
Lifrabólga B yfirborðsmótefnavaki <sup>2,3</sup>	10 míkrogrömm
Mænusóttarveira (óvirkjuð) <sup>4</sup>	
Gerð 1 (Mahoney)	40 D mótefnavakaeiningar <sup>5</sup>
Gerð 2 (MEF-1)	8 D mótefnavakaeiningar <sup>5</sup>
Gerð 3 (Saukett)	32 D mótefnavakaeiningar <sup>5</sup>
<i>Haemophilus influenzae</i> fjölsykra gerð b (Pólýríbósýlríbitólfosfat)	3 míkrogrömm
Tengt við meningókokkaprótein <sup>2</sup>	50 míkrogrömm

<sup>1</sup> aðsogað á álfosfat (0,17 mg Al<sup>3+</sup>)

<sup>2</sup> aðsogað á myndlaust álhýdroxýfosfatsúlfat (0,15 mg Al<sup>3+</sup>)

<sup>3</sup> framleitt í gerfrumum (*Saccharomyces cerevisiae*) með raðbrigða DNA-erfðatækni

<sup>4</sup> framleitt í Vero frumum

<sup>5</sup> eða svipað magn mótefnavaka ákvarðað með viðeigandi ónæmisefnafræðilegri aðferð.