

## Aneks A

Numer UE	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Docelowe gatunki zwierząt	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/15/192/001	Velactis	1,12 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło (krowy mleczne)	Podanie domięśniowe	Fiolka (ze szkła)	5 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: 23 dni  Mleko: Zero godzin / 4 dni po wycieleniu*
EU/2/15/192/002	Velactis	1,12 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło (krowy mleczne)	Podanie domięśniowe	Fiolka (ze szkła)	25 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: 23 dni  Mleko: Zero godzin / 4 dni po wycieleniu*
EU/2/15/192/003	Velactis	1,12 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło (krowy mleczne)	Podanie domięśniowe	Fiolka (ze szkła)	50 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: 23 dni  Mleko: Zero godzin / 4 dni po wycieleniu*
EU/2/15/192/004	Velactis	1,12 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło (krowy mleczne)	Podanie domięśniowe	Fiolka (ze szkła)	5 ml	5 fiolek	Tkanki jadalne: 23 dni  Mleko: Zero godzin / 4 dni po wycieleniu*

\*Okres karencji (mleko):

- Zero godzin po wycieleniu (w przypadku, gdy okres zasuszania trwa 32 dni i dłużej)
- 4 dni (8 udojów) po wycieleniu (w przypadku, gdy okres zasuszania trwa krócej niż 32 dni)