

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/08/082/001	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, ovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins, ovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Ovins : 29 jours. Porcins : 16 jours.
EU/2/08/082/002	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, ovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins, ovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Ovins : 29 jours. Porcins : 16 jours.
EU/2/08/082/003	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	500 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Porcins : 16 jours.
EU/2/08/082/004	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, ovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins, ovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Ovins : 29 jours. Porcins : 16 jours.
EU/2/08/082/005	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, ovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins, ovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Ovins : 29 jours. Porcins : 16 jours.
EU/2/08/082/006	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	500 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Porcins : 16 jours.
EU/2/08/082/007	ZACTRAN	150 mg/ml	Solution injectable	Bovins, ovins, porcins	Voie sous-cutanée (bovins, ovins) ; voie intramusculaire (porcins)	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: Bovins : 64 jours. Ovins : 29 jours. Porcins : 16 jours.