



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

29.03.2017
EMA/81869/2017

Jylamvo (metotreksaat suukaudse lahusena): tervishoiutöötajad varustatakse teabematerjaliga ravimi õige kasutamise tagamiseks

Tervishoiutöötajad peavad patsientidele põhjalikult selgitama, millal ja kuidas oma annust manustada.

Jylamvot määravatele ja väljastavatele tervishoiutöötajatele antakse ravimi õige kasutamise tagamiseks teabematerjal. Jylamvo on suukaudse lahusena tuurustatav ravim, mis sisaldab toimeainena metotreksaati ning mida kasutatakse artriidi ja psoriaasi (nahahaigus) ning ka akuutse lümfoblastse leukeemia (teatavat tüüpi verevähk) raviks.

Teabematerjalis teavitatakse tervishoiutöötajaid, et artriidi ja psoriaasi korral võetakse Jylamvot kord nädalas. Üksnes akuutse lümfoblastse leukeemia korral võib ravimit kasutada sagedamini. On oluline, et tervishoiutöötajad selgitaksid patsientidele põhjalikult, millal ja kuidas oma annust manustada. Kui ravimit kasutatakse psoriaasi või artriidi raviks ja seda võetakse ekslikult kord ööpäevas, mitte kord nädalas, võib see põhjustada rasket kahju.

Ühtlasi on tähtis, et patsiendile õpetatakse põhjalikult seda, kuidas pudelist kaasasoleva süstlaga annust võtta. Kui annuse mõõtmisega eksitakse, võib patsient manustada ravimit liiga palju või liiga vähe, mis omakorda võib kaasa tuua raskeid tagajärgi.

Teave patsientidele ja hooldajatele

- Jylamvot turustatakse suukaudse lahusena, mis sisaldab milliliitri kohta 2 mg metotreksaati.
- Artriidi ja nahahaiguste korral tuleb Jylamvot võtta üksnes kord nädalas samal nädalapäeval. Tavaliselt on annus vahemikus 7,5 mg (3,75 ml) kuni 25 mg (12,5 ml) kord nädalas. Artriidi ja nahahaiguste raviks ei tohi metotreksaati kunagi võtta iga päev.
- Teie arst, meditsiiniõde või apteeker selgitab teile, kuidas vajalikku annust kaasasoleva süstla abil pudelist võtta. Jylamvo annust tohib pudelist võtta ainult kaasasoleva süstlaga. Alljärgnevas tabelis on juhised eri annustele (mg) vastavate koguste kohta.



Jylamvo (metotreksaat 2 mg/ml)

Annus (mg)	5 mg	7,5 mg	10 mg	15 mg	20 mg	25 mg
Pudelist võetav kogus (ml)	2,5 ml	3,75 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	12,5 ml

- Akuutse lümfoblastse leukeemia korral on annus tavaliselt suurem ja te peate Jylamvot võib-olla võtma sagedamini. Järgige tervishoiutöötaja juhiseid.
- Kui teil tekivad üleannustamise nähud või sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga. Need nähud ja sümptomid on järgmised: veritsus, tavatu nõrkusetunne, suuhaavandid, iiveldus, oksendamine, musta värvi või verine väljaheide, veriköha või vere oksendamine ja uriinierituse vähenemine.
- Kui teil on raviga seoses küsimusi, rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Teave tervishoiutöötajatele

- Jylamvot turustatakse suukaudse lahuseana, mis sisaldab milliliitri kohta 2 mg metotreksaati.
- Patsientidele tuleb õpetada õiget annustamist – artriidi ja psoriaasi korral peab Jylamvot võtma kord nädalas samal nädalapäeval. Artriidi ja nahahaiguste raviks ei tohi metotreksaati kunagi võtta iga päev. Akuutse lümfoblastse leukeemia korral on annus tavaliselt suurem ja Jylamvot võetakse sagedamini.
- Jylamvoga on kaasas suukaudne süstal ja on oluline, et annus võetaks pudelist ainult selle süstlaga. Süstla mõõteskaala on milliliitrites, annust aga väljendatakse milligrammides. Jylamvot välja kirjutades tuleb annus alati kirjutada milligrammides ja milliliitrites.
- Tervishoiutöötajad peavad iga patsienti individuaalselt hindama, et teha kindlaks, kas nad suudavad annust õigesti mõõta. Ainult pärast sellist hindamist võivad patsiendid Jylamvot manustada kodus ise.
- Iga retsepti väljakirjutamisel tuleb patsiendile meelde tuletada annuse korrektset mõõtmist.
- Patsiente tuleb jälgida üleannustamise nähtude ja sümptomite suhtes, näiteks veritsus, tavatu nõrkusetunne, suuhaavandid, iiveldus, oksendamine, musta värvi või verine väljaheide, veriköha või vere oksendamine ja uriinierituse vähenemine.

Ravimi lisateave

Jylamvo on ravim, mida kasutatakse järgmiste põletikahaiguste raviks:

- aktiivne reumatoidartriit (liigesepõletikku põhjustav haigus);
- raske juveniilne idiopaatiline artriit (lastel esinev liigesehaigus);
- raske invaliidistav psoriaas (haigus, mis põhjustab punaseid ketendavaid nahalaidke);
- raske psoriaatiline artriit (psoriaasiga patsientidel esinev liigesepõletik).

Jylamvot kasutatakse ka akuutse lümfoblastse leukeemiaga (lümfoblastideks nimetatavate valgevereliblede vähk) täiskasvanute ja vähemalt 3-aastaste laste raviks.

Jylamvo lisateave on EMA

veebilehel: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003756/human_med_002083.jsp