



EUROPEAN MEDICINES AGENCY  
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/115145/2018  
EMA/V/C/004417

## Clevor

### Clevor ir jo registracijos ES motyvų apžvalga

#### Kas yra Clevor ir kam jis naudojamas?

Clevor – tai veterinarinis vaistas, kuris naudojamas šunims siekiant sukelti vėmimą. Jo sudėtyje yra veikliosios medžiagos ropinirolio.

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje.

#### Kaip naudoti Clevor?

Clevor yra akių lašų tirpalas, lašinamas į akis po 1–8 lašus, atsižvelgiant į šuns kūno svorį. Jeigu reikalinga dozė – daugiau kaip vienas lašas, padalijus į dvi dalis ją reikėtų sulašinti į abi akis, o jeigu reikia sulašinti 6 ar daugiau lašų, dozę reikėtų padalyti ir sulašinti per 2 kartus 1–2 minučių intervalu. Jeigu sulašinus vaisto šuo nepradeda vemti per 15 minučių, procedūrą galima pakartoti. Vaistą galima naudoti tik veterinarijos gydytojui arba jam atidžiai prižiūrint ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą.

Daugiau informacijos apie Clevor naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

#### Kaip veikia Clevor?

Ropiniolis yra dopamino agonistas, o tai reiškia, kad ši medžiaga imituoja dopamino veikimą. Dopaminas – tai informaciją perduodanti medžiaga, veikianti toje galvos smegenų dalyje, kuri kontroliuoja vėmimą. Stimuliuodamas šią galvos smegenų dalį, ropiniolis sukelia vėmimą.

#### Kokia Clevor nauda nustatyta tyrimuose?

Atliekant lauko tyrimą su 132 sveikais šunimis, kurio metu Clevor buvo lyginamas su placebo (netikru vaistu), praėjus ne daugiau 30 minučių vėmė 95 proc. šunų. Po 20 minučių 13 proc. šunų buvo sulašinta antra dozė, kadangi jie nepradėjo vemti. Trys šunys visiškai nevėmė, nepaisant to, kad jiems buvo sulašinta antra vaisto dozė. 32 šunų grupėje, kurioje šunims į akis buvo sulašinta placebo, vėmė tik vienas šuo.



## **Kokia rizika siejama su Clevor naudojimu?**

Dažniausi Clevor šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra trumpalaikė lengva akių hiperemija (paraudimas), akių išskyros, trečio akies voko išsikišimas, blefarospazmas (akių užmerkimas dėl akių vokų raumenų susitraukimo), trumpalaikis lengvas energijos trūkumas ir pagreitėjęs širdies plakimas.

Clevor negalima naudoti šunims:

- kurių centrinės nervų sistemos veikla sutrikusi (sutrikusi sąmonė), kuriems pasireiškia traukuliai arba kiti nervų sistemos negalavimai, dėl kurių gali išsivystyti inhaliacinė pneumonija (plaučių pažeidimas dėl į plaučius patekusio skrandžio turinio);
- kuriems išsivysčiusi hipoksija (sumažėjęs deguonies kiekis kraujyje), dispnėja (kvėpavimo sunkumai) arba sutrikę ryklės (rijimo) refleksai;
- kurie nurijo aštrių svetimkūnių, ėsdinančių medžiagų, lakiųjų medžiagų ar organinių tirpiklių.

Išsamų visų šalutinių reiškinų ir apribojimų naudojant Clevor sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje.

## **Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?**

Žmonės, kurie yra itin jautrūs (alergiški) ropinioliui, turi vengti sąlyčio su Clevor.

Nėščiosioms ar žindyvėms negalima į rankas imti šio vaisto.

Vaistui patekus ant odos arba į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti vandeniu. Pasireiškus simptomams, reikia kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

## **Kodėl Clevor buvo registruotas ES?**

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Clevor nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES

## **Kita informacija apie Clevor**

Visoje ES galiojantis Clevor registracijos pažymėjimas suteiktas 2018-04-13.

Išsamią informaciją apie Clevor rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: [ema.europa.eu/Find/medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports](http://ema.europa.eu/Find/medicine/Veterinary_Medicines/European_public_assessment_reports).

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. vasario mėn.