

























































jaoks 20 ml (1 vial). Sobiva annuse kohandamiseks alla 50 kg lastele võib olla vaja kasutada ainult murdosa vialide mahust.

4. Lisage mõõdetud kogus Alpivabi kontsentraati infusioonimahutisse.
5. Lahjendage vajalik annus Alpivabi kontsentraati naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) või 4,5 mg/ml (0,45%) infusioonilahusega, dekstroosi 5% lahusega või Ringer-laktaadilahusega mahuni 100 ml.
6. Manustage lahjendatud lahus 15...30 minutit kestva veeniinfusioonina.
7. Pärast lahjendatud Alpivabi lahuse valmistamist manustage see kohe; vastasel korral saab seda säilitada külmikus (2...8 °C) kuni 24 tundi. Kui lahjendatud Alpivabi lahust säilitatakse külmikus, laske lahusel soojeneda toatemperatuurini, seejärel manustage kohe.
8. Visake kasutamata lahjendatud Alpivabi lahus pärast 24 tundi ära.

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Medicinal Product no longer authorised