

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Gebruik een aseptische techniek tijdens de bereiding van Alpivab om microbiële besmetting te voorkomen. De oplossing bevat geen conserveringsmiddel of antibacterieel middel. Alpivab niet mengen of via infusie toedienen samen met andere geneesmiddelen die in een ader worden toegediend.

Volg de onderstaande stappen in de opgegeven volgorde om een verdunde oplossing van Alpivab te bereiden:

1. Controleer de verzegeling van elke injectieflacon. Niet gebruiken als de verzegelingsopening is verbroken of ontbreekt.
2. Inspecteer het Alpivab-concentraat. Het moet kleurloos zijn en mag geen zwevende deeltjes bevatten.
3. Als een patiënt 600 mg peramivir krijgt, is het benodigde volume Alpivab-concentraat 60 ml (3 injectieflacons met elk 20 ml). In het geval van een peramivirdosis van 300 mg is 30 ml (1½ injectieflacon) Alpivab-concentraat nodig en voor een dosis van 200 mg slechts 20 ml (1 injectieflacon). Voor passende dosisaanpassingen bij kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 50 kg kunnen delen van een injectieflacon nodig zijn.
4. Voeg het afgemeten volume Alpivab-concentraat toe in de infusiehouder.
5. Verdun de benodigde dosis Alpivab-concentraat in 0,9%- (9 mg/ml) of 0,45%- (4,5 mg/ml) natriumchlorideoplossing voor infusie, 5%-dextroseoplossing of ringerlactaatoplossing tot een volume van 100 ml.
6. Dien de verdunde oplossing via intraveneuze infusie in 15 tot 30 minuten toe.
7. Na bereiding van een verdunde Alpivab-oplossing deze onmiddellijk toedienen of in de koelkast bewaren (2 °C tot 8 °C) gedurende maximaal 24 uur. Indien gekoeld bewaard, de verdunde Alpivab-oplossing op kamertemperatuur laten komen en dan onmiddellijk toedienen.
8. Ongebruikte verdunde Alpivab-oplossing na 24 uur verwijderen.

Geen bijzondere vereisten voor verwijdering.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.