



















































Pri príprave lieku Alpivab použite aseptickú techniku, aby ste predišli mikrobiálnej kontaminácii. Roztok neobsahuje konzervačnú látku ani antibakteriálnu látku. Liek Alpivab nemiešajte ani nepodávajte súbežne v infúzii s inými liekmi podávanými do žily.

Pri príprave zriedeného roztoku lieku Alpivab sa má dodržiavať tento postup:

1. Skontrolujte uzáver na každej injekčnej liekovke. Nepoužívajte liek, ak je porušená alebo ak chýba obruba alebo viečko uzáveru. Skontrolujte koncentrát lieku Alpivab. Musí byť bezfarebný a nemá obsahovať viditeľné častice.
2. Ak má pacient dostať peramivir v dávke 600 mg, požadovaný objem koncentráту lieku Alpivab je 60 ml (3 injekčné liekovky po 20 ml). V prípade peramiviru v dávke 300 mg je potrebných 30 ml (1 a pol injekčnej liekovky) koncentrátu lieku Alpivab a v prípade peramiviru v dávke 200 mg je potrebných len 20 ml (1 injekčná liekovka). Na príslušné úpravy dávky u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg bude možno potrebné použiť len časti objemu injekčnej liekovky.
3. Odmeraný objem koncentrátu lieku Alpivab pridajte do infúznej nádoby.
4. Zried'te požadovanú dávku koncentrátu lieku Alpivab v 9 mg/ml (0,9 %) alebo 4,5 mg/ml (0,45 %) infúzneho roztoku chloridu sodného, 5 % roztoku glukózy alebo laktátovom Ringerovom roztoku na objem 100 ml.
5. Podajte zriedený roztok intravenóznou infúziou počas 15 až 30 minút.
6. Zriedený roztok lieku Alpivab podajte okamžite po príprave alebo ho uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C) maximálne 24 hodín. Ak bol zriedený roztok lieku Alpivab uložený v chladničke, nechajte ho dosiahnuť izbovú teplotu a potom ho okamžite podajte.
7. Nepoužitý zriedený roztok Alpivabu po 24 hodinách zlikvidujte.

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z tohto lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Medicinal Product no longer authorised