

























































1. Preverite zamašek vsake viala. Ne uporabljajte, če je odprtina zamaška poškodovana ali manjka.
2. Koncentrat zdravila Alpivab preglejte. Biti mora brezbarven in brez delcev.
3. Če bo bolnik prejel 600 mg peramivira, je potreben volumen koncentrata zdravila Alpivab 60 ml (3 viala, vsaka z 20 ml). Za odmerek 300 mg peramivira je potrebnih 30 ml (1½ viala) koncentrata zdravila Alpivab, za odmerek 200 mg pa le 20 ml (1 viala). Za ustrezno prilagojen odmerek pri otrocih s telesno maso manj kot 50 kg je lahko potreben le del vsebine ene viala.
4. V vsebnik za infundiranje dodajte izmerjeni volumen koncentrata zdravila Alpivab.
5. Potrebni odmerek koncentrata zdravila Alpivab razredčite v raztopini natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) ali 4,5 mg/ml (0,45 %) za infundiranje, 5-odstotni dekstrozi ali Ringerjevem laktatu do prostornine 100 ml.
6. Razredčeno raztopino dajajte z intravensko infuzijo 15 do 30 minut.
7. Ko je razredčena raztopina zdravila Alpivab pripravljena, jo dajte takoj; sicer jo za največ 24 ur shranite v hladilniku (pri 2 °C do 8 °C). Če ste razredčeno raztopino zdravila Alpivab shranili v hladilniku, počakajte, da se segreje na sobno temperaturo, nato pa jo takoj uporabite.
8. Vso neuporabljeno razredčeno raztopino zdravila Alpivab po 24 urah zavržite.

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Medicinal Product no longer authorised