

Pacienti so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR 30–59 ml/min), ktorí podstupujú PCI (či už sú liečení s bivalirudínom pri ACS alebo nie), majú dostať infúziu s nižšou rýchlosťou 1,4 mg/kg/h. Bolusová dávka sa nemá meniť v porovnaní s vyššie odporúčaným dávkovaním pre ACS alebo PCI.

Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.

(Podrobné informácie o dávkovaní nájdete v časti 4.2 súhrnu charakteristických vlastností lieku.)

Čas použiteľnosti

4 roky

Rekonštituovaný roztok: Chemická a fyzikálna stabilita zachovávajúca použiteľnosť lieku bola preukázaná počas 24 hodín pri 2 - 8°C. Uchovávajúte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajúte v mrazničke.

Nariedený roztok: Chemická a fyzikálna stabilita zachovávajúca použiteľnosť lieku bola preukázaná počas 24 hodín pri 25°C. Uchovávajúte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Neuchovávajúte v mrazničke.

Liek s ukončenou platnosťou registrácie