

















































































Jeżeli produkt został przygotowany z wykorzystaniem schłodzonej (2°C-8°C) wody do wstrzykiwań, przygotowaną zawiesinę należy natychmiast po sporządzeniu umieścić w lodówce (2°C-8°C) i przechowywać w lodówce przez nie więcej niż 22 godziny. Jeśli minęło więcej niż 22 godziny przechowywania w lodówce, zawiesinę należy odpowiednio usunąć i przygotować nową dawkę.

Przez maksymalnie 30 minut przed podaniem należy pozwolić strzykawce wypełnionej przygotowaną zawiesiną osiągnąć temperaturę około 20°C-25°C. Jeśli minęło więcej niż 30 minut, zawiesinę należy odpowiednio usunąć i przygotować nową dawkę.

#### Obliczanie dawki indywidualnej

Całkowitą dawkę można obliczyć na podstawie powierzchni ciała (pc.) w następujący sposób:

$$\text{dawka całkowita} = \text{dawka (mg/m}^2\text{)} \times \text{pc. (m}^2\text{)}$$

Poniższa tabela stanowi jedynie przykład, jak oblicza się indywidualne dawki azacytydyny w oparciu o średnią wartość pc. wynoszącą 1,8 m<sup>2</sup>.

| <u>Dawka mg/m<sup>2</sup></u><br><i>(% zalecanej dawki</i><br><i>początkowej)</i> | <u>Całkowita dawka w</u><br><u>oparciu o wartość</u><br><u>pc. 1,8 m<sup>2</sup></u> | <u>Liczba potrzebnych</u><br><u>fiolek</u> | <u>Potrzebna całkowita</u><br><u>ilość przygotowanej</u><br><u>zawiesiny</u> |
|---|--|--|--|
| 75 mg/m <sup>2</sup> (100%)   | 135 mg   | 2 fioleki                                  | 5,4 ml   |
| 37,5 mg/m <sup>2</sup> (50%)  | 67,5 mg  | 1 fiołka                                   | 2,7 ml   |
| 25 mg/m <sup>2</sup> (33%)  | 45 mg  | 1 fiołka                                   | 1,8 ml   |

#### Sposób podawania

Nie należy filtrować zawiesiny po sporządzeniu.

Przygotowany produkt Azacitidine Celgene należy wstrzyknąć podskórnie (wprowadzić igłę pod kątem 45 - 90°) przy użyciu igły 25 G w ramię, udę lub brzuch.

Dawki powyżej 4 ml należy wstrzykiwać w dwa różne miejsca.

Należy zmieniać miejsca wstrzyknięcia. Nowe wstrzyknięcia należy podawać przynajmniej 2,5 cm od poprzedniego miejsca i nigdy nie wstrzykiwać w miejsca drażliwe, zasiniaczone, zaczerwienione lub stwardniałe.

Wszelkie niewykorzystane części produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu