















































































| <u>Odmerek mg/m<sup>2</sup></u><br><u>(% priporočenega</u><br><u>začetnega odmerka)</u> | <u>Celotni odmerek na</u><br><u>podlagi vrednosti</u><br><u>BSA 1,8 m<sup>2</sup></u> | <u>Število potrebnih vial</u> | <u>Celotni volumen</u><br><u>potrebne</u><br><u>rekonstituirane</u><br><u>suspenzije</u> |
|---|---|-------------------------------|--|
| 75 mg/m <sup>2</sup> (100 %)  | 135 mg  | 2 viali                       | 5,4 ml   |
| 37,5 mg/m <sup>2</sup> (50 %)   | 67,5 mg   | 1 viala                       | 2,7 ml   |
| 25 mg/m <sup>2</sup> (33 %)   | 45 mg   | 1 viala                       | 1,8 ml   |

#### Način uporabe

Rekonstituirane suspenzije ne filtrirajte.

Rekonstituirano zdravilo Azacitidine Celgene injicirajte subkutano (iglo vstavite pod kotom 45-90°) z iglo velikosti 25 G v nadlaket, stegno ali trebuh.

Odmerke, večje kot 4 ml, injicirajte na dve različni mesti.

Mesta injiciranja menjajte. Nove injekcije morate dati vsaj 2,5 cm od prejšnjega mesta injiciranja in nikoli na predel, ki je občutljiv, poškodovan, pordel ali otrdel.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Zdravilo nima več dovoljenja za promet