

**PŘÍLOHA I**  
**SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU**

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

## 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuzní disperze

## 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

### 2.1 Obecný popis

Breyanzi (lisocabtagenum maraleucelum) je přípravek cílený proti antigenu CD19 na bázi geneticky modifikovaných autologních buněk, který se skládá z purifikovaných CD8+ a CD4+ T-lymfocytů v definovaném poměru, které byly samostatně transdukovány *ex vivo* pomocí replikačně nekompetentního lentivirového vektoru exprimujícího anti-CD19 chimérický antigenní receptor (*chimeric antigen receptor*, CAR), který se skládá z vazebné domény jednořetězcového variabilního fragmentu (scFv) myši CD19-specifické monoklonální protilátky (mAb; FMC63), části 4-1BB kostimulační koncové domény a CD3 zeta ( $\zeta$ ) signalizačních domén a nefunkčního zkráceného receptoru epidermálního růstového faktoru (*truncated epidermal growth factor receptor*, EGFRt).

### 2.2 Kvalitativní a kvantitativní složení

Přípravek Breyanzi obsahuje CAR+ životaschopné T-lymfocyty s definovaným poměrem buněčných složek CD8+ a CD4+:

#### Buněčná složka CD8+

Jedna injekční lahvička obsahuje lisocabtagenum maraleucelum v pro danou šarži specifické koncentraci autologních T-lymfocytů geneticky modifikovaných k expresi anti-CD19 chimérického antigenního receptoru (CAR+ životaschopné T-lymfocyty). Léčivý přípravek je balen v jedné nebo více injekčních lahvičkách obsahujících buněčnou disperzi  $5,1-322 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů ( $1,1-70 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů/ml) suspendovaných v kryoprezervačním roztoku.

Jedna injekční lahvička obsahuje 4,6 ml buněčné složky CD8+.

#### Buněčná složka CD4+

Jedna injekční lahvička obsahuje lisocabtagenum maraleucelum v pro danou šarži specifické koncentraci autologních T-lymfocytů geneticky modifikovaných k expresi anti-CD19 chimérického antigenního receptoru (CAR+ životaschopné T-lymfocyty). Léčivý přípravek je balen v jedné nebo více injekčních lahvičkách obsahujících buněčnou disperzi  $5,1-322 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů ( $1,1-70 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů/ml) suspendovaných v kryoprezervačním roztoku.

Jedna injekční lahvička obsahuje 4,6 ml buněčné složky CD4+.

Pro získání dávky přípravku Breyanzi může být zapotřebí více než jedna injekční lahvička buněčné složky CD8+ a/nebo buněčné složky CD4+. Celkový objem, jenž má být podán, a potřebný počet injekčních lahviček se může u každé buněčné složky lišit.

Kvantitativní údaje jsou pro každou buněčnou složku léčivého přípravku uvedeny v příslušném propouštěcím certifikátu infuze (*release for infusion certificate*, RfIC) vloženém do přepravního obalu. RfIC na základě koncentrace kryoprezervovaných CAR+ životaschopných T-lymfocytů každé

složky uvádí celkový objem, jenž má být podán, potřebný počet injekčních lahviček a objem, jenž má být podán z každé injekční lahvičky.

#### Pomocné látky se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné injekční lahvičce 12,5 mg sodíku, 6,5 mg draslíku a 0,35 ml (7,5 % V/V) dimethylsulfoxidu (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

### **3. LÉKOVÁ FORMA**

Infuzní disperze (infuze).

Mírně neprůhledná až neprůhledná, bezbarvá až žlutá nebo hnědavě žlutá disperze.

### **4. KLINICKÉ ÚDAJE**

#### **4.1 Terapeutické indikace**

Přípravek Breyanzi je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním difúzním velkobuněčným B-lymfomem (*diffuse large B-cell lymphoma*, DLBCL), primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem (*primary mediastinal large B-cell lymphoma*, PMBCL) a folikulárním lymfomem grade 3B (FL3B), po dvou nebo více liniích systémové terapie.

#### **4.2 Dávkování a způsob podání**

Přípravek Breyanzi musí být podáván ve zdravotnickém zařízení s oprávněním k této léčbě (kvalifikované léčebné centrum).

Léčba má být zahájena podle pokynů a pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hematologických malignit a zaškoleného v podávání přípravku Breyanzi a v terapii pacientů léčených tímto přípravkem.

Před podáním infuze přípravku Breyanzi musí být na každého pacienta k dispozici nejméně jedna dávka tocilizumabu pro použití v případě syndromu z uvolnění cytokinů (*cytokine release syndrome*, CRS) a pohotovostní vybavení. Zdravotnické zařízení musí mít zajištěnu dostupnost další dávky tocilizumabu do 8 hodin od podání každé předchozí dávky. Ve výjimečném případě, kdy tocilizumab není dostupný kvůli nedostatku, který je zaevidován v katalogu nedostatkových léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky, musí být před podáním infuze k dispozici jiné vhodné alternativy k léčbě CRS namísto tocilizumabu.

#### Dávkování

Přípravek Breyanzi je určen pouze k autolognímu použití (viz bod 4.4).

Léčba spočívá v podání jedné dávky infuze obsahující infuzní disperzi CAR+ životaschopných T-lymfocytů v jedné nebo více injekčních lahvičkách.

Cílová dávka je  $100 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů (s cílovým poměrem buněčné složky CD4+ k buněčné složce CD8+ 1:1) v rozmezí  $44-120 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů. Další informace týkající se dávek jsou uvedeny v příloženém propouštěcím certifikátu infuze (RfIC).

Dostupnost přípravku Breyanzi musí být potvrzena před zahájením režimu lymfodepleční chemoterapie.

Před podáním lymfodepleční chemoterapie a přípravku Breyanzi musí být pacienti znovu klinicky vyšetřeni, zda se nevyskytly žádné důvody pro odložení léčby (viz bod 4.4).

#### *Příprava před léčbou (lymfodepleční chemoterapie)*

Lymfodepleční chemoterapii tvořenou cyklofosfamidem v dávce 300 mg/m<sup>2</sup>/den a fludarabinem v dávce 30 mg/m<sup>2</sup>/den je nutné podávat intravenózně po dobu 3 dní. Informace o úpravě dávky v případě poruchy funkce ledvin najdete v souhrnu údajů o přípravku pro fludarabin a cyklofosfamid.

Přípravek Breyanzi se má podat 2 až 7 dní po dokončení lymfodepleční chemoterapie.

Pokud mezi dokončením lymfodepleční chemoterapie a infuzí přípravku Breyanzi dojde k prodlevě delší než 2 týdny, je třeba pacienta před podáním infuze přeléčit lymfodepleční chemoterapií (viz bod 4.4).

#### *Premedikace*

Aby se minimalizovalo riziko infuzních reakcí, musí být pacient premedikován paracetamolem a difenhydraminem (25-50 mg, intravenózně nebo perorálně) nebo jiným H<sub>1</sub> antihistaminikem přibližně 30 až 60 minut před podáním infuze přípravku Breyanzi.

Je nutné se vyvarovat profylaktického používání systémových kortikosteroidů, neboť jejich používání může interferovat s působením přípravku Breyanzi (viz bod 4.4).

#### *Sledování po infuzi*

- Pacienty je nutné zkontrolovat 2 až 3krát během prvního týdne po infuzi, zda se u nich nevyskytnou známky a příznaky potenciálního CRS, neurologických příhod a jiných toxicit. Lékaři mají zvážit hospitalizaci při prvních známkách nebo příznacích CRS a/nebo neurologických příhod.
- Frekvenci sledování pacienta po uplynutí prvního týdne má určit lékař a ve sledování je třeba pokračovat po dobu minimálně 4 týdnů po infuzi.
- Pacienty je třeba poučit, aby po dobu nejméně 4 týdnů po infuzi zůstali v blízkosti zdravotnického zařízení s oprávněním k této léčbě.

#### Zvláštní populace

##### *Pacienti s infekcí virem lidské imunodeficiency (HIV), virem hepatitidy B (HBV) a virem hepatitidy C (HCV)*

Nejsou k dispozici žádné klinické zkušenosti u pacientů s aktivní infekcí HIV, HBV nebo HCV.

Vyšetření na HIV, aktivní HBV a aktivní HCV musí být provedeno před odběrem buněk na výrobu přípravku. Materiál získaný od pacientů s aktivní infekcí HIV nebo aktivní infekcí HCV při leukaferéze nebude použit k výrobě přípravku (viz bod 4.4).

##### *Porucha funkce ledvin*

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu  $\leq$  30 ml/min) nejsou žádné klinické zkušenosti.

##### *Starší pacienti*

U pacientů starších 65 let není nutná úprava dávkování.

##### *Pediatriká populace*

Bezpečnost a účinnost přípravku Breyanzi u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

## Způsob podání

Přípravek Breyanzi je určen pouze k intravenóznímu podání.

*Opatření, která je nutno učinit před manipulací s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním*  
Podrobné pokyny k přípravě a likvidaci přípravku Breyanzi a informace o náhodné expozici jsou uvedeny v bodě 6.6.

### *Příprava přípravku Breyanzi*

Před rozmrazením injekčních lahviček je nutné potvrdit, že totožnost pacienta odpovídá identifikačním údajům pacienta uvedeným na přepravním obalu, vnější krabičce a propouštěcím certifikátu infuze (RfIC). Injekční lahvičky nesmí být vyjmuty z krabiček, pokud informace na štítku specifickém pro pacienta neodpovídají údajům léčeného pacienta. V případě jakéhokoli rozporu mezi informacemi na štítku a identifikačními údaji pacienta je nutné ihned kontaktovat společnost.

### *Podání*

- **NEPOUŽÍVEJTE** leukodepleční filtr.
- Ujistěte se, že jsou před podáním infuze a během období rekonvalescence k dispozici tocilizumab nebo vhodné alternativy pro výjimečný případ, kdy tocilizumab není dostupný kvůli nedostatku, který je zaevidován v katalogu nedostatkových léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky, a pohotovostní vybavení.
- Potvrďte, že totožnost pacienta odpovídá identifikačním údajům pacienta na štítku stříkačky dodávaném na příslušném propouštěcím certifikátu infuze (RfIC).
- Po natažení složek přípravku Breyanzi do stříkaček přípravek podejte co nejdříve. Celková doba od vyjmutí z mrazicí skladovací jednotky do podání pacientovi nesmí přesáhnout 2 hodiny.

Úplný podrobný postup při aplikaci přípravku je uveden v bodě 6.6.

## **4.3 Kontraindikace**

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Je nutné vzít v úvahu kontraindikace lymfodepleční chemoterapie.

## **4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití**

### Sledovatelnost

Je nutné řídit se požadavky na sledovatelnost léčivých přípravků pro moderní buněčnou terapii. Aby se zajistila sledovatelnost má se po dobu 30 let po vypršení data použitelnosti přípravku uchovávat název přípravku, číslo šarže a jméno léčeného pacienta.

### Autologní použití

Přípravek Breyanzi je určen výhradně k autolognímu použití a za žádných okolností se nesmí podávat jiným pacientům. Přípravek Breyanzi nesmí být podán, pokud identifikační údaje pacienta uvedené na krabičkách, injekčních lahvičkách a propouštěcím certifikátu infuze (RfIC) neodpovídají údajům léčeného pacienta.

## Důvody pro odložení léčby

Vzhledem k rizikům spojeným s léčbou přípravkem Breyanzi je nutné podání infuze odložit, pokud má pacient některý z následujících stavů:

- Nevyřešené závažné nežádoucí účinky (především plicní příhody, srdeční příhody nebo hypotenzi), včetně příhod po předcházející chemoterapii.
- Aktivní nekontrolované infekce nebo zánětlivá onemocnění.
- Aktivní reakce štěpu proti hostiteli (graft-versus-host disease, GVHD).

Dojde-li k odložení infuze přípravku Breyanzi, postupujte podle bodu 4.2.

## Darování krve, orgánů, tkání a buněk

Pacienti léčení přípravkem Breyanzi nesmí darovat krev, orgány, tkáně nebo buňky k transplantaci.

## Lymfom centrální nervové soustavy (CNS)

Nejsou žádné zkušenosti s používáním přípravku Breyanzi u pacientů s primárním lymfomem CNS. S používáním přípravku Breyanzi u sekundárního lymfomu CNS jsou jen omezené klinické zkušenosti (viz bod 5.1).

## Předchozí léčba přípravky anti-CD19 terapie

S používáním přípravku Breyanzi u pacientů s předchozí expozicí terapii zaměřené na CD19 jsou jen omezené klinické zkušenosti (viz bod 5.1).

## Syndrom z uvolnění cytokinů (CRS)

Po infuzi přípravku Breyanzi se může objevit CRS, včetně fatálních nebo život ohrožujících reakcí; medián doby nástupu byl 5 dní (rozmezí: 1 až 14 dní). Méně než polovina všech pacientů léčených přípravkem Breyanzi zaznamenala určitý stupeň CRS (viz bod 4.8).

V klinických studiích byla vysoká nádorová zátěž před infuzí přípravku Breyanzi spojena s vyšším výskytem CRS.

CRS po infuzi přípravku Breyanzi byl léčen tocilizumabem a/nebo kortikosteroidy (viz bod 4.8).

### *Sledování a léčba CRS*

CRS je nutné identifikovat na základě klinických projevů. U pacientů je nutné vyšetřit a léčit jiné příčiny horečky, hypoxie a hypotenze.

Alespoň jedna dávka tocilizumabu na pacienta musí být k dispozici na pracovišti před infuzí přípravku Breyanzi. Léčebné centrum musí mít zajištěnu dostupnost další dávky tocilizumabu do 8 hodin od podání každé předchozí dávky. Ve výjimečném případě, kdy tocilizumab není dostupný kvůli nedostatku, který je zaevidován v katalogu nedostatkových léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky, musí mít léčebné centrum přístup k jiným vhodným alternativám léčby CRS, namísto tocilizumabu. U pacientů je nutné po dobu prvního týdne po podání infuze přípravku Breyanzi v kvalifikovaném léčebném centru 2 až 3krát překontrolovat možné známky a příznaky CRS. Frekvenci sledování pacienta po uplynutí prvního týdne má určit lékař a ve sledování je třeba pokračovat po dobu minimálně 4 týdnů po infuzi. Pacienty je třeba poučit, že v případě jakýchkoli známek nebo příznaků CRS musí ihned vyhledat lékařskou pomoc a být okamžitě léčeni.

Při prvních známkách CRS je nutné zahájit podpůrnou léčbu, léčbu tocilizumabem nebo tocilizumabem a kortikosteroidy, jak je uvedeno v tabulce 1. Po podání tocilizumabu a kortikosteroidů může přípravek Breyanzi pokračovat v expanzi (viz bod 5.2).

U pacientů, které postihne CRS, je nutné až do vymizení příznaků důkladně sledovat funkci srdce a ostatních orgánů. V případě závažného nebo život ohrožujícího CRS je třeba zvážit sledování na úrovni jednotky intenzivní péče a podpůrnou léčbu.

U pacientů s těžkým nebo na léčbu nereagujícím CRS je třeba zvážit, zda nedošlo k hemofagocytující lymfohistiocytóze / syndromu aktivace makrofágů (HLH/MAS). Léčbu HLH/MAS je třeba zajistit v souladu se směrnicemi zdravotnického zařízení.

Pokud během CRS existuje podezření na souběžnou neurologickou toxicitu, je třeba podat:

- kortikosteroidy za použití agresivnější intervence podle stupňů CRS a neurologické toxicity v tabulce 1 a 2,
- tocilizumab podle stupně CRS v tabulce 1,
- antikonvulziva podle stupně neurologické toxicity v tabulce 2.

**Tabulka 1: Stupně CRS a pokyny k jeho léčbě**

Stupeň CRS <sup>a</sup>	Tocilizumab	Kortikosteroidy <sup>b</sup>
<b>1. stupeň</b> Horečka	Objeví-li se 72 a více hodin po infuzi, podávejte symptomatickou léčbu.  Objeví-li se do 72 hodin po infuzi, zvažte i.v. podávání tocilizumabu v dávce 8 mg/kg po dobu 1 hodiny (dávka nesmí přesáhnout 800 mg).	Objeví-li se 72 a více hodin po infuzi, podávejte symptomatickou léčbu.  Objeví-li se do 72 hodin po infuzi, zvažte i.v. podávání dexamethasonu v dávce 10 mg každých 24 hodin.
<b>2. stupeň</b> Příznaky vyžadují a reagují na střední intervenci.  Horečka, potřeba kyslíku nižší než 40 % podílu vdechovaného kyslíku (FiO <sub>2</sub> ), nebo hypotenze odpovídající na podání tekutin nebo nízké dávky jednoho vazopresiva nebo orgánová toxicita 2. stupně.	Podávejte i.v. tocilizumab v dávce 8 mg/kg po dobu 1 hodiny (dávka nesmí přesáhnout 800 mg).	Objeví-li se 72 a více hodin po infuzi, zvažte i.v. podání dexamethasonu v dávce 10 mg každých 12 až 24 hodin.  Objeví-li se do 72 hodin po infuzi, podávejte dexamethason v dávce 10 mg i.v. každých 12 až 24 hodin.
	Pokud nedojde ke zlepšení do 24 hodin nebo dojde k rychlé progresi, zopakujte podávání tocilizumabu a zvyšte dávku a frekvenci dexamethasonu (10–20 mg i.v. každých 6 až 12 hodin).  Pokud nedojde ke zlepšení nebo bude pokračovat rychlá progresi, podejte maximální dávku dexamethasonu a v případě potřeby přejděte na methylprednisolon ve vysoké dávce 2 mg/kg. Po 2 dávkách tocilizumabu zvažte alternativní imunosupresiva. Nepřekročte 3 dávky tocilizumabu za 24 hodin nebo 4 dávky celkem.	
<b>3. stupeň</b> Příznaky vyžadují a reagují na agresivní intervenci.	Podle stupně 2.	Podávejte dexamethason v dávce 10 mg i.v. každých 12 hodin.

Stupeň CRS <sup>a</sup>	Tocilizumab	Kortikosteroidy <sup>b</sup>
Horečka, potřeba kyslíku větší nebo rovna 40 % FiO <sub>2</sub> nebo hypotenze vyžadující vysokou dávku nebo kombinaci vasopresiv nebo orgánová toxicita 3. stupně nebo transaminitida 4. stupně.	Pokud nedojde ke zlepšení do 24 hodin nebo dojde k rychlé progresi CRS, postupně zvyšujte dávku tocilizumabu a kortikosteroidů podle stupně 2.	
<b>4. stupeň</b> Život ohrožující příznaky.	Podle stupně 2.	Podávejte dexamethason v dávce 20 mg i.v. každých 6 hodin.
Potřeba podpory mechanickou ventilací nebo kontinuální venovenózní hemodialýzy ( <i>continuous veno-venous haemodialysis</i> , CVVHD) nebo orgánová toxicita 4. stupně (s výjimkou transaminitidy).	Pokud nedojde ke zlepšení během 24 hodin nebo dojde k rychlé progresi CRS, postupně zvyšujte dávku tocilizumabu a kortikosteroidů podle stupně 2.	

<sup>a</sup> Lee a kol., 2014.

<sup>b</sup> V případě zahájení podávání kortikosteroidů pokračujte do podání alespoň 3 dávek nebo do úplného vymizení příznaků a zvažte snížení dávky kortikosteroidů.

### Neurologické nežádoucí účinky

Po léčbě přípravkem Breyanzi se objevila neurologická toxicita, která může být závažná nebo život ohrožující, a to souběžně s CRS, po vymizení CRS nebo i v případě absence CRS. Medián doby do nástupu první příhody byl 9 dní (rozmezí: 1 až 66 dní). Mezi nejčastější neurologické příznaky patřily encefalopatie, třes, afázie, delirium, závratě a bolest hlavy (viz bod 4.8).

### *Sledování a léčba neurologické toxicity*

U pacientů je nutné po dobu prvního týdne po podání infuze 2 až 3krát překontrolovat možné známky a příznaky neurologické toxicity v kvalifikovaném léčebném centru. Frekvenci sledování pacienta po uplynutí prvního týdne má určit lékař a ve sledování je třeba pokračovat po dobu minimálně 4 týdnů po infuzi. Pacienty je třeba poučit, že v případě jakýchkoli známek a příznaků neurologické toxicity musí ihned vyhledat lékařskou pomoc a být okamžitě léčeni.

V případě podezření na neurologickou toxicitu je třeba zahájit léčbu dle doporučení v tabulce 2. Je nutné vyloučit jiné příčiny neurologických příznaků, včetně vaskulárních příhod. V případě závažných nebo život ohrožujících neurologických toxicit je třeba zajistit podpůrnou léčbu na úrovni jednotky intenzivní péče.

Pokud během neurologické toxicity existuje podezření na souběžný CRS, je nutné podat:

- kortikosteroidy za použití agresivnější intervence podle stupňů CRS a neurologické toxicity v tabulce 1 a 2,
- tocilizumab podle stupně CRS v tabulce 1,
- antikonvulziva podle stupně neurologické toxicity v tabulce 2.

### **Tabulka 2: Stupně neurologické toxicity a pokyny k její léčbě**



Stupeň NT <sup>a</sup>	Léčba kortikosteroidy a antikonvulzivy
<b>1. stupeň</b>	<p>Zahajte léčbu antikonvulzivy bez sedativního účinku (např. levetiracetam) k profylaxi epileptických záchvatů.</p> <p>Pokud se objeví 72 a více hodin po infuzi, pacienta sledujte.</p> <p>Pokud k nástupu dojde méně než 72 hodin po infuzi, podávejte dexamethason v dávce 10 mg i.v. každých 12 až 24 hodin po dobu 2 až 3 dní.</p>
<b>2. stupeň</b>	<p>Zahajte léčbu antikonvulzivy bez sedativního účinku (např. levetiracetam) k profylaxi epileptických záchvatů.</p> <p>Podávejte dexamethason v dávce 10 mg i.v. každých 12 hodin po dobu 2 až 3 dní nebo déle v případě přetrvávajících příznaků. Zvažte postupné snižování dávky u celkové expozice kortikosteroidům delší než 3 dny.</p> <p>Pokud po 24 hodinách nedojde ke zlepšení nebo dojde ke zhoršení neurologické toxicity, zvyšte dávku a/nebo frekvenci podávání dexamethasonu až na maximální dávku 20 mg i.v. každých 6 hodin.</p> <p>Pokud po dalších 24 hodinách nedojde ke zlepšení nebo dojde k rychlé progresi příznaků nebo se objeví život ohrožující komplikace, podejte methylprednisolon (úvodní dávka 2 mg/kg následovaná dávkou 2 mg/kg rozdělenou do 4 podání denně; postupně snižujte během 7 dní).</p>
<b>3. stupeň</b>	<p>Zahajte léčbu antikonvulzivy bez sedativního účinku (např. levetiracetam) k profylaxi epileptických záchvatů.</p> <p>Podávejte dexamethason v dávce 10 mg až 20 mg i.v. každých 8 až 12 hodin. Kortikosteroidy se nedoporučují u izolovaných bolestí hlavy 3. stupně.</p> <p>Pokud po 24 hodinách nedojde ke zlepšení nebo dojde ke zhoršení neurologické toxicity, zintenzivněte léčbu přechodem na methylprednisolon (dávka a frekvence podle 2. stupně).</p> <p>V případě podezření na otok mozku zvažte hyperventilaci a hyperosmolární léčbu. Podávejte vysokou dávku methylprednisolonu (1 až 2 g, opakujte každých 24 hodin dle potřeby; postupně snižujte dle klinické indikace) a cyklofosamid v dávce 1,5 g/m<sup>2</sup>.</p>
<b>4. stupeň</b>	<p>Zahajte léčbu antikonvulzivy bez sedativního účinku (např. levetiracetam) k profylaxi epileptických záchvatů.</p> <p>Podávejte dexamethason v dávce 20 mg i.v. každých 6 hodin.</p> <p>Pokud po 24 hodinách nedojde ke zlepšení nebo dojde ke zhoršení neurologické toxicity, přejděte na vysokou dávku methylprednisolonu (dávka a frekvence podle 2. stupně).</p> <p>V případě podezření na otok mozku zvažte hyperventilaci a hyperosmolární léčbu. Podávejte vysokou dávku methylprednisolonu (1 až 2 g, opakujte každých 24 hodin dle potřeby; postupně snižujte dle klinické indikace) a cyklofosamid v dávce 1,5 g/m<sup>2</sup>.</p>

<sup>a</sup> Kritéria NCI CTCAE v.4.03 pro hodnocení neurologických toxicit.

## Infekce a febrilní neutropenie

Přípravek Breyanzi se nesmí podávat pacientům s klinicky významnou aktivní infekcí nebo zánětlivým onemocněním. U pacientů se po podávání tohoto přípravku objevily závažné infekce, včetně život ohrožujících nebo fatálních infekcí (viz bod 4.8). U pacientů je nutné sledovat známky a příznaky infekce před a po podání infuze a náležitě je léčit. Profylaxi antimikrobiálními léky je třeba provádět podle standardních postupů zdravotnického zařízení.

U pacientů byla po léčbě přípravkem Breyanzi zaznamenána febrilní neutropenie (viz bod 4.8), která se může vyskytovat souběžně s CRS. V případě febrilní neutropenie je nutné infekci vyhodnotit a léčit širokospektrými antibiotiky, podáváním tekutin a další podpůrnou léčbou dle zdravotní indikace.

## Reaktivace viru

U imunosuprimovaných pacientů může dojít k reaktivaci viru (např. HBV, lidský herpesvirus 6 [HHV-6]).

Projevy reaktivace viru mohou komplikovat a opozdit diagnózu a vhodnou léčbu nežádoucích příhod souvisejících s CAR T-lymfocyty. Aby bylo možné tyto projevy odlišit od nežádoucích příhod souvisejících s CAR T-lymfocyty, je třeba provést vhodná diagnostická vyšetření.

U pacientů léčených léčivými přípravky namířenými proti B-buňkám může dojít k reaktivaci HBV, v některých případech vedoucí k fulminantní hepatitidě, selhání jater a úmrtí. U pacientů s HBV v anamnéze se doporučuje profylaktická antivirová supresivní léčba, aby se zabránilo reaktivaci HBV během a po léčbě přípravkem Breyanzi (viz bod 5.1).

## Sérologické testování

Vyšetření na HBV, HCV a HIV musí být provedeno před odběrem buněk na výrobu přípravku (viz bod 4.2).

## Prolongované cytopenie

Po lymfodepleční chemoterapii a infuzi přípravku Breyanzi se u pacientů mohou objevit cytopenie, které přetrvávají několik týdnů (viz bod 4.8). Před a po podání infuze přípravku Breyanzi je proto nutné sledovat krevní obraz. Prolongované cytopenie je nutné léčit v souladu s klinickými doporučeními.

## Hypogamaglobulinemie

U pacientů léčených přípravkem Breyanzi se může objevit aplazie B-buněk vedoucí k hypogamaglobulinemii. U pacientů léčených přípravkem Breyanzi byla hypogamaglobulinemie pozorována velmi často (viz bod 4.8). Po léčbě je nutné sledovat hladiny imunoglobulinů a poskytnout léčbu v souladu s klinickými doporučeními, včetně opatření proti infekcím, profylaxe antibiotiky a/nebo náhrady imunoglobulinů.

## Sekundární malignity

U pacientů léčených přípravkem Breyanzi se mohou rozvinout sekundární malignity. Pacienty je proto nutné po celý život sledovat s ohledem na sekundární malignity. Pokud se objeví sekundární malignita T-buněčného původu, je nutné kontaktovat společnost a vyžádat si pokyny k odběru vzorků nádorové tkáně na testování.

## Syndrom nádorového rozpadu (*tumour lysis syndrome, TLS*)

U pacientů léčených CAR T terapií se může objevit TLS. Aby se minimalizovalo riziko TLS, má se pacientům se zvýšenou hladinou kyseliny močové nebo vysokou nádorovou zátěží před infuzí

přípravku Breyanzi podat allopurinol nebo alternativní profylaxe. Znamky a příznaky TLS je nutné sledovat a léčit v souladu s klinickými doporučeními.

### Hypersenzitivní reakce

V souvislosti s infuzí přípravku Breyanzi se mohou objevit alergické reakce. Závažné hypersenzitivní reakce, včetně anafylaxe, mohou být způsobeny dimethylsulfoxidem.

### Interference se sérologickým testováním

U viru HIV a lentiviru používaného k výrobě přípravku Breyanzi existují omezené, krátké úseky identické genetické informace (RNA). Proto mohou u pacientů léčených přípravkem Breyanzi některé komerční testy nukleové kyseliny HIV poskytovat falešně pozitivní výsledek. Pacienti, kteří podstoupili léčbu přípravkem Breyanzi, nemají být testováni na HIV pomocí PCR testu.

### Předchozí transplantace kmenových buněk (GVHD)

Nedoporučuje se, aby pacienti, kteří podstoupili alogenní transplantaci kmenových buněk a trpí aktivní akutní nebo chronickou GVHD, tuto léčbu absolvovali, neboť existuje riziko, že by přípravek Breyanzi případně mohl GVHD zhoršit.

### Dlouhodobé následné sledování

Předpokládá se, že pacienti budou zařazeni a sledováni v registru s cílem lépe porozumět dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti přípravku Breyanzi.

### Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 12,5 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 0,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,2 mmol (nebo 6,5 mg) draslíku v jedné injekční lahvičce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

## **4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce**

U člověka nebyly provedeny žádné studie interakcí.

### Monoklonální protilátky namířené proti receptoru epidermálního růstového faktoru (anti-EGFR mabs)

Použití anti-EGFR monoklonálních protilátek po podání CAR T-lymfocytů může ovlivnit jejich dlouhodobou perzistenci, v současné době však nejsou k dispozici žádné klinické údaje.

### Živé vakcíny

Bezpečnost imunizace živými virovými vakcínami během léčby nebo po léčbě přípravkem Breyanzi nebyla studována. Vakcinace živými virovými vakcínami se nedoporučuje po dobu nejméně 6 týdnů před zahájením lymfodepleční chemoterapie, během léčby a do zotavení imunitního systému po léčbě.

## **4.6 Fertilita, těhotenství a kojení**

### Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen

Před zahájením léčby přípravkem Breyanzi je nutné u žen ve fertilním věku ověřit případné těhotenství pomocí těhotenského testu.

Informace o potřebě účinné antikoncepce u pacientů podstupujících lymfodepleční chemoterapii najdete v souhrnu údajů o přípravku pro fludarabin a cyklofosamid.

Neexistují dostatečné údaje o expozici, aby bylo možné poskytnout doporučení ohledně doby používání antikoncepce po léčbě přípravkem Breyanzi.

### Těhotenství

Údaje o podávání lisokabtagenu maraleucelu těhotným ženám nejsou k dispozici. Nebyly provedeny žádné studie reprodukční a vývojové toxicity na zvířatech, které by zhodnotily, zda může způsobovat poškození plodu při podávání těhotným ženám (viz bod 5.3).

Není známo, zda se může lisokabtagen maraleucel přenášet na plod. Na základě mechanismu účinku mohou transdukované buňky, pokud projdou placentou, způsobovat fetální toxicitu, včetně B-buněčné lymfocytopenie. Přípravek Breyanzi se proto u žen, které jsou těhotné, nebo u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje. Těhotné ženy je nutné poučit o potenciálních rizicích pro plod. Těhotenství po léčbě přípravkem Breyanzi je nutné prodiskutovat s ošetřujícím lékařem.

U novorozenců matek léčených přípravkem Breyanzi je třeba zvážit vyšetření hladin imunoglobulinů a B-buněk.

### Kojení

Není známo, zda se lisokabtagen maraleucel vylučuje do lidského mateřského mléka nebo zda se přenáší na kojene dítě. Ženy, které kojí, je nutné poučit o potenciálních rizicích pro kojene dítě.

### Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku lisokabtagenu maraleucelu na fertilitu.

## **4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje**

Přípravek Breyanzi může mít výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzhledem k potenciálním neurologickým příhodám, včetně změn duševního stavu nebo epileptických záchvatů souvisejících s podáním přípravku Breyanzi se mají pacienti léčení přípravkem Breyanzi vyhnout řízení nebo obsluhování velkých či potenciálně nebezpečných strojů po dobu alespoň 8 týdnů po podání infuze přípravku Breyanzi.

## **4.8 Nežádoucí účinky**

### Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky jakéhokoliv stupně byly neutropenie (67 %), anemie (48 %), CRS (39 %), únava (38 %) a trombocytopenie (37 %).

Mezi nejčastější závažné nežádoucí účinky patřily CRS (17 %), encefalopatie (11 %), infekce nespecifikovaným patogenem (6 %), neutropenie (4 %), trombocytopenie (4 %), afázie (4 %), pyrexie (4 %), onemocnění způsobená bakteriální infekcí (4 %), delirium (4 %), třes (4 %), febrilní neutropenie (3 %) a hypotenze (3 %).

Nejčastější nežádoucí účinky 3. nebo vyššího stupně zahrnovaly neutropenii (63 %), anemii (35 %), trombocytopenii (29 %), leukopenii (21 %), infekci nespecifikovaným patogenem (9 %) a febrilní neutropenii (8 %).

### Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Frekvence nežádoucích účinků vycházejí ze souhrnných údajů ze 4 studií (TRANSCEND [017001], TRANSCEND WORLD [JCAR017-BCM-001], PLATFORM [JCAR017-BCM-002] a OUTREACH [017007]), prováděných u 314 dospělých pacientů s rozmezím dávky 44-120 × 10<sup>6</sup> CAR+ životaschopných T-lymfocytů s R/R velkobuněčným B-lymfomem, definovaným jako DLBCL, PMBCL a FL3B, kterým byla podána dávka lisokabtagenu maraleucelu. Frekvence nežádoucích účinků z klinických studií vycházejí z frekvence nežádoucích příhod z jakýchkoliv příčin, kde část příhod související s nežádoucím účinkem může mít jiné příčiny.

Hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny níže. Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a frekvence MedDRA. Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) a méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

**Tabulka 3: Nežádoucí účinky identifikované u přípravku Breyanzi**

<b>Třídy orgánových systémů (SOC)</b>	<b>Frekvence</b>	<b>Nežádoucí účinky</b>
Infekce a infestace <sup>a</sup>	Velmi časté	Infekce – nespecifikovaný patogen Bakteriální infekční onemocnění
	Časté	Virová infekční onemocnění Mykotická infekční onemocnění
Poruchy krve a lymfatického systému	Velmi časté	Neutropenie Anemie Trombocytopenie Leukopenie
	Časté	Febrilní neutropenie Lymfopenie Hypofibrinogenemie Pancytopenie
Poruchy imunitního systému	Velmi časté	Syndrom z uvolnění cytokinů Hypogamaglobulinemie
	Méně časté	Hemofagocytující lymfohistiocytóza
Poruchy metabolismu a výživy	Časté	Hypofosfatemie
	Méně časté	Syndrom nádorového rozpadu
Psychiatrické poruchy	Velmi časté	Insomnie Delirium <sup>b</sup>
	Časté	Úzkost
Poruchy nervového systému	Velmi časté	Bolest hlavy <sup>c</sup> Encefalopatie <sup>d</sup> Závrat <sup>e</sup> Třes <sup>f</sup>
	Časté	Afázie <sup>g</sup> Periferní neuropatie <sup>h</sup> Poruchy zraku <sup>i</sup> Ataxie <sup>j</sup> Porucha chuti <sup>k</sup> Cerebelární syndrom <sup>l</sup> Cerebrovaskulární porucha <sup>m</sup> Záchvaty <sup>n</sup>
	Méně časté	Paralýza faciálního nervu Otok mozku

Třídy orgánových systémů (SOC)	Frekvence	Nežádoucí účinky
Srdeční poruchy	Velmi časté	Tachykardie
	Časté	Arytmie <sup>o</sup> Kardiomyopatie
Cévní poruchy	Velmi časté	Hypotenze Hypertenze
	Časté	Trombóza <sup>p</sup>
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy	Velmi časté	Kašel Dyspnoe <sup>q</sup>
	Časté	Pleurální výpotek Hypoxie Plicní edém
Gastrointestinální poruchy	Velmi časté	Nauzea Zácpa Průjem Bolest břicha Zvracení
	Časté	Gastrointestinální krvácení <sup>r</sup>
Poruchy kůže a podkožní tkáně	Velmi časté	Vyrážka
Poruchy ledvin a močových cest	Velmi časté	Akutní poškození ledvin <sup>s</sup>
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace	Velmi časté	Únava Pyrexie Edém <sup>t</sup>
	Časté	Zimnice
Poranění, otravy a procedurální komplikace	Časté	Reakce spojené s infuzí

<sup>a</sup> Infekce a infestace jsou řazeny podle skupinových termínů MedDRA vysoké úrovně.

<sup>b</sup> Delirium zahrnuje agitovanost, delirium, bludy, dezorientaci, halucinace, vizuální halucinace, podrážděnost a neklid.

<sup>c</sup> Bolest hlavy zahrnuje bolest hlavy, migrénu, sinusovou bolest hlavy.

<sup>d</sup> Encefalopatie zahrnuje amnézii, kognitivní poruchu, stav zmatenosti, depersonalizaci/derealizaci, sníženou úroveň vědomí, poruchu pozornosti, encefalopatii, plochý afekt, letargii, leukoencefalopatii, ztrátu vědomí, zhoršení paměti, duševní poruchu, změny duševního stavu, paranoii, somnolenci, stupor.

<sup>e</sup> Závrať zahrnuje závrať, presynkopu, synkopu.

<sup>f</sup> Třes zahrnuje esenciální třes, intenční třes, klidový třes, třes.

<sup>g</sup> Afázie zahrnuje afázii, zmatenou řeč, dysartrii, dysfonii, pomalou řeč.

<sup>h</sup> Periferní neuropatie zahrnuje hyperestezii, hypoestezii, hyporeflexii, periferní neuropatii, parestézii, periferní motorickou neuropatii, periferní senzickou neuropatii, ztrátu smyslového vnímání.

<sup>i</sup> Poruchy zraku zahrnují slepotu, jednostrannou slepotu, pohledovou obrnu, mydriázu, nystagmus, rozmazané vidění, poruchu zorného pole, zhoršení zraku.

<sup>j</sup> Ataxie zahrnuje ataxii, poruchu chůze.

<sup>k</sup> Porucha chuti zahrnuje dysgeuzii, poruchu chuti.

<sup>l</sup> Cerebelární syndrom zahrnuje poruchu rovnováhy, dysdiadochokinezi, dyskinezi, dysmetrii, poruchu koordinace ruka-oko.

<sup>m</sup> Cerebrovaskulární porucha zahrnuje cévní mozkovou příhodu, mozkovou žilní trombózu, intrakraniální krvácení, tranzitorní ischemickou ataku.

<sup>n</sup> Záchvat zahrnuje záchvat, status epilepticus.

<sup>o</sup> Arytmie zahrnuje arytmiu, fibrilaci síní, úplnou atrioventrikulární blokádu, atrioventrikulární blokádu druhého stupně, supraventrikulární tachykardii, ventrikulární tachykardii.

<sup>p</sup> Trombóza zahrnuje hlubokou žilní trombózu, embolii, plicní embolii, trombózu, trombózu duté žíly, žilní trombózu končetiny.

<sup>q</sup> Dyspnoe zahrnuje akutní poruchu dýchání, dušnost, dušnost při zátěži, respirační selhání.

<sup>r</sup> Gastrointestinální krvácení zahrnuje krvácení ze žaludečního vředu, gastrointestinální krvácení, hematochézii, melénu, rektální krvácení, krvácení do horní části trávicího traktu.

<sup>s</sup> Akutní poškození ledvin zahrnuje akutní poškození ledvin, zvýšenou hladinu kreatininu v krvi, snížení rychlosti glomerulární filtrace, selhání ledvin, poškození funkce ledvin, poranění ledvin.

<sup>t</sup> Edém zahrnuje generalizovaný edém, místní edém, edém, edém genitálií, periferní edém, periferní otoky, edém skrota, otok.

## Popis vybraných nežádoucích účinků

### *Syndrom z uvolnění cytokinů*

CRS se objevil u 39 % pacientů, z nichž 3 % trpěla CRS 3. stupně nebo 4. stupně (závažným či život ohrožujícím CRS). Nedošlo k žádným fatálním příhodám. Mezi pacienty, kteří zemřeli po podání přípravku Breyanzi, byli 4, u nichž v době smrti přetrvával CRS. Medián doby nástupu byl 5 dní (rozmezí: 1 až 14 dní) a medián doby trvání byl 5 dní (rozmezí: 1 až 17 dní).

Nejčastějšími projevy CRS byly pyrexie (37 %), hypotenze (18 %), tachykardie (13 %), zimnice (10 %) a hypoxie (9 %). Pokyny ke sledování a léčbě viz bod 4.4.

V klinických studiích byl 57 z 314 (18 %) pacientů po infuzi přípravku Breyanzi podán tocilizumab a/nebo kortikosteroidy k léčbě CRS. Třiceti třem (11 %) pacientům byl podán pouze tocilizumab, 21 (7 %) tocilizumab i kortikosteroidy a 3 pacienti (1 %) byli léčeni pouze kortikosteroidy.

### *Neurologické nežádoucí účinky*

Neurologické toxicity související s CAR pozitivními T-lymfocyty se na základě posouzení zkoušejícím vyskytly u 26 % pacientů léčených přípravkem Breyanzi, včetně neurologické toxicity 3. nebo 4. stupně u 10 % pacientů (žádné fatální příhody). Medián doby do nástupu první příhody byl 9 dní (rozmezí: 1 až 66 dní); 99 % všech neurologických toxicit se objevilo během prvních 8 týdnů po infuzi přípravku Breyanzi. Medián doby trvání neurologických toxicit byl 10 dní (rozmezí: 1 až 84 dní).

Nejčastějšími projevy neurologických toxicit byly encefalopatie (17 %), třes (10 %), afázie (9 %), delirium (6 %), ataxie (4 %), závrať (3 %) a bolest hlavy (3 %). U pacientů léčených přípravkem Breyanzi se rovněž vyskytly záchvaty (1 %) a edém mozku (0,3 %). Pokyny ke sledování a léčbě neurologických toxicit viz bod 4.4.

### *Febrilní neutropenie a infekce*

U 9 % pacientů byla po podání přípravku Breyanzi pozorována febrilní neutropenie. Infekce (všechny stupně) se objevily u 39 % pacientů. Infekce 3. nebo vyššího stupně se objevily u 12 % pacientů. Infekce 3. nebo vyššího stupně nespécifikovaným patogenem se objevily u 9 % pacientů, bakteriální infekce se objevily u 4 % pacientů, mykotické infekce u 1 % pacientů a virové infekce u 0,6 % pacientů.

Oportunní infekce (všech stupňů) byly pozorovány u 4 % ze 314 pacientů léčených přípravkem Breyanzi v rámci sloučených studií s DLBCL; oportunní infekce 3. nebo vyššího stupně se přitom vyskytly u 2 % pacientů.

U 314 pacientů léčených přípravkem Breyanzi v rámci sloučených studií s DLBCL byly hlášeny 4 fatální infekce, z nichž jedna byla hlášena jako fatální oportunní infekce. Pokyny ke sledování a léčbě viz bod 4.4.

### *Prolongované cytopenie*

Cytopenie 3. nebo vyššího stupně přítomné 29. den po podání přípravku Breyanzi se vyskytly u 39 % pacientů a zahrnovaly trombocytopenii (31 %), neutropenii (20 %) a anemii (6 %). Pokyny ke sledování a léčbě viz bod 4.4.

Z celkem 275 pacientů léčených v rámci studií TRANSCEND a TRANSCEND WORLD (kohorta 1 a kohorta 3), u nichž byla 29. den na základě laboratorních nálezů prokázána trombocytopenie 3. nebo 4. stupně (n = 88) nebo neutropenie 3. nebo 4. stupně (n = 60) nebo anemie 3. nebo 4. stupně (n = 18) a pro které byly k dispozici kontrolní laboratorní výsledky cytopenie, byl medián doby (min., max.) do vymizení (cytopenie zotavující se na 2. nebo nižší stupeň) následující (ve dnech): trombocytopenie 41 dní (5, 328); neutropenie 29 dní (2, 336) a anemie 33 dní (3, 150).

#### *Hypogamaglobulinemie*

Hypogamaglobulinemie se vyskytla u 12 % pacientů. Pokyny ke sledování a léčbě viz bod 4.4.

#### Imunogenita

Přípravek Breyanzi může potenciálně indukovat protilátky proti tomuto léčivému přípravku. U studie TRANSCEND a studie TRANSCEND WORLD byla humorální imunogenita přípravku Breyanzi měřena stanovením protilátek proti CAR před podáním přípravku a po něm. Ve sloučených studiích byly preexistující antiterapeutické protilátky (ATA) detekovány u 9 % (29/309) pacientů a ATA vyvolané nebo posílené léčbou byly detekovány u 15 % (46/304) pacientů. Souvislost mezi stavem ATA a účinností, bezpečností nebo farmakokinetikou neumožňuje učinit žádné závěry z důvodu omezeného počtu pacientů s ATA.

#### Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v [Dodatku V](#).

### **4.9 Předávkování**

Nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií o předávkování přípravkem Breyanzi.

## **5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

### **5.1 Farmakodynamické vlastnosti**

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: **dosud nepřidělen**

#### Mechanismus účinku

Breyanzi je geneticky modifikovaná, autologní buněčná imunoterapie cílená proti antigenu CD19 podávaná ke snížení variability v definovaném poměru dávky CD8+ a CD4+ T-lymfocytů. CAR se skládá z jednořetězcového variabilního fragmentu (*single chain variable fragment*, scFv) myši FMC63 monoklonální protilátky, pantové oblasti IgG4, transmembránové domény CD28, 4-1BB (CD137) kostimulační domény a zeta aktivační domény CD3. Zeta signalizace CD3 je důležitá pro inicializaci aktivity T-lymfocytů a protinádorové aktivity, zatímco 4-1BB (CD137) signalizace zvyšuje expanzi a perzistenci přípravku Breyanzi (viz také bod 5.2).

Navázání CAR na CD19 exprimovaný na buněčném povrchu nádorových a normálních B-buněk vyvolává aktivaci a proliferaci CAR T-lymfocytů, uvolňování prozánětlivých cytokinů a cytotoxické zabíjení cílových buněk.



## Klinická účinnost a bezpečnost

### *TRANSCEND*

Protinádorová aktivita a bezpečnost přípravku Breyanzi byla hodnocena v otevřené, jednoramenné, multicentrické studii TRANSCEND (017001) u pacientů s relabujícím nebo refrakterním (R/R) agresivním B-buněčným non-Hodgkinovým lymfomem (NHL). Pacienty vhodnými k zařazení do této studie byli pacienti ve věku  $\geq 18$  let s R/R DLBCL blíže neurčeným (*not otherwise specified*, NOS); s onemocněním na základě klasifikace WHO z roku 2008 zahrnujícím DLBCL vznikající z indolentního lymfomu (transformovaného z folikulárního lymfomu, lymfomu z marginální zóny, chronické lymfocytární leukemie / lymfomu z malých lymfocytů, Waldenströmovy makroglobulinemie apod.) a B-buněčného lymfomu vysokého stupně; primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem (*primary mediastinal large B-cell lymphoma*, PMBCL) a folikulárním lymfomem grade 3B (FL3B), kteří podstoupili alespoň 2 linie léčby nebo absolvovali autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Pacienti s dalšími subtypy DLBCL nebyli do studie zařazení a poměr přínosu a rizika nebyl stanoven. Studie zahrnovala pacienty s výkonnostním stavem podle ECOG (*Eastern Cooperative Group*)  $< 2$ , pacienty před autologní a/nebo alogenní transplantací hematopoetických kmenových buněk (*haematopoietic stem cell transplant*, HSCT) a pacienty s prezencí sekundárního lymfomu CNS. Pacienti, kteří podstoupili předchozí anti-CD19 terapii, byli způsobilí za předpokladu, že pozitivita na CD19 byla potvrzena biopsií nádoru kdykoli po provedení anti-CD19 terapie. Ze studie byli vyloučeni pacienti s clearance kreatininu nižší než 30 ml/min, alaninaminotransferázou  $> 5$ násobek horní hranice normy a ejekční frakcí levé komory  $< 40$  %.

Nebyl stanoven žádný minimální požadavek na hodnoty krevního obrazu; pacienti byli způsobilí k zařazení do studie, pokud zkoušející vyhodnotil, že mají dostatečnou funkci kostní dřeně k léčbě lymfodepleční chemoterapií. Základní demografické charakteristiky a charakteristiky související s onemocněním viz tabulka 4.

Léčba sestávala z lymfodepleční (LD) chemoterapie, podání fludarabinu v dávce 30 mg/m<sup>2</sup>/den a cyklofosfamidu v dávce 300 mg/m<sup>2</sup>/den po dobu 3 dní a následně přípravku Breyanzi po 2 až 7 dnech U pacientů léčených dávkami v rozmezí 44-120  $\times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů byl medián dávky přípravku Breyanzi 87  $\times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů.

Protinádorová léčba za účelem kontroly onemocnění (překlenovací terapie) byla mezi aferézou a lymfodeplecí povolena. Z 229 pacientů léčených přípravkem Breyanzi 60 % podstoupilo protinádorovou léčbu za účelem kontroly onemocnění; typ a délka překlenovací terapie byly ponechány na rozhodnutí zkoušejícího.

Medián doby od leukaferézy do dostupnosti přípravku byl 24 dní (rozmezí: 17 až 51 dní). Kromě toho byl medián doby od leukaferézy do infuze 38,5 dní (rozmezí: 27 až 156 dní).

Z 298 pacientů, kteří podstoupili leukaferézu a pro něž byl přípravek Breyanzi připraven v rozmezí dávky 44-120  $\times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů, byl přípravek Breyanzi podán 229 pacientům a 69 pacientům podán nebyl. U 27 z těchto 69 pacientů došlo k selhání výroby, přičemž 2 pacientům nebyl podán přípravek Breyanzi vůbec a 25 pacientů bylo léčeno hodnoceným přípravkem, který nesplňoval specifikace při propouštění. Ostatních 42 pacientů nebylo léčeno přípravkem Breyanzi nejčastěji z důvodu úmrtí (n = 29) nebo komplikace onemocnění (n = 6). Počet pacientů, u nichž bylo možné vyhodnotit účinnost, byl 216 (soubor pro stanovení účinnosti). U 13 pacientů nebylo možné účinnost vyhodnotit, včetně 10 pacientů, kteří neměli při vstupu do studie onemocnění potvrzené pozitronovou emisní tomografií (PET+) nebo PET+ onemocnění po protinádorové léčbě ke kontrole onemocnění nebylo potvrzeno nezávislou hodnotící komisí (*Independent Review Committee*, IRC) a 3 pacientů, kde to nebylo možné z jiných důvodů.

Tabulka 4 shrnuje základní charakteristiky pacientů a onemocnění ve studii TRANSCEND.

**Tabulka 4: Základní demografické charakteristiky a charakteristiky související s onemocněním pro TRANSCEND**

Charakteristika	Všichni podstoupivší leukoferézu (n = 298)	Léčení přípravkem Breyanzi (n = 229)
Medián věku, roky (rozmezí)	62,0 (18; 82)	62,0 (18; 82)
≥ 65 let, n (%)	116 (38,9)	89 (38,9)
≥ 75 let, n (%)	25 (8,4)	19 (8,3)
Pohlaví, n (%)		
Muž	197 (66,1)	153 (66,8)
Žena	101 (33,9)	76 (33,2)
Předchozí HSCT, n (%)	106 (35,6)	87 (38,0)
Autologní HSCT	100 (33,6)	84 (36,7)
Alogenní HSCT	11 (3,7)	8 (3,5)
Výkonnostní stav podle ECOG		
ECOG 0-1, n (%)	290 (97,3)	225 (98,3)
ECOG 2, n (%)	8 (2,7)	4 (1,7)
Histologický subtyp onemocnění, n (%)		
DLBCL, NOS	142 (47,7)	117 (51,1)
DLBCL transformovaný z indolentního lymfomu	87 (29,2)	60 (26,2)
B-buněčný lymfom vysokého stupně <sup>a</sup>	48 (16,1)	33 (14,4)
PMBCL	15 (5,0)	15 (6,6)
FL3B	6 (2,0)	4 (1,7)
Medián počtu předchozích terapií (rozmezí)	3 (1-12)	3 (1-8)
Chemorefrakterní <sup>b</sup> , n (%)	212 (71,1)	160 (69,9)
Refrakterní <sup>c</sup> , n (%)	246 (82,6)	186 (81,2)
Relabující <sup>d</sup> , n (%)	52 (17,4)	43 (18,8)
Sekundární lymfom CNS v době podání infuze přípravku Breyanzi, n (%)	7 (2,3)	6 (2,6)
Nikdy nedosažená CR při předchozích terapiích, n (%)	141 (47,3)	103 (45,0)

<sup>a</sup> Přestavba genů MYC a BCL2 a/nebo BCL6 s histologickým nálezem DLBCL.

<sup>b</sup> Chemorefrakterní je definováno jako výskyt stabilního onemocnění (*stable disease*, SD) nebo progresivního onemocnění (*progressive disease*, PD) v reakci na poslední chemoterapii nebo relaps < 12 měsíců po autologní transplantaci kmenových buněk.

<sup>c</sup> Stav byl refrakterní, dosáhl-li pacient horší než kompletní odpovědi (*complete response*, CR) na poslední předchozí terapii.

<sup>d</sup> Stav byl relabující, dosáhl-li pacient CR na poslední předchozí terapii.

Účinnost byla hodnocena na základě primárního cílového parametru, četnosti celkové léčebné odpovědi (*overall response rate*, ORR), a sekundárních cílových parametrů, které zahrnovaly četnost kompletní léčebné odpovědi (CR), dobu trvání odpovědi (*duration of response*, DOR) stanovenou nezávislou hodnotící komisí (tabulka 5 a obrázek 1). Medián doby následného sledování ve studii byl 19,9 měsíce (rozmezí 0,2 až 45,2 měsíce).

**Tabulka 5: studie TRANSCEND: výskyt odpovědi, doba trvání odpovědi (hodnocení IRC)**

	<b>Všichni podstupivší leukoferézu (n = 298)</b>	<b>Soubor pro stanovení účinnosti (n = 216)</b>
<b>Celkový výskyt odpovědi<sup>a</sup>, n (%)</b> [95% CI]	179 (60,1) [54,3; 65,7]	157 (72,7) [66,2; 78,5]
Kompletní odpověď, n (%) [95% CI]	128 (43,0) [37,3; 48,8]	115 (53,2) [46,4; 60,0]
Částečná odpověď, n (%) [95% CI]	51 (17,1) [13,0; 21,9]	42 (19,4) [14,4; 25,4]
<b>Doba trvání odpovědi (DOR)<sup>a,b</sup> (měsíce)</b>	n = 179	n = 157
Medián [95% CI] <sup>c</sup>	16,8 [8,0; NR]	20,2 [8,2; NR]
Rozmezí	0,0; 27,4	0,0; 27,4
<b>DOR, je-li nejlepší odpověď CR<sup>a,b</sup> (měsíce)</b>	n = 128	n = 115
Medián [95% CI] <sup>c</sup>	26,1 [23,1; NR]	26,1 [23,1; NR]
Rozmezí	0,0; 27,4	0,0; 27,4

CI = interval spolehlivosti (*confidence interval*); CR = kompletní odpověď (*complete response*); IRC = nezávislá hodnotící komise (*Independent Review Committee*); KM = Kaplan-Meier; NR = není dosaženo (*not reached*)

<sup>a</sup> Podle kritérií Lugano 2014 na základě hodnocení IRC.

<sup>b</sup> Úmrtí po zahájení protinádorové léčby byla považována za příhody.

<sup>c</sup> Metoda KM byla použita k získání oboustranných 95% CI.

<sup>+</sup> Probíhající.

Medián doby do odpovědi (CR nebo částečná odpověď [PR]) byl 1,0 měsíc (rozmezí: 0,7 až 8,9 měsíce). Medián doby do CR byl 1,0 měsíc (rozmezí: 0,8 až 12,5 měsíce). Doby trvání odpovědi byly delší u pacientů, kteří dosáhli CR, ve srovnání s pacienty s nejlepší PR.

Ve studii TRANSCEND bylo léčeno 6 pacientů se sekundárním lymfomem CNS, u kterých bylo možné vyhodnotit účinnost. Tři z těchto šesti pacientů dosáhli CR; u 2 ze 3 pacientů se vyskytly dlouhodobé remise v délce 23 měsíců, které pokračovaly v době ukončení studie. Bezpečnostní profil těchto pacientů se sekundárním lymfomem CNS byl shodný s bezpečnostním profilem pozorovaným v celkové populaci.

V souboru pro stanovení účinnosti byly výsledky ORR u PMBCL 79 % (11/14 pacientů) a u FL3B 100 % (4/4 pacientů). Výskyt CR byl 50 % pro PMBCL a 100 % pro FL3B. Bezpečnostní profil byl u všech těchto subtypů konzistentní.

V souboru pro stanovení účinnosti byly výsledky ORR u pacientů s DLBCL transformovaným (t) z předchozího indolentního lymfomu vzniklého z folikulárního lymfomu (FL) 86 % (38/44 pacientů), z lymfomu z marginální zóny (MZL) 43 % (3/7 pacientů), z chronické lymfocytární leukemie / lymfomu z malých lymfocytů (CLL/SLL) 50 % (2/4 pacientů) a z Waldenströmovy makroglobulinemie (WM) 50 % (1/2 pacientů). Četnost CR byla 61,4 % u tFL, 29 % u tMZL, 25 % u tCLL/SLL (Richterův syndrom) a 0 % u WM. Bezpečnostní profil byl konzistentní napříč všemi těmito subtypy. Setrvalá remise (tj. DOR  $\geq$  12 měsíců) byla pozorována u pacientů s tFL a tMZL. U pacientů s tCLL/SLL (4 pacienti) a tWM (2 pacienti), u nichž byly zaznamenány maximální DOR 2 měsíce, respektive 5,3 měsíců, jsou však k dispozici jen velmi omezené zkušenosti. Bezpečnostní profil byl konzistentní napříč těmito subtypy.

V klinických studiích s přípravkem Breyanzi bylo 89 (39 %) z 229 pacientů ve studii TRANSCEND ve věku 65 let a starších a 19 (8 %) bylo ve věku 75 let a starších. Bezpečnost a účinnost přípravku Breyanzi pozorovaná u těchto pacientů a mladších pacientů byla obdobná.


Jedenáct pacientů absolvovalo předchozí anti-CD19 terapii a výsledky v rámci účinnosti a bezpečnosti u nich byly podobné jako v celkové populaci. U všech pacientů byl CD19 exprimován před podáním infuze přípravku Breyanzi.

S použitím přípravku Breyanzi u pacientů s výkonnostním stavem dle ECOG 2 před aferézou (4 pacienti) a před alogenní HSCT (8 pacientů) jsou k dispozici jen omezené zkušenosti.

Z 229 pacientů léčených přípravkem Breyanzi byl většině těchto pacientů (n = 209) podán přípravek Breyanzi v doporučeném poměru složky CD4 ke složce CD8, a to v rozmezí 0,8 až 1,2. S použitím přípravku Breyanzi mimo uvedený poměr rozmezí složky CD4 ke složce CD8 jsou jen omezené zkušenosti (n = 19 nad hodnotou 1,2; n = 1 pod hodnotou 0,8), což limituje interpretaci údajů z této podskupiny.

Ze 115 pacientů, kteří dosáhli CR, se u 82 (71 %) vyskytla remise v délce minimálně 6 měsíců a u 72 (63 %) remise trvala minimálně 12 měsíců.

### Obrázek 1: Doba trvání odpovědi u respondérů na základě hodnocení IRC, TRANSCEND, soubor pro stanovení účinnosti



CR = úplná odpověď; PR = částečná odpověď

Úmrtí po zahájení protinádorové léčby byla považována za příhody.

Jedenáct pacientů s anamnézou hepatitidy B nebo hepatitidy C bylo léčeno přípravkem Breyanzi bez reaktivace hepatitidy a zároveň podstoupilo antivirovou supresivní léčbu v souladu s klinickými doporučeními (viz bod 4.4).

### TRANSCEND WORLD

TRANSCEND WORLD je probíhající jednoramenná, multicentrická studie fáze 2. Účelem kohorty 1 je poskytnout klinické zkušenosti s přípravkem Breyanzi v Evropě při léčbě dospělých pacientů s velkobuněčným B-lymfomem po nejméně dvou předchozích léčbách, definovaným jako R/R DLBCL (DLBCL NOS [de novo], transformovaný FL), B-buněčným lymfomem vysokého stupně s přestavbou genů MYC a BCL2 a/nebo BCL6 s histologickým nálezem DLBCL a FL3B podle klasifikace WHO 2016. Pacienti, kteří dříve podstoupili anti-CD19 terapii, byli ze studie vyloučeni. Základní demografické charakteristiky a charakteristiky související s onemocněním viz tabulka 6.

**Tabulka 6: Základní demografické charakteristiky a charakteristiky související s onemocněním pro TRANSCEND WORLD (kohorta 1)**

Charakteristika	Všichni podstoupivší leukaferézu (n = 45)	Léčení přípravkem Breyanzi (n = 36)
Medián věku, roky (rozmezí)	64,0 (26; 73)	61,5 (26,0; 72,0)
≥ 65 let, n (%)	19 (42,2)	14 (38,9)
≥ 75 let, n (%)	0	0
Pohlaví, n (%)		
Muž	30 (66,7)	25 (69,4)
Žena	15 (33,3)	11 (30,6)
Předchozí HSCT, n (%)		
Autologní HSCT	14 (31,1)	12 (33,3)
Alogenní HSCT	0	0
Výkonnostní stav podle ECOG (při screeningu)	26 (57,8)	19 (52,8)
ECOG 0-1, n (%)	18 (40,0)	16 (44,4)
ECOG 2, n (%)	1 (2,2)	1 (2,8)
Histologický subtyp onemocnění, n (%)		
DLBCL, NOS	36 (80,0)	31 (86,1)
B-buněčný lymfom vysokého stupně <sup>a</sup>	7 (15,6)	4 (11,1)
PMBCL	0	0
FL3B	2 (4,4)	1 (2,8)
Chemorefrakterní <sup>b</sup> , n (%)	37 (82,2)	29 (80,6)
Refrakterní <sup>c</sup> , n (%)	36 (80,0)	28 (77,8)
Relabující <sup>d</sup> , n (%)	9 (20,0)	8 (22,2)

<sup>a</sup> Přestavba genů MYC a BCL2 a/nebo BCL6 s histologickým nálezem DLBCL.

<sup>b</sup> Chemorefrakterní je definováno jako výskyt stabilního onemocnění (SD) nebo progresivního onemocnění (PD) v reakci na poslední chemoterapii nebo relaps < 12 měsíců po autologní transplantaci kmenových buněk.

<sup>c</sup> Stav byl refrakterní, dosáhl-li pacient méně než kompletní odpovědi (CR) na poslední předchozí terapii.

<sup>d</sup> Stav byl relabující, dosáhl-li pacient CR na poslední předchozí terapii.

V době ukončení sběru údajů (4. ledna 2021) bylo 45 pacientů v kohortě 1 podrobena leukaferéze a 36 pacientů bylo léčených přípravkem Breyanzi, s mediánem doby sledování 11,6 měsíce. Medián doby od leukaferézy do dostupnosti přípravku činil 29 dní (rozmezí: 24 až 38 dní). U skupiny léčené přípravkem Breyanzi byla ORR 61,1 % (95% CI: 43,5-76,9) a výskyt CR činil 33,3 % (95% CI: 18,6-51,0). Zátěž způsobená onemocněním a základní demografické údaje svědčily o pokročilých agresivních charakteristikách onemocnění. Bezpečnostní profil přípravku Breyanzi byl konzistentní v celé sdružené populaci, u které se sledovala bezpečnost. Nežádoucí účinky spojené s lisokabtagenem maraleucelem viz bod 4.8.

#### *Pediatriká populace*

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Breyanzi u jedné nebo více podskupin pediatriké populace u pediatrikých pacientů s hmotností minimálně 6 kg k léčbě novotvarů ze zralých B-buněk (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

## 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Ve studii TRANSCEND vykazoval přípravek Breyanzi po infuzi počáteční expanzi následovanou biexponenciálním poklesem. Medián doby maximální expanze v periferní krvi nastal 11 dní po první infuzi. Přípravek Breyanzi přetrvával v periferní krvi po dobu až 2 let.

Respondéři (n = 150) měli 2,85krát vyšší medián  $C_{\max}$  než nonrespondéři (n = 45) (33 766,0 versus 11 846,0 kopií/ $\mu\text{g}$ ). Respondéři měli 2,22krát vyšší medián  $AUC_{0-28d}$  než nonrespondéři (257 769,0 versus 116 237,3 dne \* kopií/ $\mu\text{g}$ ).

Pacienti ve věku < 65 let (n = 145) měli 2,93krát a 2,35krát vyšší medián  $C_{\max}$  a  $AUC_{0-28d}$ , v uvedeném pořadí, ve srovnání s pacienty ve věku  $\geq$  65 let (n = 102, včetně 77 pacientů ve věku 65–74 let, 24 ve věku 75–84 let a 1 ve věku  $\geq$  85 let). Pohlaví a tělesná hmotnost nevykazovaly jasné vztahy k  $C_{\max}$  a  $AUC_{0-28d}$ .

## 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Testy genotoxicity a studie kancerogenity nebyly provedeny.

Studie *in vitro* expanze nepřinesly u T-lymfocytů přípravku Breyanzi od zdravých dárců a pacientů žádný důkaz transformace a/nebo imortalizace a žádnou preferenční integraci v blízkosti dotčených genů.

Vzhledem k charakteru přípravku nebyly provedeny neklinické studie fertility, reprodukce ani vývoje.

# 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

## 6.1 Seznam pomocných látek

Cryostor (R) CS10  
Chlorid sodný  
Natrium-glukonát  
Trihydrát natrium-acetátu  
Chlorid draselný  
Chlorid hořečnatý  
Lidský albumin  
Racemický tryptofan  
Kyselina oktanová  
Voda pro injekci

## 6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

## 6.3 Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička při uchovávání v plynné fázi kapalného dusíku

13 měsíců.

Po rozmrazení

Přípravek je třeba podat okamžitě po rozmrazení. Doba uchovávání přípravku při pokojové teplotě (15 - 25 °C) nesmí přesáhnout 2 hodiny.

Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

#### 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Přípravek Breyanzi musí být uchováván a přepravován zmrazený v plynné fázi kapalného dusíku ( $\leq -130$  °C). Zmrazený musí zůstat, dokud není pacient připraven k léčbě, aby byla zajištěna dostupnost životaschopných buněk k podání pacientovi. Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rozmrazení jsou uvedeny v bodě 6.3.

#### 6.5 Druh obalu a obsah balení

Přípravek Breyanzi se dodává v kryoprezervačních injekčních lahvičkách vyrobených z cyklického olefinového kopolymeru. Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje 4,6 ml buněčné disperze.

CAR+ životaschopné T-lymfocyty (buněčná složka CD8+ nebo buněčná složka CD4+) jsou umístěny v samostatných krabičkách obsahujících až 4 injekční lahvičky pro každou složku, v závislosti na koncentraci CAR+ životaschopných T-lymfocytů v kryoprezervovaném léčivém přípravku.

Krabičky s buněčnou složkou CD8+ a buněčnou složkou CD4+ jsou umístěny v jedné vnější krabičce.

#### 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

##### Opatření, která je třeba přijmout před manipulací nebo podáním léčivého přípravku

- Přípravek Breyanzi je třeba v rámci zdravotnického zařízení přepravovat v uzavřených, nerozbitných, nepropustných přepravnících.
- Tento léčivý přípravek obsahuje lidské krevní buňky. Zdravotničtí pracovníci, kteří manipulují s přípravkem Breyanzi, mají dodržovat vhodná preventivní opatření (použití rukavic, ochranného oděvu a ochrana očí), aby se zabránilo možnému přenosu infekčních chorob.

##### Příprava před podáním

###### *Před rozmrazením injekčních lahviček*

- Ověřte totožnost pacienta a identifikační údaje pacienta uvedené na přepravním obalu.
- Přípravek Breyanzi je složen z CAR+ životaschopných T-lymfocytů, které jsou připraveny jako samostatné buněčné složky CD8+ a CD4+; ke každé buněčné složce je k dispozici samostatný propouštěcí certifikát infuze (RfIC). V RfIC (umístěný uvnitř přepravního obalu) si přečtete informace o počtu stříkaček, které jsou zapotřebí, a podávaném objemu buněčných složek CD8+ a CD4+ (štítky stříkaček jsou poskytovány s RfIC).
- Předem potvrďte čas infuze a přizpůsobte čas zahájení rozmrazování přípravku Breyanzi tak, aby byl k dispozici pro infuzi, až bude připraven pacient.

**Poznámka:** Po vyjmutí injekčních lahviček s CAR+ životaschopnými T-lymfocyty (buněčné složky CD8+ a CD4+) z mrazicí skladovací jednotky musí být rozmrazení dokončeno a buňky podány do 2 hodin.

###### *Rozmrazení injekčních lahviček*

- Ověřte totožnost pacienta a identifikační údaje pacienta uvedené na vnější krabičce a propouštěcím certifikátu infuze (RfIC).
- Vyjměte krabičku s buněčnou složkou CD8+ a krabičku s buněčnou složkou CD4+ z vnější krabičky.
- Otevřete každou vnitřní krabičku a vizuálně překontrolujte případné poškození injekční lahvičky (lahviček). V případě poškození injekčních lahviček se obraťte na společnost.

- Opatrně vyjměte injekční lahvičky z krabiček, umístěte injekční lahvičky na ochrannou podložku a nechejte rozmrazit při pokojové teplotě. Všechny injekční lahvičky rozmrazujte současně. **Dbejte na to, aby buněčné složky CD8+ a CD4+ zůstaly oddělené.**

#### *Příprava dávky*

- Pro každou složku může být pro podání dávky zapotřebí i více než jedna injekční lahvička s buněčnými složkami CD8+ a CD4+ v závislosti na koncentraci CAR+ životaschopných T-lymfocytů. Pro každou injekční lahvičku s buněčnými složkami CD8+ nebo CD4+ je třeba použít samostatnou stříkačku.


**Poznámka: Natahovaný a vstříkovaný objem se může u jednotlivých složek lišit.**

- Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje celkový extrahovatelný objem 4,6 ml buněčných složek CD8+ nebo CD4+ T-lymfocytů. Propouštěcí certifikát infuze (RfIC) pro každou složku udává objem (ml) buněk, který má být natažen do každé stříkačky. K natažení uvedeného objemu z každé injekční lahvičky použijte vždy nejmenší potřebnou stříkačku se špičkou luer-lock (1 ml až 5 ml). Stříkačka 5ml se nemá používat pro objemy menší než 3 ml.
- **Nejdříve si připravte stříkačku (stříkačky) s buněčnou složkou CD8+.** Ověřte, že identifikační údaje pacienta uvedené na štítku stříkačky s buněčnou složkou CD8+ odpovídají identifikačním údajům pacienta uvedeným na štítku injekční lahvičky s buněčnou složkou CD8+. Před natažením požadovaného objemu do stříkačky (stříkaček) připevněte příslušné štítky s označením pro buněčnou složku CD8+ na stříkačku (stříkačky).
- Postup zopakujte pro buněčnou složku CD4+.

**Poznámka:** Je důležité ověřit, že objem natažený pro každou buněčnou složku odpovídá objemu uvedenému v příslušném propouštěcím certifikátu infuze (RfIC).

Natažení požadovaného objemu buněk z každé injekční lahvičky do samostatné stříkačky je třeba provádět podle následujících pokynů:

1. Rozmrazenou injekční lahvičku (lahvičky) držte ve svislé poloze a zlehka ji (je) obraťte, aby se buněčný přípravek promíchal. Objeví-li se jakékoliv shluky, pokračujte v obracení injekční lahvičky (lahviček), dokud se shluky nerozptýlí a buňky se rovnoměrně neresuspendují.



Injekční lahvička ve svislé poloze


Injekční lahvička v obrácené poloze

2. Vizuálně překontrolujte případné poškození či netěsnosti rozmrazené injekční lahvičky (lahviček). Nepoužívejte, je-li injekční lahvička poškozená nebo nejsou-li shluky rozptýlené; obraťte se na společnost. Kapalina v injekčních lahvičkách má být lehce neprůhledná až neprůhledná, bezbarvá až žlutá nebo hnědožlutá.




3. Odstraňte polyaluminiovou krytku (je-li přítomna) ze spodní části injekční lahvičky a septum oťete tamponem s alkoholem. Před pokračováním nechejte uschnout na vzduchu.

**POZNÁMKA:** Absence polyaluminiové krytky nemá vliv na sterilitu injekční lahvičky.




4. Injekční lahvičku (lahvičky) držte ve svislé poloze, odstříhnete zapečetění na trubičce na horní straně injekční lahvičky bezprostředně nad filtrem k otevření odvzdušňovacího otvoru na injekční lahvičce.

**POZNÁMKA:** Dávejte pozor na výběr správné trubičky s filtrem. Odstříhnete POUZE trubičku s filtrem.




ZDE ODSTŘIHNĚTE  
FILTR




5. Přidržte jehlu 20 G 1-1,5" otvorem hrotu jehly směrem od septa portu.
- Zasuňte jehlu do septa pod úhlem 45°- 60° za účelem propíchnutí septa portu.
  - Při zasunování jehly do injekční lahvičky postupně zvětšujte úhel jehly.

a

b




6. BEZ nasávání vzduchu do stříkačky pomalu natáhněte požadovaný objem (jak je uvedeno v propouštěcím certifikátu infuze (RFIC)).



7. Než budete pokračovat, pečlivě překontrolujte stříkačku, zda neobsahuje nečistoty. Pokud ano, obraťte se na společnost.
8. Ověřte, že objem buněčné složky CD8+/ CD4+ odpovídá objemu uvedenému pro příslušnou složku v propouštěcím certifikátu infuze (RFIC).

Po ověření objemu přidržte injekční lahvičku a stříkačku ve svislé poloze a oddělte stříkačku / jehlu od injekční lahvičky.

Opatrně oddělte jehlu od stříkačky a na stříkačku nasad'te ochranný kryt..



9. Držte injekční lahvičku ve vodorovné poloze a vraťte ji do krabičky, aby se zabránilo úniku tekutiny z injekční lahvičky.
10. Nespotrebovanou část přípravku Breyanzi zlikvidujte.

## Podávání

Další informace o podání viz bod 4.2.

- Použijte injekční roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) pro intravenózní podání k propláchnutí všech hadiček infuzního setu před a po podání buněčné složky CD8+ nebo buněčné složky CD4+.
- Nejdříve podejte buněčnou složku CD8+. Celý objem buněčné složky CD8+ se podává intravenózně rychlostí infuze přibližně 0,5 ml/min přes nejbližší port nebo rozdvojku.
- Je-li pro plnou dávku buněčné složky CD8+ zapotřebí více než jedna stříkačka, podejte objem v každé stříkačce postupně bez jakékoli prodlevy mezi podáními obsahu stříkaček (neexistuje-li klinický důvod k pozdržení dávky, např. reakce na infuzi). Po podání buněčné složky CD8+ propláchněte hadičky injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).
- Ihned po podání buněčné složky CD8+ podejte buněčnou složku CD4+ za použití stejných kroků a rychlosti infuze, jaké jsou popsány pro buněčnou složku CD8+. Po podání buněčné složky CD4+ propláchněte hadičky dostatečným množstvím injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %), aby se zajistilo pročištění hadiček a intravenózního katetru v celé délce. Doba aplikace infuze se bude lišit a obvykle bude kratší než 15 minut pro každou složku.

### Opatření pro likvidaci léčivého přípravku

- S nepoužitým léčivým přípravkem a veškerým materiálem, který byl ve styku s přípravkem Breyanzi (pevný a kapalný odpad), má být zacházeno jako s potenciálně infekčním odpadem v souladu s místními předpisy pro zacházení s materiálem lidského původu a musí být takto zlikvidován.

### Náhodná expozice

- V případě náhodné expozice je nutné dodržovat místní předpisy pro zacházení s materiálem lidského původu. Pracovní povrchy a materiály, které byly potenciálně v kontaktu s přípravkem Breyanzi, musí být dekontaminovány vhodným dezinfekčním prostředkem.

## **7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  
Plaza 254  
Blanchardstown Corporate Park 2  
Dublin 15, D15 T867  
Irsko

## **8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA**

EU/1/22/1631/001

## **9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE**

Datum první registrace: {DD. měsíc RRRR}

## **10. DATUM REVIZE TEXTU**

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky <http://www.ema.europa.eu>.

## **PŘÍLOHA II**

- A. VÝROBCE BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK  
A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ**
- B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ**
- C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE**
- D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA  
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO  
PŘÍPRAVKU**

## **A. VÝROBCE BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ**

### Název a adresa výrobce biologických léčivých látek

Juno Therapeutics Inc.  
1522 217<sup>th</sup> Pl. SE  
Bothell  
WA 98021  
USA

### Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Celgene Distribution B.V.  
Orteliuslaan 1000  
3528 BD Utrecht  
Nizozemsko

## **B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ**

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

## **C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE**

### **• Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR)**

Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) předloží první PSUR pro tento léčivý přípravek do 6 měsíců od jeho registrace.

## **D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

### **• Plán řízení rizik (RMP)**

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

- na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
- při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení významného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

- **Další opatření k minimalizaci rizik**

Klíčové prvky:

Dostupnost tocilizumabu a kvalifikovanost místa podání prostřednictvím programu řízené distribuce

Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, aby nemocnice a jejich přidružená centra vydávající přípravek Breyanzi získaly kvalifikaci v souladu s odsouhlaseným programem řízené distribuce, a to následovně:

- zajistí v místě podání přípravku okamžitou dostupnost 1 dávky tocilizumabu na pacienta před podáním infuze přípravku Breyanzi. Zdravotnické zařízení musí mít také zajištěnu dostupnost další dávky tocilizumabu do 8 hodin od podání každé předchozí dávky. Zajistí, aby ve výjimečném případě, kdy tocilizumab není dostupný kvůli nedostatku, který je zaevidován v katalogu nedostatkových léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky, byly na pracovišti k dispozici jiné vhodné alternativy k léčbě CRS než tocilizumab.
- zdravotničtí pracovníci (HCP) zapojení do léčby pacienta absolvují edukační program.

Edukační program

Před uvedením přípravku Breyanzi na trh v každém členském státě musí držitel rozhodnutí o registraci (MAH) nechat odsouhlasit obsah a formát edukačních materiálů příslušnou národní regulační autoritou.

Edukační program pro zdravotnické pracovníky

Všichni zdravotničtí pracovníci (HCP), u nichž se předpokládá, že budou předepisovat, vydávat a podávat přípravek Breyanzi, obdrží příručku pro zdravotnické pracovníky, která bude obsahovat informace o:

- identifikaci CRS a závažných neurologických nežádoucích účincích,
- zvládnutí CRS a závažných neurologických nežádoucích účinků,
- náležitém sledování CRS a závažných neurologických nežádoucích účinků,
- poskytnutí veškerých relevantních informací pacientům,
- nutnosti zajištění okamžité dostupnosti 1 dávky tocilizumabu na pacienta před podáním infuze přípravku Breyanzi v místě podání. Zdravotnické zařízení musí mít zajištěnu dostupnost další dávky tocilizumabu do 8 hodin od podání každé předchozí dávky. Ve výjimečném případě, kdy tocilizumab není dostupný kvůli nedostatku, který je zaevidován v katalogu nedostatkových léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky, musí být zajištěno, aby na pracovišti byly k dispozici jiné vhodné alternativy k léčbě CRS než tocilizumab.
- kontaktních údajích pro testování vzorku nádoru po rozvoji sekundární malignity s původem z T-lymfocytů,
- poskytnout informace o studii dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti a významu zapojení se do takové studie,
- nutnosti odpovídajícího a správného hlášení nežádoucích účinků,
- zajištění poskytnutí podrobných pokynů k procesu rozmrazování.

Edukační program pro pacienty

Všichni pacienti, jimž bude přípravek Breyanzi podáván, obdrží kartu pacienta, na níž budou uvedeny následující základní informace:

- rizika CRS a závažné neurologické nežádoucí účinky související s přípravkem Breyanzi;
- nutnost neprodleně hlásit příznaky možného CRS a neurotoxicity svému ošetřujícímu lékaři;
- nutnost zůstat v blízkosti místa, kde jim byl podán přípravek Breyanzi, po dobu alespoň 4 týdnů po infuzi přípravku Breyanzi;
- nutnost mít u sebe neustále kartu pacienta;
- připomenutí pacientům, aby ukázali kartu pacienta všem HCP, a to i v případě akutních stavů, a zprávu pro HCP, že pacient je léčen přípravkem Breyanzi;
- pole pro záznam kontaktních údajů ošetřujícího lékaře a číslo šarže.

- **Povinnost uskutečnit poregistrační opatření**

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření:

<b>Popis</b>	<b>Termín splnění</b>
Aby bylo možné důkladněji posoudit konzistenci kvality přípravku a klinických výsledků, předloží držitel rozhodnutí o registraci analýzu šarží a související údaje o klinické bezpečnosti a účinnosti z alespoň třiceti (30) šarží hotového přípravku Breyanzi použitých k léčbě pacientů zařazených do neintervenční studie založené na sekundárním využití údajů ze stávajících registrů podle odsouhlaseného protokolu. Na základě těchto údajů má držitel rozhodnutí o registraci rovněž poskytnout vyhodnocení potřeby revize specifikací hotového přípravku. Průběžné zprávy mají být předloženy přibližně po 15 šaržích a jakékoliv významné odchylky od předpokládaných výsledků mají být okamžitě hlášeny.	Průběžné zprávy budou předkládány v souladu s RMP.  Závěrečná zpráva do 31. prosince 2026
Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (PASS): Aby bylo možné důkladněji charakterizovat dlouhodobou bezpečnost a účinnost přípravku Breyanzi u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní DLBCL, PMBCL a FL3B po dvou nebo více liniích systémové terapie, provede držitel rozhodnutí o registraci prospektivní studii založenou na údajích z registru a předloží její výsledky podle schváleného protokolu.	Průběžné zprávy budou předkládány v souladu s RMP.  Závěrečná zpráva: 3. čtvrtletí 2043
Aby bylo možné důkladněji charakterizovat dlouhodobou účinnost a bezpečnost přípravku Breyanzi u pacientů léčených s relabující nebo refrakterní DLBCL, PMBCL a FL3B po dvou nebo více liniích systémové terapie, předloží držitel rozhodnutí o registraci údaje z 24měsíčního následného sledování po infuzi přípravku Breyanzi (u zařazené a léčené populace) ze studie 017001.	4. čtvrtletí 2022
Aby bylo možné důkladněji charakterizovat dlouhodobou účinnost a bezpečnost přípravku Breyanzi u pacientů léčených s relabující nebo refrakterní DLBCL, PMBCL a FL3B po dvou nebo více liniích systémové terapie, předloží držitel rozhodnutí o registraci údaje z 24měsíčního následného sledování po infuzi přípravku Breyanzi (u zařazené a léčené populace) ze studie JCAR017-BCM-001 pro kohortu 1.	4. čtvrtletí 2022

**PŘÍLOHA III**  
**OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE**



## **A. OZNAČENÍ NA OBALU**

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### VNĚJŠÍ KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuzní disperze  
lisocabtagenum maraleucelum (CAR+ životaschopné T-lymfocyty)

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Autologní lidské T-lymfocyty geneticky modifikované lentivirovým vektorem kódujícím anti-CD19 chimérický antigenní receptor (CAR), sestávající z buněčných složek CD8+ a CD4+ o síle  $1,1-70 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů/ml v každé buněčné složce.

Tento léčivý přípravek obsahuje buňky lidského původu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další složky: Cryostor (R) CS10, chlorid sodný, natrium-glukonát, trihydrát natrium-acetátu, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, lidský albumin, racemický tryptofan, kyselina oktanová, voda pro injekci.  
Více informací viz příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

##### Infuzní disperze

Obsahuje 1–4 injekční lahvičky buněčné složky CD8+ a 1–4 injekční lahvičky buněčné složky CD4+.  
Obsah: 4,6 ml buněčné disperze / injekční lahvička.

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Nezařujte.

NEPOUŽÍVEJTE leukodepleční filtr.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a propouštěcí certifikát infuze.

POZOR! Před infuzí potvrďte totožnost pacienta.

**Nejdříve podávejte buněčnou složku CD8+.**

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze autologní použití.

**8. POUŽITELNOST**

	Buněčná složka CD8+	Buněčná složka CD4+
EXP		

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte a přepravujte zmrazené v plynné fázi kapalného dusíku ( $\leq -130$  °C).  
Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Tento léčivý přípravek obsahuje lidské krevní buňky.  
Nepoužitý léčivý přípravek nebo použitý materiál musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro zacházení s biologickým odpadem lidského původu.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  
Plaza 254  
Blanchardstown Corporate Park 2  
Dublin 15, D15 T867  
Irsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

EU/1/22/1631/001

**13. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ověření totožnosti pacienta

**SEC:**

Jméno:

Příjmení:

Datum narození pacienta:

JOIN:

Aph ID/DIN:

	Buněčná složka CD8+	Buněčná složka CD4+
Lot		

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍ KRABIČCE

### KRABIČKA (BUNĚČNÁ SLOŽKA CD8+)

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuzní disperze  
lisocabtagenum maraleucelum (CAR+ životaschopné T-lymfocyty)

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Autologní lidské T-lymfocyty geneticky modifikované lentivirovým vektorem (LVV) kódujícím anti-CD19 chimérický antigenní receptor (CAR)

##### **Buněčná složka CD8+**

Injekční lahvička obsahuje  $5,1-322 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů ve 4,6 ml ( $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml)

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další složky: Cryostor (R) CS10, chlorid sodný, natrium-glukonát, trihydrát natrium-acetátu, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, lidský albumin, racemický tryptofan, kyselina oktanová, voda pro injekci. Více informací viz vnější krabička a příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

##### **Infuzní disperze**

1–4 injekční lahvičky s CAR+ životaschopnými T-lymfocyty (**buněčná složka CD8+**)

Obsah: 4,6 ml buněčná disperze/ injekční lahvička.

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Neozářujte.

NEPOUŽÍVEJTE leukodepleční filtr.

Před použitím si přečtěte vnější krabičku, propouštěcí certifikát infuze a příbalovou informaci.

##### **1. Nejdříve podejte CD8+**

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze autologní použití

## 8. POUŽITELNOST

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte zmrazené v plynné fázi kapalného dusíku ( $\leq -130$  °C).  
Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Tento léčivý přípravek obsahuje lidské krevní buňky. Nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro zacházení s biologickým odpadem lidského původu.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  
Plaza 254  
Blanchardstown Corporate Park 2  
Dublin 15, D15 T867  
Irsko

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/22/1631/001

## 13. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ověření totožnosti pacienta:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození pacienta:

JOIN:

Aph ID/DIN:

Lot:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍ KRABIČCE

### KRABIČKA (BUNĚČNÁ SLOŽKA CD4+)

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuzní disperze  
lisocabtagenum maraleucelum (CAR+ životaschopné T-lymfocyty)

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Autologní lidské T-lymfocyty geneticky modifikované lentivirovým vektorem (LVV) kódujícím anti-CD19 chimérický antigenní receptor (CAR)

##### **Buněčná složka CD4+**

Injekční lahvička obsahuje:  $5,1-322 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů ve 4,6 ml  
( $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml)

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další složky: Cryostor (R) CS10, chlorid sodný, natrium-glukonát, trihydrát natrium-acetátu, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, lidský albumin, racemický tryptofan, kyselina oktanová, voda pro injekci.  
Více informací viz vnější krabička a příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

##### Infuzní disperze

1–4 injekční lahvičky s CAR+ životaschopnými T-lymfocyty (**buněčná složka CD4+**)

Obsah: 4,6 ml buněčná disperze/ injekční lahvička.

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Neozářujte.

NEPOUŽÍVEJTE leukodepleční filtr.

Před použitím si přečtěte vnější krabičku, propouštěcím certifikátu infuze a příbalovou informaci.

##### **2. CD4+ podejte jako druhé**

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pouze autologní použití



**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte a přepravujte zmrazené v plynné fázi kapalného dusíku ( $\leq -130\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).  
Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Tento léčivý přípravek obsahuje lidské krevní buňky. Nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro zacházení s biologickým odpadem lidského původu.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  
Plaza 254  
Blanchardstown Corporate Park 2  
Dublin 15, D15 T867  
Irsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

EU/1/22/1631/001

**13. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ověření totožnosti pacienta:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození pacienta:

JOIN:

Aph ID/DIN:

Lot.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Neuplatňuje se – odůvodnění přijato.

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

**ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE (BUNĚČNÁ SLOŽKA CD8+)**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuze  
lisocabtagenum maraleucelum (CAR+ životaschopné T-lymfocyty)  
i.v.

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

**1. CD8+ podejte jako první**

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ověření totožnosti pacienta:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození pacienta:

JOIN:

Aph ID/DIN:

Lot:

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

**Buněčná složka CD8+  $5,1-322 \times 10^6$  buněk/4,6 ml**

**6. JINÉ**

Pouze autologní použití

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

**ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE (BUNĚČNÁ SLOŽKA CD4+)**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuze  
lisocabtagenum maraleucelum (CAR+ životaschopné T-lymfocyty)  
i.v.

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

**2. CD4+ podejte jako druhé**

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ověření totožnosti pacienta:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození pacienta:

JOIN:

Aph ID/DIN:

Lot:

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

**Buněčná složka CD4+  $5,1-322 \times 10^6$  buněk/4,6 ml.**

**6. JINÉ**

Pouze autologní použití.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ V PROPOUŠTĚCÍM CERTIFIKÁTU INFUZE (RFIC) PŘILOŽENÉM KE KAŽDÉ DODÁVCE PRO JEDNOTLIVÉHO PACIENTA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Breyanzi  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml /  $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml infuzní disperze  
lisocabtagenum maraleucelum (CAR+ životaschopné T-lymfocyty)

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Autologní lidské T-lymfocyty geneticky modifikované lentivirovým vektorem (LVV) kódujícím anti-CD19 chimérický antigenní receptor (CAR), tvořené buněčnou složkou CD8+ a buněčnou složkou CD4+ o síle  $1,1-70 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů/ml v každé složce.

**3. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

Infuzní disperze

1–4 injekční lahvičky s CAR+ životaschopnými T-lymfocyty

Obsah: 4,6 ml buněčná disperze / injekční lahvička.

**Buněčná složka CD8+**

**Buněčná složka CD4+**

Injekční lahvička obsahuje  $5,1-322 \times 10^6$  CAR+ životaschopných T-lymfocytů ve 4,6 ml ( $1,1-70 \times 10^6$  buněk/ml).

**Dávka léčivého přípravku:**

Úplné pokyny pro dávkování naleznete v informacích o přípravku. Postup pro ověření dávky je uveden na konci tohoto propouštěcího certifikátu infuze (RFIC).

<b>Dávka</b>	[variabilní pole] $\times 10^6$ CAR+ životaschopných T-lymfocytů			
<b>Koncentrace CAR+ životaschopných T-lymfocytů</b>	[variabilní pole] $\times 10^6$ CAR+ životaschopných T-lymfocytů/ml			
<b>Celkový objem dávky</b>	[variabilní pole] ml	Požadovaný počet injekčních lahviček:		[variabilní pole]
<b>Objem dávky z jedné lahvičky</b>	První injekční lahvička	[variabilní pole] ml	Třetí injekční lahvička	[variabilní pole] ml nebo <input type="checkbox"/> neuplatní se
	Druhá injekční lahvička	[variabilní pole] ml nebo <input type="checkbox"/> neuplatní se	Čtvrtá injekční lahvička	[variabilní pole] ml nebo <input type="checkbox"/> neuplatní se
<b>Důležité:</b> Použijte jednu stříkačku na injekční lahvičku. Zajistěte, aby byl infuzí podán pouze „objem požadované dávky z jedné injekční lahvičky“.				

**Štítek (štítky) na stříkačce (stříkačkách) v tomto balení**

**Objemy infuze buněčné složky CD8+ na stříkačku a štítky stříkačky**

**Objemy infuze buněčné složky CD4+ na stříkačku a štítky stříkačky**

Poznámka: Použijte jednu stříkačku na injekční lahvičku. Zajistěte, aby byl infuzí podán pouze „objem požadované dávky z jedné injekční lahvičky“.

První stříkačka o objemu [variabilní pole] ml	Přilepte štítek stříkačky #1 s buněčnou složkou CD8+ zde Přilepte štítek stříkačky #1 s buněčnou složkou CD4+ zde Odlepte zde
Druhá stříkačka o objemu [variabilní pole] ml NEBO ODSTRÁŇTE	Přilepte štítek stříkačky #2 s buněčnou složkou CD8+ zde Přilepte štítek stříkačky #2 s buněčnou složkou CD4+ zde Odlepte zde
Třetí stříkačka o objemu [variabilní pole] ml NEBO ODSTRÁŇTE	Přilepte štítek stříkačky #3 s buněčnou složkou CD8+ zde Přilepte štítek stříkačky #3 s buněčnou složkou CD4+ zde Odlepte zde
Čtvrtá stříkačka o objemu [variabilní pole] ml NEBO ODSTRÁŇTE	Přilepte štítek stříkačky #4 s buněčnou složkou CD8+ zde Přilepte štítek stříkačky #4 s buněčnou složkou CD4+ zde Odlepte zde

#### 4. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte informace o přípravku.

Intravenózní podání.

Nezadržujte.

NEPOUŽÍVEJTE leukodepleční filtr.

Před použitím si přečtěte text na vnější krabici, propouštěcí certifikát infuze (RfIC) a příbalovou informaci.

#### 5. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

ULOŽTE SI TENTO DOKUMENT A MĚJTE JEJ K DISPOZICI, AŽ SE BUDETE PŘIPRAVOVAT NA PODÁNÍ PŘÍPRAVKU BREYANZI

Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo otázky, zavolejte:

Kopii tohoto formuláře založte do zdravotní dokumentace pacienta.

Pouze autologní použití.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte zmrazené v plynné fázi kapalného dusíku ( $\leq -130$  °C).

Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

#### 7. POUŽITELNOST

Informace o přípravku

Výrobce:	
Datum výroby:	
Datum expirace:	

**8. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Tento léčivý přípravek obsahuje lidské krevní buňky. Nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro zacházení s biologickým odpadem lidského původu.

**9. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Informace o pacientovi**

Jméno:		Příjmení:	
Datum narození:		Lot:	
JOIN:		Aph ID/DIN:	
SEC:			

**10. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  
Plaza 254  
Blanchardstown Corporate Park 2  
Dublin 15, D15 T867  
Irsko

**11. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

EU/1/22/1631/001

## **B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE**



## Příbalová informace: informace pro pacienta

### Breyanzi $1,1-70 \times 10^6$ buněk/ml / $1,1-70 \times 10^6$ buněk/ml infuzní disperze

lisocabtagenum maraleucelum (životaschopné T-lymfocyty s chimérickým antigenním receptorem [CAR-pozitivní])

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Lékař Vám předá kartu pacienta. Přečtěte si ji pečlivě a postupujte podle pokynů, které jsou v ní uvedeny.
- Vždy ukažte kartu pacienta lékaři nebo zdravotní sestře, když je navštívíte, nebo pokud jdete do nemocnice.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

#### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Breyanzi a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Breyanzi podán
3. Jak se přípravek Breyanzi podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Breyanzi uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### 1. Co je přípravek Breyanzi a k čemu se používá

##### Co je přípravek Breyanzi

Přípravek Breyanzi obsahuje léčivou látku lisocabtagen maraleucel, typ léčby zvaný „léčba geneticky modifikovanými buňkami“.

Přípravek Breyanzi je vyroben z Vašich vlastních bílých krvinek. Výroba spočívá v tom, že je Vám odebráno trochu krve, ze které jsou odděleny bílé krvinky. Ty jsou poté odeslány do laboratoře, kde jsou upraveny tak, aby z nich mohl být vyroben přípravek Breyanzi.

##### K čemu se přípravek Breyanzi používá

Přípravek Breyanzi se používá k léčbě dospělých s typem nádoru krve zvaným lymfom, který ovlivňuje Vaši lymfatickou tkáň a způsobuje, že se tvorba bílých krvinek vymkne kontrole. Přípravek Breyanzi se používá k léčbě:

- difuzního velkobuněčného B-lymfomu,
- primárního mediastinálního velkobuněčného B-lymfomu,
- folikulárního lymfomu třídy 3B.

Podává se v případech, kdy alespoň 2 předchozí léčby nefungovaly nebo přestaly fungovat.

##### Jak přípravek Breyanzi účinkuje

- Buňky v přípravku Breyanzi byly geneticky upraveny, aby rozpoznaly buňky lymfomu v těle.
- Jakmile jsou tyto buňky vráceny do Vašeho krevního oběhu, dokážou rozpoznat buňky lymfomu a zaútočit na ně.

## 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Breyanzi podán

### Přípravek Breyanzi Vám nesmí být podán:

- jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud se domníváte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.
- jestliže nemůžete podstoupit léčbu zvanou lymfodepleční chemoterapie, která snižuje počet bílých krvinek v krvi (viz také bod 3, Jak se přípravek Breyanzi podává).

### Upozornění a opatření

#### Než Vám bude přípravek Breyanzi podán, informujte svého lékaře, jestliže:

- máte jakékoli potíže s plícemi nebo srdcem,
- máte nízký krevní tlak,
- máte infekci nebo jiná zánětlivá onemocnění; infekce bude léčena před tím, než Vám bude podán přípravek Breyanzi,
- jste během posledních 4 měsíců podstoupil(a) transplantaci kmenových buněk od jiné osoby, transplantované buňky mohou zaútočit na Vaše tělo („reakce štěpu proti hostiteli“), což způsobuje příznaky, jako je vyrážka, pocit na zvracení, zvracení, průjem a krev ve stolici,
- zaznamenáte zhoršení příznaků rakoviny; tyto příznaky zahrnují horečku, pocit slabosti, noční pocení, náhlý úbytek tělesné hmotnosti,
- máte infekci způsobenou virem hepatitidy B nebo C (žloutenka) nebo virem lidské imunodeficiency (HIV),
- jste v posledních 6 týdnech absolvoval(a) očkování nebo v následujících několika měsících plánujete očkování. Více informací je uvedeno níže v části „Živé vakcíny“.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem, než Vám bude přípravek Breyanzi podán.

### Testy a kontroly

#### Než Vám bude přípravek Breyanzi podán, Váš lékař:

- Vám vyšetří plíce, srdce a krevní tlak
- zkontroluje možné známky infekce; jakákoli infekce bude léčena dříve, než Vám bude podán přípravek Breyanzi
- zkontroluje možné známky „reakce štěpu proti hostiteli“, ke které může dojít po transplantaci kmenových buněk od jiné osoby
- zkontroluje Vám hladinu kyseliny močové v krvi a kolik máte v krvi rakovinných buněk. To ukáže, zda je pravděpodobné, že se u Vás rozvine stav nazývaný syndrom nádorového rozpadu. K prevenci tohoto onemocnění Vám mohou být podány léky.
- zkontroluje, zda se Vám rakovina zhoršuje
- zkontroluje, zda nemáte hepatitidu (žloutenku) B, hepatitidu C nebo HIV

### Poté, co Vám byl přípravek Breyanzi podán

- Pokud se u Vás vyskytnou některé závažné nežádoucí účinky, musíte o nich ihned informovat svého lékaře nebo zdravotní sestru, protože je možné, že budete potřebovat léčbu. Viz bod 4 „Závažné nežádoucí účinky“.
- Lékař bude pravidelně kontrolovat krevní obraz, neboť může dojít ke snížení počtu krvinek.
- Zůstaňte v blízkosti zdravotnického zařízení, kde Vám byl podán přípravek Breyanzi, po dobu alespoň 4 týdnů. Viz body 3 a 4.
- Nesmíte darovat krev, orgány, tkáně ani buňky k transplantaci.

Budete požádán(a), abyste se na dobu alespoň 15 let nechal(a) zapsat do registru. To nám pomůže lépe porozumět dlouhodobým účinkům přípravku Breyanzi.

## **Děti a dospívající**

Přípravek Breyanzi se nesmí podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

## **Další léčivé přípravky a přípravek Breyanzi**

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Informace o lécích, které Vám budou podány před podáním přípravku Breyanzi, viz bod 3.

## **Přípravky ovlivňující Váš imunitní systém**

Než Vám bude podán přípravek Breyanzi, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte jakékoli léky, které oslabují imunitní systém, jako například:

- kortikosteroidy.

Tyto přípravky totiž mohou snižovat účinek přípravku Breyanzi.

## **Další léky k léčbě nádorového onemocnění**

Některé léky k léčbě nádorových onemocnění mohou snižovat účinek přípravku Breyanzi. Váš lékař zváží, pokud budete potřebovat další léčbu nádorového onemocnění.

## **Živé vakcíny**

Nesmíte podstoupit očkování určitými vakcínami zvanými živé vakcíny:

- během 6 týdnů před absolvováním krátkého cyklu chemoterapie (zvané lymfodepleční chemoterapie), která tělo připraví na podání přípravku Breyanzi,
- během léčby přípravkem Breyanzi,
- po léčbě během zotavování Vašeho imunitního systému.

Pokud potřebujete jakékoli očkování, poraďte se svým lékařem.

## **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán nebo než podstoupíte lymfodepleční chemoterapii. Účinky přípravku Breyanzi u těhotných nebo kojících žen nejsou známy a přípravek by mohl poškodit Vaše nenarozené nebo kojené dítě.

- Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná a byla jste léčena přípravkem Breyanzi, ihned se poraďte se svým lékařem.
- Před zahájením léčby Vám bude proveden těhotenský test. Přípravek Breyanzi se smí podat pouze v případě, že výsledek testu prokáže, že nejste těhotná.

Poraďte se se svým lékařem o tom, zda je nutné, abyste používala antikoncepci.

Pokud Vám byl podán přípravek Breyanzi, poraďte se o těhotenství se svým lékařem.

## **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Po dobu alespoň 8 týdnů po léčbě neříd'te, neobsluhujte stroje a neúčastněte se aktivit, které vyžadují Vaši plnou pozornost. Přípravek Breyanzi u Vás může vyvolat ospalost, snižovat pozornost a vést ke zmatenosti a epileptickým záchvatům.

## **Přípravek Breyanzi obsahuje sodík, draslík a dimethylsulfoxid (DMSO)**

Tento léčivý přípravek obsahuje až 12,5 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 0,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. V jedné dávce může být podáno až 8 injekčních lahviček tohoto léčivého přípravku; taková dávka obsahuje celkem 100 mg sodíku neboli 5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku pro dospělého.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 0,2 mmol (nebo 6,5 mg) draslíku v jedné dávce. Váš lékař vezme obsah draslíku v úvahu, pokud Vám dobře nefungují ledviny nebo pokud jste na dietě s nízkým obsahem draslíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje také DMSO, který může způsobit závažné hypersenzitivní reakce.

### **3. Jak se přípravek Breyanzi podává**

#### **Karta pacienta**

- Váš lékař Vám předá kartu pacienta. Důkladně si ji přečtěte a postupujte podle pokynů, které jsou na ní uvedeny.
- Kartu pacienta vždy ukažte lékaři nebo zdravotní sestře, když je navštívíte, nebo když jdete do nemocnice.

#### **Poskytnutí vzorku krve k výrobě přípravku Breyanzi z Vašich bílých krvinek**

Přípravek Breyanzi se vyrábí z Vašich vlastních bílých krvinek.

- Lékař Vám odebere trochu krve pomocí hadičky (katétru) zavedené do žíly. Z krve bude oddělena část bílých krvinek. Zbytek krve se vrátí do Vašeho těla. Tento proces se nazývá „leukaferéza“ a může trvat 3 až 6 hodin. Tento proces může být nutné opakovat.
- Poté budou bílé krvinky odeslány k výrobě přípravku Breyanzi.

#### **Další přípravky, které Vám budou podány před podáním přípravku Breyanzi**

- Několik dní předtím, než Vám bude podán přípravek Breyanzi, absolvujete krátký cyklus chemoterapie. Tímto procesem se odstraní zbývající bílé krvinky.
- Krátce před podáním přípravku Breyanzi Vám bude podán paracetamol a antihistaminikum. Ty se používají ke snížení rizika infuzních reakcí a horečky.

#### **Jak se přípravek Breyanzi podává**

- Lékař zkontroluje, zda identifikační údaje pacienta na štítku přípravku odpovídají Vaším údajům, čímž ověří, že byl přípravek Breyanzi připraven z Vaší krve
- Přípravek Breyanzi se podává infuzí (kapačkou) pomocí hadičky do žíly.
- Podány Vám budou infuze CD8 pozitivních buněk, následované ihned infuzemi CD4 pozitivních buněk. Délka infuzí se bude lišit, obvykle ale bude kratší než 15 minut u každého ze 2 uvedených typů buněk.

#### **Po podání přípravku Breyanzi**

- Zůstaňte v blízkosti zdravotnického zařízení, kde Vám byl podán přípravek Breyanzi, po dobu alespoň 4 týdnů.
- Během prvního týdne po léčbě budete muset 2 až 3krát navštívit zdravotnické zařízení, aby lékař mohl zkontrolovat, zda je u Vás léčba účinná – a aby byla zajištěna pomoc v případě jakýchkoli nežádoucích účinků. Viz body 2 a 4.

#### **Když vynecháte návštěvu**

Co nejdříve zavolejte svému lékaři nebo do zdravotnického zařízení a domluvte si novou návštěvu.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

#### **Závažné nežádoucí účinky**

Pokud se po podání přípravku Breyanzi projeví některý z následujících nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře:

- horečka, zimnice nebo třes, pocit únavy, rychlý nebo npravidelný tlukot srdce, točení hlavy a dušnost – tyto projevy mohou být známkami závažného problému zvaného syndrom z uvolnění cytokinů.
- zmatenost, snížená bdělost (snížené vědomí), potíže s mluvením nebo nesrozumitelná řeč, třes, pocit úzkosti, závrať a bolest hlavy – tyto projevy mohou být známkami problémů s nervovým systémem,
- pocit tepla, horečka, zimnice nebo třesavka – tyto projevy mohou být známkami infekce. Infekce může být způsobena:
  - nízkými hladinami bílých krvinek, které pomáhají v boji proti infekcím, nebo
  - nízkými hladinami protilátek nazývaných „imunoglobuliny“.
- pocit velké únavy nebo slabosti a dušnost – tyto projevy mohou být známkami nízkých hladin červených krvinek (anemie),
- snadnější krvácení nebo tvorba podlitin – tyto projevy mohou být známkami nízkých hladin krevních buněk známých jako krevní destičky.

Pokud po podání přípravku Breyanzi zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře, jelikož můžete potřebovat urgentní lékařské ošetření.

### **Další možné nežádoucí účinky**

#### **Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 osob**

- potíže se spánkem
- nízký nebo vysoký krevní tlak včetně známek jako velmi závažná bolest hlavy nebo závrať, mdloby nebo změny vidění
- kašel
- pocit na zvracení nebo zvracení
- průjem nebo zácpa
- bolest žaludku
- vyrážka
- snížené močení
- otoky kotníků, paží, nohou a obličeje.

#### **Časté: mohou postihovat až 1 z 10 osob**

- problémy s rovnováhou nebo chůzí
- změny vidění
- změny chuti
- mozková mrtvice nebo malá mozková mrtvice
- necitlivost a brnění v nohou nebo rukou
- křeče nebo epileptické záchvaty
- srdeční slabost způsobující dušnost a otok kotníků
- tekutina v okolí plic
- krevní sraženiny nebo problémy se srážením krve
- krvácení do střev
- reakce na infuzi - například pocit závratě, horečka a dušnost
- nízká hladina fosfátů v krvi
- nízká hladina kyslíku v krvi.

#### **Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob**

- rychlý rozpad nádorových buněk, který vede k uvolňování toxických odpadních látek do krve, jehož známkou může být tmavá moč s příznaky jako pocit na zvracení nebo bolest na straně žaludku
- těžké zánětlivé onemocnění – příznaky mohou zahrnovat horečku, vyrážku, zvětšení jater, sleziny a lymfatických uzlin
- slabost obličejových svalů
- otok mozku.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v [Dodatku V](#). Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Breyanzi uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičkách a na štítku injekční lahvičky za „EXP“.

Uchovávejte zmrazené v plynné fázi kapalného dusíku ( $\leq -130$  °C).

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Breyanzi obsahuje**

- Léčivou látkou je lisocabtagenum maraleucelum. Jedna 4,6ml injekční lahvička obsahuje disperzi CAR-pozitivních životaschopných T-lymfocytů (buněčná složka CD8-pozitivní nebo buněčná složka CD4-pozitivní) o síle  $1,1 \times 10^6$  až  $70 \times 10^6$  CAR-pozitivních životaschopných T-lymfocytů v každé buněčné složce. Může jít až o 4 injekční lahvičky s buněčnými složkami CD8-pozitivní nebo CD4-pozitivní, v závislosti na koncentraci hluboce zmrazeného léku.
- Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou Cryosstor (R) CS10 (obsahuje dimethylsulfoxid neboli DMSO), chlorid sodný, natrium-glukonát, trihydrát natrium-acetátu, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, lidský albumin, racemický tryptofan, kyselina oktanová, voda pro injekci. Viz bod 2, „Přípravek Breyanzi obsahuje sodík, draslík a dimethylsulfoxid (DMSO)“.

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované lidské krevní buňky.

### **Jak přípravek Breyanzi vypadá a co obsahuje toto balení**

Přípravek Breyanzi je buněčná infuzní disperze. Dodává se v injekčních lahvičkách s mírně neprůhlednou až neprůhlednou, bezbarvou až žlutou nebo hnědavě žlutou disperzí. Každá injekční lahvička obsahuje 4,6 ml disperze složky CD8 pozitivních buněk nebo složky CD4 pozitivních buněk.

### **Držitel rozhodnutí o registraci**

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG  
Plaza 254  
Blanchardstown Corporate Park 2  
Dublin 15, D15 T867  
Irsko

### **Výrobce**

Celgene Distribution B.V.  
Orteliuslaan 1000  
3528 BD Utrecht  
Nizozemsko

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována**

## Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese <http://www.ema.europa.eu>.

---

### Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

#### Opatření, která je třeba přijmout před manipulací nebo podáním léčivého přípravku

Přípravek Breyanzi je třeba v rámci zdravotnického zařízení přepravovat v uzavřených, nerozbitných, nepropustných přepravnících.

Tento léčivý přípravek obsahuje lidské krevní buňky. Zdravotničtí pracovníci, kteří manipulují s přípravkem Breyanzi, mají dodržovat vhodná preventivní opatření (použití rukavic, ochranného oděvu a ochrana očí), aby se zabránilo možnému přenosu infekčních chorob.

#### Příprava před podáním

##### **Před** rozmrazením injekčních lahviček

- Ověřte totožnost pacienta a identifikační údaje pacienta uvedené na přepravním obalu.
- Přípravek Breyanzi je složen z CAR+ životaschopných T-lymfocytů, které jsou připraveny jako samostatné buněčné složky CD8+ a CD4+; ke každé buněčné složce je k dispozici samostatný propouštěcí certifikát infuze (RfIC). V RfIC (umístěný uvnitř přepravního obalu) si přečtete informace o počtu stříkaček, které jsou zapotřebí, a podávaném objemu buněčných složek CD8+ a CD4+ (štítky stříkaček jsou poskytovány s RfIC).
- Předem potvrďte čas infuze a přizpůsobte čas zahájení rozmrazování přípravku Breyanzi tak, aby byl k dispozici pro infuzi, až bude připraven pacient.

**Poznámka:** Po vyjmutí injekčních lahviček s CAR+ životaschopnými T-lymfocyty (buněčné složky CD8+ a CD4+) z mrazicích skladovacích jednotek musí být rozmrazení dokončeno a buňky podány do 2 hodin.

##### *Rozmrazení injekčních lahviček*

- Ověřte totožnost pacienta a identifikační údaje pacienta uvedené na vnější krabici a propouštěcím certifikátu infuze (RfIC).
- Vyjměte krabičku s buněčnou složkou CD8+ a krabičku s buněčnou složkou CD4+ z vnější krabičky.
- Otevřete každou vnitřní krabičku a vizuálně přezkontrolujte případné poškození injekční lahvičky (lahviček). V případě poškození injekčních lahviček se obraťte na společnost.
- Opatrně vyjměte injekční lahvičky z krabiček, umístěte injekční lahvičky na ochrannou podložku a nechteje rozmrazit při pokojové teplotě. Všechny injekční lahvičky rozmrazujte současně. **Dbejte na to, aby buněčné složky CD8+ a CD4+ zůstaly oddělené.**

##### *Příprava dávky*

- Pro každou složku může být pro podání dávky zapotřebí i více než jedna injekční lahvička s buněčnými složkami CD8+ a CD4+ v závislosti na koncentraci CAR+ životaschopných T-lymfocytů. Pro každou injekční lahvičku s buněčnými složkami CD8+ nebo CD4+ je třeba použít samostatnou stříkačku.

**Poznámka:** Natahovaný a vstříkovaný objem se může u jednotlivých složek lišit.


- Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje celkový extrahovatelný objem 4,6 ml buněčných složek CD8+ nebo CD4+ T-lymfocytů. Certifikát RfIC pro každou složku udává objem (ml) buněk, který má být natažen do každé stříkačky. K natažení uvedeného objemu z každé injekční lahvičky použijte vždy nejmenší potřebnou stříkačku se špičkou luer-lock (1 ml až 5 ml). Stříkačka 5ml se nemá používat pro objemy menší než 3 ml.

- **Nejdříve si připravte stříkačku (stříkačky) s buněčnou složkou CD8+.** Ověřte, že identifikační údaje pacienta uvedené na štítku stříkačky s buněčnou složkou CD8+ odpovídají identifikačním údajům pacienta uvedeným na štítku injekční lahvičky s buněčnou složkou CD8+. Před natažením požadovaného objemu do stříkačky (stříkaček) připevněte příslušné štítky s označením pro buněčnou složku CD8 + na stříkačku (stříkačky).
- Postup zopakujte pro buněčnou složku CD4+.

**Poznámka:** Je důležité ověřit, že objem natažený pro každou buněčnou složku odpovídá objemu uvedenému v příslušném propouštěcím certifikátu infuze (RFIC).

Natažení požadovaného objemu buněk z každé injekční lahvičky do samostatné stříkačky je třeba provádět podle následujících pokynů:

1. Rozmrazenou injekční lahvičku (lahvičky) držte ve svislé poloze a zlehka ji (je) obraťte, aby se buněčný přípravek promíchal. Objeví-li se jakékoliv shluky, pokračujte v obracení injekční lahvičky (lahviček), dokud se shluky neroztýlí a buňky se rovnoměrně neresuspendují.




Injekční lahvička ve svislé poloze

Injekční lahvička v obrácené poloze

2. Vizuálně překontrolujte případné poškození či netěsnosti rozmrazené injekční lahvičky (lahviček). Nepoužívejte, je-li injekční lahvička poškozená nebo nejsou-li shluky rozptýlené; obraťte se na společnost. Kapalina v injekčních lahvičkách má být lehce neprůhledná až neprůhledná, bezbarvá až žlutá nebo hnědožlutá.
3. Odstraňte polyaluminiovou krytku (je-li přítomna) ze spodní části injekční lahvičky a septum otřete tamponem s alkoholem. Před pokračováním nechejte uschnout na vzduchu.


**POZNÁMKA:** Absence polyaluminiové krytky nemá vliv na sterilitu injekční lahvičky.






- Injekční lahvičku (lahvičky) držte ve svislé poloze, odstříhnete zapečetění na trubičce na horní straně injekční lahvičky bezprostředně nad filtrem k otevření odvzdušňovacího otvoru na injekční lahvičce.

**POZNÁMKA:** Dávejte pozor na výběr správné trubičky s filtrem. Odstříhnete **POUZE** trubičku s filtrem.




ZDE ODSTŘIHNĚTE  
FILTR




- Přidržíte jehlu 20 G 1-1,5" otvorem hrotu jehly směrem od septa portu.
  - Zasuňte jehlu do septa pod úhlem 45°– 60° za účelem propíchnutí septa portu.
  - Při zasunování jehly do injekční lahvičky postupně zvětšujte úhel jehly.

a

b




- BEZ** nasávání vzduchu do stříkačky pomalu natáhněte požadovaný objem (jak je uvedeno v propouštěcím certifikátu infuze (RfIC)).



- Než budete pokračovat, pečlivě překontrolujte stříkačku, zda neobsahuje nečistoty. Pokud ano, obraťte se na společnost.
- Ověřte, že objem buněčné složky CD8+/CD4+ odpovídá objemu uvedenému pro příslušnou složku v propouštěcím certifikátu infuze (RfIC).

Po ověření objemu přidržíte injekční lahvičku a stříkačku ve svislé poloze a oddělte stříkačku / jehlu od injekční lahvičky.

Opatrně oddělte jehlu od stříkačky a na stříkačku nasadíte ochranný kryt.



9. Držte injekční lahvičku ve vodorovné poloze a vraťte ji do krabičky, aby se zabránilo úniku tekutiny z injekční lahvičky.

10. Nespotřebovanou část přípravku Breyanzi zlikvidujte.

### Podávání

- **NEPOUŽÍVEJTE** leukodepleční filtr.
- Ujistěte se, že jsou před podáním infuze a během období zotavování k dispozici tocilizumab a pohotovostní vybavení. Ve výjimečném případě, kdy tocilizumab není dostupný kvůli nedostatku, který je zaevidován v katalogu nedostatkových léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky, musí být zajištěno, aby na pracovišti byly k dispozici jiné vhodné alternativy k léčbě CRS než tocilizumab.
- Potvrďte, že totožnost pacienta odpovídá identifikačním údajům pacienta na štítku stříkačky dodávaném na příslušném certifikátu RfIC.
- Po natažení přípravku Breyanzi do stříkaček přípravek podejte co nejdříve. Celková doba od vyjmutí přípravku Breyanzi z mrazicí skladovací jednotky do podání pacientovi nesmí přesáhnout 2 hodiny.
- Před a po podání buněčné složky CD8+ nebo buněčné složky CD4+ propláchněte hadičky injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).
- Nejdříve podejte buněčnou složku CD8+. Celý objem buněčné složky CD8+ se podává intravenózně rychlostí infuze přibližně 0,5 ml/min přes nejbližší port nebo rozdvojkou.
- Je-li pro plnou dávku buněčné složky CD8+ zapotřebí více než jedna stříkačka, podejte objem v každé stříkačce postupně bez jakékoli prodlevy mezi podáními obsahu stříkaček (neexistuje-li klinický důvod k pozdržení dávky, např. reakce na infuzi). Po podání buněčné složky CD8+ propláchněte hadičky injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %).
- Ihned po podání buněčné složky CD8+ podejte buněčnou složku CD4+ za použití stejných kroků a rychlosti infuze, jaké jsou popsány pro buněčnou složku CD8+. Po podání buněčné složky CD4+ propláchněte hadičky dostatečným množstvím injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %), aby se zajistilo pročištění hadiček a intravenózního katetru v celé délce. Doba aplikace infuze se bude lišit a obvykle bude kratší než 15 minut pro každou složku.

### Opatření, která je třeba přijmout pro likvidaci přípravku Breyanzi

S nepoužitým léčivým přípravkem a veškerým materiálem, který byl ve styku s přípravkem Breyanzi (pevný a kapalný odpad), má být zacházeno jako s potenciálně infekčním odpadem v souladu s místními předpisy pro zacházení s biologickým odpadem lidského původu a musí být takto zlikvidován.

### Náhodná expozice

- V případě náhodné expozice je nutné dodržovat místní předpisy pro zacházení s materiálem lidského původu. Pracovní povrchy a materiály, které byly potenciálně v kontaktu s přípravkem Breyanzi, musí být dekontaminovány vhodným dezinfekčním prostředkem.