



- Vieną kartą paspauskite injekcijos mygtuką (turite išgirsti spragtelėjimą, kuris reiškia injekcijos pradžia) ir laikykite švirkštiklį stipriai prispaustą prie odos, kol **lėtai suskaičiuosite iki 10**.
- Atlikdami injekciją, nejudinkite švirkštiklio.
- Prieš atitraukdami švirkštiklį nuo odos, įsitikinkite, kad suleidote visą dozę, t. y., kad stūmoklis (žr. langelį) pasiekė švirkštiklio dugną.

C. Atitraukite švirkštiklį



- Pakelkite švirkštiklį tiesiai virš odos. Automatiškai nusileis antgalio adatos apsauga ir uždengs adatą.
- Jei reikia, injekcijos vietą prispauskite vatos gumuliuku arba marlės tamponu, kad sustabdytumėte kraujavimą.
- Netrinkite injekcijos vietos.



9) Išmeskite švirkštiklį



- Panaudoto Cyltezo švirkštiklio nebandykite naudoti pakartotinai.
- Išmeskite Cyltezo švirkštiklį į aštrių atliekų talpyklę.
- Aštrių atliekų talpyklę visada laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Jei nepavyksta tinkamai atlikti injekcijos, kito Cyltezo švirkštiklio nenaudokite. Skambinkite sveikatos priežiūros specialistui.