


- Pirms injicēšanas izlasiet 8. darbības A. līdz C. punktu, lai uzzinātu, kā pareizi ievadīt devu.

8) Pirms injicēšanas izlasiet 8. darbības A. līdz C. punktu, lai uzzinātu, kā pareizi ievadīt devu.

A. Sagatavojieties ievadīt devu




- Turiet pildspalvveida pilnšļirci tieši perpendikulāri injekcijas vietai (90° pret ādu). Mēģiniet neaizsegt logu ar roku.
- Stingri piespiediet uzgali saspīestajai injekcijas vietai. Injekcijas poga atblosies un būs gatava lietošanai.

B. Ievadiet devu




- Ievadiet **visu devu**:
 - vienu reizi nospiediet injekcijas pogu (Jums vajadzētu izdzirdēt „klikšķi”, kas norāda uz injekcijas sākumu) un turiet pildspalvveida pilnšļirci piespiestu cieši pie ādas, kamēr **lēni aizskaitāt līdz 10**;
 - injekcijas laikā nekustiniet pildspalvveida pilnšļirci;
- Pirms pildspalvveida šļirces izvilkšanas no ādas apstipriniet, ka ir ievadīta visa deva, pārbaudot, ka virzulis ir sasniedzis pildspalvveida pilnšļirces apakšu (redzams logā).

C. Izvelciet pildspalvveida pilnšļirci



- Paceliet pildspalvveida pilnšļirci uz augšu taisnā leņķī attiecībā pret ādu. Adatas aizsargs automātiski nobīdās uz leju un nosedz adatu.
- Ja nepieciešams, virs injekcijas vietas piespiediet vates vai marles tamponu, lai apturētu asiņošanu.
- Neberzējiet injekcijas vietu.



9) Izmetiet Cyltezo pildspalvveida pilnšļirci



- Nemēģiniet lietot Cyltezo pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti.
- Izmetiet visu Cyltezo pildspalvveida pilnšļirci asiem priekšmetiem paredzētajā konteinerā.
- Asiem priekšmetiem paredzēto konteineru vienmēr uzglabājiet bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Ja ar injekciju kaut kas nav kārtībā, nelietojiet citu Cyltezo pildspalvveida pilnšļirci. Zvaniet savam veselības aprūpes speciālistam.