

**ALLEGATO I**

**RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni flaconcino di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato contiene 20 mg di docetaxel. Ogni ml di concentrato contiene 27,73 mg di docetaxel.

### Eccipienti con effetti noti:

Ogni flaconcino di concentrato contiene 25,1% (p/p) di etanolo anidro (181 mg di etanolo anidro).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Concentrato e solvente per soluzione per infusione.

Il concentrato è una soluzione viscosa limpida, di colore da giallo a giallo-bruno.

Il solvente è una soluzione incolore.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

#### Cancro della mammella

Docetaxel Teva in associazione con doxorubicina e ciclofosfamida è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

- cancro della mammella operabile linfonodo positivo
- cancro della mammella operabile linfonodo negativo

Nei pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del cancro della mammella nelle fasi iniziali. (vedere paragrafo 5.1).

Docetaxel Teva in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel Teva in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel Teva in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel Teva in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina.

#### Cancro del polmone non a piccole cellule

Docetaxel Teva è indicato per il trattamento di pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

#### Cancro della prostata

Docetaxel Teva in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione.

Docetaxel Teva in associazione con terapia di deprivazione androgenica (*androgen-deprivation therapy*, ADT), con o senza prednisone o prednisolone, è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile.

#### Adenocarcinoma dello stomaco

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

#### Cancro del collo e della testa

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato del collo e della testa.

### **4.2 Posologia e modo di somministrazione**

L'utilizzo di docetaxel deve essere limitato ai reparti specializzati nella somministrazione di terapie citotossiche e la sua somministrazione deve essere effettuata sotto il controllo di un medico specializzato nell'utilizzo di chemioterapia antitumorale (vedere paragrafo 6.6).

#### Posologia

Per il cancro della mammella, il cancro del polmone non a piccole cellule, l'adenocarcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, può essere utilizzata, se non controindicata, una premedicazione con un corticosteroide orale, quale desametasone 16 mg/die (es. 8 mg BID) per 3 giorni iniziando 1 giorno prima della somministrazione di docetaxel (vedere paragrafo 4.4).

Per il cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, dato l'utilizzo contemporaneo di prednisone o prednisolone, la premedicazione raccomandata è desametasone 8 mg per via orale 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel (vedere paragrafo 4.4).

Per il cancro della prostata metastatico ormono-sensibile, indipendentemente dall'uso concomitante di prednisone o prednisolone, il regime di premedicazione raccomandato è desametasone 8 mg per via orale 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel (vedere paragrafo 4.4).

La profilassi con G-CSF può essere utilizzata per ridurre il rischio di tossicità ematologica.

Docetaxel viene somministrato in infusione della durata di un'ora ogni tre settimane.

#### Cancro della mammella

Per la terapia adiuvante del cancro della mammella operabile linfonodo positivo e linfonodo negativo la dose di docetaxel raccomandata è di 75 mg/m<sup>2</sup> somministrata 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamida 500 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 6 cicli (regime TAC) (vedere anche Adattamento della dose durante il trattamento).

Per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico la dose raccomandata di docetaxel in monoterapia è 100 mg/m<sup>2</sup>. Nel trattamento di prima linea, docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> è somministrato in associazione con doxorubicina (50 mg/m<sup>2</sup>).

In associazione con trastuzumab la dose raccomandata di docetaxel è 100 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane, con trastuzumab somministrato settimanalmente. Nello studio registrativo l'infusione iniziale di docetaxel

è stata iniziata il giorno dopo la prima somministrazione di trastuzumab. Le successive dosi di docetaxel sono state somministrate immediatamente dopo l'infusione di trastuzumab se la precedente dose di trastuzumab era stata ben tollerata. Per la dose e la somministrazione di trastuzumab vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto del trastuzumab.

In associazione con capecitabina il dosaggio raccomandato di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup> ogni tre settimane, in associazione con capecitabina alla dose di 1.250 mg/m<sup>2</sup> due volte al giorno (entro 30 minuti dopo il pasto) per 2 settimane seguite da un intervallo di 1 settimana. Per il calcolo della dose di capecitabina secondo la superficie corporea, vedere il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di capecitabina.

#### Cancro del polmone non a piccole cellule

In pazienti che non hanno mai ricevuto chemioterapia per il cancro del polmone non a piccole cellule, la dose raccomandata è docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> seguita immediatamente da cisplatino 75 mg/m<sup>2</sup> in 30-60 minuti. Per il trattamento dopo fallimento di precedente chemioterapia contenente platino la dose raccomandata è di 75 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia.

#### Cancro della prostata

##### *Cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione*

La dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup>. Prednisone o prednisolone 5 mg per via orale due volte al giorno viene somministrato per tutta la durata del trattamento (vedere paragrafo 5.1).

##### *Cancro della prostata metastatico ormono-sensibile*

La dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 6 cicli. Prednisone o prednisolone 5 mg per via orale due volte al giorno può essere somministrato per tutta la durata del trattamento.

#### Adenocarcinoma dello stomaco

La dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione della durata di 1 ora, seguita da cisplatino 75 mg/m<sup>2</sup>, in infusione della durata di 1-3 ore (entrambe solo il giorno 1), seguita da 5-fluorouracile 750 mg/m<sup>2</sup> al giorno somministrato in infusione continua di 24 ore per 5 giorni, a partire dalla fine dell'infusione di cisplatino. Il trattamento è ripetuto ogni tre settimane. I pazienti devono ricevere una premedicazione con antiemetici ed un'adeguata idratazione per la somministrazione del cisplatino. Deve essere fatta la profilassi con G-CSF in modo tale da attenuare il rischio di tossicità ematologiche (vedere inoltre Adattamento della dose durante il trattamento).

#### Cancro del collo e della testa

I pazienti devono ricevere antiemetici come premedicazione ed un'idratazione adeguata (prima e dopo la somministrazione del cisplatino). La profilassi con G-CSF può essere fatta in modo tale da attenuare il rischio di tossicità ematologiche. Tutti i pazienti trattati con docetaxel degli studi TAX 323 e TAX 324 hanno ricevuto una profilassi antibiotica.

- Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia (TAX 323)  
Per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato e non operabile del collo e della testa (SCCHN), la dose consigliata di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup> come infusione di 1 ora seguita dal cisplatino 75 mg/m<sup>2</sup> per oltre 1 ora, il giorno 1, seguito da 5-fluorouracile 750 mg/m<sup>2</sup> al giorno somministrato in infusione continua di 24 ore per 5 giorni. Questo schema posologico viene somministrato ogni 3 settimane per 4 cicli. A seguito della chemioterapia, i pazienti devono ricevere la radioterapia.
- Chemioterapia di induzione seguita da chemioradioterapia (TAX 324)  
Per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma localmente avanzato del collo e della testa a cellule squamose (SCCHN) (tecnicamente inoperabile, con una bassa probabilità di riuscita chirurgica, e nell'ottica di una conservazione dell'organo) la dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione della durata di 1 ora, il giorno 1, seguito dal cisplatino 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in infusione della durata di 30 minuti fino a tre ore, seguito da 5-fluorouracile 1000 mg/m<sup>2</sup> al giorno, somministrato in infusione continua di 1-4 giorni. Questo schema posologico viene somministrato ogni tre settimane per tre cicli. Dopo la chemioterapia, i pazienti devono ricevere la chemio-radioterapia.

Per le modifiche della dose di 5-fluorouracile e cisplatino, vedere gli specifici riassunti delle caratteristiche del prodotto.

#### Adattamento della posologia durante il trattamento

##### Generale

Il docetaxel deve essere somministrato quando la conta dei neutrofili è  $\geq 1500$  cellule/mm<sup>3</sup>. In pazienti che abbiano manifestato, durante la terapia con docetaxel, neutropenia febbrile, neutrofili  $<500$  /mm<sup>3</sup> per più di una settimana, reazioni cutanee gravi o cumulative, o neuropatia periferica grave, la dose di docetaxel deve essere ridotta da 100 mg/m<sup>2</sup> a 75 mg/m<sup>2</sup> e/o da 75 a 60 mg/m<sup>2</sup>. Se, a 60 mg/m<sup>2</sup>, il paziente continua a manifestare queste reazioni, il trattamento deve essere interrotto.

##### Terapia adiuvante per il cancro della mammella

Una profilassi primaria con G-CSF deve essere considerata per i pazienti che ricevono una terapia adiuvante con docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide (TAC) per il cancro della mammella. Nei pazienti che presentano neutropenia febbrile e/o infezione neutropenica la dose di docetaxel deve essere ridotta a 60 mg/m<sup>2</sup> in tutti i cicli successivi (vedere sezioni 4.4 e 4.8). Nei pazienti che manifestano una stomatite di Grado 3 o 4 la dose deve essere ridotta a 60 mg/m<sup>2</sup>

##### In associazione con cisplatino

Per i pazienti trattati inizialmente con docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino ed il cui nadir della conta piastrinica nel precedente ciclo di terapia è stato  $<25000$  cellule/mm<sup>3</sup>, o in pazienti che manifestano neutropenia febbrile, o in pazienti con grave tossicità non ematologica, la dose di docetaxel nei cicli successivi deve essere ridotta a 65 mg/m<sup>2</sup>. Per gli aggiustamenti della dose di cisplatino, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto.

##### In associazione con capecitabina

- Per l'adattamento della dose di capecitabina, si veda il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina.
- Nei pazienti che sviluppano la prima comparsa di una tossicità di Grado 2 che permane al momento della somministrazione successiva di docetaxel/capecitabina, il trattamento deve essere rimandato fino a risoluzione al Grado 0-1, e successivamente ripreso con il 100% della dose iniziale.
- Nei pazienti che sviluppano la seconda comparsa di una tossicità di Grado 2, oppure la prima comparsa di una tossicità di Grado 3 in qualsiasi momento del ciclo di terapia, il trattamento deve essere rimandato fino a risoluzione al Grado 0-1 e successivamente ripreso con docetaxel 55 mg/m<sup>2</sup>.
- Per una qualsiasi comparsa successiva di tossicità o per una qualsiasi tossicità di Grado 4 sospendere la terapia con docetaxel.

Per le modifiche della dose di trastuzumab, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab.

##### In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile:

Se si verifica un episodio di neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica malgrado l'uso di G-CSF, la dose di docetaxel deve essere ridotta da 75 a 60 mg/m<sup>2</sup>. Se si verificano ulteriori episodi di neutropenia complicata la dose di docetaxel deve essere ridotta da 60 a 45 mg/m<sup>2</sup>. Nel caso di trombocitopenia di Grado 4 la dose di docetaxel deve essere ridotta da 75 a 60 mg/m<sup>2</sup>. I pazienti non devono essere ritrattati con altri cicli di docetaxel fino a che i neutrofili siano ritornati ad un livello  $> 1.500$  cellule/mm<sup>3</sup> e le piastrine siano ritornate ad un livello  $> 100.000$  cellule/mm<sup>3</sup>.

Interrompere il trattamento se queste tossicità persistono (vedere paragrafo 4.4).

Modifiche della dose raccomandate a causa della tossicità in pazienti trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (5-FU):

| <b>Tossicità</b>   | <b>Aggiustamento della dose</b>  |
|--------------------|--|
| Diarrea di grado 3 | Primo episodio: ridurre la dose del 5-FU del 20%.<br>Secondo episodio: ridurre la dose di docetaxel del 20%. |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Diarrea di grado 4            | Primo episodio: ridurre le dosi del docetaxel e del 5-FU del 20%.<br>Secondo episodio: interrompere il trattamento.   |
| Stomatiti/mucositi di grado 3 | Primo episodio: ridurre la dose del 5-FU del 20%.<br>Secondo episodio: interrompere il solo 5-FU, in tutti i cicli successivi.<br>Terzo episodio: ridurre la dose di docetaxel del 20%. |
| Stomatiti/mucositi di grado 4 | Primo episodio: interrompere il solo 5-FU, in tutti i cicli successivi.<br>Secondo episodio: ridurre la dose di docetaxel del 20%.  |

Per le modifiche della dose del cisplatino e del 5-fluorouracile, vedere gli specifici riassunti delle caratteristiche del prodotto.

Nello studio registrativo SCCHN in pazienti che hanno manifestato neutropenia complicata (comprendente neutropenia prolungata, neutropenia febbrile, o infezione), è stato suggerito l'uso di G-CSF per fornire una copertura profilattica (es. giorni 6-15) in tutti i cicli successivi.

### Popolazioni particolari

#### Pazienti con insufficienza epatica

Sulla base dei dati di farmacocinetica con docetaxel a 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in monoterapia, nei pazienti con aumento delle transaminasi (ALT e/o AST) maggiori di 1,5 volte il limite superiore normale e fosfatasi alcalina maggiore di 2,5 volte il limite superiore normale, la dose di docetaxel raccomandata è 75 mg/m<sup>2</sup> (vedere paragrafi 4.4 e 5.2). Per i pazienti con bilirubina sierica oltre il limite superiore normale e/o ALT e AST >3,5 volte il limite superiore normale associati con fosfatasi alcalina maggiore di 6 volte il limite superiore normale, non può essere raccomandata alcuna riduzione della dose e docetaxel non deve essere somministrato se non nei casi in cui sia strettamente indicato.

In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco, lo studio clinico registrativo ha escluso i pazienti con un valore di ALT e/o AST > 1,5 volte il limite superiore normale associato a un valore di fosfatasi alcalina > 2,5 volte il limite superiore normale e a un valore di bilirubina >1 volta il limite superiore normale; per questi pazienti, nessuna riduzione della dose può essere consigliata ed il docetaxel non deve essere usato a meno che non sia strettamente indicato. Non sono disponibili dati in pazienti con insufficienza epatica trattati con docetaxel in associazione nelle altre indicazioni.

#### Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di Docetaxel Teva nel carcinoma nasofaringeo nei bambini di età da 1 mese a meno di 18 anni non sono state stabilite.

Non vi sono dati sull'uso di Docetaxel Teva nella popolazione pediatrica nelle indicazioni del cancro della mammella, cancro del polmone non a piccole cellule, cancro della prostata, adenocarcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, escludendo il carcinoma nasofaringeo tipo II e III meno differenziato.

#### Anziani

Con riferimento alla farmacocinetica di popolazione, non vi sono speciali istruzioni per l'uso negli anziani. In associazione con capecitabina per i pazienti di età di 60 anni e oltre, si raccomanda una riduzione della dose iniziale al 75% (vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina).

#### Modo di somministrazione

Per le istruzioni sulla preparazione e sulla somministrazione del prodotto, vedere paragrafo 6.6.

### **4.3 Controindicazioni**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Il docetaxel non deve essere usato nei pazienti con una conta iniziale di neutrofili <1.500 cellule/mm<sup>3</sup>.

Il docetaxel non deve essere usato in pazienti con insufficienza epatica grave, in mancanza di dati disponibili (vedere paragrafi 4.2 e 4.4).

Le controindicazioni per gli altri farmaci valgono anche quando utilizzati in associazione con docetaxel.

#### **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego**

Salvo controindicazioni, per i tumori della mammella e del polmone non a piccole cellule la premedicazione con corticosteroidi orali, come desametasone 16 mg al dì (es. 8 mg BID) per 3 giorni, iniziando il giorno prima della somministrazione di docetaxel, può ridurre l'incidenza e la gravità della ritenzione di liquidi così come la gravità delle reazioni di ipersensibilità. Per il cancro della prostata, la premedicazione è costituita da desametasone orale 8 mg, 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel (vedere paragrafo 4.2).

##### Ematologia

La neutropenia è la più frequente delle reazioni avverse osservate con docetaxel. I nadir dei neutrofili sono comparsi dopo 7 giorni (valore mediano) ma nei pazienti pesantemente pretrattati questo intervallo può essere abbreviato. In tutti i pazienti in trattamento con docetaxel deve essere eseguito frequentemente un controllo dell'emocromo completo. I pazienti non devono essere trattati di nuovo con docetaxel finché il valore dei neutrofili sia ritornato a  $\geq 1.500$  cellule/mm<sup>3</sup> (vedere paragrafo 4.2).

Nel caso di neutropenia grave ( $< 500$  cellule/mm<sup>3</sup> per sette o più giorni) durante il trattamento con docetaxel si raccomanda una riduzione della dose nei cicli successivi di terapia o l'uso di appropriate misure sintomatiche (vedere paragrafo 4.2).

In pazienti trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (TCF), la neutropenia febbrile e l'infezione neutropenica si sono verificate con un'incidenza più bassa quando i pazienti hanno ricevuto G-CSF in profilassi. I pazienti trattati con TCF devono ricevere il G-CSF come profilassi per attenuare il rischio di neutropenia complicata (neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica). I pazienti che ricevono TCF devono essere monitorati molto attentamente (vedere paragrafi 4.2 e 4.8).

Nei pazienti trattati con docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamida (regime TAC), neutropenia febbrile e/o infezione neutropenica si sono verificate con un'incidenza più bassa quando i pazienti hanno ricevuto profilassi primaria con G-CSF. La profilassi primaria con G-CSF deve essere considerata nei pazienti che ricevono terapia adiuvante con TAC per il cancro della mammella per attenuare il rischio di neutropenia complicata (neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica). I pazienti che ricevono TAC devono essere monitorati attentamente (vedere paragrafi 4.2 e 4.8).

##### Reazioni gastrointestinali

Si raccomanda cautela nei pazienti con neutropenia, particolarmente a rischio di sviluppare complicanze gastrointestinali. Benché la maggioranza dei casi si sia verificata durante il primo o secondo ciclo del regime contenente docetaxel si può sviluppare un'enterocolite in ogni momento, e può portare al decesso già dal primo giorno di insorgenza. I pazienti devono essere strettamente monitorati per manifestazioni precoci di grave tossicità gastrointestinale (vedere paragrafi 4.2, 4.4 Ematologia e 4.8).

##### Reazioni di ipersensibilità

I pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione per la possibile comparsa di reazioni di ipersensibilità, specialmente durante la prima e la seconda infusione. Entro pochi minuti dall'inizio dell'infusione di docetaxel possono verificarsi reazioni di ipersensibilità perciò devono essere tenuti a disposizione mezzi per il trattamento della ipotensione e del broncospasmo. Se si verificano reazioni di ipersensibilità con sintomi minori come vampate o reazioni cutanee localizzate non è necessario interrompere la terapia. Tuttavia reazioni gravi, come ipotensione grave, broncospasmo o

eruzione/eritema generalizzati richiedono l'immediata sospensione dell'infusione di docetaxel ed un trattamento appropriato. I pazienti in cui comparissero gravi reazioni di ipersensibilità non devono più assumere docetaxel. Pazienti che hanno avuto una precedente reazione di ipersensibilità a paclitaxel possono essere a rischio di sviluppare una reazione di ipersensibilità a docetaxel, inclusa una reazione di ipersensibilità più severa. Questi pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione durante l'inizio della terapia con docetaxel.

### Reazioni cutanee

Sono stati osservati eritema cutaneo localizzato alle estremità (palmo della mano e pianta del piede) con edema seguito da desquamazione. Sono stati riportati sintomi gravi quali eruzioni cutanee seguite da desquamazione che hanno condotto alla sospensione momentanea o definitiva del trattamento con docetaxel (vedere paragrafo 4.2).

A seguito del trattamento con docetaxel sono state riportate Reazioni Avverse Cutanee Gravi (SCAR - Severe Cutaneous Adverse Reactions) quali Sindrome di Stevens-Johnson (SJS), Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) e Pustolosi Esantematosa Generalizzata Acuta (AGEP). I pazienti devono essere informati su segni e sintomi delle gravi manifestazioni cutanee e monitorati attentamente. Se compaiono segni e sintomi suggestivi di queste reazioni, si deve considerare l'interruzione di docetaxel.

### Ritenzione di liquidi

I pazienti con grave ritenzione di liquidi, come versamento pleurico, pericardico e ascite, devono essere monitorati attentamente.

### Patologie respiratorie

Sono stati riportati casi di Sindrome da distress respiratorio acuto, polmonite interstiziale/polmonite, malattia polmonare interstiziale, fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria e possono essere associati ad esito fatale. Sono stati riportati casi di polmonite atinica in pazienti sottoposti anche a radioterapia.

Se appaiono nuovi sintomi polmonari o se i sintomi già esistenti dovessero peggiorare, i pazienti devono essere tempestivamente esaminati, strettamente monitorati, e trattati adeguatamente. È raccomandata la sospensione della terapia con docetaxel fino a quando non è disponibile una diagnosi. L'impiego tempestivo di misure di supporto adeguate può contribuire a migliorare il quadro clinico. Il beneficio relativo alla ripresa della terapia con docetaxel deve essere attentamente valutato.

### Pazienti con compromissione epatica

In pazienti trattati con docetaxel a 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in monoterapia che hanno livelli di transaminasi sieriche (ALT e/o AST) maggiori di 1,5 volte il limite superiore normale in concomitanza con livelli di fosfatasi alcalina sierica maggiori di 2,5 volte il limite superiore normale, c'è un rischio più elevato di sviluppare reazioni avverse gravi come morte tossica comprendente sepsi ed emorragia gastrointestinale che possono essere fatali, neutropenia febbrile, infezioni, trombocitopenia, stomatite ed astenia. Perciò, in pazienti con test di funzionalità epatica elevati, la dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m<sup>2</sup> e i test di funzionalità epatica devono essere eseguiti prima di iniziare il trattamento e prima di ogni ciclo (vedere paragrafo 4.2).

Nei pazienti che abbiano valori sierici di bilirubina maggiori del limite superiore normale e/o valori di ALT e AST superiori di 3,5 volte il limite superiore normale con fosfatasi alcalina superiore di 6 volte il limite superiore normale non si può raccomandare una riduzione di dosaggio e docetaxel non deve essere usato se non strettamente indicato.

In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco, lo studio clinico registrativo ha escluso i pazienti con un valore di ALT e/o AST >1,5 volte il limite superiore normale associato a un valore di fosfatasi alcalina > 2,5 volte il limite superiore normale e a un valore di bilirubina >1 volta il limite superiore normale; per questi pazienti, nessuna riduzione della dose può essere consigliata ed il docetaxel non dovrebbe essere usato a meno che non sia strettamente indicato. Non sono disponibili dati su pazienti con compromissione epatica trattati con docetaxel in associazione nelle altre indicazioni.



### Pazienti con compromissione renale

Non vi sono dati disponibili nei pazienti con grave compromissione renale sottoposti a terapia con docetaxel.

### Sistema nervoso

La comparsa di neurotossicità periferica grave richiede riduzione della dose (vedere paragrafo 4.2).

### Tossicità cardiaca

Insufficienza cardiaca è stata osservata in pazienti trattati con docetaxel in associazione con trastuzumab, in particolare dopo chemioterapia contenente antracicline (doxorubicina o epirubicina). Questa è risultata essere da moderata a severa ed è stata associata a decessi (vedere paragrafo 4.8).

Quando i pazienti sono candidati al trattamento di docetaxel in associazione con trastuzumab devono essere sottoposti ad una valutazione cardiaca di base. La funzione cardiaca deve essere ulteriormente monitorata durante il trattamento (es. ogni tre mesi) per identificare i pazienti che potrebbero sviluppare alterazioni cardiache. Per maggiori dettagli vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab.

In pazienti trattati con docetaxel in regimi di combinazione che includevano doxorubicina, 5-fluorouracile e/o ciclofosfamide è stata riportata aritmia ventricolare, inclusa tachicardia ventricolare (a volte fatale) (vedere paragrafo 4.8).

Si raccomanda una valutazione cardiaca al basale.

### Patologie dell'occhio

In pazienti trattati con docetaxel sono stati riportati casi di edema maculare cistoide (EMC). I pazienti con problemi di vista devono essere sottoposti ad un tempestivo e completo esame oftalmologico. Nel caso in cui venga diagnosticata la EMC, il trattamento con docetaxel deve essere interrotto ed iniziato un appropriato trattamento (vedi paragrafo 4.8).

### Seconda malignità primitiva

Sono state osservate seconde malignità primitive quando docetaxel è stato somministrato in combinazione con altri trattamenti antitumorali, noti per essere associati con seconde malignità primitive. Seconde malignità primitive (incluse leucemia mieloide acuta, sindrome mielodisplastica e linfoma non-Hodgkin), possono verificarsi diversi mesi o anni dopo la terapia contenente docetaxel. I pazienti devono essere monitorati per seconde malignità primitive (vedere paragrafo 4.8).

### Sindrome da lisi tumorale

È stata segnalata sindrome da lisi tumorale dopo il primo o il secondo ciclo di trattamento con docetaxel (vedere paragrafo 4.8). I pazienti a rischio di sindrome da lisi tumorale (ad esempio con insufficienza renale, iperuricemia, tumore voluminoso, progressione rapida) devono essere attentamente monitorati. Si raccomanda la correzione della disidratazione e il trattamento degli alti livelli di acido urico prima dell'inizio del trattamento.

### Altro

Devono essere adottate misure contraccettive durante il trattamento sia per gli uomini sia per le donne e per gli uomini per almeno sei mesi dopo la sua sospensione (vedere paragrafo 4.6).

La co-somministrazione di docetaxel con forti inibitori del CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, itraconazolo, claritromicina, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina e voriconazolo), deve essere evitata (vedere paragrafo 4.5).

### Ulteriori precauzioni per il trattamento adiuvante del cancro della mammella

### Neutropenia complicata

Per le pazienti che presentano una neutropenia complicata (neutropenia prolungata, neutropenia febbrile o infezione) si deve considerare la terapia con G-CSF e riduzione della dose (vedere paragrafo 4.2).

### Eventi avversi gastrointestinali

Sintomi come dolore addominale e malessere, febbre, diarrea con o senza neutropenia, potrebbero essere manifestazioni precoci di tossicità gastrointestinale grave e devono essere valutati e trattati immediatamente.

### Insufficienza cardiaca congestizia

Le pazienti, durante la terapia ed il periodo di follow-up, devono essere seguite per sintomi che possono ricondurre a insufficienza cardiaca congestizia. . Nelle pazienti trattate con il regime TAC per cancro della mammella linfonodo positivo è stato dimostrato che il rischio di insufficienza cardiaca congestizia (CHF) è più elevato nel primo anno dopo la terapia (vedere paragrafi 4.8 e 5.1).

### Pazienti con 4 o più linfonodi positivi

Dato che il beneficio osservato nelle pazienti con 4 o più linfonodi positivi non è stato statisticamente significativo per quanto riguarda la sopravvivenza libera da malattia (DFS) e sopravvivenza globale (OS), il positivo rapporto beneficio/ rischio della terapia con TAC in pazienti con 4 o più linfonodi positivi non è stato pienamente dimostrato nell'analisi finale (vedere paragrafo 5.1).

### Anziani

#### Precauzioni per l'uso nella terapia adiuvante per il cancro della mammella

Sono disponibili dati limitati su pazienti di età superiore a 70 anni trattati con docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide.

#### Precauzioni per l'uso nel cancro della prostata resistente alla castrazione

In uno studio sul cancro della prostata (TAX 327) dei 333 pazienti trattati con docetaxel ogni tre settimane, 209 avevano un'età uguale o superiore a 65 anni e 68 pazienti superiore ai 75 anni. Nei pazienti trattati con docetaxel ogni tre settimane, l'incidenza di alterazioni ungueali correlate al farmaco, nei pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni, risultava superiore di oltre il 10% rispetto ai pazienti più giovani. L'incidenza di febbre, diarrea, anoressia ed edema periferico correlabili al farmaco nei pazienti di età uguale o superiore ai 75 anni risultava superiore di oltre il 10% rispetto ai pazienti di età inferiore ai 65 anni.

#### Precauzioni per l'uso nel cancro della prostata ormono-sensibile

In uno studio sul cancro della prostata ormono-sensibile (STAMPEDE), dei 545 pazienti trattati con docetaxel ogni 3 settimane, 296 avevano un'età uguale o superiore a 65 anni e 48 pazienti un'età uguale o superiore a 75 anni. Un numero maggiore di pazienti di età  $\geq 65$  anni nel braccio docetaxel ha riportato reazioni da ipersensibilità, neutropenia, anemia, ritenzione di liquidi, dispnea e alterazioni ungueali rispetto ai pazienti di età inferiore a 65 anni. Nessuno di questi aumenti nella frequenza ha raggiunto il 10% di differenza rispetto al braccio di controllo. Nei pazienti di età pari o superiore a 75 anni, rispetto ai pazienti più giovani, neutropenia, anemia, diarrea, dispnea e infezione delle vie respiratorie superiori sono state segnalate con una maggiore incidenza (almeno il 10% in più).

#### Precauzioni per l'uso nell'adenocarcinoma dello stomaco

Fra i 300 pazienti (221 nello studio di fase III e 79 nello studio di fase II) trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile nello studio del carcinoma dello stomaco, 74 avevano 65 o più anni e 4 avevano 75 o più anni. L'incidenza degli eventi avversi gravi è stata più elevata nei pazienti anziani in confronto a quelli più giovani. L'incidenza degli eventi avversi è stata più elevata nelle persone anziane rispetto a quelle giovani. L'incidenza dei seguenti eventi avversi (di tutti i gradi): letargia, stomatite ed infezione neutropenica si è verificata con una frequenza  $> 10\%$  nei pazienti con 65 o più anni rispetto ai pazienti più giovani.

Gli anziani trattati con TCF devono essere monitorati molto attentamente.

### Eccipienti

### *Etanolo*

Questo medicinale contiene 181 mg di alcol (etanolo anidro) in ogni flaconcino (25,1% (w/w)).

Una dose di 100 mg/m<sup>2</sup> di questo medicinale somministrato a un adulto di 70 kg comporterebbe un'esposizione a 23 mg/kg di etanolo che può causare un aumento della concentrazione di alcol nel sangue (BAC) di circa 4 mg/100 ml.

Per confronto, per un adulto che beve un bicchiere di vino o 500 ml di birra, il BAC è probabile che sia di circa 50 mg/100 ml.

Poiché questo medicinale viene solitamente somministrato lentamente nell'arco di 1 ora, gli effetti dell'alcol possono essere ridotti.

La co-somministrazione con medicinali contenenti per es. glicole propilenico o etanolo può portare all'accumulo di etanolo e indurre effetti avversi, in particolare nei bambini piccoli con attività metabolica bassa o immatura.

Dannoso per chi soffre di alcolismo.

La presenza di etanolo è da considerare anche in caso di gravidanza o allattamento, e nel trattamento dei bambini.

Devono essere considerati possibili effetti sul sistema nervoso centrale.

### **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione**

La quantità di alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali.

Studi *in vitro* hanno dimostrato che il metabolismo del docetaxel può essere modificato dalla co-somministrazione di composti che inducono o inibiscono il citocromo P450-3A o che vengono da questo metabolizzati (e possano perciò inibire competitivamente l'enzima), quali ciclosporine, ketoconazolo e eritromicina. Di conseguenza usare cautela nella gestione di pazienti in trattamento concomitante con tali medicinali per il rischio potenziale di interazioni importanti.

In caso di associazione con inibitori del CYP3A4, l'insorgenza di reazioni avverse a docetaxel può aumentare, come conseguenza di un ridotto metabolismo. Se il trattamento concomitante di un forte inibitore del CYP3A4 (per esempio ketoconazolo, itraconazolo, claritromicina, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina e voriconazolo) non può essere evitato, è necessario uno stretto controllo clinico ed un aggiustamento della dose di docetaxel può essere appropriato durante il trattamento con un forte inibitore del CYP3A4 (vedere paragrafo 4.4). In uno studio di farmacocinetica con 7 pazienti, la co-somministrazione di docetaxel con ketoconazolo, un forte inibitore del CYP3A4, ha portato alla diminuzione del 49% della clearance del docetaxel.

La farmacocinetica di docetaxel in presenza di prednisone è stata studiata nei pazienti con cancro della prostata metastatico. Docetaxel è metabolizzato da CYP3A4 ed il prednisone causa induzione del CYP3A4. Non è stato osservato alcun effetto statisticamente significativo del prednisone sulla farmacocinetica di docetaxel.

Docetaxel è altamente legato alle proteine (> del 95%). Anche se non è stata studiata specificatamente la possibile interazione *in vivo* tra docetaxel e terapie concomitanti, le interazioni *in vitro* tra farmaci fortemente legati alle proteine quali eritromicina, difenidramina, propranololo, propafenone, fenitoina, salicilati, sulfametoxazolo e sodio valproato non hanno evidenziato influenze sul legame di docetaxel alle proteine. Inoltre desametasone non modifica il legame proteico di docetaxel. Docetaxel non influenza il legame della digitossina.

La farmacocinetiche di docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide non hanno manifestato interferenze durante la loro co-somministrazione. Dati limitati provenienti da un singolo studio non controllato sembrano indicare un'interazione tra docetaxel e carboplatino. Quando utilizzato in associazione con docetaxel, la clearance di carboplatino è stata superiore di circa il 50% rispetto ai valori precedentemente riportati per l'utilizzo in monoterapia.

## 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

### Gravidanza

Non ci sono informazioni sull'uso di docetaxel nella donna in gravidanza. In studi effettuati sul ratto e sul coniglio, docetaxel risulta embriotossico e fetotossico, e riduce la fertilità nel ratto. Come per altri medicinali citotossici, il docetaxel può provocare danno fetale se somministrato a donne in gravidanza. Per questo motivo docetaxel non deve essere somministrato a donne gravide, a meno che non sia chiaramente indicato.

Le donne in età fertile in trattamento con docetaxel devono essere avvertite di evitare una gravidanza e di avvisare immediatamente il loro medico nel caso in cui ciò avvenga.

### Allattamento

Il docetaxel è una sostanza lipofila ma non è noto se venga escreto nel latte materno. Di conseguenza, data la potenziale insorgenza di reazioni avverse nel lattante, l'allattamento deve essere interrotto durante il trattamento con docetaxel.

### Contracezione in maschi e femmine

Durante il trattamento deve essere adottato un efficace metodo contraccettivo

### Fertilità

In studi non clinici, docetaxel ha effetti genotossici e può alterare la fertilità maschile (vedere paragrafo 5.3). Pertanto, agli uomini in trattamento con docetaxel si raccomanda di non procreare durante e fino a 6 mesi dopo il trattamento e di informarsi sulla conservazione dello sperma prima del trattamento.

## 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non sono stati eseguiti studi sugli effetti sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari. La quantità di alcol contenuta in questo medicinale e gli effetti indesiderati del prodotto possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Pertanto, i pazienti devono essere avvisati dell'impatto potenziale della quantità di alcol e degli effetti indesiderati del prodotto sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari, ed essere consigliati di non guidare o usare macchinari se hanno questi effetti indesiderati durante il trattamento.

## 4.8 Effetti indesiderati

### Sintesi del profilo di sicurezza per tutte le indicazioni

Le reazioni avverse considerate possibilmente o probabilmente correlate alla somministrazione di docetaxel sono state ottenute in:

- 1.312 e 121 pazienti che hanno ricevuto 100 mg/m<sup>2</sup> e 75 mg/m<sup>2</sup> di docetaxel rispettivamente come monoterapia,
- 258 pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con doxorubicina,
- 406 pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con cisplatino,
- 92 pazienti trattati con docetaxel in associazione con trastuzumab,
- 255 pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con capecitabina,
- 332 pazienti (TAX 327) che hanno ricevuto docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone (vengono presentati gli effetti indesiderati correlati al trattamento clinicamente rilevanti),
- 1.276 pazienti (744 e 532 rispettivamente in TAX 316 e GEICAM 9805) che hanno ricevuto docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide (vengono presentati gli effetti indesiderati correlati al trattamento clinicamente rilevanti),
- 300 pazienti con adenocarcinoma dello stomaco (221 nello studio di fase III e 79 nello studio di fase II) trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (si sono verificati

degli effetti indesiderati clinicamente importanti legati al trattamento).

- 174 e 251 pazienti con cancro del collo e della testa trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (si sono verificati degli effetti indesiderati clinicamente importanti legati al trattamento).
- 545 pazienti (studio STAMPEDE) che hanno ricevuto docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone e ADT.

Tali reazioni sono state descritte con i criteri NCI Common Toxicity Criteria (grado 3= G3; grado 3-4= G3/4; grado 4= G4) e con i termini COSTARTE MedDRA. Le frequenze sono definite come: molto comuni ( $\geq 1/10$ ); comuni (da  $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ); non comuni (da  $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ); rari (da  $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ); molto rari ( $< 1/10.000$ ); non nota (non può essere definita stimate in base ai dati disponibili).

All'interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità.

Le reazioni avverse riportate più di frequente durante l'uso del solo docetaxel sono: neutropenia (reversibile e non cumulativa; il giorno medio al nadir era il giorno 7 e la durata media della neutropenia grave ( $< 500$  cellule/mm<sup>3</sup>) era di 7 giorni), anemia, alopecia, nausea, vomito, stomatiti, diarrea ed astenia. La gravità degli eventi avversi di docetaxel può essere aumentata quando docetaxel è somministrato in associazione con altri agenti chemioterapici.

Per l'associazione con trastuzumab sono stati riportati gli eventi avversi (tutti i gradi) in percentuale  $\geq 10\%$ . Vi è stato un aumento dell'incidenza di eventi avversi seri (40% vs 31%) e di eventi avversi di grado 4 (34% vs 23%) nel gruppo trattato in associazione con trastuzumab rispetto alla monoterapia con docetaxel.

Per la associazione con capecitabina, vengono riportati gli effetti indesiderati correlati al trattamento più frequenti ( $\geq 5\%$ ) osservati in uno studio clinico di fase III in pazienti con cancro della mammella dopo fallimento di una terapia con antracicline (vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina).

Per l'associazione con ADT e prednisone o prednisolone (studio STAMPEDE) vengono riportati gli eventi avversi verificatisi durante i 6 cicli di trattamento con docetaxel e con una incidenza superiore di almeno il 2% nel braccio di trattamento con docetaxel rispetto al braccio di controllo, utilizzando la scala di classificazione CTCAE.

Con docetaxel sono state osservate frequentemente le seguenti reazioni avverse:

#### Disturbi del sistema immunitario

Reazioni di ipersensibilità si sono verificate prevalentemente entro pochi minuti dall'inizio dell'infusione di docetaxel e sono state generalmente di grado da lieve a moderato. I sintomi riportati più frequentemente sono stati vampate di calore, rash con o senza prurito, oppressione toracica, dolore alla schiena, dispnea e febbre o brividi. Le reazioni gravi sono state caratterizzate da ipotensione e/o broncospasmo o rash/eritema generalizzato (vedere paragrafo 4.4).

#### Patologie del sistema nervoso

Lo sviluppo di neurotossicità periferica grave richiede la riduzione della dose (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Segni neurosensoriali di grado da lieve a moderato sono caratterizzati da parestesia, disestesia o dolore incluso bruciore. Eventi neuromotori sono caratterizzati principalmente da debolezza.

#### Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Sono state osservate reazioni cutanee reversibili considerate in genere di grado da lieve a moderato. Le reazioni sono state caratterizzate da rash, incluse le eruzioni localizzate principalmente ai piedi ed alle mani (compresa la sindrome mano-piede grave), ma anche alle braccia, al viso o al torace, frequentemente associate a prurito. Le eruzioni si sono manifestate generalmente entro una settimana

dall'infusione di docetaxel.

Meno frequentemente sono stati riportati sintomi gravi come eruzioni seguite da desquamazione che raramente hanno richiesto la sospensione temporanea o definitiva del trattamento (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Sono state riportate gravi alterazioni a carico dell'unghia caratterizzate da ipopigmentazione o iperpigmentazione, talvolta dolore e onicolisi.

#### Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

Le reazioni nel sito di infusione sono state generalmente lievi e caratterizzate da iperpigmentazione, infiammazione, arrossamento e secchezza della pelle, flebite o stravaso, «aumento della permeabilità» della vena.

Ritenzione di liquidi che comprende casi di edema periferico e meno frequentemente casi di versamento pleurico, pericardico, ascite e aumento di peso. L'edema periferico di solito si manifesta iniziando alle estremità inferiori e può divenire generalizzato con un aumento di peso di 3 o più kg. La ritenzione idrica è cumulativa per incidenza e intensità (vedere paragrafo 4.4).

#### Tabella riassuntiva delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezioni (G3/4: 5,7% comprese sepsi e polmonite letali nell'1,7%)  | Infezioni associate a neutropenia G4 (G3/4: 4,6%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G4: 76,4%);<br>Anemia (G3/4: 8,9%);<br>Neutropenia febbrile  | Trombocitopenia (G4: 0,2%)   |  |
| Disturbi del sistema immunitario                            | Ipersensibilità (G3/4: 5,3%)  |  |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia   |  |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3: 4,1%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 4%);<br>Disgeusia (grave 0,07%) |  |  |
| Patologie cardiache   |   | Aritmia (G3/4: 0,7%)   | Insufficienza cardiaca                 |
| Patologie vascolari   |   | Ipotensione;<br>Ipertensione;<br>Emorragie   |  |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           | Dispnea (grave: 2,7%)   |  |  |
| Patologie gastrointestinali                                 | Stomatite (G3/4: 5,3%);<br>Diarrea (G3/4: 4%);<br>Nausea (G3/4: 4%);<br>Vomito (G3/4: 3%)                           | Stipsi (grave: 0,2%);<br>Dolore addominale (grave: 1%);<br>Emorragia gastrointestinale (grave: 0,3%) | Esofagite (grave: 0,4%)                |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo             | Alopecia;<br>Reazioni cutanee (G3/4: 5,9%);<br>Alterazioni ungueali (gravi: 2,6%)                                   |  |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>                                  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|--|--|
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (grave: 1,4%)   | Artralgia  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Ritenzione di liquidi (grave: 6,5%);<br>Astenia (grave: 11,2%);<br>Dolore | Reazioni in sede di infusione;<br>Dolore toracico non cardiaco (grave 0,4%)  |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (< 5%);<br>Aumento della fosfatasi alcalina ematica G3/4 (< 4%);<br>Aumento di AST G3/4 (< 3%);<br>Aumento di ALT G3/4 (< 2%) |  |

Descrizione di reazioni avverse selezionate nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia

*Patologie del sistema emolinfopoietico*

Raro: episodi di sanguinamento associati a trombocitopenia di grado 3/4

*Patologie del sistema nervoso*

Dati di reversibilità sono disponibili nel 35,3% dei pazienti che hanno sviluppato neurotossicità dopo trattamento con docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia. Gli eventi sono stati reversibili in maniera spontanea entro i 3 mesi.

*Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Molto raro: un caso di alopecia non reversibile alla fine dello studio. Il 73% delle reazioni cutanee sono state reversibili entro 21 giorni.

*Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione*

La dose cumulativa media alla sospensione del trattamento è stata di più di 1.000 mg/m<sup>2</sup> e il tempo mediano di reversibilità della ritenzione idrica è stato di 16,4 settimane (range da 0 a 42 settimane). La comparsa di ritenzione di grado da moderato a grave (dose cumulativa media: 818,9 mg/m<sup>2</sup>) è ritardata nei pazienti che hanno ricevuto la premedicazione rispetto ai pazienti senza premedicazione (dose media cumulativa: 489,7 mg/m<sup>2</sup>); tuttavia, in alcuni pazienti, è stata riportata durante i primi cicli di terapia.

Tabella delle reazioni avverse nel cancro del polmone non a piccole cellule per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>         |
|---|---|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezioni (G3/4: 5%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G4: 54,2%);<br>Anemia (G3/4: 10,8%);<br>Trombocitopenia (G4: 1,7%) | Neutropenia febbrile                       |
| Disturbi del sistema immunitario                            |   | Ipersensibilità (non grave)                |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia   |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 0,8%)                                    | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 2,5%) |
| Patologie cardiache   |   | Aritmia (non grave)                        |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>         |
|--|---|--|
| Patologie vascolari  |   | Ipotensione                                |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea (G3/4: 3,3%);<br>Stomatite (G3/4: 1,7%);<br>Vomito (G3/4: 0,8%);<br>Diarrea (G3/4: 1,7%) | Stipsi                                     |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia;<br>Reazioni cutanee (G3/4: 0,8%)  | Alterazioni ungueali (grave 0,8%)          |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Mialgia                                    |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (grave: 12,4%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 0,8%);<br>Dolore                       |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (< 2%); |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con doxorubicina

| <b>Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA</b>        | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>             | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni   | Infezioni (G3/4: 7,8%)  |  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                            | Neutropenia (G4: 91,7%);<br>Anemia (G3/4: 9,4%);<br>Neutropenia febbrile;<br>Trombocitopenia (G4: 0,8%) |  |  |
| Disturbi del sistema immunitario                                  |   | Ipersensibilità (G3/4: 1,2%)                   |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                       |   | Anoressia                                      |  |
| Patologie del sistema nervoso                                     | Neuropatia sensitiva periferica (G3: 0,4%)  | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0,4%)     |  |
| Patologie cardiache   |   | Insufficienza cardiaca;<br>Aritmia (non grave) |  |
| Patologie vascolari   |   |  | Ipotensione                            |
| Patologie gastrointestinali                                       | Nausea (G3/4: 5%);<br>Stomatite (G3/4: 7,8%);<br>Diarrea (G3/4: 6,2%);<br>Vomito (G3/4: 5%);<br>Stipsi  |  |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                   | Alopecia;<br>Alterazioni ungueali (grave 0,4%);<br>Reazioni cutanee (non grave)                         |  |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo |   | Mialgia  |  |
| Patologie sistemiche e  | Astenia (grave: 8,1%);  | Reazioni in sede di                            |  |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| condizioni relative alla sede di somministrazione | Ritenzione di liquidi (grave: 1,2%);<br>Dolore | infusione   |   |
| Esami diagnostici                                 |  | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (< 2,5%);<br>Aumento di fosfatasi alcalina ematica G3/4 (< 2,5%) | Aumento di AST G3/4 (< 1%);<br>Aumento di ALT G3/4 (< 1%) |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro del polmone non a piccole cellule per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                                       | <b>Effetti indesiderati non comuni</b>   |
|--|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni  | Infezioni (G3/4: 5,7%)  |  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                                   | Neutropenia (G4: 51,5%);<br>Anemia (G3/4: 6,9%);<br>Trombocitopenia (G4: 0,5%)                | Neutropenia febbrile   |  |
| Disturbi del sistema immunitario   | Ipersensibilità (G3/4: 2,5%)  |  |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                              | Anoressia   |  |  |
| Patologie del sistema nervoso  | Neuropatia sensitiva periferica (G3: 3,7%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 2%)       |  |  |
| Patologie cardiache  |   | Aritmia (G3/4: 0,7%)   | Insufficienza cardiaca   |
| Patologie vascolari  |   | Ipotensione (G3/4: 0,7%)   |  |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea (G3/4: 9,6%);<br>Vomito (G3/4: 7,6%);<br>Diarrea (G3/4: 6,4%);<br>Stomatite (G3/4: 2%) | Stipsi   |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia;<br>Alterazioni ungueali (grave 0,7%);<br>Reazioni cutanee (G3/4: 0,2%)              |  |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (grave: 0,5%)   |  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (grave: 9,9%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 0,7%);<br>Febbre (G3/4: 1,2%)         | Reazioni in sede di infusione;<br>Dolore                                 |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (2,1%);<br>Aumento di ALT G3/4 (1,3%) | Aumento di AST G3/4 (0,5%);<br>Aumento di fosfatasi alcalina ematica G3/4 (0,3%) |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in associazione

con trastuzumab

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b> |
|--|--|------------------------------------|
| Patologie del sistema emolinfopoietico                                   | Neutropenia (G4: 32%);<br>Neutropenia febbrile (che include neutropenia associata a febbre e uso di antibiotico) o sepsi neutropenica; |                                    |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                              | Anoressia  |                                    |
| Disturbi psichiatrici  | Insonnia   |                                    |
| Patologie del sistema nervoso  | Parestesia; Cefalea; Disgeusia;<br>Ipoestesia  |                                    |
| Patologie dell'occhio  | Aumento della lacrimazione;<br>Congiuntivite   |                                    |
| Patologie cardiache  |  | Insufficienza cardiaca             |
| Patologie vascolari  | Linfedema  |                                    |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche                        | Epistassi; Dolore faringolaringeo;<br>Rinofaringite;<br>Dispnea; Tosse; Rinorrea   |                                    |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea; Diarrea; Vomito; Stipsi;<br>Stomatite; Dispepsia; Dolore addominale  |                                    |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia; Eritema; Rash;<br>Alterazioni ungueali   |                                    |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia; Artralgia; Dolore alle estremità; Dolore osseo; Dolore alla schiena   |                                    |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia; Edema periferico;<br>Piressia; Fatica; Infiammazione delle mucose; Dolore; Sindrome parainfluenzale; Dolore al petto; Brividi | Letargia                           |
| Esami diagnostici  | Aumento di peso  |                                    |

Descrizione di reazioni avverse selezionate nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in associazione con trastuzumab

#### *Patologie cardiache*

Insufficienza cardiaca sintomatica è stata riportata nel 2,2% dei pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con trastuzumab, rispetto allo 0% dei pazienti che hanno ricevuto docetaxel in monoterapia. Nel gruppo docetaxel e trastuzumab il 64% dei pazienti aveva ricevuto precedentemente antracicline come terapia adiuvante rispetto al 55% dei pazienti trattati con docetaxel in monoterapia.

#### *Patologie del sistema emolinfopoietico*

Molto comune: la tossicità ematologica era aumentata nei pazienti trattati con trastuzumab e docetaxel rispetto a quelli trattati con il solo docetaxel (neutropenia di grado 3/4 32% verso 22%, secondo i criteri NCI-CTC). Si noti che questo è probabilmente una sottovalutazione poiché è risaputo che docetaxel, da solo, ad una dose di 100 mg/m<sup>2</sup> porta a neutropenia nel 97% dei pazienti, di grado 4 nel 76%, basato sul nadir della conta dei neutrofili. L'incidenza della neutropenia febbrile/sepsi neutropenica era anche aumentata nei pazienti trattati con Herceptin e docetaxel (23% verso 17% dei pazienti trattati con solo docetaxel).

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con capecitabina

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  |
|--|--|---|
| Infezioni ed infestazioni  |  | Candidosi orale (G3/4: < 1%)  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                                   | Neutropenia (G3/4: 63%);<br>Anemia (G3/4: 10%)   | Trombocitopenia (G3/4: 3%)  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                              | Anoressia (G3/4: 1%);<br>Diminuzione dell'appetito   | Disidratazione (G3/4: 2%)   |
| Patologie del sistema nervoso  | Disgeusia (G3/4: <1%);<br>Parestesia (G3/4: <1%)   | Capogiri;<br>Cefalea (G3/4: <1%);<br>Neuropatia periferica  |
| Patologie dell'occhio  | Aumento della lacrimazione   |   |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche                        | Dolore faringolaringeo (G3/4: 2%)  | Dispnea (G3/4: 1%);<br>Tosse (G3/4: <1%);<br>Epistassi (G3/4: <1%)                                |
| Patologie gastrointestinali  | Stomatite (G3/4: 18%);<br>Diarrea (G3/4: 14%);<br>Nausea (G3/4: 6%);<br>Vomito (G3/4: 4%);<br>Stipsi (G3/4: 1%);<br>Dolore addominale (G3/4: 2%);<br>Dispepsia | Dolore all'addome superiore;<br>Secchezza delle fauci   |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Sindrome mano-piede (G3/4: 24%);<br>Alopecia (G3/4: 6%);<br>Alterazioni ungueali (G3/4: 2%)  | Dermatite;<br>Rash eritematoso (G3/4: <1%);<br>Scolorimento delle unghie;<br>Onicolisi (G3/4: 1%) |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (G3/4: 2%);<br>Artalgia (G3/4: 1%)   | Dolore alle estremità corporee (G3/4: <1%);<br>Dolore alla schiena (G3/4: 1%)                     |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (G3/4: 3%);<br>Piressia (G3/4: 1%);<br>Fatica/debolezza (G3/4: 5%);<br>Edema periferico (G3/4: 1%)   | Letargia;<br>Dolore   |
| Esami diagnostici  |  | Diminuzione di peso<br>Aumento di bilirubina ematica G3/4 (9%)                                    |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con prednisone o prednisolone

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>                              | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   |
|---|---|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezione (G3/4: 3,3%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G3/4: 32%);<br>Anemia (G3/4: 4,9%)                       | Trombocitopenia (G3/4: 0,6%);<br>Neutropenia febbrile                      |
| Disturbi del sistema immunitario                            |   | Ipersensibilità (G3/4: 0,6%)   |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia (G3/4: 0,6%)  |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 1,2%);<br>Disgeusia (G3/4: 0%) | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0%)                                   |
| Patologie dell'occhio                                       |   | Aumento della lacrimazione (G3/4: 0,6%)                                    |
| Patologie cardiache   |   | Disfunzione della funzionalità cardiaca ventricolare sinistra (G3/4: 0,3%) |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           |   | Epistassi (G3/4: 0%);<br>Dispnea (G3/4: 0,6%);                             |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>           | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>              |
|---|---|---|
|   |   | Tosse (G3/4: 0%)                                |
| Patologie gastrointestinali   | Nausea (G3/4: 2,4%);<br>Diarrea (G3/4: 1,2%);<br>Stomatite/Faringite (G3/4: 0,9%);<br>Vomito (G3/4: 1,2%) |   |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                       | Alopecia;<br>Alterazioni ungueali (non grave)   | Rash esfoliativo (G3/4: 0,3%)                   |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo     |   | Artralgia (G3/4: 0,3%);<br>Mialgia (G3/4: 0,3%) |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede somministrazione | Fatica (G3/4: 3,9%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 0,6%)   |   |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della prostata ormono-sensibile localmente avanzato o metastatico ad alto rischio per docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con prednisone o prednisolone e ADT (studio STAMPEDE)

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b> |
|---|---|------------------------------------|
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G3-4: 12%)<br>Anemia<br>Neutropenia febbrile (G3-4: 15%)   |                                    |
| Disturbi del sistema immunitario                            |   | Ipersensibilità (G3-4: 1%)         |
| Patologie endocrine   |   | Diabete (G3-4: 1%)                 |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 |   | Anoressia                          |
| Disturbi psichiatrici                                       | Insomnia (G3: 1%)   |                                    |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (≥G3: 2%) <sup>a</sup><br>Cefalea   | Capogiri                           |
| Patologie dell'occhio                                       |   | Visione annebbiata                 |
| Patologie cardiache   |   | Ipotensione (G3: 0%)               |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           | Dispnea (G3: 1%)<br>Tosse (G3: 0%)<br>Infezione delle vie respiratorie superiori (G3: 1%)   | Faringite (G3: 0%)                 |
| Patologie gastrointestinali                                 | Diarrea (G3: 3%)<br>Stomatite (G3: 0%)<br>Stipsi (G3: 0%)<br>Nausea (G3: 1%)<br>Dispepsia<br>Dolore addominale (G3: 0%)<br>Flatulenza | Vomito (G3: 1%)                    |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   |
|--|--|--|
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia (G3: 3%) <sup>a</sup><br>Alterazioni ungueali (G3: 1%)  | Eruzione cutanea   |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3-4: 2%)<br>Sintomi simil-influenzali (G3: 0%)<br>Astenia (G3: 0%)<br>Ritenzione di liquidi | Febbre (G3: 1%)<br>Candidiasi orale<br>Ipocalcemia (G3: 0%)<br>Iposfosfatemia (G3-4: 1%)<br>Ipokaliemia (G3: 0%) |

<sup>a</sup> Dallo studio GETUG AFU15

Tabella delle reazioni avverse per terapia adiuvante con Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con doxorubicina e ciclofosfamida nei pazienti con cancro della mammella linfonodo positivo (TAX 316) e linfonodo negativo (GEICAM 9805) – dati cumulativi

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>            | <b>Effetti indesiderati non comuni</b>                                     |
|---|--|---|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezione (G3/4: 2,4%);<br>Infezione neutropenica (G3/4: 2,6%)   |   |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Anemia (G3/4: 3%);<br>Neutropenia (G3/4: 59,2%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 1,6%);<br>Neutropenia febbrile (G3/4: NA) |   |  |
| Disturbi del sistema immunitario                            |  | Ipersensibilità (G3/4: 0,6%)                  |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia (G3/4: 1,5%)   |   |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Disgeusia (G3/4: 0,6%);<br>Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: <0,1%)   | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0%)      | Sincope (G3/4: 0%);<br>Neurotossicità (G3/4: 0%);<br>Sonnolenza (G3/4: 0%) |
| Patologie dell'occhio                                       | Congiuntivite (G3/4: <0,1%)  | Aumento della lacrimazione (G3/4: <0,1%)      |  |
| Patologie cardiache   |  | Aritmia (G3/4: 0,2%)                          |  |
| Patologie vascolari   | Vampate (G3/4: 0,5%)   | Ipotensione (G3/4: 0%);<br>Flebite (G3/4: 0%) | Linfedema (G3/4: 0%)   |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           |  | Tosse (G3/4: 0%)                              |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>           | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                           | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|---|--|--|
| Patologie gastrointestinali   | Nausea (G3/4: 5,0%);<br>Stomatite (G3/4: 6,0%);<br>Vomito (G3/4: 4,2%);<br>Diarrea (G3/4: 3,4%);<br>Stipsi (G3/4: 0,5%) | Dolore addominale (G3/4: 0,4%)                               |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                       | Alopecia (persistente <3%);<br>Alterazioni cutanee (G3/4: 0,6%);<br>Alterazioni ungueali (G3/4: 0,4%)                   |  |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo     | Mialgia (G3/4: 0,7%);<br>Artralgia (G3/4: 0,2%)   |  |  |
| Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella                 | Amenorrea (G3/4: NA)  |  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede somministrazione | Astenia (G3/4: 10,0%);<br>Piressia (G3/4: NA)<br>Edema periferico (G3/4: 0,2%)  |  |  |
| Esami diagnostici   |   | Aumento ponderale (G3/4: 0 %)<br>Calo ponderale (G3/4: 0,2%) |  |

Descrizione di reazioni avverse selezionate per la terapia adiuvante con Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide in pazienti con cancro della mammella linfonodo positivo (TAX 316) e linfonodo negativo (GEICAM 9805)

#### *Patologie del sistema nervoso*

Nello studio TAX316 si è riscontrata neuropatia sensitiva periferica che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up in 84 pazienti (11,3%) nel braccio TAC e in 15 pazienti (2%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni), si è osservato che la neuropatia sensitiva periferica era ancora in corso in 10 pazienti (1,3%) nel braccio TAC, e in 2 pazienti (0,3%) nel braccio FAC.

Nello studio GEICAM 9805 la neuropatia sensitiva periferica che è iniziata durante il periodo di trattamento è perdurata durante il periodo di follow-up in 10 pazienti (1,9%) nel braccio TAC e in 4 pazienti (0,8%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), si è osservato che la neuropatia sensitiva periferica era ancora in corso in 3 pazienti (0,6%) nel braccio TAC, e in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

#### *Patologie cardiache*

Nello studio TAX316, 26 pazienti (3,5%) nel gruppo TAC e 17 pazienti (2,3%) nel gruppo FAC hanno manifestato insufficienza cardiaca congestizia. Tutte le pazienti, tranne una, in ciascun gruppo di trattamento hanno avuto diagnosi di insufficienza cardiaca congestizia (CHF) più di 30 giorni dopo il periodo di trattamento. Due pazienti nel gruppo TAC e 4 pazienti nel gruppo FAC sono decedute per insufficienza cardiaca.

Nello studio GEICAM 9805, 3 pazienti (0,6%) del braccio TAC e 3 pazienti (0,6%) del braccio FAC hanno sviluppato durante il periodo di follow up una insufficienza cardiaca congestizia. Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), nessun paziente mostrava CHF nel braccio TAC, una paziente nel gruppo TAC era deceduta per cardiomiopatia dilatativa, e si è osservato che CHF era ancora in corso in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

#### *Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Nello studio TAX 316, in 687 pazienti delle 744 del gruppo TAC(92,3%) e in 645 pazienti delle 736 del gruppo FAC (87,6%) alla fine della chemioterapia è stata riportata alopecia che perdurava nel periodo di follow-up.

Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni) in 29 pazienti nel gruppo TAC (3,9%) e in 16 pazienti del gruppo FAC (2,2%) l'alopecia presentavano ancora.

Nello studio GEICAM 9805 si è osservato che l'alopecia che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up era ancora presente in 49 pazienti (9,2%) del braccio TAC e in 35 pazienti (6,7%) del braccio FAC. L'alopecia correlata al farmaco dello studio si è manifestata o aggravata durante il periodo di follow-up in 42 pazienti (7,9%) del braccio TAC e in 30 pazienti (5,8%) del braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), si è osservato che l'alopecia era ancora presente in 3 pazienti (0,6%) nel braccio TAC, e in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

#### *Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella*

Nello studio TAX316, si è osservato che l'amenorrea che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia è stata riportata in 202 delle 744 pazienti TAC (27,2%) e in 125 delle 736 pazienti FAC (17,0%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni) si è osservato che l'amenorrea era ancora presente in 121 delle 744 pazienti TAC (16,3%) e in 86 delle pazienti FAC (11,7%).

Nello studio GEICAM 9805, si è osservato che l'amenorrea che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up era ancora presente in 18 pazienti (3,4%) nel braccio TAC e in 5 pazienti (1,0%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), si è osservato che l'amenorrea era ancora presente in 7 pazienti (1,3%) nel braccio TAC, e in 4 pazienti (0,8%) nel braccio FAC.

#### *Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione*

Nello studio TAX316 si è osservato edema periferico che è iniziato durante il periodo di trattamento ed è perdurato durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia in 119 delle 744 pazienti TAC (16,0%) e in 23 delle 736 pazienti FAC (3,1%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 8 anni), l'edema periferico era in 19 pazienti TAC (2,6%) e in 4 pazienti FAC (0,5%).

Nello studio TAX 316 il linfedema che è iniziato durante il periodo di trattamento ed è perdurato durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia è stato riportato in 11 delle 744 pazienti TAC (1,5%) e in 1 delle 736 pazienti FAC (0,1%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 8 anni) si è osservato che il linfedema era ancora in corso in 6 pazienti TAC (0,8%) e in 1 paziente FAC (0,1%).

Nello studio TAX 316 l'astenia che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia è stata riportata in 236 delle 744 pazienti TAC (31,7%) e in 180 delle 736 pazienti FAC (24,5%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 8 anni) si è osservato che l'astenia era in corso in 29 pazienti TAC (3,9%) e in 16 pazienti FAC (2,2%).

Nello studio GEICAM 9805 è stato riscontrato che l'edema periferico iniziato durante il periodo di trattamento è perdurato durante il periodo di follow-up in 4 pazienti (0,8%) nel braccio TAC e in 2 pazienti (0,4%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi) nessuna paziente (0%) nel braccio TAC aveva edema periferico e si è osservato che l'edema periferico era in corso in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

Il linfedema che è iniziato durante il periodo di trattamento è perdurato durante il periodo di follow-up in 5 pazienti (0,9%) nel braccio TAC e in 2 pazienti (0,4%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up, si è osservato che il linfedema era in corso in 4 pazienti (0,8%) nel braccio TAC e in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

L'astenia che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up era ancora presente in 12 pazienti (2,3%) del braccio TAC e in 4 pazienti (0,8%) del braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up, si è osservato che l'astenia era ancora presente in 2 pazienti (0,4%)

nel braccio TAC e in 2 pazienti (0,4%) nel braccio FAC.

*Leucemia acuta / Sindrome mielodisplastica.*

Dopo 10 anni di follow-up nello studio TAX316 è stata riportata leucemia acuta in 3 delle 744 pazienti nel gruppo TAC (0,4%) e in 1 delle 736 pazienti nel gruppo FAC (0,1%). Una paziente TAC (0,1%) e 1 paziente FAC (0,1%) sono decedute per LMA (leucemia mieloide acuta) durante il periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni). Sindrome mielodisplastica è stata riportata in 2 delle 744 pazienti (0,3%) nel gruppo TAC e in 1 delle 736 pazienti (0,1%) nel gruppo FAC.

Dopo 10 anni di follow-up nello studio GEICAM 9805, si è verificata leucemia acuta in 1 dei 532 (0,2%) pazienti del braccio TAC. Nessun caso è stato riportato nei pazienti del braccio FAC. In nessuno dei gruppi di trattamento sono stati diagnosticati casi di sindrome mielodisplastica.

*Complicanze neutropeniche*

La tabella sottostante mostra che l'incidenza di neutropenia, neutropenia febbrile e infezione neutropenica di Grado 4 sono risultate ridotte nei pazienti che hanno ricevuto profilassi primaria con G-CSF dopo che questa è diventata obbligatoria nel braccio di trattamento TAC – studio GEICAM.

Complicanze neutropeniche nei pazienti che hanno ricevuto TAC con o senza profilassi primaria con G-CSF (GEICAM 9805)

|                                    | <b>Senza profilassi primaria con G-CSF<br/>(n = 111)<br/>n (%)</b> | <b>Con profilassi primaria con G-CSF<br/>(n = 421)<br/>n (%)</b> |
|------------------------------------|--|--|
| Neutropenia (Grado 4)              | 104 (93,7)   | 135 (32,1)   |
| Neutropenia febbrile               | 28 (25,2)  | 23 (5,5)   |
| Infezione neutropenica             | 14 (12,6)  | 21 (5,0)   |
| Infezione neutropenica (Grado 3-4) | 2 (1,8)  | 5 (1,2)  |

Tabella delle reazioni avverse nell'adenocarcinoma dello stomaco per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   |
|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezioni neutropeniche;<br>Infezioni (G3/4: 11,7%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Anemia (G3/4: 20,9%);<br>Neutropenia (G3/4: 83,2%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 8,8%);<br>Neutropenia febbrile |  |
| Disturbi del sistema immunitario                            | Ipersensibilità (G3/4: 1,7%)   |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia (G3/4: 11,7%)  |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 8,7%)   | Capogiri (G3/4: 2,3%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 1,3%)   |
| Patologie dell'occhio                                       |  | Aumento della lacrimazione (G3/4: 0%)  |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto                     |  | Alterazione dell'udito (G3/4: 0%)  |
| Patologie cardiache   |  | Aritmia (G3/4: 1,0%)   |
| Patologie gastrointestinali                                 | Diarrea (G3/4: 19,7%);<br>Nausea (G3/4: 16%);<br>Stomatite (G3/4: 23,7%);<br>Vomito (G3/4: 14,3%)            | Stipsi (G3/4: 1,0%);<br>Dolore gastrointestinale (G3/4: 1,0%);<br>Esofagiti/disfagia/odinofagia (G3/4: 0,7%) |
| Patologie della cute e del                                  | Alopecia (G3/4: 4,0%)  | Rash prurito (G3/4: 0,7%);   |



| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                                    |
|--|---|---|
| tessuto sottocutaneo   |   | Alterazioni ungueali (G3/4: 0,7%);<br>Esfoliazione cutanea (G3/4: 0%) |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3/4: 19,0%);<br>Febbre (G3/4: 2,3%);<br>Ritenzione di liquidi (grave/pericolo di vita: 1%) |   |

Descrizione di reazioni avverse selezionate nell'adenocarcinoma dello stomaco per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

*Patologie del sistema emolinfopoietico*

La neutropenia febbrile e l'infezione neutropenica si sono verificate rispettivamente nel 17,2% e nel 13,5% dei pazienti, a prescindere dall'uso del G-CSF. G-CSF è stato usato per la profilassi secondaria nel 19,3% dei pazienti (10,7% dei cicli). La neutropenia febbrile e l'infezione neutropenica si sono verificate rispettivamente nel 12,1% e nel 3,4% dei pazienti che hanno ricevuto G-CSF come profilassi, nel 15,6% e nel 12,9% dei pazienti senza la profilassi con G-CSF (vedere paragrafo 4.2).

Tabella delle reazioni avverse nel cancro del collo e della testa per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

- Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia (TAX 323)

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>         | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>          | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|--|---|--|
| Infezioni ed infestazioni   | Infezioni (G3/4: 6,3%);<br>infezione neutropenia                                   |   |  |
| Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) |  | Dolore dovuto al tumore (G3/4: 0,6%)        |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                              | Neutropenia (G3/4: 76,3%);<br>Anemia (G3/4: 9,2%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 5,2%) | Neutropenia febbrile                        |  |
| Disturbi del sistema immunitario                                    |  | Ipersensibilità (non grave)                 |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                         | Anoressia (G3/4: 0,6%)   |   |  |
| Patologie del sistema nervoso                                       | Disgeusia/Parosmia<br>Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 0,6%);                | Capogiri                                    |  |
| Patologie dell'occhio   |  | Aumento della lacrimazione<br>Congiuntiviti |  |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto                             |  | Alterazione dell'udito                      |  |
| Patologie cardiache   |  | Ischemia del miocardio (G3/4: 1,7%)         | Aritmia (G3/4: 0,6%)                   |
| Patologie vascolari   |  | Alterazioni alle vene (G3/4:                |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|--|--|
|  |   | 0,6%)  |  |
| Patologie gastrointestinali.   | Nausea (G3/4: 0,6%);<br>Stomatiti (G3/4: 4,0%);<br>Diarrea (G3/4: 2,9%);<br>Vomito (G3/4: 0,6%) | Stipsi;<br>Esofagiti/disfagia/odinofagia (G3/4: 0,6%);<br>Dolore addominale;<br>Dispepsia;<br>Emorragia gastrointestinale (G3/4: 0,6%) |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo.                         | Alopecia (G3/4: 10,9%)  | Rash pruriginoso;<br>Pelle secca;<br>Esfoliazione della pelle (G3/4: 0,6%)   |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Mialgia (G3/4: 0,6%)   |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3/4: 3,4%);<br>Piressia (G3/4: 0,6%);<br>Ritenzione di liquidi;<br>Edema             |  |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di peso  |  |

- Chemioterapia di induzione seguita da chemioradioterapia (TAX 324).

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>         | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                                   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|--|--|--|
| Infezioni ed infestazioni   | Infezioni (G3/4: 3,6%)   | Infezione neutropenica   |  |
| Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) |  | Dolore dovuto al tumore (G3/4: 1,2%)                                 |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                              | Neutropenia (G3/4: 83,5%);<br>Anemia (G3/4: 12,4%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 4,0%);<br>Neutropenia febbrile |  |  |
| Disturbi del sistema immunitario                                    |  |  | Ipersensibilità                        |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                         | Anoressia (G3/4: 12,0%)  |  |  |
| Patologie del sistema nervoso                                       | Disgeusia/Parosmia (G3/4: 0,4%);<br>Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 1,2%).                            | Capogiri (G3/4: 2,0%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0,4%) |  |
| Patologie dell'occhio   |  | Aumento della lacrimazione   | Congiuntiviti                          |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto                             | Alterazione dell'udito (G3/4: 1,2%)  |  |  |
| Patologie cardiache   |  | Aritmia (G3/4: 2,0%)   | Ischemia del miocardio                 |
| Patologie vascolari   |  |  | Alterazioni alle vene                  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|---|--|
| Patologie gastrointestinali.   | Nausea (G3/4: 13,9%);<br>Stomatiti (G3/4: 20,7%);<br>Vomito (G3/4: 8,4%);<br>Diarrea (G3/4: 6,8%);<br>Esofagiti/disfagia/odinofagia (G3/4: 12,0%);<br>Stipsi (G3/4: 0,4%) | Dispepsia (G3/4: 0,8%);<br>Dolore gastrointestinale (G3/4: 1,2%);<br>Emorragia gastrointestinale (G3/4: 0,4%) |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo.                         | Alopecia (G3/4: 4,0%);<br>Rash eritematoso  | Pelle secca<br>Esfoliazione della pelle   |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Mialgia (G3/4:0,4%)   |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3/4: 4,0%);<br>Piressia (G3/4: 3,6%);<br>Ritenzione di liquidi (G3/4: 1,2%);<br>Edema (G3/4: 1,2%)   |   |  |
| Esami diagnostici  | Diminuzione di peso   |   | Aumento di peso                        |

#### Esperienza post-marketing:

##### *Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi)*

Seconde malignità primitive (frequenza non nota), incluso il linfoma non-Hodgkin, sono state osservate con docetaxel, quando usato in combinazione con altri trattamenti antitumorali noti per essere associati con seconde malignità primitive. In studi clinici registrativi nel cancro della mammella con il regime TAC, sono stati osservati casi di leucemia mieloide acuta e sindrome mielodisplastica (frequenza non nota).

##### *Patologie del sistema emolinfopoietico*

Sono state riportate soppressione midollare e altre reazioni avverse di tipo ematologico. È stata segnalata coagulazione intravascolare disseminata spesso in associazione con sepsi o insufficienza multiorgano.

##### *Disturbi del sistema immunitario*

Sono stati segnalati alcuni casi di shock anafilattico, alcuni fatali.

Sono state riscontrate reazioni di ipersensibilità (frequenza non nota) con docetaxel in pazienti che avevano avuto precedenti reazioni di ipersensibilità a paclitaxel.

##### *Patologie del sistema nervoso*

Dopo somministrazione di docetaxel sono stati osservati rari casi di convulsioni o perdita temporanea di coscienza. Tali reazioni talvolta compaiono durante l'infusione.

##### *Patologie dell'occhio*

Si sono manifestati solitamente durante l'infusione del medicinale casi molto rari di alterazioni visive transitorie (bagliori, lampi di luce, scotomi) e in associazione con reazioni di ipersensibilità. Queste sono risultate reversibili dopo interruzione dell'infusione. Raramente sono stati riportati casi di lacrimazione con o senza congiuntivite, come casi di ostruzione del dotto lacrimale come conseguenza di una eccessiva lacrimazione. In pazienti trattati con docetaxel sono stati riportati casi di edema maculare cistoide (EMC).

##### *Patologie dell'orecchio e del labirinto*

Sono stati segnalati casi rari di ototossicità, deficit dell'udito e/o perdita dell'udito.

##### *Patologie cardiache*

Sono stati riportati casi rari di infarto del miocardio.

In pazienti trattati con docetaxel in regimi di combinazione che includevano doxorubicina, 5-fluorouracile e/o ciclofosfamida è stata riportata aritmia ventricolare, inclusa tachicardia ventricolare (frequenza non nota), a volte fatale.

#### *Patologie vascolari*

Sono stati segnalati raramente eventi tromboembolici venosi.

#### *Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche*

Raramente sono stati riportati sindrome da distress respiratorio acuto e casi di polmonite interstiziale/polmonite, malattia polmonare interstiziale, fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria talvolta fatali. Sono stati riportati rari casi di polmoniti causate da radiazioni in pazienti sottoposti anche a radioterapia.

#### *Patologie gastrointestinali*

Sono stati riportati rari casi di enterocolite, inclusa colite, colite ischemica, ed enterocolite neutropenica, con esito potenzialmente fatale (frequenza non nota).

Sono stati riportati rari episodi di disidratazione come conseguenza di disturbi gastrointestinali inclusa l'enterocolite e la perforazione gastrointestinale. Sono stati riportati casi rari di occlusione ileale ed intestinale.

#### *Patologie epatobiliari*

Sono stati riportati casi molto rari di epatite, talvolta fatali prevalentemente nei pazienti con patologie epatiche pre-esistenti.

#### *Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Con docetaxel sono stati riportati casi di *lupus eritematosus* cutaneo, eruzioni bollose quali eritema multiforme e gravi reazioni avverse cutanee quali sindrome di Stevens-Johnson (SJS), Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) e Pustolosi Esantematoso Generalizzata Acuta (AGEP). Durante il trattamento con docetaxel, sono state segnalate manifestazioni simili alla sclerodermia di solito precedute da linfo-edema periferico. Sono stati riportati casi di alopecia permanente (frequenza non nota).

#### *Patologie renali e urinarie*

Sono stati riportati casi di insufficienza renale e scompenso renale. In circa il 20% di tali casi non erano presenti fattori di rischio di insufficienza renale acuta, quali prodotti medicinali nefrotossici e disturbi gastrointestinali.

#### *Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione*

Raramente sono stati riportati fenomeni di «recall» da radiazione.

Reazioni di «recall» in sede di iniezione (recidiva di reazione cutanea nel sito di un precedente stravasamento dopo la somministrazione di docetaxel in un sito differente) sono state osservate nel sito di uno stravasamento precedente (frequenza non nota).

La ritenzione di liquidi non era associata a episodi acuti di oliguria o ipotensione. Raramente sono stati riportati disidratazione ed edema polmonare.

#### *Disturbi del metabolismo e della nutrizione*

Sono stati riportati casi di squilibrio elettrolitico e casi di iponatriemia per lo più associati a disidratazione, vomito e polmonite. Sono state osservate ipokalemia, ipomagnesemia e ipocalcemia, solitamente in associazione con disturbi gastrointestinali e in particolare con diarrea. È stata segnalata sindrome da lisi tumorale, a volte fatale (frequenza non nota).

#### *Patologie del sistema muscoloscheletrico*

Con docetaxel è stata segnalata miosite (frequenza non nota).

#### Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite

il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[Allegato V](#).

## 4.9 Sovradosaggio

Sono stati riportati alcuni casi di sovradosaggio. Non esiste antidoto noto per il sovradosaggio da docetaxel. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto in un'unità specializzata e le funzioni vitali strettamente monitorate. In caso di sovradosaggio, ci si può aspettare un'esacerbazione degli eventi avversi. Le complicazioni principali che si aspettano in caso di sovradosaggio consistono in soppressione del midollo osseo, neurotossicità periferica e mucosite. I pazienti devono ricevere G-CSF terapeutico al più presto dopo evidenza di sovradosaggio. Devono essere intraprese altre misure sintomatiche appropriate, secondo necessità.

## 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

### 5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: taxani, Codice ATC: L01CD 02

#### Meccanismo d'azione

Il docetaxel è un farmaco antineoplastico che agisce favorendo l'aggregazione di tubulina in microtubuli stabili e inibisce la loro disaggregazione, portando così ad una notevole diminuzione di tubulina libera. Il legame di docetaxel ai microtubuli non altera il numero dei protofilamenti.

Il docetaxel *in vitro* spezza il sistema microtubulare cellulare che è essenziale per funzioni vitali della cellula quali la mitosi e l'interfase.

#### Effetti farmacodinamici

Il docetaxel *in vitro* è citotossico nei confronti di varie linee tumorali murine ed umane e di tumori umani asportati recentemente nelle prove clonogeniche effettuate. Docetaxel raggiunge concentrazioni intra-cellulari elevate e durature. Inoltre docetaxel è attivo su alcune delle linee cellulari (ma non tutte) che esprimono un eccesso di glicoproteina-p, codificata dal gene di multiresistenza ai farmaci. *In vivo*, docetaxel ha sperimentalmente un ampio spettro di azione nei confronti di tumori murini in stadio avanzato, e tumori umani innestati, indipendentemente dallo schema posologico.

#### Efficacia clinica e sicurezza

##### Cancro della mammella

*Docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide: trattamento adiuvante.*

##### Pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo positivo (TAX 316)

I dati di uno studio multicentrico randomizzato, in aperto supportano l'impiego di docetaxel come trattamento adiuvante di pazienti con cancro della mammella linfonodo positivo operabile e KPS  $\geq$  80% in età compresa tra 18 e 70 anni. In seguito alla stratificazione in base al numero di linfonodi positivi (1-3, più di 4), 1.491 pazienti sono state randomizzate a ricevere docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> somministrato 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (gruppo TAC) o doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> seguita da fluorouracile 500 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (gruppo FAC). Entrambi i regimi sono stati somministrati una volta ogni 3 settimane per 6 cicli. Docetaxel veniva somministrato mediante infusione di 1 ora, tutti gli altri medicinali venivano somministrati in bolo endovenoso al giorno 1. G-CSF veniva somministrato come profilassi secondaria alle pazienti che presentavano neutropenia complicata (neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione). Le pazienti del gruppo TAC ricevevano una profilassi antibiotica con ciprofloxacina 500 mg per os o antibiotici equivalenti due volte al giorno per 10 giorni partendo dal giorno 5 di ciascun ciclo. In entrambi i gruppi, dopo l'ultimo ciclo di chemioterapia, le pazienti positive per i recettori estrogenici e/o progestinici ricevevano tamoxifene 20 mg/die per 5 anni. Terapia radiante adiuvante veniva

prescritta in accordo alle linee guida valide in ciascun centro partecipante ed è stata somministrata al 69% delle pazienti che hanno ricevuto TAC ed al 72% delle pazienti che hanno ricevuto FAC.

Sono state condotte due analisi ad interim ed una analisi finale. La prima analisi ad interim è stata pianificata 3 anni dopo l'arruolamento della metà delle pazienti. La seconda analisi ad interim è stata effettuata dopo aver registrato in totale 400 eventi DFS, ad un follow-up mediano di 55 mesi.

L'analisi finale è stata condotta quando tutte le pazienti hanno raggiunto la visita di follow-up al decimo anno (tranne in caso di evento DFS o perse prima al follow-up). La sopravvivenza libera da malattia (DFS) era l'obiettivo primario di efficacia mentre la sopravvivenza globale (OS) era l'obiettivo secondario di efficacia.

L'analisi finale è stata condotta con un follow-up mediano effettivo di 96 mesi. È stata dimostrata una sopravvivenza libera da malattia significativamente aumentata nel gruppo TAC rispetto al gruppo FAC. L'incidenza di recidiva a 10 anni è risultata ridotta nelle pazienti che avevano ricevuto TAC rispetto a quelle che avevano ricevuto FAC (39% vs 45% rispettivamente) ovvero una riduzione del rischio assoluto del 6% (p=0,0043). La sopravvivenza globale a 10 anni è risultata anch'essa significativamente aumentata con TAC rispetto a FAC (76% vs 69% rispettivamente) ovvero una riduzione del rischio di morte assoluto del 7% (p=0,002). Dato che il beneficio osservato nelle pazienti con 4 o più linfonodi non è stato statisticamente significativo per DFS e OS, il positivo rapporto beneficio/rischio per il trattamento con TAC nelle pazienti con 4 o più linfonodi non è stato pienamente dimostrato nell'analisi finale.

Globalmente, i risultati dello studio dimostrano un rapporto beneficio/rischio positivo per TAC rispetto a FAC.

I sottogruppi di pazienti trattati con TAC in accordo con i principali fattori prognostici definiti a priori sono stati analizzati:

| Sottogruppi di pazienti         | Numero di pazienti | Sopravvivenza libera da malattia |           |        | Sopravvivenza globale |           |        |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|--------|
|                                 |                    | Rapporto di rischio*             | 95% CI    | p=     | Rapporto di rischio*  | 95% CI    | p=     |
| <b>N. di linfonodi positivi</b> |                    |                                  |           |        |                       |           |        |
| Globali                         | 745                | 0,80                             | 0,68-0,93 | 0,0043 | 0,74                  | 0,61-0,90 | 0,0020 |
| 1-3                             | 467                | 0,72                             | 0,58-0,91 | 0,0047 | 0,62                  | 0,46-0,82 | 0,0008 |
| Più di 4                        | 278                | 0,87                             | 0,70-1,09 | 0,2290 | 0,87                  | 0,67-1,12 | 0,2746 |

\*un rapporto di rischio inferiore ad 1 indica che TAC è associato ad una sopravvivenza libera da malattia e ad una sopravvivenza globale superiori rispetto a FAC

#### Pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo candidati alla chemioterapia (GEICAM 9805)

I dati di uno studio multicentrico, aperto, randomizzato supportano l'utilizzo di Docetaxel per la terapia adiuvante in pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo candidati alla chemioterapia.

Sono stati randomizzati 1.060 pazienti a ricevere Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> somministrato 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (539 pazienti nel braccio TAC), oppure doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> seguita da fluorouracile 500 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (521 pazienti nel braccio FAC) come terapia adiuvante nel cancro della mammella operabile linfonodo negativo ad elevato rischio di ricaduta secondo i criteri 1998 St. Gallen (dimensione tumorale >2 cm e/o ER e PR negativo e/o elevato grado istologico/nucleare (grado 2 a 3) e/o età <35 anni). Entrambi i trattamenti sono stati somministrati una volta ogni 3 settimane per 6 cicli. Docetaxel è stato somministrato come infusione di 1 ora, tutti gli altri prodotti medicinali sono stati somministrati per via e.v. al giorno 1 ogni tre settimane. Una profilassi primaria con G-CSF è stata resa obbligatoria nel braccio TAC dopo la randomizzazione di 230 pazienti. L'incidenza di neutropenia, neutropenia febbrile ed infezione neutropenica di Grado 4 è risultata ridotta nei pazienti che hanno ricevuto una profilassi primaria con G-CSF (vedere paragrafo 4.8). In entrambi i gruppi di trattamento, dopo l'ultimo ciclo di chemioterapia, i pazienti con tumori ER+ e/o PgR+ hanno ricevuto tamoxifene 20 mg una volta al

giorno per un periodo fino a 5 anni. La terapia radiante adiuvante è stata somministrata come previsto dalle linee guida in vigore nei centri partecipanti ed è stata somministrata al 57,3% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento TAC e al 51,2% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento FAC.

Sono state effettuate un'analisi principale e un aggiornamento dell'analisi. L'analisi principale è stata effettuata quando tutti i pazienti avevano un periodo di follow-up maggiore di 5 anni (periodo di follow-up mediano di 77 mesi). L'aggiornamento dell'analisi è stata effettuata quando tutti i pazienti hanno raggiunto la visita di follow-up dei 10 anni (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi) (a meno che non abbiano avuto un evento DFS o sono stati persi dal follow-up precedentemente). L'endpoint primario di efficacia era la sopravvivenza libera da malattia (DSF) e l'endpoint secondario di efficacia era la sopravvivenza complessiva (OS).

Al tempo mediano di follow-up di 77 mesi, è stato dimostrato un aumento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da malattia per il braccio TAC rispetto al braccio FAC. I pazienti trattati con TAC hanno avuto una riduzione del 32% nel rischio di ricaduta rispetto a quelli trattati con FAC (rapporto di rischio = 0,68, 95% CI (0,49-0,93),  $p = 0,01$ ). Al tempo mediano di 10 anni e 5 mesi di follow-up, i pazienti trattati con TAC hanno una riduzione del rischio di ricadute del 16,5% rispetto a quelli trattati con FAC (rapporto di rischio = 0,84, 95% CI (0,65-1,08),  $p = 0,1646$ ). I dati DFS non erano statisticamente significativi ma erano ancora associati ad un trend positivo in favore del braccio TAC.

Al tempo mediano di 77 mesi di follow-up, la sopravvivenza globale (OS) è risultata più lunga nel braccio TAC con una riduzione del 24% del rischio di morte per i pazienti trattati con TAC rispetto a FAC (rapporto di rischio = 0,76, 95% CI (0,46-1,26,  $p = 0,29$ ). Tuttavia, la distribuzione della sopravvivenza globale non si è rivelata significativamente diversa tra i due gruppi.

Al tempo mediano di 10 anni e 5 mesi di follow-up, i pazienti trattati con TAC hanno avuto una riduzione del rischio di morte del 9% rispetto ai pazienti trattati con FAC (rapporto di rischio = 0,91, 95% CI (0,63-1,32)). Il tasso di sopravvivenza era di 93,7% nel braccio TAC e di 91,4% nel braccio FAC, al timepoint dell'ottavo anno di follow-up e di 91,3% nel braccio TAC e di 89% nel braccio FAC al timepoint del decimo anno di follow-up.

Il rapporto beneficio/rischio positivo per TAC comparato con FAC rimane invariato.

Sono stati analizzati sottogruppi di pazienti trattati con TAC suddivisi secondo fattori prognostici maggiori definiti in modo prospettico nell'analisi principale (al tempo mediano di follow-up di 77 mesi) (vedere tabella sottostante):

Analisi di sottogruppi - Studio della terapia adiuvante nei pazienti con cancro della mammella linfonodo negativo (Analisi Intent-to-Treat)

| Sottogruppo di pazienti                  | Numero di pazienti nel gruppo TAC | Sopravvivenza libera da malattia |           |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  |                                   | Rapporto di rischio*             | 95% CI    |
| <b>Globale</b>                           | 539                               | 0,68                             | 0,49-0,93 |
| <b>Età categoria 1</b>                   |                                   |                                  |           |
| <50 anni                                 | 260                               | 0,67                             | 0,43-1,05 |
| ≥50 anni                                 | 279                               | 0,67                             | 0,43-1,05 |
| <b>Età categoria 2</b>                   |                                   |                                  |           |
| <35 anni                                 | 42                                | 0,31                             | 0,11-0,89 |
| ≥35 anni                                 | 497                               | 0,73                             | 0,52-1,01 |
| <b>Stato dei recettori ormonali</b>      |                                   |                                  |           |
| Negativo                                 | 195                               | 0,7                              | 0,45-1,1  |
| Positivo                                 | 344                               | 0,62                             | 0,4-0,97  |
| <b>Dimensioni tumorali</b>               |                                   |                                  |           |
| ≤2 cm                                    | 285                               | 0,69                             | 0,43-1,1  |
| >2 cm                                    | 254                               | 0,68                             | 0,45-1,04 |
| <b>Grado istologico</b>                  |                                   |                                  |           |
| Grado I (compreso il grado non valutato) | 64                                | 0,79                             | 0,24-2,6  |

|                          |     |      |           |
|--------------------------|-----|------|-----------|
| Grado 2                  | 216 | 0,77 | 0,46-1,3  |
| Grado 3                  | 259 | 0,59 | 0,39-0,9  |
| <b>Stato Menopausale</b> |     |      |           |
| Pre-Menopausa            | 285 | 0,64 | 0,40-1    |
| Post-Menopausa           | 254 | 0,72 | 0,47-1,12 |

\*un rapporto di rischio (TAC/FAC) inferiore a 1 indica che TAC è associato ad una sopravvivenza libera da malattia più lunga rispetto a FAC.

Le analisi esplorative dei sottogruppi per la sopravvivenza libera da malattia nei pazienti rispondenti ai criteri 2009 St. Gallen per la chemioterapia – (popolazione ITT) sono state effettuate e sono presentate nella tabella sottostante

|  | <b>TAC</b>        | <b>FAC</b>        | <b>Rapporto di rischio (TAC/FAC)</b> |                 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Sottogruppi</b>   | (n=539)           | (n=521)           | (95% CI)                             | <b>valore p</b> |
| Rispondenti alle indicazioni per la chemioterapia <sup>a</sup> |                   |                   |                                      |                 |
| No   | 18/214<br>(8,4%)  | 26/227<br>(11,5%) | 0,796<br>(0,434 - 1,459)             | 0,4593          |
| Si   | 48/325<br>(14,8%) | 69/294<br>(23,5%) | 0,606<br>(0,42 - 0,877)              | 0,0072          |

TAC = docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide

FAC = 5-fluorouracile, doxorubicina e ciclofosfamide

CI = intervallo di confidenza; ER = recettore degli estrogeni

PR = recettore del progesterone

<sup>a</sup>ER/PR-negativo o Grado 3 o dimensione tumorale >5 cm

Il rapporto di rischio è stato stimato con il Cox proportional hazard model utilizzando il gruppo di terapia come fattore.

#### *Docetaxel come unico trattamento*

Sono stati condotti due studi comparativi randomizzati di fase III con docetaxel alle dosi raccomandate e con un regime di 100 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane, su pazienti con tumore metastatico della mammella, di cui 326 dopo fallimento di un trattamento con alchilanti e 392 dopo fallimento di un trattamento con antracicline.

Nelle pazienti nelle quali il trattamento con agenti alchilanti era risultato inefficace, il docetaxel è stato confrontato con doxorubicina (75 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane). Docetaxel ha aumentato la percentuale di risposte (52% verso 37%, p=0,01) e diminuito il tempo di risposta (12 settimane verso 23 settimane, p=0,007), senza variare il tempo di sopravvivenza (15 mesi per docetaxel verso 14 mesi per doxorubicina, p=0,38) od il tempo di progressione (27 settimane per docetaxel verso 23 settimane per doxorubicina, p=0,54). Tre pazienti trattate con docetaxel (2%) hanno dovuto sospendere il trattamento a causa di ritenzione di liquidi, mentre 15 pazienti in trattamento con doxorubicina (9%) hanno dovuto sospendere a causa di tossicità a livello cardiaco (tre decessi per scompenso cardiaco congestizio).

Nelle pazienti nelle quali il trattamento con antracicline era risultato inefficace, docetaxel è stato confrontato con la associazione di mitomicina C e vinblastina (12 mg/m<sup>2</sup> ogni 6 settimane e 6 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane). Docetaxel ha aumentato la percentuale di risposta (33% verso 12%, p <0,0001), ha aumentato il tempo di progressione della malattia (19 settimane verso 11 settimane, p=0,0004) ed ha aumentato il tempo di sopravvivenza (11 mesi verso 9 mesi, p=0,01).

Il profilo di tollerabilità di docetaxel nel corso di questi due studi di fase III era in linea con il profilo di tollerabilità riscontrato negli studi di fase II (vedere paragrafo 4.8).

È stato condotto uno studio randomizzato, in aperto, multicentrico di fase III di confronto tra



docetaxel in monoterapia e paclitaxel nel trattamento del carcinoma della mammella avanzato in pazienti nelle quali la terapia precedente aveva già compreso un'antraciclina. Sono state randomizzate complessivamente 449 pazienti a ricevere o docetaxel in monoterapia 100 mg/m<sup>2</sup> in infusione di 1 ora oppure paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> in infusione di 3 ore. I due trattamenti sono stati somministrati ogni 3 settimane.

Docetaxel ha prolungato il tempo alla progressione mediano (24,6 settimane vs 15,6 settimane; p<0,01) e la sopravvivenza mediana (15,3 mesi vs 12,7 mesi; p=0,03) senza aver dimostrato un effetto sul tasso di risposta globale, endpoint primario dello studio (32% vs 25%, p=0,10).

Sono stati osservati più eventi avversi di grado 3/4 con docetaxel in monoterapia (55,4%) rispetto a paclitaxel (23,0%).

#### *Docetaxel in associazione con doxorubicina*

È stato condotto uno studio randomizzato di fase III su 429 pazienti con tumore metastatico, non pretrattate, che confrontava doxorubicina (50 mg/m<sup>2</sup>) in associazione con docetaxel (75 mg/m<sup>2</sup>) (braccio AT) a doxorubicina (60 mg/m<sup>2</sup>) in associazione con ciclofosfamide (600 mg/m<sup>2</sup>) (braccio AC). Entrambi i regimi sono stati somministrati il giorno 1 ogni tre settimane.

- Il tempo alla progressione (TTP) è risultato significativamente aumentato nel braccio AT rispetto a quello del braccio AC, p=0,0138. Il TTP mediano è stato di 37,3 settimane (95% CI: 33,4 – 42,1) nel braccio AT e di 31,9 settimane (95% CI: 27,4 – 36,0) nel braccio AC.
- La percentuale di risposta osservata è risultata significativamente più elevata nel braccio AT rispetto al braccio AC, p=0,009. Tale percentuale è risultata del 59,3% (95% CI: 52,8 – 65,9) nel braccio AT rispetto al 46,5% (95% CI: 39,8 – 53,2) nel braccio AC.

In questo studio, il braccio AT ha evidenziato una maggiore incidenza, rispetto al braccio AC, di neutropenia grave (90% contro 68,6%), di neutropenia febbrile (33,3% contro 10%), di infezioni (8% contro 2,4%), di diarrea (7,5% contro 1,4%), di astenia (8,5% contro 2,4%), e di dolore (2,8% contro 0%). D'altra parte, il braccio AC ha mostrato una maggiore incidenza di anemia grave rispetto al braccio AT (15,8% contro 8,5%) e una maggiore incidenza di tossicità cardiaca: insufficienza cardiaca congestizia (3,8% contro 2,8%), diminuzione assoluta del LVEF  $\geq$  20% (13,1% contro 6,1%), diminuzione assoluta del LVEF  $\geq$  30% (6,2% contro 1,1%). La morte tossica si è verificata in 1 paziente del braccio AT (insufficienza cardiaca congestizia) e in 4 pazienti del braccio AC (1 dovuta a shock settico e 3 dovute a insufficienza cardiaca congestizia).

In entrambi i bracci la qualità della vita, misurata con il questionario dell'EORTC, è risultata paragonabile e stabile durante il trattamento e il follow-up.

#### *Docetaxel in associazione con trastuzumab*

Docetaxel in associazione con trastuzumab è stato valutato nel trattamento di pazienti con cancro della mammella metastatico con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto precedenti trattamenti chemioterapici per malattia metastatica. Sono state randomizzate 186 pazienti a ricevere docetaxel (100 mg/m<sup>2</sup>) con o senza trastuzumab; il 60% delle pazienti hanno ricevuto in precedenza una chemioterapia adiuvante con antracicline. Docetaxel con trastuzumab era efficace nelle pazienti che avevano o non avevano ricevuto precedentemente terapia adiuvante con antracicline. Il test maggiormente utilizzato per determinare la positività di HER2 in questo studio registrativo è stato la immunohistochimica (IHC). Per un numero minore di pazienti è stato utilizzato il test della fluorescenza in situ (FISH). In questo studio l'87% delle pazienti presentava una malattia che era IHC 3+ e il 95% delle pazienti arruolate aveva una malattia IHC 3+ e/o FISH positivo. I risultati di efficacia sono riepilogati nella tabella seguente:

| <b>Parametri</b>                                    | <b>Docetaxel più trastuzumab<sup>1</sup><br/>n=92</b> | <b>Docetaxel<sup>1</sup><br/>n=94</b> |
|---|---|---------------------------------------|
| Percentuale di risposta<br>(95% CI)                 | 61%<br>(50-71)  | 34%<br>(25-45)                        |
| Durata mediana della risposta (in mesi)<br>(95% CI) | 11,4<br>(9,2-15,0)                                    | 5,1<br>(4,4-6,2)                      |
| Tempo alla progressione TTP (in                     |   |                                       |

|   |                                |                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| mesi) mediano<br>(95% CI)                   | 10,6<br>(7,6-12,9)             | 5,7<br>(5,0-6,5)                 |
| Sopravvivenza (in mesi) mediana<br>(95% CI) | 30,5 <sup>2</sup><br>(26,8-ne) | 22,1 <sup>2</sup><br>(17,6-28,9) |

TTP = tempo alla progressione; “ne” indica che non può essere stimato o che non è stato ancora raggiunto.

<sup>1</sup> Popolazione intent-to-treat

<sup>2</sup> Sopravvivenza mediana stimata

#### *Docetaxel in associazione con capecitabina*

I dati di uno studio clinico di fase III multicentrico, randomizzato, controllato, supportano l'utilizzo di docetaxel in associazione con capecitabina per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico dopo insuccesso di una chemioterapia citotossica che ha incluso un'antraciclina. In questo studio 255 pazienti sono state assegnate per randomizzazione al trattamento con docetaxel (75 mg/m<sup>2</sup> in infusione endovenosa di 1 ora ogni 3 settimane) e capecitabina (1.250 mg/m<sup>2</sup> due volte al giorno per 2 settimane seguite da un intervallo di 1 settimana). 256 pazienti sono state assegnate per randomizzazione al trattamento con docetaxel da solo (100 mg/m<sup>2</sup> in infusione endovenosa di 1 ora ogni 3 settimane). La sopravvivenza è stata superiore nel braccio di associazione docetaxel + capecitabina (p=0,0126). La sopravvivenza mediana è stata di 442 giorni (docetaxel + capecitabina) rispetto a 352 giorni (docetaxel da solo). La percentuale di risposta obiettiva globale riscontrabile nell'intera popolazione randomizzata (valutazione dello sperimentatore) è stata di 41,6% (docetaxel + capecitabina) rispetto a 29,7% (docetaxel da solo); p = 0,0058. Il tempo alla progressione della malattia è stato superiore nel braccio di associazione docetaxel + capecitabina (p <0,0001). Il tempo mediano alla progressione è stato di 186 giorni (docetaxel + capecitabina) rispetto a 128 giorni (docetaxel da solo).

#### *Cancro del polmone non a piccole cellule*

##### *Pazienti precedentemente trattati con chemioterapici con o senza radioterapia*

In uno studio clinico di fase III, in pazienti pre-trattati, il tempo di progressione (12,3 settimane contro 7 settimane) e la sopravvivenza sono significativamente aumentati con docetaxel a 75 mg/m<sup>2</sup> rispetto al Migliore Trattamento di Supporto (MTS).

La percentuale di sopravvivenza ad 1 anno è risultata significativamente superiore con docetaxel (40%) rispetto a MTS (16%).

In pazienti trattati con docetaxel a 75 mg/m<sup>2</sup> è stato fatto minore uso di morfina (p<0,01), di analgesici non a base di morfina (p<0,01), di altri trattamenti (p=0,06) e radioterapia (p<0,01) rispetto a quelli trattati con MTS.

Nei pazienti valutabili, la percentuale di risposta globale è stata del 6,8%, e la durata media della risposta è stata di 26,1 settimane.

##### *Docetaxel in associazione con derivati del platino in pazienti mai trattati con chemioterapia*

In uno studio di fase III, 1.218 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule inoperabile di stadio IIIB o IV, con Karnofsky Performance Status di 70% e oltre, che non avevano ricevuto precedente chemioterapia per questa condizione, sono stati randomizzati a docetaxel (T) 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione di un'ora seguita immediatamente da cisplatino (Cis) 75 mg/m<sup>2</sup> in 30-60 minuti ogni tre settimane (TCis), docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione di un'ora in associazione con carboplatino (AUC 6 mg/ml.min) in 30-60 minuti ogni tre settimane, oppure vinorelbina (V) 25 mg/m<sup>2</sup> somministrata in 6-10 minuti ai giorni 1, 8, 15, 22 seguita da cisplatino 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato il primo giorno del ciclo ripetuto ogni 4 settimane (VCis).

Nella tabella sotto riportata sono illustrati i dati di sopravvivenza, tempo medio alla progressione e tasso di risposta per due bracci dello studio.

|                       | <b>TCis<br/>n=408</b> | <b>VCis<br/>n=404</b> | <b>Analisi statistica</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Sopravvivenza globale |                       |                       |                           |

|   | <b>TCis<br/>n=408</b> | <b>VCis<br/>n=404</b> | <b>Analisi statistica</b>                                 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| (Obiettivo primario):<br>Sopravvivenza Mediana (mesi) | 11,3                  | 10,1                  | Rapporto di rischio: 1,122<br>[97,2% CI: 0,937; 1,342]*   |
| Sopravvivenza a 1 anno (%)                            | 46                    | 41                    | Differenza tra i trattamenti 5,4%<br>[95% CI: -1,1;12,0]  |
| Sopravvivenza a 2 anni (%)                            | 21                    | 14                    | Differenza tra i trattamenti: 6,2%<br>[95% CI: 0,2; 12,3] |
| Tempo mediano alla Progressione<br>(settimane)        | 22,0                  | 23,0                  | Rapporto di Rischio: 1,032 [95% CI:<br>0,876; 1,2161]     |
| Tasso globale di risposta (%)                         | 31,6                  | 24,5                  | Differenza tra i trattamenti: 7,1%<br>[95% CI: 0,7; 13,5] |

\*: Corretto per confronti multipli e aggiustato per fattori di stratificazione (stadio della malattia e regione di trattamento), sulla base della popolazione dei pazienti valutabili.

Gli obiettivi secondari comprendevano variazione nel dolore, valutazione globale della qualità della vita tramite EuroQoL-5D, scala dei sintomi del tumore polmonare (LCSS: Lung Cancer Symptom Scale) e cambiamento nel Karnofsky performance status. I risultati di questi obiettivi hanno confermato i risultati degli obiettivi primari.

Per la associazione docetaxel/carboplatino, non è stato possibile dimostrare né equivalenza né non-inferiorità di efficacia nei confronti del trattamento di riferimento: la associazione VCis.

### Cancro della prostata

#### Cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione

La tollerabilità e l'efficacia di docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone nei pazienti affetti da cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione sono state valutate in uno studio randomizzato multicentrico di fase III (TAX 327). Sono stati randomizzati complessivamente 1.006 pazienti con KPS  $\geq$  60 nei seguenti gruppi terapeutici:

- Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 10 cicli.
- Docetaxel 30 mg/m<sup>2</sup> somministrato ogni settimana per le prime 5 settimane di un ciclo di 6 settimane per un totale di 5 cicli.
- Mitoxantrone 12 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 10 cicli.

Tutti i tre regimi terapeutici sono stati somministrati in associazione con prednisone o prednisolone 5 mg due volte al giorno, di continuo.

I pazienti che hanno ricevuto docetaxel ogni tre settimane hanno dimostrato una sopravvivenza globale significativamente più prolungata rispetto ai pazienti trattati con mitoxantrone. L'aumento della sopravvivenza osservato nel gruppo trattato con docetaxel ogni settimana non è risultato statisticamente significativo rispetto al gruppo di controllo trattato con mitoxantrone. I parametri di efficacia ottenuti nei gruppi trattati con docetaxel rispetto al gruppo di controllo sono riassunti nella seguente tabella:

| <b>Endpoint</b>                 | <b>Docetaxel<br/>3 settimane</b> | <b>ogni</b> | <b>Docetaxel<br/>settimana</b> | <b>ogni</b> | <b>Mitoxantrone<br/>ogni 3 settimane</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| Numero dei pazienti             | 335                              |             | 334                            |             | 337                                      |
| Sopravvivenza Mediana<br>(mesi) | 18,9                             |             | 17,4                           |             | 16,5                                     |
| 95% CI                          | (17,0-21,2)                      |             | (15,7-19,0)                    |             | (14,4-18,6)                              |
| Rapporto di rischio             | 0,761                            |             | 0,912                          |             | --                                       |
| 95% CI                          | (0,619-0,936)                    |             | (0,747-1,113)                  |             | --                                       |
| valore di p <sup>†</sup> *      | 0,0094                           |             | 0,3624                         |             | --                                       |
| Numero dei pazienti             | 291                              |             | 282                            |             | 300                                      |

|   |                                      |                                      |                                  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Tasso di risposta del PSA** (%)</i><br><i>95% CI</i><br><i>valore di p *</i>                               | 45,4<br>(39,5-51,3)<br>0,0005        | 47,9<br>(41,9-53,9)<br><0,0001       | 31,7<br>(26,4-37,3)<br>--        |
| <i>Numero di pazienti</i><br><i>Tasso di risposta del dolore (%)</i><br><i>95% CI</i><br><i>valore di p *</i> | 153<br>34,6<br>(27,1-42,7)<br>0,0107 | 154<br>31,2<br>(24,0-39,1)<br>0,0798 | 157<br>21,7<br>(15,5-28,9)<br>-- |
| <i>Numero di pazienti</i><br><i>Risposte obiettive (%)</i><br><i>95% CI</i><br><i>valore di p *</i>           | 141<br>12,1<br>(7,2-18,6)<br>0,1112  | 134<br>8,2<br>(4,2-14,2)<br>0,5853   | 137<br>6,6<br>(3,0-12,1)<br>--   |

<sup>†</sup>Stratified log rank test

\*Limite per la significatività statistica=0,0175

\*\*PSA: Prostate-Specific Antigen (Antigene specifico Prostatico)

Dato che docetaxel ogni settimana ha presentato un profilo di tollerabilità leggermente migliore rispetto a docetaxel ogni 3 settimane, è possibile che alcuni pazienti possano beneficiare dalla terapia settimanale con docetaxel.

Non è stata osservata una differenza statisticamente significativa per la Qualità della Vita Globale tra i gruppi di trattamento.

#### Cancro della prostata metastatico ormono-sensibile

##### *STUDIO STAMPEDE*

La tollerabilità e l'efficacia di docetaxel somministrato in concomitanza con lo standard di cura (ADT) nei pazienti con cancro della prostata ormono-sensibile localmente avanzato o metastatico ad alto rischio sono state valutate in uno studio multicentrico randomizzato multi-braccio e multi-stadio (MAMS) con disegno senza soluzione di continuità di fase II/III (STAMPEDE – MRC PR08). Un totale di 1776 pazienti di sesso maschile è stato assegnato ai bracci di trattamento di interesse:

- Standard di cura + docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup>, somministrato ogni 3 settimane per 6 cicli
- Solo standard di cura

Il regime con docetaxel è stato somministrato in associazione con prednisone o prednisolone, 5 mg due volte al giorno per tutta la durata del trattamento.

Tra i 1776 pazienti randomizzati, 1086 (61%) presentavano malattia metastatica, 362 sono stati randomizzati a docetaxel in associazione con lo standard di cura e 724 hanno ricevuto solo lo standard di cura.

Nei pazienti affetti da cancro della prostata metastatico, la sopravvivenza globale mediana è risultata significativamente maggiore nei gruppi di trattamento con docetaxel rispetto al gruppo con il solo standard di cura, con un valore mediano superiore di 19 mesi con l'aggiunta di docetaxel (HR = 0,76, IC al 95% = 0,62-0,92, p=0,005).

I risultati di efficacia nei pazienti con cancro della prostata metastatico nel braccio docetaxel rispetto al braccio di controllo sono riassunti nella seguente tabella:

Efficacia di docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone e standard di cura nel trattamento di pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (STAMPEDE)

| Endpoint   | Docetaxel + standard di cura | Solo standard di cura |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Numero di pazienti con cancro della prostata metastatico | 362                          | 724                   |
| Sopravvivenza globale mediana (mesi)                     | 62                           | 43                    |
| IC al 95%  | 51-73                        | 40-48                 |
| Rapporto di rischio aggiustato                           |                              | 0,76                  |
| IC al 95%  |                              | (0,62-0,92)           |
| valore p <sup>a</sup>                                    |                              | 0,005                 |
| Sopravvivenza senza fallimento <sup>b</sup>              |                              |                       |
| Mediana (mesi)   | 20,4                         | 12                    |
| IC al 95%  | 16,8-25,2                    | 9,6-12                |
| Rapporto di rischio aggiustato                           |                              | 0,66                  |
| IC al 95%  |                              | (0,57-0,76)           |
| valore p <sup>a</sup>                                    |                              | < 0,001               |

<sup>a</sup> Valore p calcolato dal test del rapporto di verosimiglianza e aggiustato per tutti i fattori di stratificazione (eccetto la terapia ormonale del centro e pianificata) e stratificato in base al periodo della sperimentazione

<sup>b</sup> Sopravvivenza senza fallimento: tempo trascorso dalla randomizzazione alla prima manifestazione di almeno uno tra i seguenti eventi: fallimento biochimico (definito come aumento del PSA del 50% oltre il nadir entro 24 settimane e superiore a 4 ng/ml, confermato mediante ripetizione del test o trattamento); progressione locale, a livello linfonodale, oppure in metastasi a distanza; evento correlato all'apparato scheletrico; o decesso da cancro della prostata.

#### Studio *CHAARTED*

La sicurezza e l'efficacia di docetaxel somministrato all'inizio della terapia di deprivazione androgenica (ADT) nei pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile sono state valutate in uno studio multicentrico randomizzato di fase III (*CHAARTED*). Un totale di 790 pazienti di sesso maschile è stato assegnato ai 2 gruppi di trattamento:

- ADT + docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> somministrato all'inizio della terapia ADT, ogni 3 settimane per 6 cicli
- Sola ADT

La sopravvivenza globale mediana è risultata significativamente maggiore nel gruppo trattato con docetaxel rispetto al gruppo trattato con sola ADT, con un valore mediano di 13,6 mesi superiore con l'aggiunta di docetaxel all'ADT (rapporto di rischio (HR) = 0,61, intervallo di confidenza (IC) al 95% = 0,47-0,80, p=0,0003).

I risultati di efficacia per il braccio docetaxel rispetto al braccio di controllo sono riassunti nella seguente tabella:

Efficacia di docetaxel e ADT nel trattamento di pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (CHAARTED)

| Endpoint  | Docetaxel +ADT | Sola ADT    |
|---|----------------|-------------|
| Numero di pazienti  | 397            | 393         |
| Sopravvivenza globale mediana (mesi)                                    |                |             |
| Tutti i pazienti  | 57,6           | 44,0        |
| IC al 95%   | 49,1-72,8      | 34,4-49,1   |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,61           | --          |
| IC al 95%   | (0,47-0,80)    | --          |
| valore p <sup>a</sup>   | 0,0003         | --          |
| Sopravvivenza libera da progressione                                    |                |             |
| Mediana (mesi)  | 19,8           | 11,6        |
| IC al 95%   | 16,7-22,8      | 10,8-14,3   |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,60           | --          |
| IC al 95%   | 0,51-0,72      | --          |
| Valore p*   | p<0,0001       | --          |
| Risposta PSA** a 6 mesi – N(%)  | 127 (32,0)     | 77 (19,6)   |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |
| Risposta PSA** a 12 mesi – N(%)   | 110 (27,7)     | 66 (16,8)   |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |
| Tempo al cancro della prostata resistente alla castrazione <sup>b</sup> |                |             |
| Mediana (mesi)  | 20,2           | 11,7        |
| IC al 95%   | (17,2-23,6)    | (10,8-14,7) |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,61           | --          |
| IC al 95%   | (0,51-0,72)    | --          |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |
| Tempo alla progressione clinica <sup>c</sup>                            |                |             |
| Mediana (mesi)  | 33,0           | 19,8        |
| IC al 95%   | (27,3-41,2)    | (17,9-22,8) |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,61           | --          |
| IC al 95%   | (0,50-0,75)    | --          |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |

a Tempo alle variabili di evento: Test dei ranghi logaritmici stratificato.

Variabili del tasso di risposta: Test esatto di Fisher

\* Valore p per scopi descrittivi.

\*\* Risposta PSA (risposta dell'antigene prostatico specifico): livello di PSA <0,2 ng/ml misurato per due volte consecutive ad almeno 4 settimane di distanza.

b Tempo al cancro della prostata resistente alla castrazione = tempo dalla randomizzazione alla progressione del PSA o alla progressione clinica (ovvero, aumento delle metastasi ossee sintomatiche, progressione secondo i criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi (*Response Evaluation Criteria in Solid Tumors*, RECIST) o peggioramento clinico dovuto al cancro secondo il parere dello sperimentatore), a seconda dell'evento che si verifica per primo.

c Tempo alla progressione clinica = tempo dalla randomizzazione fino alla progressione clinica (ovvero, aumento dei sintomi delle metastasi ossee; progressione in base ai criteri RECIST o peggioramento clinico dovuto al cancro secondo l'opinione dello sperimentatore).

### Adenocarcinoma dello stomaco

Uno studio multicentrico, randomizzato, in aperto è stato condotto per valutare la sicurezza e l'efficacia di docetaxel nel trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che in precedenza non avevano ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica. Un totale di 445 pazienti con KPS > 70 sono stati trattati con docetaxel (T) (75 mg/m<sup>2</sup> il giorno 1) in associazione con cisplatino (C) (75 mg/m<sup>2</sup> il giorno 1) e 5-fluorouracile (F) (750 mg/m<sup>2</sup> al giorno per 5 giorni) oppure con cisplatino (100 mg/m<sup>2</sup> il giorno 1) e 5-fluorouracile (1.000 mg/m<sup>2</sup> al giorno per 5 giorni). La durata di un ciclo di trattamento è stata di

3 settimane per il braccio TCF e 4 settimane per il braccio CF.

Il numero medio di cicli somministrati per paziente è stato di 6 (con un intervallo di 1-16) per il braccio TCF e di 4 (con un intervallo di 1-12) per il braccio CF. Il tempo alla progressione (TTP) era l'end point primario. La riduzione di rischio di progressione è stata del 32,1% ed è stata associata con un TTP significativamente più lungo ( $p=0,0004$ ) per il braccio TCF. La sopravvivenza globale è stata inoltre significativamente più lunga ( $p=0,0201$ ) per il braccio TCF con una riduzione di rischio di mortalità del 22,7%. I risultati di efficacia sono riassunti nella seguente tabella:

Efficacia di docetaxel nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma dello stomaco

| <b>Endpoint</b>  | <b>TCF</b><br>n=221    | <b>CF</b><br>N=224 |
|--|------------------------|--------------------|
| Tempo Mediano alla Progressione<br>TTP (mesi) - (95% CI) | 5,6<br>(4,86-5,91)     | 3,7<br>(3,45-4,47) |
| Rapporto di rischio<br>(95% CI)                          | 1,473<br>(1,189-1,825) |                    |
| Valore di p *  | 0,0004                 |                    |
| Sopravvivenza mediana (mesi)<br>(95% CI)                 | 9,2<br>(8,38-10,58)    | 8,6<br>(7,16-9,46) |
| Valutazione a 2 anni(%)                                  | 18,4                   | 8,8                |
| Rapporto di rischio<br>(95% CI)                          | 1,293<br>(1,041-1,606) |                    |
| Valore di p*   | 0,0201                 |                    |
| Tasso globale di risposta (CR+PR)<br>(%)                 | 36,7                   | 25,4               |
| Valore di p  | 0,0106                 |                    |
| Progressione come migliore risposta<br>globale (%)       | 16,7                   | 25,9               |

\*Unstratified log rank test

Le analisi dei sottogruppi per età, genere e razza hanno favorito costantemente il braccio TCF rispetto al braccio CF.

Un'analisi aggiornata della sopravvivenza condotta con un tempo medio di follow-up di 41,6 mesi non ha più mostrato una differenza statisticamente significativa, anche se sempre in favore del regime TCF e ha evidenziato che il beneficio di TCF rispetto a CF è evidente fra i 18 e i 30 mesi di follow-up.

In generale, la qualità della vita (QoL) ed i risultati clinici sui benefici hanno costantemente indicato un miglioramento in favore del braccio TCF. I pazienti trattati con TCF hanno avuto un tempo più lungo all'aggravamento dello stato della salute del 5% sul questionario QLQ-C30 ( $p=0,0121$ ) ed un tempo più lungo al peggioramento definitivo del Karnofsky performance status ( $p=0,0088$ ) a confronto con i pazienti trattati con CF.

Cancro del collo e della testa

- Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia (TAX 323)

La sicurezza e l'efficacia di docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose del collo e della testa (SCCHN) sono state valutate in uno studio randomizzato in aperto, multicentrico di fase III (TAX323). In questo studio, 358 pazienti con SCCHN localmente avanzato inoperabile con WHO performance status 0 - 1, sono stati randomizzati a uno dei due bracci di trattamento. I pazienti nel braccio con docetaxel hanno ricevuto docetaxel (T) 75 mg/m<sup>2</sup> seguito dal cisplatino (P) 75 mg/m<sup>2</sup> seguito dal 5-fluorouracile (F) 750 mg/m<sup>2</sup> al giorno in infusione continua per 5 giorni. Questo schema posologico veniva somministrato ogni tre settimane per 4 cicli nel caso in cui si fosse osservata almeno, una risposta minima (>25% riduzione del tumore misurato bidimensionalmente) dopo 2 cicli. Alla fine della chemioterapia, con un intervallo minimo di 4 settimane e massimo di sette settimane, i pazienti per i quali la patologia non progredisce ricevono la radioterapia (RT), in accordo con le linee guida istituzionali, per 7 settimane (TPF/RT). I pazienti nel braccio di comparazione hanno ricevuto cisplatino (P) 100 mg/m<sup>2</sup> seguito da 5-fluorouracile (F)

1000 mg/m<sup>2</sup> al giorno per 5 giorni. Questo schema posologico è stato somministrato ogni tre settimane per 4 cicli nel caso in cui si fosse osservata almeno una risposta minima ( $\geq 25\%$  riduzione del formato bidimensionale misurato del tumore) dopo 2 cicli. Alla conclusione della chemioterapia, con un intervallo minimo di 4 settimane e un intervallo massimo di 7 settimane, i pazienti nei quali la malattia non era progredita hanno ricevuto la radioterapia (RT) secondo la linea guida di riferimento per 7 settimane (PF/RT). La terapia locoregionale con radiazioni è stata applicata ad una frazione convenzionale (1,8 Gy-2,0 Gy una volta al giorno, 5 giorni per settimana per una dose totale da 66 a 70 Gy), o a regimi accelerati/iperfrazionati della radioterapia (due volte al giorno, con un intervallo minimo di frazioni di 6 ore, di 5 giorni per settimana). Un totale di 70 Gy è stato suggerito per i regimi accelerati e 74 Gy per gli schemi iperfrazionati. La resezione chirurgica è permessa dopo la chemioterapia, prima o dopo la radioterapia. I pazienti del braccio TPF hanno ricevuto per os come profilassi antibiotica ciprofloxacina 500 mg due volte al giorno per 10 giorni iniziando il giorno 5 di ogni ciclo, o equivalente. L'end point primario in questo studio, la sopravvivenza libera alla progressione (PFS), era significativamente più lunga nel braccio TPF che nel braccio PF,  $p = 0,0042$  (PFS mediano: 11,4 vs 8,3 mesi rispettivamente) con un tempo mediano di 33,7 mesi. La sopravvivenza mediana era inoltre significativamente più lunga per il braccio TPF rispetto al PF (OS mediano: 18,6 vs 14,5 mesi rispettivamente) con una riduzione del rischio di mortalità del 28%,  $p = 0,0128$ . I risultati di efficacia sono presentati nella tabella qui sotto:

Efficacia di docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con SCCHN localmente avanzato inoperabile. (Intent-to-Treat Analysis).

| <b>Endpoint</b>  | <b>Docetaxel +<br/>Cis+5-FU<br/>n=177</b> | <b>Cis+5-FU<br/>n=181</b>    |
|--|---|------------------------------|
| Progressione mediana della sopravvivenza (mesi) - (95% CI)                                       | 11,4<br>(10,1-14,0)                       | 8,3<br>(7,4-9,1)             |
| Rapporto di rischio aggiustato (95% CI)  | 0,70<br>(0,55-0,89)                       |                              |
| * – p-value  | 0,0042                                    |                              |
| Sopravvivenza mediana (mesi) (95% CI)  | 18,6<br>(15,7-24,0)                       | 14,5<br>(11,6-18,7)          |
| Rapporto di rischio (95% CI)   | 0,72<br>(0,56-0,93)                       |                              |
| ** p-value   | 0,0128                                    |                              |
| Migliore risposta globale alla chemioterapia (%) - (95% CI)                                      | 67,8<br>(60,4-74,6)                       | 53,6<br>(46,0-61,0)          |
| *** p-value  | 0,006                                     |                              |
| Migliore risposta globale al trattamento di studio [chemioterapia +/- radioterapia] (%) (95% CI) | 72,3<br>(65,1-78,8)                       | 58,6<br>(51,0-65,8)          |
| *** p-value  | 0,006                                     |                              |
| Durata mediana della risposta alla chemioterapia ± radioterapia (mesi) (95% CI)                  | n=128<br>15,7<br>(13,4-24,6)              | n=106<br>11,7<br>(10,2-17,4) |
| Rapporto di rischio (95% CI)   | 0,72<br>(0,52-0,99)                       |                              |
| ** p-value   | 0,0457                                    |                              |

un rapporto di rischio inferiore ad 1 a favore dell'associazione docetaxel + cisplatino + 5-FU  
 \*Modello Cox (aggiustamento per sito del tumore primario, stadiazione su T e N e PS-WHO)  
 \*\*Logrank test  
 \*\*\*Chi-square test

*Parametri per definire la qualità della vita.*

I pazienti trattati con TPF manifestano significativamente una diminuzione del deterioramento della loro salute globale in confronto a quelli trattati con PF ( $p=0,01$ , usando EORTC QLQ-C30 scale).

*Parametri per definire i benefici clinici*

La scala del performance, per testa e collo (PSS-HN) che ha inteso misurare la comprensione della



parola, la possibilità di mangiare in pubblico e la normalità della dieta, è risultata significativamente a favore del braccio TPF rispetto al braccio PF. Il tempo mediano al primo deterioramento della condizione delle prestazioni del WHO era significativamente più lungo nel braccio TPF in confronto al braccio PF. La scala di intensità del dolore segna un miglioramento durante il trattamento in entrambi i gruppi, questo sta ad indicare che la gestione del dolore è adeguata.

- Chemioterapia di induzione seguita da chemio-radioterapia (TAX 324)

La sicurezza e l'efficacia del docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con cancro del collo e della testa a cellule squamose (SCCHN) localmente avanzato sono state valutate in uno studio clinico multicentrico randomizzato in aperto, di fase III (TAX 324). In questo studio, 501 pazienti, con SCCHN localmente avanzato con WHO performance status 0 o 1 sono stati randomizzati ad uno dei due bracci. La popolazione in studio ha compreso anche pazienti tecnicamente inoperabili, pazienti con una bassa probabilità di riuscita della resezione chirurgica, e pazienti che ambivano ad una conservazione dell'organo. La valutazione del profilo di sicurezza e di efficacia ha considerato solamente gli endpoints di sopravvivenza, mentre la riuscita nella conservazione dell'organo non è stata formalmente considerata. I pazienti trattati con docetaxel hanno ricevuto 75 mg/m<sup>2</sup> di docetaxel (T) in infusione endovenosa il giorno 1 seguito dal cisplatino (P) 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in infusione endovenosa di durata da 30 minuti a 3 ore, seguita da infusione endovenosa continua di 5-fluorouracile (F) 1.000 mg/m<sup>2</sup>/die dal giorno 1 al giorno 4. I cicli sono stati ripetuti ogni tre settimane per 3 cicli. Tutti i pazienti che non avevano progressione di malattia dovevano ricevere la chemioradioterapia (CRT) come da protocollo (TPF/CRT). I pazienti nel braccio di confronto hanno ricevuto cisplatino (P) 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in infusione di durata da 30 minuti a tre ore il giorno 1, seguito da 5-fluorouracile (F) 1.000 mg/m<sup>2</sup>/die dal giorno 1 al giorno 5. I cicli sono stati ripetuti ogni tre settimane per 3 cicli. Tutti i pazienti che non avevano progressione di malattia dovevano ricevere CRT come da protocollo (PF/CRT).

I pazienti, in entrambi i bracci di trattamento, hanno ricevuto 7 giorni di CRT dopo la chemioterapia di induzione con un intervallo minimo di 3 settimane e non più lungo di 8 settimane dopo l'inizio dell'ultimo ciclo (dal giorno 22 al giorno 56 dell'ultimo ciclo). Durante la radioterapia, il carboplatino (AUC 1,5) è stato somministrato in infusione endovenosa di un'ora per un massimo di 7 dosi. La radiazione è stata somministrata con uno strumento ad alto voltaggio utilizzando il frazionamento giornaliero (2 Gy al giorno, 5 giorni a settimana per 7 settimane, per una dose complessiva di 70-72 Gy). La chirurgia nel sito primario del tumore e/o del collo poteva essere presa in considerazione in qualsiasi momento dopo il completamento della CRT. Tutti i pazienti in studio nel braccio con docetaxel hanno ricevuto una profilassi antibiotica. L'endpoint primario di efficacia di questo studio, la sopravvivenza (OS) è stata significativamente più lunga (log-rank test p=0,0058) con il regime contenente docetaxel rispetto al PF (mediana OS: 70,6 vs 30,1 mesi rispettivamente), con un 30% di riduzione del rischio di morte rispetto al PF (rapporto di rischio (HR)=0,70, 95% intervallo di confidenza (CI)=0,54-0,90) ad un follow-up mediano di 41,9 mesi. L'endpoint secondario, PFS, ha dimostrato una riduzione del rischio di progressione o morte del 29% ed un miglioramento del PFS mediano di 22 mesi (35,5 mesi per TPF e 13,1 per PF). Questo è stato anche statisticamente significativo con un HR di 0,71, 95% CI 0,56 – 0,90; log-rank test p=0,004. I risultati sull'efficacia sono presentati nella tabella seguente:

Efficacia di docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con SCCHN localmente avanzato. (Intent-to-Treat Analysis).

| <b>Endpoint</b>   | <b>Docetaxel +Cis+5-FU<br/>n=255</b> | <b>Cis+5-FU<br/>n=246</b> |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Progressione mediana della sopravvivenza (mesi) - (95% CI)          | 70,6<br>(49,0-NA)                    | 30,1<br>(20,9-51,5)       |
| Rapporto di rischio aggiustato (95% CI)                             | 0,70<br>(0,54-0,90)                  |                           |
| * p-value   | 0,0058                               |                           |
| Sopravvivenza mediana (PFS) (mesi) (95% CI)                         | 35,5<br>(19,3)                       | 13,1<br>(10,6-20,2)       |
| Rapporto di rischio (95% CI)  | 0,71<br>(0,56-0,90)                  |                           |
| ** p-value  | 0,004                                |                           |
| Migliore risposta globale alla chemioterapia (CR+PR) (%) - (95% CI) | 71,8<br>(65,8-77,2)                  | 64,2<br>(57,9-70,2)       |

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| *** p-value  | 0,070               |                      |
| Migliore risposta globale al trattamento (CR+PR) di studio [chemioterapia +/- radioterapia] (%) (95% CI) | 76,5<br>(70,8-81,5) | 71,5<br>(65,50-77,1) |
| *** p-value  | 0,209               |                      |

un rapporto di rischio inferiore ad 1 a favore dell'associazione docetaxel + cisplatino + 5-fluorouracile

\*aggiustamento log-rank test

\*\*aggiustamento log-rank test, nessun aggiustamento per comparazioni multiple

\*\*\*Chi-square test, nessun aggiustamento per comparazioni multiple

NA – non applicabile

### Popolazione Pediatrica

L'Agenzia europea per i medicinali ha concesso una deroga dall'obbligo di fornire i risultati di studi con il medicinale di riferimento contenente docetaxel in tutti i sottogruppi di pazienti della popolazione pediatrica nel cancro della mammella, cancro del polmone non a piccole cellule, cancro della prostata, carcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, escluso il carcinoma nasofaringeo tipo II e III meno differenziato (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull'utilizzo pediatrico).

## **5.2 Proprietà farmacocinetiche**

### Assorbimento

La farmacocinetica di docetaxel è stata studiata in pazienti con tumore dopo somministrazione di 20-115 mg/m<sup>2</sup> in studi di fase I. Il profilo cinetico di docetaxel non è dose-dipendente ed è consistente con un modello farmacocinetico a tre compartimenti, con emivite per le fasi  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $\gamma$  rispettivamente di 4 min., 36 min. e 11,1 ore. La fase tardiva è in parte dovuta al ritorno relativamente lento di docetaxel dal compartimento periferico.

### Distribuzione

Dopo la somministrazione di 100 mg/m<sup>2</sup> per infusione di un'ora è stato ottenuto un livello medio di picco plasmatico di 3,7  $\mu$ g/ml, con una corrispondente AUC di 4,6 h. $\mu$ g/ml. Valori medi di clearance totale e volume di distribuzione allo steady state erano rispettivamente 21 l/h/m<sup>2</sup> e 113 l. Le variazioni interindividuali della clearance totale sono state di circa il 50%. Il docetaxel si lega alle proteine plasmatiche per oltre il 95%.

### Eliminazione

Uno studio con <sup>14</sup>C-docetaxel è stato condotto in tre pazienti con tumore. Docetaxel era eliminato sia nelle urine sia nelle feci tramite metabolismo ossidativo mediato dal citocromo P450 del gruppo estere tert-butilico; entro sette giorni, circa il 6% ed il 75% della radioattività somministrata viene escreta rispettivamente attraverso le urine e le feci. Circa l'80% della radioattività riscontrata nelle feci è escreta entro le prime 48 ore sotto forma di un metabolita maggiore e tre metaboliti minori inattivi e quantità molto piccole del medicinale immodificato.

### Popolazioni particolari

#### *Età e genere*

Uno studio di farmacocinetica di popolazione è stato eseguito su 577 pazienti. I parametri farmacocinetici calcolati attraverso il modello erano molto vicini a quelli osservati negli studi di fase I. La farmacocinetica del docetaxel non è stata modificata dall'età o dal sesso del paziente.

#### *Compromissione epatica*

In un piccolo numero di pazienti (n=23) con risultati biochimici che suggerivano una moderata disfunzione epatica (ALT, AST  $\geq$  1,5 volte il limite superiore normale, associate a fosfatasi

alcalina  $\geq 2,5$  il limite superiore normale), la clearance totale è diminuita in media del 27% (vedere paragrafo 4.2).

#### *Ritenzione di liquidi*

La clearance di docetaxel non è modificata nei pazienti con ritenzione di liquidi lieve o moderata. Non sono disponibili dati in pazienti con ritenzione di liquidi grave.

#### Terapia di associazione

##### *Doxorubicina*

Quando usato in associazione, docetaxel non influenza la clearance della doxorubicina e i livelli plasmatici del doxorubicinolo (un metabolita della doxorubicina). La farmacocinetica di docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamida non è influenzata dalla loro co-somministrazione.

##### *Capecitabina*

Uno studio di fase I sulla valutazione degli effetti di capecitabina sulla farmacocinetica di docetaxel e viceversa ha dimostrato che non vi è alcun effetto di capecitabina sulla farmacocinetica di docetaxel ( $C_{max}$  e AUC) e che non vi è alcun effetto di docetaxel sulla farmacocinetica di un metabolita rilevante di capecitabina, 5'-DFUR.

##### *Cisplatino*

La clearance di docetaxel nella terapia in associazione con cisplatino è stata simile a quella osservata durante la monoterapia. Il profilo farmacocinetico di cisplatino somministrato poco dopo l'infusione di docetaxel è simile a quello osservato con cisplatino da solo.

##### *Cisplatino e 5-fluorouracile*

La somministrazione combinata di docetaxel, cisplatino e 5-fluorouracile in 12 pazienti con tumori solidi non ha avuto influenza sulla farmacocinetica dei singoli medicinali.

##### *Prednisone e desametasone*

L'effetto del prednisone sulla farmacocinetica di docetaxel somministrato con una premedicazione standard con desametasone è stato studiato in 42 pazienti.

##### *Prednisone*

Non è stato osservato alcun effetto di prednisone sulla farmacocinetica di docetaxel.

### **5.3 Dati preclinici di sicurezza**

La potenzialità cancerogena di docetaxel non è stata studiata.

Il docetaxel si è dimostrato mutageno nel test *in vitro* di aberrazione cromosomiale in cellule CHO-K1 e *in vivo* nel test del micronucleo nel topo. Tuttavia docetaxel non è mutageno nel test di Ames o nel test di mutazione genica CHO/HGPRT. Questi risultati sono consistenti con l'attività farmacologica di docetaxel.

Effetti indesiderati sugli organi genitali maschili, osservate nel corso di studi di tossicità nei roditori, suggeriscono che docetaxel può danneggiare la fertilità maschile.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

#### Concentrato

Polisorbato 80.

Etanolo, anidro

#### Solvente

Acqua per preparazioni iniettabili

## 6.2 Incompatibilità

Il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.

## 6.3 Periodo di validità

- 18 mesi
- Soluzione premiscelata: la stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per 8 ore se conservata tra 2 C e 8 C o a temperatura ambiente (inferiore ai 25 C).  
Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima del suo impiego sono sotto la responsabilità dell'operatore e non dovrebbero superare di norma le 24 ore a 2 C-8 C, a meno che la diluizione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e convalidate.
- Soluzione per infusione: la stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per 4 ore a temperatura ambiente (inferiore ai 25 C). Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima del suo impiego sono sotto la responsabilità dell'operatore e non dovrebbero superare di norma le 24 ore a 2 C-8 C, a meno che la diluizione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e convalidate.

## 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.

Per le condizioni di conservazione del medicinale diluito, vedere paragrafo 6.3.

## 6.5 Natura e contenuto del contenitore

Ogni confezione contiene:

- Un flaconcino di concentrato e,
- Un flaconcino di solvente.
- Flaconcino di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml  
Flaconcino in vetro chiaro Tipo I da 6 ml con tappo di gomma bromobutilica e capsula rimovibile.

Il flaconcino contiene 0,72 ml di una soluzione 27,73 mg/ml di docetaxel in polisorbato 80 (volume di riempimento: 24,4 mg/0,88 ml). Questo volume di riempimento è stato stabilito durante lo sviluppo di docetaxel per compensare la perdita di liquido durante la preparazione della soluzione prediluita dovuta alla formazione di schiuma, all'adesione alle pareti del flaconcino ed allo 'spazio morto'. Il sovrariempimento assicura che dopo la diluizione con l'intero contenuto del flaconcino di solvente accluso a docetaxel, il volume minimo estraibile di soluzione prediluita sia di 2 ml, contenenti 10 mg/ml di docetaxel che corrisponde al contenuto dichiarato in etichetta di 20 mg per flaconcino.

### Flaconcino di solvente

Flaconcino in vetro chiaro Tipo I da 6 ml con tappo di gomma bromobutilica e capsula rimovibile.

Il flaconcino di solvente contiene 1,28 ml di acqua per preparazioni iniettabili (volume di riempimento: 1,71 ml). L'aggiunta dell'intero contenuto del flaconcino di solvente a quello di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato per soluzione per infusione assicura l'ottenimento di una soluzione premiscelata con una concentrazione di 10 mg/ml di docetaxel.

## 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Docetaxel Teva è un farmaco antineoplastico e, come con altri prodotti potenzialmente tossici, si deve usare cautela nel maneggiarlo e nel prepararne soluzioni. Si raccomanda l'uso di guanti.

Se Docetaxel Teva in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone. Se docetaxel in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con membrane mucose, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.

#### Preparazione per la somministrazione endovenosa

##### a) Preparazione della soluzione pronta per l'uso di Docetaxel Teva (10 mg docetaxel/ml)

Se i flaconcini sono conservati in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente (inferiore ai 25 C) per 5 minuti il numero richiesto di scatole di Docetaxel Teva.

Usando una siringa graduata con ago aspirare l'intero contenuto del flaconcino di solvente per Docetaxel Teva capovolgendo parzialmente il flaconcino.

Iniettare l'intero contenuto della siringa nel corrispondente flaconcino di Docetaxel Teva.

Rimuovere la siringa e l'ago e mescolare la soluzione manualmente capovolgendo ripetutamente per 45 secondi. Non agitare.

Lasciare riposare il flaconcino di soluzione prediluita per 5 minuti a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C) e quindi controllare che la soluzione risulti chiara e omogenea. (La formazione di schiuma è normale anche dopo 5 minuti a causa del contenuto di polisorbato 80 nella formulazione).

La soluzione prediluita contiene 10 mg/ml di docetaxel e deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione, anche se è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica di detta soluzione per un periodo di 8 ore se conservata tra +2 °C e +8 °C o a temperatura ambiente (inferiore ai 25 C).

##### b) Preparazione della soluzione per infusione

Per ottenere la dose richiesta per il paziente possono essere necessari più flaconcini di soluzione prediluita. Sulla base della dose necessaria per il paziente espressa in mg, prelevare in asepsi il volume corrispondente di soluzione prediluita contenente 10 mg/ml di docetaxel da un numero appropriato di flaconcini di soluzione prediluita per mezzo di una siringa graduata con ago. Ad esempio per una dose di 140 mg di docetaxel si devono prelevare 14 ml di soluzione prediluita di docetaxel.

Iniettare il volume necessario di soluzione prediluita in una sacca non-PVC di 250 ml contenenti una soluzione glucosata al 5% o soluzione per infusione con 9 mg/ml di sodio cloruro (0,9%).

Nel caso in cui sia necessaria una dose di docetaxel superiore a 200 mg, utilizzare un volume maggiore di soluzione da infusione in modo che la concentrazione di docetaxel non superi 0,74 mg/ml.

Mescolare manualmente la sacca o il flacone con movimento rotatorio.

La soluzione per infusione di Docetaxel Teva deve essere utilizzata entro 4 ore e deve essere somministrata sotto forma di infusione della durata di 1 ora, in asepsi, a temperatura ambiente (inferiore ai 25 C) ed in normali condizioni di luce.

Come per tutti i prodotti per uso parenterale, la soluzione prediluita e la soluzione per infusione di Docetaxel Teva deve essere esaminata visivamente prima dell'uso, le soluzioni contenenti precipitati devono essere eliminate.

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.

## **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Paesi Bassi

**8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/09/611/001

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data della prima autorizzazione: 26 Gennaio 2010

Data del rinnovo più recente: 14 Luglio 2014

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali : <http://www.ema.europa.eu/>

## 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione

## 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni flaconcino di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato contiene 80 mg di docetaxel. Ogni ml di concentrato contiene 27,73 mg di docetaxel.

### Eccipienti con effetti noti:

Ogni flaconcino di concentrato contiene 25,1% (p/p) di etanolo anidro (723 mg di etanolo anidro).

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICA

Concentrato e solvente per soluzione per infusione.

Il concentrato è una soluzione viscosa limpida, di colore da giallo a giallo-bruno.

Il solvente è una soluzione incolore.

## 4. INFORMAZIONI CLINICHE

### 4.1 Indicazioni terapeutiche

#### Cancro della mammella

Docetaxel Teva in associazione con doxorubicina e ciclofosfamida è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

- cancro della mammella operabile linfonodo positivo
- cancro della mammella operabile linfonodo negativo.

Nei pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del cancro della mammella nelle fasi iniziali. (vedere paragrafo 5.1).

Docetaxel Teva in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel Teva in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel Teva in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel Teva in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina.

#### Cancro del polmone non a piccole cellule

Docetaxel Teva è indicato per il trattamento di pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

#### Cancro della prostata

Docetaxel Teva in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione.

Docetaxel Teva in associazione con terapia di deprivazione androgenica (*androgen-deprivation therapy*, ADT), con o senza prednisone o prednisolone, è indicato per il trattamento dei pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile.

#### Adenocarcinoma dello stomaco

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

#### Cancro del collo e della testa

Docetaxel Teva in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato del collo e della testa.

### **4.2 Posologia e modo di somministrazione**

L'utilizzo di docetaxel deve essere limitato ai reparti specializzati nella somministrazione di terapie citotossiche e la sua somministrazione deve essere effettuata sotto il controllo di un medico specializzato nell'utilizzo di chemioterapia antitumorale (vedere paragrafo 6.6).

#### Posologia

Per il cancro della mammella, il cancro del polmone non a piccole cellule, l'adenocarcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, può essere utilizzata, se non controindicata, una premedicazione con un corticosteroide orale, quale desametasone 16 mg/die (es. 8 mg BID) per 3 giorni iniziando 1 giorno prima della somministrazione di docetaxel (vedere paragrafo 4.4).

Per il cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, dato l'utilizzo contemporaneo di prednisone o prednisolone, la premedicazione raccomandata è desametasone 8 mg per via orale 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel (vedere paragrafo 4.4).

Per il cancro della prostata metastatico ormono-sensibile, indipendentemente dall'uso concomitante di prednisone o prednisolone, il regime di premedicazione raccomandato è desametasone 8 mg per via orale 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel (vedere paragrafo 4.4).

La profilassi con G-CSF può essere utilizzata per ridurre il rischio di tossicità ematologica.

Docetaxel viene somministrato in infusione della durata di un'ora ogni tre settimane.

#### Cancro della mammella

Per la terapia adiuvante del cancro della mammella operabile linfonodo positivo e linfonodo negativo la dose di docetaxel raccomandata è di 75 mg/m<sup>2</sup> somministrata 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamida 500 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 6 cicli (regime TAC) (vedere anche Adattamento della dose durante il trattamento).

Per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico la dose raccomandata di docetaxel in monoterapia è 100 mg/m<sup>2</sup>. Nel trattamento di prima linea, docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> è somministrato in associazione con doxorubicina (50 mg/m<sup>2</sup>).

In associazione con trastuzumab la dose raccomandata di docetaxel è 100 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane, con trastuzumab somministrato settimanalmente. Nello studio registrativo l'infusione iniziale di docetaxel



è stata iniziata il giorno dopo la prima somministrazione di trastuzumab. Le successive dosi di docetaxel sono state somministrate immediatamente dopo l'infusione di trastuzumab se la precedente dose di trastuzumab era stata ben tollerata. Per la dose e la somministrazione di trastuzumab vedere il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del trastuzumab.

In associazione con capecitabina il dosaggio raccomandato di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup> ogni tre settimane, in associazione con capecitabina alla dose di 1.250 mg/m<sup>2</sup> due volte al giorno (entro 30 minuti dopo il pasto) per 2 settimane seguite da un intervallo di 1 settimana. Per il calcolo della dose di capecitabina secondo la superficie corporea, vedere il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di capecitabina.

#### Cancro del polmone non a piccole cellule

In pazienti che non hanno mai ricevuto chemioterapia per il cancro del polmone non a piccole cellule, la dose raccomandata è docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> seguita immediatamente da cisplatino 75 mg/m<sup>2</sup> in 30-60 minuti. Per il trattamento dopo fallimento di precedente chemioterapia contenente platino la dose raccomandata è di 75 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia.

#### Cancro della prostata

##### *Cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione*

La dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup>. Prednisone o prednisolone 5 mg per via orale due volte al giorno viene somministrato per tutta la durata del trattamento (vedere paragrafo 5.1).

##### *Cancro della prostata metastatico ormono-sensibile*

La dose raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 6 cicli. Prednisone o prednisolone 5 mg per via orale due volte al giorno può essere somministrato per tutta la durata del trattamento.

#### Adenocarcinoma dello stomaco

La dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione della durata di 1 ora, seguita da cisplatino 75 mg/m<sup>2</sup>, in infusione della durata di 1 - 3 ore (entrambe solo il giorno 1), seguita da 5-fluorouracile 750 mg/m<sup>2</sup> al giorno somministrato in infusione continua di 24 ore per 5 giorni, a partire dalla fine dell'infusione di cisplatino. Il trattamento è ripetuto ogni tre settimane. I pazienti devono ricevere una premedicazione con antiemetici ed un'adeguata idratazione per la somministrazione del cisplatino. Deve essere fatta la profilassi con G-CSF in modo tale da attenuare il rischio di tossicità ematologiche (vedere inoltre Adattamento della dose durante il trattamento).

#### Cancro del collo e della testa

I pazienti devono ricevere antiemetici come premedicazione ed un'idratazione adeguata (prima e dopo la somministrazione del cisplatino). La profilassi con G-CSF può essere fatta in modo tale da attenuare il rischio di tossicità ematologiche. Tutti i pazienti trattati con docetaxel degli studi TAX 323 e TAX 324 hanno ricevuto una profilassi antibiotica.

- Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia (TAX 323)  
Per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato e non operabile del collo e della testa (SCCHN), la dose consigliata di docetaxel è di 75 mg/m<sup>2</sup> come infusione di 1 ora seguita dal cisplatino 75 mg/m<sup>2</sup> per oltre 1 ora, il giorno 1, seguito da 5-fluorouracile 750 mg/m<sup>2</sup> al giorno somministrato in infusione continua di 24 ore per 5 giorni. Questo schema posologico viene somministrato ogni 3 settimane per 4 cicli. A seguito della chemioterapia, i pazienti devono ricevere la radioterapia.
- Chemioterapia di induzione seguita da chemioradioterapia (TAX 324)  
Per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma localmente avanzato del collo e della testa a cellule squamose (SCCHN) (tecnicamente inoperabile, con una bassa probabilità di riuscita chirurgica, e nell'ottica di una conservazione dell'organo) la dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione della durata di 1 ora, il giorno 1, seguito dal cisplatino 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in infusione della durata di 30 minuti fino a tre ore, seguito da 5-fluorouracile 1000 mg/m<sup>2</sup> al giorno, somministrato in infusione continua di 1-4 giorni. Questo schema posologico viene somministrato ogni tre settimane per tre cicli. Dopo la chemioterapia, i pazienti devono ricevere la chemio-radioterapia.

Per le modifiche della dose di 5-fluorouracile e cisplatino, vedere gli specifici riassunti delle caratteristiche del prodotto.

#### Adattamento della posologia durante il trattamento

##### Generale

Il docetaxel deve essere somministrato quando la conta dei neutrofili è  $\geq 1500$  cellule/mm<sup>3</sup>.

In pazienti che abbiano manifestato, durante la terapia con docetaxel, neutropenia febbrile, neutrofili  $< 500$ /mm<sup>3</sup> per più di una settimana, reazioni cutanee gravi o cumulative, o neuropatia periferica grave, la dose di docetaxel deve essere ridotta da 100 mg/m<sup>2</sup> a 75 mg/m<sup>2</sup> e/o da 75 a 60 mg/m<sup>2</sup>. Se, a 60 mg/m<sup>2</sup>, il paziente continua a manifestare queste reazioni, il trattamento deve essere interrotto.

##### Terapia adiuvante per il cancro della mammella

Una profilassi primaria con G-CSF deve essere considerata per i pazienti che ricevono una terapia adiuvante con docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide (TAC) per il cancro della mammella. Nei pazienti che presentano neutropenia febbrile e/o infezione neutropenica la dose di docetaxel deve essere ridotta a 60 mg/m<sup>2</sup> in tutti i cicli successivi (vedere sezioni 4.4 e 4.8). Nei pazienti che manifestano una stomatite di Grado 3 o 4 la dose deve essere ridotta a 60 mg/m<sup>2</sup>.

##### In associazione con cisplatino

Per i pazienti trattati inizialmente con docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino ed il cui nadir della conta piastrinica nel precedente ciclo di terapia è stato  $< 25000$  cellule/mm<sup>3</sup>, o in pazienti che manifestano neutropenia febbrile, o in pazienti con grave tossicità non ematologica, la dose di docetaxel nei cicli successivi deve essere ridotta a 65 mg/m<sup>2</sup>. Per gli aggiustamenti della dose di cisplatino, vedere il corrispondente riassunto delle caratteristiche del prodotto.

##### In associazione con capecitabina

- Per l'adattamento della dose di capecitabina, si veda il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina.
- Nei pazienti che sviluppano la prima comparsa di una tossicità di Grado 2 che permane al momento della somministrazione successiva di docetaxel/capecitabina, il trattamento deve essere rimandato fino a risoluzione al Grado 0-1 e successivamente ripreso con il 100% della dose iniziale.
- Nei pazienti che sviluppano la seconda comparsa di una tossicità di Grado 2, oppure la prima comparsa di una tossicità di Grado 3 in qualsiasi momento del ciclo di terapia, il trattamento deve essere rimandato fino a risoluzione al Grado 0-1 e successivamente ripreso con docetaxel 55 mg/m<sup>2</sup>.
- Per una qualsiasi comparsa successiva di tossicità o per una qualsiasi tossicità di Grado 4, sospendere la terapia con docetaxel.

Per le modifiche della dose di trastuzumab, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab.

##### In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

Se si verifica un episodio di neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica malgrado l'uso di G-CSF, la dose di docetaxel deve essere ridotta da 75 a 60 mg/m<sup>2</sup>. Se si verificano ulteriori episodi di neutropenia complicata la dose di docetaxel deve essere ridotta da 60 a 45 mg/m<sup>2</sup>. Nel caso di trombocitopenia di Grado 4 la dose di docetaxel deve essere ridotta da 75 a 60 mg/m<sup>2</sup>. I pazienti non devono essere ritrattati con altri cicli di docetaxel fino a che i neutrofili siano ritornati ad un livello  $> 1.500$  cellule/mm<sup>3</sup> e le piastrine siano ritornate ad un livello  $> 100.000$  cellule/mm<sup>3</sup>.

Interrompere il trattamento se queste tossicità persistono (vedere paragrafo 4.4).

Modifiche della dose raccomandata a causa della tossicità in pazienti trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (5-FU):

| <b>Tossicità</b>   | <b>Aggiustamento della dose</b>  |
|--------------------|--|
| Diarrea di grado 3 | Primo episodio: ridurre la dose del 5-FU del 20%.<br>Secondo episodio: ridurre la dose di docetaxel del 20%. |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Diarrea di grado 4            | Primo episodio: ridurre le dosi del docetaxel e del 5-FU del 20%.<br>Secondo episodio: interrompere il trattamento.  |
| Stomatiti/mucositi di grado 3 | Primo episodio: ridurre la dose del 5-FU del 20%.<br>Secondo episodio: interrompere il solo 5-FU, in tutti i cicli successivi.<br>Terzo episodio: ridurre la dose del docetaxel del 20%. |
| Stomatiti/mucositi di grado 4 | Primo episodio: interrompere il solo 5-FU, in tutti i cicli successivi.<br>Secondo episodio: ridurre la dose di docetaxel del 20%.   |

Per le modifiche della dose del cisplatino e del 5-fluorouracile, vedere gli specifici riassunti delle caratteristiche del prodotto.

Nello studio registrativo SCCHN in pazienti che hanno manifestato neutropenia complicata (comprendente neutropenia prolungata, neutropenia febbrile, o infezione), è stato suggerito l'uso di G-CSF per fornire una copertura profilattica (es. giorni 6-15) in tutti i cicli successivi.

### Popolazioni particolari

#### Pazienti con insufficienza epatica

Sulla base dei dati di farmacocinetica con docetaxel a 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in monoterapia, nei pazienti con aumento delle transaminasi (ALT e/o AST) maggiori di 1,5 volte il limite superiore normale e fosfatasi alcalina maggiore di 2,5 volte il limite superiore normale, la dose di docetaxel raccomandata è 75 mg/m<sup>2</sup> (vedere paragrafi 4.4 e 5.2). Per i pazienti con bilirubina sierica oltre il limite superiore normale e/o ALT e AST >3,5 volte il limite superiore normale associati con fosfatasi alcalina maggiore di 6 volte il limite superiore normale, non può essere raccomandata alcuna riduzione della dose e docetaxel non deve essere somministrato se non nei casi in cui sia strettamente indicato.

In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco, lo studio clinico registrativo ha escluso i pazienti con un valore di ALT e/o AST > 1,5 volte il limite superiore normale associato a un valore di fosfatasi alcalina > 2,5 volte il limite superiore normale e a un valore di bilirubina >1 volta il limite superiore normale; per questi pazienti, nessuna riduzione della dose può essere consigliata ed il docetaxel non deve essere usato a meno che non sia strettamente indicato. Non sono disponibili dati in pazienti con insufficienza epatica trattati con docetaxel in associazione nelle altre indicazioni.

#### Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di Docetaxel Teva nel carcinoma nasofaringeo nei bambini di età da 1 mese a meno di 18 anni non sono state stabilite.

Non vi sono dati sull'uso di Docetaxel Teva nella popolazione pediatrica nelle indicazioni del cancro della mammella, cancro del polmone non a piccole cellule, cancro della prostata, carcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, escludendo il carcinoma nasofaringeo tipo II e III meno differenziato.

#### Anziani

Con riferimento alla farmacocinetica di popolazione, non vi sono speciali istruzioni per l'uso negli anziani. In associazione con capecitabina per i pazienti di età di 60 anni e oltre, si raccomanda una riduzione della dose iniziale al 75% (vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina).

#### Modo di somministrazione

Per le istruzioni sulla preparazione e sulla somministrazione del prodotto, vedere paragrafo 6.6.

### **4.3 Controindicazioni**

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.

Il docetaxel non deve essere usato nei pazienti con una conta iniziale di neutrofili <1.500 cellule/mm<sup>3</sup>.

Il docetaxel non deve essere usato in pazienti con insufficienza epatica grave, in mancanza di dati disponibili (vedere paragrafi 4.2 e 4.4).

Le controindicazioni per gli altri farmaci valgono anche quando utilizzati in associazione con docetaxel.

#### **4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego**

Salvo controindicazioni, per i tumori della mammella e del polmone non a piccole cellule la premedicazione con corticosteroidi orali, come desametasone 16 mg al dì (es. 8 mg BID) per 3 giorni, iniziando il giorno prima della somministrazione di docetaxel, può ridurre l'incidenza e la gravità della ritenzione di liquidi così come la gravità delle reazioni di ipersensibilità. Per il cancro della prostata, la premedicazione è costituita da desametasone orale 8 mg, 12 ore, 3 ore e 1 ora prima dell'infusione di docetaxel (vedere paragrafo 4.2).

##### Ematologia

La neutropenia è la più frequente delle reazioni avverse osservate con docetaxel. I nadir dei neutrofili sono comparsi dopo 7 giorni (valore mediano) ma nei pazienti pesantemente pretrattati questo intervallo può essere abbreviato. In tutti i pazienti in trattamento con docetaxel deve essere eseguito frequentemente un controllo dell'emocromo completo. I pazienti non devono essere trattati di nuovo con docetaxel finché il valore dei neutrofili non sia ritornato a  $\geq 1.500$  cellule/mm<sup>3</sup> (vedere paragrafo 4.2).

Nel caso di neutropenia grave ( $< 500$  cellule/mm<sup>3</sup> per sette o più giorni) durante il trattamento con docetaxel si raccomanda una riduzione della dose nei cicli successivi di terapia o l'uso di appropriate misure sintomatiche (vedere paragrafo 4.2).

In pazienti trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (TCF), la neutropenia febbrile e l'infezione neutropenica si sono verificate con un'incidenza più bassa quando i pazienti hanno ricevuto G-CSF in profilassi. I pazienti trattati con TCF devono ricevere il G-CSF come profilassi per attenuare il rischio di neutropenia complicata (neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica). I pazienti che ricevono TCF devono essere monitorati molto attentamente (vedere paragrafi 4.2 e 4.8).

Nei pazienti trattati con docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamida (regime TAC), neutropenia febbrile e/o infezione neutropenica si sono verificate con un'incidenza più bassa quando i pazienti hanno ricevuto profilassi primaria con G-CSF. La profilassi primaria con G-CSF deve essere considerata nei pazienti che ricevono terapia adiuvante con TAC per il cancro della mammella per attenuare il rischio di neutropenia complicata (neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione neutropenica). I pazienti che ricevono TAC devono essere monitorati attentamente (vedere paragrafi 4.2 e 4.8).

##### Reazioni gastrointestinali

Si raccomanda cautela nei pazienti con neutropenia, particolarmente a rischio di sviluppare complicanze gastrointestinali. Benché la maggioranza dei casi si sia verificata durante il primo o secondo ciclo del regime contenente docetaxel si può sviluppare un'enterocolite in ogni momento, e può portare al decesso già dal primo giorno di insorgenza. I pazienti devono essere strettamente monitorati per manifestazioni precoci di grave tossicità gastrointestinale (vedere paragrafi 4.2, 4.4 Ematologia e 4.8).

##### Reazioni di ipersensibilità

I pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione per la possibile comparsa di reazioni di ipersensibilità, specialmente durante la prima e la seconda infusione. Entro pochi minuti dall'inizio dell'infusione di docetaxel possono verificarsi reazioni di ipersensibilità perciò devono essere tenuti a disposizione mezzi per il trattamento della ipotensione e del broncospasmo. Se si verificano reazioni di ipersensibilità con sintomi minori come vampate o reazioni cutanee localizzate non è necessario

interrompere la terapia. Tuttavia reazioni gravi, come ipotensione grave, broncospasmo o eruzione/eritema generalizzati richiedono l'immediata sospensione dell'infusione di docetaxel ed un trattamento appropriato. I pazienti in cui comparissero gravi reazioni di ipersensibilità non devono più assumere docetaxel. Pazienti che hanno avuto una precedente reazione di ipersensibilità a paclitaxel possono essere a rischio di sviluppare una reazione di ipersensibilità a docetaxel, inclusa una reazione di ipersensibilità più severa. Questi pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione durante l'inizio della terapia con docetaxel.

### Reazioni cutanee

Sono stati osservati eritema cutaneo localizzato alle estremità (palmo della mano e pianta del piede) con edema seguito da desquamazione. Sono stati riportati sintomi gravi quali eruzioni cutanee seguite da desquamazione che hanno condotto alla sospensione momentanea o definitiva del trattamento con docetaxel (vedere paragrafo 4.2).

A seguito del trattamento con docetaxel sono state riportate Reazioni Avverse Cutanee Gravi (SCAR - Severe Cutaneous Adverse Reactions) quali Sindrome di Stevens-Johnson (SJS), Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) e Pustolosi Esantematosa Generalizzata Acuta (AGEP). I pazienti devono essere informati su segni e sintomi delle gravi manifestazioni cutanee e monitorati attentamente. Se compaiono segni e sintomi suggestivi di queste reazioni, si deve considerare l'interruzione di docetaxel.

### Ritenzione di liquidi

I pazienti con grave ritenzione di liquidi, come versamento pleurico, pericardico e ascite, devono essere monitorati attentamente.

### Patologie respiratorie

Sono stati riportati casi di Sindrome da distress respiratorio acuto, polmonite interstiziale/polmonite, malattia polmonare interstiziale, fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria e possono essere associati ad esito fatale. Sono stati riportati casi di polmonite atipica in pazienti sottoposti anche a radioterapia.

Se appaiono nuovi sintomi polmonari o se i sintomi già esistenti dovessero peggiorare, i pazienti devono essere tempestivamente esaminati, strettamente monitorati, e trattati adeguatamente. È raccomandata la sospensione della terapia con docetaxel fino a quando non è disponibile una diagnosi. L'impiego tempestivo di misure di supporto adeguate può contribuire a migliorare il quadro clinico. Il beneficio relativo alla ripresa della terapia con docetaxel deve essere attentamente valutato.

### Pazienti con compromissione epatica

In pazienti trattati con docetaxel a 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in monoterapia che hanno livelli di transaminasi sieriche (ALT e/o AST) maggiori di 1,5 volte il limite superiore normale in concomitanza con livelli di fosfatasi alcalina sierica maggiori di 2,5 volte il limite superiore normale, c'è un rischio più elevato di sviluppare reazioni avverse gravi come morte tossica comprendente sepsi ed emorragia gastrointestinale che possono essere fatali, neutropenia febbrile, infezioni, trombocitopenia, stomatite ed astenia. Perciò, in pazienti con test di funzionalità epatica elevati, la dose raccomandata di docetaxel è 75 mg/m<sup>2</sup> e i test di funzionalità epatica devono essere eseguiti prima di iniziare il trattamento e prima di ogni ciclo (vedere paragrafo 4.2).

Nei pazienti che abbiano valori sierici di bilirubina maggiori del limite superiore normale e/o valori di ALT e AST superiori di 3,5 volte il limite superiore normale con fosfatasi alcalina superiore di 6 volte il limite superiore normale non si può raccomandare una riduzione di dosaggio e docetaxel non deve essere usato se non strettamente indicato.

In associazione con cisplatino e 5-fluorouracile per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco, lo studio clinico registrativo ha escluso i pazienti con un valore di ALT e/o AST >1,5 volte il limite superiore normale associato a un valore di fosfatasi alcalina >2,5 volte il limite superiore normale e a un valore di bilirubina >1 volta il limite superiore normale; per questi pazienti, nessuna riduzione della dose può essere consigliata ed il docetaxel non dovrebbe essere usato

a meno che non sia strettamente indicato. Non sono disponibili dati su pazienti con compromissione epatica trattati con docetaxel in associazione nelle altre indicazioni.

#### Pazienti con compromissione renale

Non vi sono dati disponibili nei pazienti con grave compromissione renale sottoposti a terapia con docetaxel.

#### Sistema nervoso

La comparsa di neurotossicità periferica grave richiede riduzione della dose (vedere paragrafo 4.2).

#### Tossicità cardiaca

Insufficienza cardiaca è stata osservata in pazienti trattati con docetaxel in associazione con trastuzumab, in particolare dopo chemioterapia contenente antracicline (doxorubicina o epirubicina). Questa è risultata essere da moderata a severa ed è stata associata a decessi (vedere paragrafo 4.8).

Quando i pazienti sono candidati al trattamento di docetaxel in associazione con trastuzumab devono essere sottoposti ad una valutazione cardiaca di base. La funzione cardiaca deve essere ulteriormente monitorata durante il trattamento (es. ogni tre mesi) per identificare i pazienti che potrebbero sviluppare alterazioni cardiache. Per maggiori dettagli vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di trastuzumab.

In pazienti trattati con docetaxel in regimi di combinazione che includevano doxorubicina, 5-fluorouracile e/o ciclofosfamide è stata riportata aritmia ventricolare inclusa tachicardia ventricolare (a volte fatale) (vedere paragrafo 4.8).

Si raccomanda una valutazione cardiaca al basale.

#### Patologie dell'occhio

In pazienti trattati con docetaxel sono stati riportati casi di edema maculare cistoide (EMC). I pazienti con problemi di vista devono essere sottoposti ad un tempestivo e completo esame oftalmologico. Nel caso in cui venga diagnosticata la EMC, il trattamento con docetaxel deve essere interrotto ed iniziato un appropriato trattamento (vedi paragrafo 4.8).

#### Seconda malignità primitiva

Sono state osservate seconde malignità primitive quando docetaxel è stato somministrato in combinazione con altri trattamenti antitumorali, noti per essere associati con seconde malignità primitive. Seconde malignità primitive (incluse leucemia mieloide acuta, sindrome mielodisplastica e linfoma non-Hodgkin), possono verificarsi diversi mesi o anni dopo la terapia contenente docetaxel. I pazienti devono essere monitorati per seconde malignità primitive (vedere paragrafo 4.8).

#### Sindrome da lisi tumorale

È stata segnalata sindrome da lisi tumorale dopo il primo o il secondo ciclo di trattamento con docetaxel (vedere paragrafo 4.8). I pazienti a rischio di sindrome da lisi tumorale (ad esempio con insufficienza renale, iperuricemia, tumore voluminoso, progressione rapida) devono essere attentamente monitorati. Si raccomanda la correzione della disidratazione e il trattamento degli alti livelli di acido urico prima dell'inizio del trattamento.

#### Altro

Devono essere adottate misure contraccettive durante il trattamento sia per gli uomini sia per le donne e per gli uomini per almeno sei mesi dopo la sua sospensione (vedere paragrafo 4.6).

La co-sommistrazione di docetaxel con forti inibitori del CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, itraconazolo, claritromicina, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina e voriconazolo), deve essere evitata (vedere paragrafo 4.5).

## Ulteriori precauzioni per il trattamento adiuvante del cancro della mammella

### Neutropenia complicata

Per le pazienti che presentano una neutropenia complicata (neutropenia prolungata, neutropenia febbrile o infezione) si deve considerare la terapia con G-CSF e riduzione della dose (vedere paragrafo 4.2).

### Eventi avversi gastrointestinali

Sintomi come dolore addominale e malessere, febbre, diarrea con o senza neutropenia, potrebbero essere manifestazioni precoci di tossicità gastrointestinale grave e devono essere valutati e trattati immediatamente.

### Insufficienza cardiaca congestizia

Le pazienti, durante la terapia ed il periodo di follow-up, devono essere seguite per sintomi che possono ricondurre a insufficienza cardiaca congestizia. Nelle pazienti trattate con il regime TAC per cancro della mammella linfonodo positivo è stato dimostrato che il rischio di insufficienza cardiaca congestizia (CHF) è più elevato nel primo anno dopo la terapia (vedere paragrafi 4.8 e 5.1).

### Pazienti con 4 o più linfonodi positivi

Dato che il beneficio osservato nelle pazienti con 4 o più linfonodi positivi non è stato statisticamente significativo per quanto riguarda la sopravvivenza libera da malattia (DFS) e sopravvivenza globale (OS), il positivo rapporto beneficio/rischio della terapia con TAC in pazienti con 4 o più linfonodi positivi non è stato pienamente dimostrato nell'analisi finale (vedere paragrafo 5.1).

### Anziani

#### Precauzioni per l'uso nella terapia adiuvante per il cancro della mammella

Sono disponibili i dati limitati su pazienti di età superiore a 70 anni trattati con docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide.

#### Precauzioni per l'uso nel cancro della prostata resistente alla castrazione

In uno studio sul cancro della prostata (TAX 327), dei 333 pazienti trattati con docetaxel ogni tre settimane, 209 avevano un'età uguale o superiore a 65 anni e 68 pazienti un'età superiore a 75 anni. Nei pazienti trattati con docetaxel ogni tre settimane l'incidenza di alterazioni ungueali correlate al farmaco, nei pazienti di età uguale o superiore a 65 anni, risultava superiore di  $\geq 10\%$  rispetto ai pazienti più giovani. L'incidenza di febbre, diarrea, anoressia ed edema periferico correlati al farmaco, nei pazienti di età uguale o superiore a 75 anni, risultava superiore di  $\geq 10\%$  rispetto ai pazienti di età inferiore a 65 anni.

#### Precauzioni per l'uso nel cancro della prostata ormono-sensibile

In uno studio sul cancro della prostata dei 333 pazienti trattati con docetaxel ogni tre settimane, 209 avevano un'età uguale o superiore a 65 anni e 68 pazienti superiore ai 75 anni. Nei pazienti trattati con docetaxel ogni tre settimane, l'incidenza di alterazioni ungueali correlate al farmaco, nei pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni, risultava superiore di oltre il 10% rispetto ai pazienti più giovani. L'incidenza di febbre, diarrea, anoressia ed edema periferico correlabili al farmaco nei pazienti di età uguale o superiore ai 75 anni risultava superiore di oltre il 10% rispetto ai pazienti di età inferiore ai 65 anni.

Fra i 300 pazienti (221 nello studio di fase III e 79 nello studio di fase II) trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile nello studio del carcinoma dello stomaco, 74 avevano 65 o più anni e 4 avevano 75 o più anni. L'incidenza degli eventi avversi gravi è stata più elevata nei pazienti anziani in confronto a quelli più giovani. L'incidenza degli eventi avversi è stata più elevata nelle persone anziane rispetto a quelle giovani. L'incidenza dei seguenti eventi avversi (tutti i gradi): letargia, stomatite ed infezione neutropenica si è verificata con una frequenza  $>10\%$  nei pazienti con 65 o più anni rispetto ai pazienti più giovani.

Gli anziani trattati con TCF devono essere monitorati molto attentamente.

### Eccipienti

### Etanolo

Questo medicinale contiene 723 mg di alcol (etanolo anidro) in ogni flaconcino (25,1% (w/w)).

Una dose di 100 mg/m<sup>2</sup> di questo medicinale somministrato a un adulto di 70 kg comporterebbe un'esposizione a 23 mg/kg di etanolo che può causare un aumento della concentrazione di alcol nel sangue (BAC) di circa 4 mg/100 ml.

Per confronto, per un adulto che beve un bicchiere di vino o 500 ml di birra, il BAC è probabile che sia di circa 50 mg/100 ml.

Poiché questo medicinale viene solitamente somministrato lentamente nell'arco di 1 ora, gli effetti dell'alcol possono essere ridotti.

La co-somministrazione con medicinali contenenti per es. glicole propilenico o etanolo può portare all'accumulo di etanolo e indurre effetti avversi, in particolare nei bambini piccoli con attività metabolica bassa o immatura.

Dannoso per chi soffre di alcolismo.

La presenza di etanolo è da considerare anche in caso di gravidanza o allattamento, e nel trattamento dei bambini.

Devono essere considerati possibili effetti sul sistema nervoso centrale.

### **4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione**

La quantità di alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali.

Studi *in vitro* hanno dimostrato che il metabolismo del docetaxel può essere modificato dalla co-somministrazione di composti che inducono o inibiscono il citocromo P450-3A o che vengono da questo metabolizzati (e possano perciò inibire competitivamente l'enzima), quali ciclosporine, ketoconazolo e eritromicina. Di conseguenza usare cautela nella gestione di pazienti in trattamento concomitante con tali medicinali per il rischio potenziale di interazioni importanti.

In caso di associazione con inibitori del CYP3A4, l'insorgenza di reazioni avverse a docetaxel può aumentare, come conseguenza di un ridotto metabolismo. Se il trattamento concomitante di un forte inibitore del CYP3A4 (per esempio ketoconazolo, itraconazolo, claritromicina, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina e voriconazolo) non può essere evitato, è necessario uno stretto controllo clinico ed un aggiustamento della dose di docetaxel può essere appropriato durante il trattamento con un forte inibitore del CYP3A4 (vedere paragrafo 4.4). In uno studio di farmacocinetica con 7 pazienti, la co-somministrazione di docetaxel con ketoconazolo, un forte inibitore del CYP3A4, ha portato alla diminuzione del 49% della clearance del docetaxel.

La farmacocinetica di docetaxel in presenza di prednisone è stata studiata nei pazienti con cancro della prostata metastatico. Docetaxel è metabolizzato da CYP3A4 ed il prednisone causa induzione del CYP3A4. Non è stato osservato alcun effetto statisticamente significativo del prednisone sulla farmacocinetica di docetaxel.

Docetaxel è altamente legato alle proteine (> del 95%). Anche se non è stata studiata specificatamente la possibile interazione *in vivo* tra docetaxel e terapie concomitanti, le interazioni *in vitro* tra farmaci fortemente legati alle proteine quali eritromicina, difenidramina, propranololo, propafenone, fenitoina, salicilati, sulfametoxazolo e sodio valproato non hanno evidenziato influenze sul legame di docetaxel alle proteine. Inoltre desametasone non modifica il legame proteico di docetaxel. Docetaxel non influenza il legame della digitossina.

Le farmacocinetiche di docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide non hanno manifestato interferenze durante la loro co-somministrazione. Dati limitati provenienti da un singolo studio non controllato sembrano indicare un'interazione tra docetaxel e carboplatino. Quando utilizzato in associazione con docetaxel, la clearance di carboplatino è stata superiore di circa il 50% rispetto ai valori precedentemente riportati per l'utilizzo in monoterapia.



## **4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento**

### Gravidanza

Non ci sono informazioni sull'uso di docetaxel nella donna in gravidanza. In studi effettuati sul ratto e sul coniglio, docetaxel risulta embriotossico e fetotossico e riduce la fertilità nel ratto. Come per altri medicinali citotossici, il docetaxel può provocare danno fetale se somministrato a donne in gravidanza. Per questo motivo docetaxel non deve essere somministrato a donne gravide, a meno che non sia chiaramente indicato.

Le donne in età fertile in trattamento con docetaxel devono essere avvertite di evitare una gravidanza e di avvisare immediatamente il loro medico nel caso in cui ciò avvenga.

### Allattamento

Il docetaxel è una sostanza lipofila ma non è noto se sia escreto nel latte materno.

Di conseguenza, data la potenziale insorgenza di reazioni avverse nel lattante, l'allattamento deve essere interrotto durante il trattamento con docetaxel.

### Contracezione in maschi e femmine

Durante il trattamento deve essere adottato un efficace metodo contraccettivo.

### Fertilità

In studi non clinici, docetaxel ha effetti genotossici e può alterare la fertilità maschile (vedere paragrafo 5.3). Pertanto, agli uomini in trattamento con docetaxel si raccomanda di non procreare durante e fino a 6 mesi dopo il trattamento e di informarsi sulla conservazione dello sperma prima del trattamento.

## **4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari**

Non sono stati eseguiti studi sugli effetti sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari. La quantità di alcol contenuta in questo medicinale e gli effetti indesiderati del prodotto possono compromettere la capacità di guidare o usare macchinari (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Pertanto, i pazienti devono essere avvisati dell'impatto potenziale della quantità di alcol e degli effetti indesiderati del prodotto sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari, ed essere consigliati di non guidare o usare macchinari se hanno questi effetti indesiderati durante il trattamento.

## **4.8 Effetti indesiderati**

### Sintesi del profilo di sicurezza per tutte le indicazioni

Le reazioni avverse considerate possibilmente o probabilmente correlate alla somministrazione di docetaxel sono state ottenute in:

- 1.312 e 121 pazienti che hanno ricevuto 100 mg/m<sup>2</sup> e 75 mg/m<sup>2</sup> di docetaxel rispettivamente come monoterapia,
- 258 pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con doxorubicina,
- 406 pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con cisplatino,
- 92 pazienti trattati con docetaxel in associazione con trastuzumab,
- 255 pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con capecitabina,
- 332 pazienti (TAX 327) che hanno ricevuto docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone (vengono presentati gli effetti indesiderati correlati al trattamento clinicamente rilevanti),
- 1.276 pazienti (744 e 532 rispettivamente in TAX 316 e GEICAM 9805) che hanno ricevuto docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamida (vengono presentati gli effetti indesiderati correlati al trattamento clinicamente rilevanti),
- 300 pazienti con adenocarcinoma dello stomaco (221 nello studio di fase III e 79 nello studio di fase II) trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (si sono verificati

degli effetti indesiderati clinicamente importanti legati al trattamento).

- 174 e 251 pazienti con cancro del collo e della testa trattati con docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile (si sono verificati degli effetti indesiderati clinicamente importanti legati al trattamento)
- 545 pazienti (studio STAMPEDE) che hanno ricevuto docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone e ADT.

Tali reazioni sono state descritte con i criteri NCI Common Toxicity Criteria (grado 3= G3; grado 3-4 =G3/4; grado 4= G4) e con i termini COSTART e MedDRA. Le frequenze sono definite come: molto comuni ( $\geq 1/10$ ); comuni (da  $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ); non comuni (da  $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ); rari (da  $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ); molto rari ( $< 1/10.000$ ); non nota (non può essere stimata in base ai dati disponibili).

All'interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità.

Le reazioni avverse riportate più di frequente durante l'uso del solo docetaxel sono: neutropenia (reversibile e non cumulativa; il giorno medio al nadir era il giorno 7 e la durata media della neutropenia grave ( $< 500$  cellule/mm<sup>3</sup>) era di 7 giorni), anemia, alopecia, nausea, vomito, stomatiti, diarrea ed astenia. La gravità degli eventi avversi di docetaxel può essere aumentata quando docetaxel è somministrato in associazione con altri agenti chemioterapici.

Per l'associazione con trastuzumab sono stati riportati gli eventi avversi (tutti i gradi) in percentuale  $\geq 10\%$ . Vi è stato un aumento dell'incidenza di eventi avversi seri (40% vs 31%) e di eventi avversi di grado 4 (34% vs 23%) nel gruppo trattato in associazione con trastuzumab rispetto alla monoterapia con docetaxel.

Per la associazione con capecitabina, vengono riportati gli effetti indesiderati correlati al trattamento più frequenti ( $\geq 5\%$ ) osservati in uno studio clinico di fase III in pazienti con cancro della mammella dopo fallimento di una terapia con antracicline (vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto di capecitabina).

Per l'associazione con ADT e prednisone o prednisolone (studio STAMPEDE) vengono riportati gli eventi avversi verificatisi durante i 6 cicli di trattamento con docetaxel e con una incidenza superiore di almeno il 2% nel braccio di trattamento con docetaxel rispetto al braccio di controllo, utilizzando la scala di classificazione CTCAE.

Con docetaxel sono state osservate frequentemente le seguenti reazioni avverse:

#### Disturbi del sistema immunitario

Reazioni di ipersensibilità si sono verificate prevalentemente di solito entro pochi minuti dall'inizio dell'infusione di docetaxel e sono state generalmente di grado da lieve a moderato. I sintomi riportati più frequentemente sono stati vampate di calore, rash con o senza prurito, oppressione toracica, dolore alla schiena, dispnea e febbre o brividi. Le reazioni gravi sono state caratterizzate da ipotensione e/o broncospasmo o rash/eritema generalizzato (vedere paragrafo 4.4).

#### Patologie del sistema nervoso

Lo sviluppo di neurotossicità periferica grave richiede la riduzione della dose (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Segni neurosensoriali di grado da lieve a moderato sono caratterizzati da parestesia, disestesia o dolore incluso bruciore. Eventi neuromotori sono caratterizzati principalmente da debolezza.

#### Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo

Sono state osservate reazioni cutanee reversibili considerate in genere di grado da lieve a moderato. Le reazioni sono state caratterizzate da rash, incluse le eruzioni localizzate principalmente ai piedi ed alle mani (compresa la sindrome mano-piede grave), ma anche alle braccia, al viso o al torace, frequentemente associate a prurito. Le eruzioni si sono manifestate generalmente entro una settimana

dall'infusione di docetaxel.

Meno frequentemente sono stati riportati sintomi gravi come eruzioni seguite da desquamazione che raramente hanno richiesto la sospensione temporanea o definitiva del trattamento (vedere paragrafi 4.2 e 4.4). Sono state riportate gravi alterazioni a carico dell'unghia caratterizzate da ipopigmentazione o iperpigmentazione, talvolta dolore e onicolisi.

#### Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione

Le reazioni nel sito di infusione sono state generalmente lievi e caratterizzate da iperpigmentazione, infiammazione, arrossamento e secchezza della pelle, flebite o stravaso, «aumento della permeabilità» della vena.

Ritenzione di liquidi che comprende casi di edema periferico e meno frequentemente casi di versamento pleurico, pericardico, ascite e aumento di peso. L'edema periferico di solito si manifesta iniziando alle estremità inferiori e può divenire generalizzato con un aumento di peso di 3 o più kg. La ritenzione idrica è cumulativa per incidenza e intensità (vedere paragrafo 4.4).

#### Tabella riassuntiva delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezioni (G3/4: 5,7% comprese sepsi e polmonite letali nell'1,7%)  | Infezioni associate a neutropenia G4 (G3/4: 4,6%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G4: 76,4%);<br>Anemia (G3/4: 8,9%);<br>Neutropenia febbrile  | Trombocitopenia (G4: 0,2%)   |  |
| Disturbi del sistema immunitario                            | Ipersensibilità (G3/4: 5,3%)  |  |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia   |  |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3: 4,1%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 4%);<br>Disgeusia (grave 0,07%) |  |  |
| Patologie cardiache   |   | Aritmia (G3/4: 0,7%)   | Insufficienza cardiaca                 |
| Patologie vascolari   |   | Ipotensione;<br>Ipertensione;<br>Emorragie   |  |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           | Dispnea (grave: 2,7%)   |  |  |
| Patologie gastrointestinali                                 | Stomatite (G3/4: 5,3%);<br>Diarrea (G3/4: 4%);<br>Nausea (G3/4: 4%);<br>Vomito (G3/4: 3%)                           | Stipsi (grave: 0,2%);<br>Dolore addominale (grave: 1%);<br>Emorragia gastrointestinale (grave: 0,3%) | Esofagite (grave: 0,4%)                |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo             | Alopecia;<br>Reazioni cutanee (G3/4: 5,9%);<br>Alterazioni ungueali (gravi: 2,6%)                                   |  |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>                                  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|--|--|
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (grave: 1,4%)   | Artralgia  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Ritenzione di liquidi (grave: 6,5%);<br>Astenia (grave: 11,2%);<br>Dolore | Reazioni in sede di infusione;<br>Dolore toracico non cardiaco (grave 0,4%)  |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (< 5%);<br>Aumento della fosfatasi alcalina ematica G3/4 (< 4%);<br>Aumento di AST G3/4 (< 3%);<br>Aumento di ALT G3/4 (< 2%) |  |

Descrizione di reazioni avverse selezionate nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia

*Patologie del sistema emolinfopoietico*

Raro: episodi di sanguinamento associati a trombocitopenia di grado 3/4

*Patologie del sistema nervoso*

Dati di reversibilità sono disponibili nel 35,3% dei pazienti che hanno sviluppato neurotossicità dopo trattamento con docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia. Gli eventi sono stati reversibili in maniera spontanea entro i 3 mesi.

*Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Molto raro: un caso di alopecia non reversibile alla fine dello studio. Il 73% delle reazioni cutanee sono state reversibili entro 21 giorni.

*Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione*

La dose cumulativa media alla sospensione del trattamento è stata di più di 1.000 mg/m<sup>2</sup> e il tempo mediano di reversibilità della ritenzione idrica è stato di 16,4 settimane (range da 0 a 42 settimane). La comparsa di ritenzione di grado da moderato a grave (dose cumulativa media: 818,9 mg/m<sup>2</sup>) è ritardata nei pazienti che hanno ricevuto la premedicazione rispetto ai pazienti senza premedicazione (dose media cumulativa: 489,7 mg/m<sup>2</sup>); tuttavia, in alcuni pazienti, è stata riportata durante i primi cicli di terapia.

Tabelladelle reazioni avverse nel cancro del polmone non a piccole cellule per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in monoterapia

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>         |
|---|---|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezioni (G3/4: 5%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G4: 54,2%);<br>Anemia (G3/4: 10,8%);<br>Trombocitopenia (G4: 1,7%) | Neutropenia febbrile                       |
| Disturbi del sistema immunitario                            |   | Ipersensibilità (non grave)                |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia   |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 0,8%)                                    | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 2,5%) |
| Patologie cardiache   |   | Aritmia (non grave)                        |
| Patologie vascolari   |   | Ipotensione                                |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>        |
|--|---|---|
| Patologie gastrointestinali  | Nausea (G3/4: 3,3%);<br>Stomatite (G3/4: 1,7%);<br>Vomito (G3/4: 0,8%);<br>Diarrea (G3/4: 1,7%) | Stipsi                                    |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia;<br>Reazioni cutanee (G3/4: 0,8%)  | Alterazioni ungueali (grave 0,8%)         |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Mialgia                                   |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (grave: 12,4%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 0,8%);<br>Dolore                       |   |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (<2%); |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con doxorubicina

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>       | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>             | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni   | Infezioni (G3/4: 7.8%)  |  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                            | Neutropenia (G4: 91,7%);<br>Anemia (G3/4: 9,4%);<br>Neutropenia febbrile;<br>Trombocitopenia (G4: 0,8%) |  |  |
| Disturbi del sistema immunitario                                  |   | Ipersensibilità (G3/4: 1,2%)                   |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                       |   | Anoressia                                      |  |
| Patologie del sistema nervoso                                     | Neuropatia sensitiva periferica (G3: 0,4%)  | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0,4%)     |  |
| Patologie cardiache   |   | Insufficienza cardiaca;<br>Aritmia (non grave) |  |
| Patologie vascolari   |   |  | Ipotensione                            |
| Patologie gastrointestinali                                       | Nausea (G3/4: 5%);<br>Stomatite (G3/4: 7,8%);<br>Diarrea (G3/4: 6,2%);<br>Vomito (G3/4: 5%);<br>Stipsi  |  |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                   | Alopecia;<br>Alterazioni ungueali (grave 0,4%);<br>Reazioni cutanee (non grave)                         |  |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo |   | Mialgia  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di           | Astenia (grave: 8,1%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 1,2%);  | Reazioni in sede di infusione                  |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b> | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati non comuni</b>                  |
|---|--|---|---|
| somministrazione  | Dolore                                   |   |   |
| Esami diagnostici   |  | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (< 2,5%);<br>Aumento di fosfatasi alcalina ematica G3/4 (< 2,5%) | Aumento di AST G3/4 (<1%);<br>Aumento di ALT G3/4 (<1%) |

Tabelladelle reazioni avverse nel cancro del polmone non a piccole cellule per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                                       | <b>Effetti indesiderati non comuni</b>   |
|--|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni  | Infezioni (G3/4: 5,7%)  |  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                                   | Neutropenia (G4: 51,5%);<br>Anemia (G3/4: 6,9%);<br>Trombocitopenia (G4: 0,5%)                | Neutropenia febbrile   |  |
| Disturbi del sistema immunitario   | Ipersensibilità (G3/4: 2,5%)  |  |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                              | Anoressia   |  |  |
| Patologie del sistema nervoso  | Neuropatia sensitiva periferica (G3: 3,7%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 2%)       |  |  |
| Patologie cardiache  |   | Aritmia (G3/4: 0,7%)   | Insufficienza cardiaca   |
| Patologie vascolari  |   | Ipotensione (G3/4: 0,7%)   |  |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea (G3/4: 9,6%);<br>Vomito (G3/4: 7,6%);<br>Diarrea (G3/4: 6,4%);<br>Stomatite (G3/4: 2%) | Stipsi   |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia;<br>Alterazioni ungueali (grave 0,7%);<br>Reazioni cutanee (G3/4: 0,2%)              |  |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (grave: 0,5%)   |  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (grave: 9,9%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 0,7%);<br>Febbre (G3/4: 1,2%)         | Reazioni in sede di infusione;<br>Dolore                                 |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di bilirubina ematica G3/4 (2,1%);<br>Aumento di ALT G3/4 (1,3%) | Aumento di AST G3/4 (0,5%);<br>Aumento di fosfatasi alcalina ematica G3/4 (0,3%) |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in associazione con trastuzumab

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b> |
|--|--|------------------------------------|
| Patologie del sistema emolinfopoietico                                   | Neutropenia (G4: 32%);<br>Neutropenia febbrile (che include neutropenia associata a febbre e uso di antibiotico) o sepsi neutropenica; |                                    |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                              | Anoressia  |                                    |
| Disturbi psichiatrici  | Insonnia   |                                    |
| Patologie del sistema nervoso  | Parestesia; Cefalea; Disgeusia;<br>Ipoestesia  |                                    |
| Patologie dell'occhio  | Aumento della lacrimazione;<br>Congiuntivite   |                                    |
| Patologie cardiache  |  | Insufficienza cardiaca             |
| Patologie vascolari  | Linfedema  |                                    |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche                        | Epistassi; Dolore faringolaringeo;<br>Rinofaringite;<br>Dispnea; Tosse; Rinorrea   |                                    |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea; Diarrea; Vomito; Stipsi;<br>Stomatite; Dispepsia; Dolore addominale  |                                    |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia; Eritema; Rash;<br>Alterazioni ungueali   |                                    |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia; Artralgia; Dolore alle estremità; Dolore osseo; Dolore alla schiena   |                                    |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia; Edema periferico;<br>Piressia; Fatica; Infiammazione delle mucose; Dolore; Sindrome parainfluenzale; Dolore al petto; Brividi | Letargia                           |
| Esami diagnostici  | Aumento di peso  |                                    |

Descrizione di reazioni avverse selezionate nel cancro della mammella per Docetaxel 100 mg/m<sup>2</sup> in associazione con trastuzumab

Patologie cardiache

Insufficienza cardiaca sintomatica è stata riportata nel 2,2% dei pazienti che hanno ricevuto docetaxel in associazione con trastuzumab, rispetto allo 0% dei pazienti che hanno ricevuto docetaxel in monoterapia. Nel gruppo docetaxel e trastuzumab il 64% dei pazienti aveva ricevuto precedentemente antracicline come terapia adiuvante rispetto al 55% dei pazienti trattati con docetaxel in monoterapia.

Patologie del sistema emolinfopoietico

Molto comune: la tossicità ematologica era aumentata nei pazienti trattati con trastuzumab e docetaxel rispetto a quelli trattati con il solo docetaxel (neutropenia di grado 3/4 32% verso 22%, secondo i criteri NCI-CTC). Si noti che questo è probabilmente una sottovalutazione poiché è risaputo che docetaxel, da solo, ad una dose di 100 mg/m<sup>2</sup> porta a neutropenia nel 97% dei pazienti, di grado 4 nel 76%, basato sul nadir della conta dei neutrofili. L'incidenza della neutropenia febbrile/sepsi neutropenica era anche aumentata nei pazienti trattati con Herceptin e docetaxel (23% verso 17% dei pazienti trattati con solo docetaxel).

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della mammella per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con capecitabina

| <b>Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b> | <b>Effetti indesiderati comuni</b> |
|--|--|------------------------------------|
|--|--|------------------------------------|

| <b>Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA</b>               | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  |
|--|--|---|
| Infezioni ed infestazioni  |  | Candidosi orale (G3/4: < 1%)  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                                   | Neutropenia (G3/4: 63%);<br>Anemia (G3/4: 10%)   | Trombocitopenia (G3/4: 3%)  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                              | Anoressia (G3/4: 1%);<br>Diminuzione dell'appetito   | Disidratazione (G3/4: 2%)   |
| Patologie del sistema nervoso  | Disgeusia (G3/4: <1%);<br>Parestesia (G3/4: <1%)   | Capogiri;<br>Cefalea (G3/4: <1%);<br>Neuropatia periferica  |
| Patologie dell'occhio  | Aumento della lacrimazione   |   |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche                        | Dolore faringolaringeo (G3/4: 2%)  | Dispnea (G3/4: 1%);<br>Tosse (G3/4: <1%);<br>Epistassi (G3/4: <1%)                                |
| Patologie gastrointestinali  | Stomatite (G3/4: 18%);<br>Diarrea (G3/4: 14%);<br>Nausea (G3/4: 6%);<br>Vomito (G3/4: 4%);<br>Stipsi (G3/4: 1%);<br>Dolore addominale (G3/4: 2%);<br>Dispepsia | Dolore all'addome superiore;<br>Secchezza delle fauci   |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Sindrome mano-piede (G3/4: 24%);<br>Alopecia (G3/4: 6%);<br>Alterazioni ungueali (G3/4: 2%)  | Dermatite;<br>Rash eritematoso (G3/4: <1%);<br>Scolorimento delle unghie;<br>Onicolisi (G3/4: 1%) |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (G3/4: 2%);<br>Artralgia (G3/4: 1%)  | Dolore alle estremità corporee (G3/4: <1%);<br>Dolore alla schiena (G3/4: 1%)                     |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (G3/4: 3%);<br>Piressia (G3/4: 1%);<br>Fatica/debolezza (G3/4: 5%);<br>Edema periferico (G3/4: 1%)   | Letargia;<br>Dolore   |
| Esami diagnostici  |  | Diminuzione di peso<br>Aumento di bilirubina ematica<br>G3/4 (9%)                                 |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con prednisone o prednisolone

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>                              | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   |
|---|---|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezione (G3/4: 3,3%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G3/4: 32%);<br>Anemia (G3/4: 4,9%)                       | Trombocitopenia (G3/4: 0,6%);<br>Neutropenia febbrile                      |
| Disturbi del sistema immunitario                            |   | Ipersensibilità (G3/4: 0,6%)   |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia (G3/4: 0,6%)  |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 1,2%);<br>Disgeusia (G3/4: 0%) | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0%)                                   |
| Patologie dell'occhio                                       |   | Aumento della lacrimazione (G3/4: 0,6%)                                    |
| Patologie cardiache   |   | Diminuzione della funzionalità cardiaca ventricolare sinistra (G3/4: 0,3%) |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           |   | Epistassi (G3/4: 0%);<br>Dispnea (G3/4: 0,6%);                             |



| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>              |
|--|---|---|
|  |   | Tosse (G3/4: 0%)                                |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea (G3/4: 2,4%);<br>Diarrea (G3/4: 1,2%);<br>Stomatite/Faringite (G3/4: 0,9%);<br>Vomito (G3/4: 1,2%) |   |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia;<br>Alterazioni ungueali (non grave)   | Rash esfoliativo (G3/4: 0,3%)                   |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Artralgia (G3/4: 0,3%);<br>Mialgia (G3/4: 0,3%) |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Fatica (G3/4: 3,9%);<br>Ritenzione di liquidi (grave: 0,6%)   |   |

Tabella delle reazioni avverse nel cancro della prostata localmente avanzato o metastatico ormono-sensibile ad alto rischio per docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con prednisone o prednisolone e ADT (studio STAMPEDE)

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b> |
|---|---|------------------------------------|
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Neutropenia (G3-4: 12%)<br>Anemia<br>Neutropenia febbrile (G3-4: 15%)                     |                                    |
| Disturbi del sistema immunitario                            |   | Ipersensibilità (G3-4: 1%)         |
| Patologie endocrine   |   | Diabete (G3-4: 1%)                 |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 |   | Anoressia                          |
| Disturbi psichiatrici                                       | Insonnia (G3: 1%)   |                                    |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica ( $\geq$ G3: 2%) <sup>a</sup><br>Cefalea                  | Capogiri                           |
| Patologie dell'occhio                                       |   | Visione annebbiata                 |
| Patologie cardiache   |   | Ipotensione (G3: 0%)               |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche           | Dispnea (G3: 1%)<br>Tosse (G3: 0%)<br>Infezione delle vie respiratorie superiori (G3: 1%) | Faringite (G3: 0%)                 |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  |
|--|---|---|
| Patologie gastrointestinali  | Diarrea (G3: 3%)<br>Stomatite (G3: 0%)<br>Stipsi (G3: 0%)<br>Nausea (G3: 1%)<br>Dispepsia<br>Dolore addominale (G3: 0%)<br>Flatulenza | Vomito (G3: 1%)   |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia (G3: 3%) <sup>a</sup><br>Alterazioni ungueali (G3: 1%)   | Eruzione cutanea  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia   |   |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3-4: 2%)<br>Sintomi simil-influenzali (G3: 0%)<br>Astenia (G3: 0%)<br>Ritenzione di liquidi                                | Febbre (G3: 1%)<br>Candidiasi orale<br>Ipocalcemia (G3: 0%)<br>Ipofosfatemia (G3-4: 1%)<br>Ipokaliemia (G3: 0%) |

<sup>a</sup> Dallo studio GETUG AFU15

Tabella delle reazioni avverse per la terapia adiuvante con Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide nei pazienti con cancro della mammella linfonodo positivo (TAX 316) e linfonodo negativo (GEICAM 9805) – dati cumulativi

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>        | <b>Effetti indesiderati non comuni</b>                                     |
|---|--|---|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezione (G3/4: 2,4%);<br>Infezione neutropenica (G3/4: 2,6%)   |   |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Anemia (G3/4: 3%);<br>Neutropenia (G3/4: 59,2%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 1,6%);<br>Neutropenia febbrile (G3/4: NA) |   |  |
| Disturbi del sistema immunitario                            |  | Ipersensibilità (G3/4: 0,6%)              |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia (G3/4: 1,5%)   |   |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Disgeusia (G3/4: 0,6%);<br>Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: <0,1%)   | Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0%); | Sincope (G3/4: 0%);<br>Neurotossicità (G3/4: 0%);<br>Sonnolenza (G3/4: 0%) |
| Patologie dell'occhio                                       | Congiuntivite (G3/4: <0,1%)  | Aumento della lacrimazione (G3/4: <0,1%); |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                          | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|---|--|
| Patologie cardiache  |   | Aritmia (G3/4: 0,2%)  |  |
| Patologie vascolari  | Vampate (G3/4: 0,5%)  | Ipotensione (G3/4: 0%)<br>Flebite (G3/4: 0%)                | Linfedema (G3/4: 0%)                   |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche                        |   | Tosse (G3/4: 0%)  |  |
| Patologie gastrointestinali  | Nausea (G3/4: 5,0%);<br>Stomatite (G3/4: 6,0%);<br>Vomito (G3/4: 4,2%);<br>Diarrea (G3/4: 3,4%);<br>Stipsi (G3/4: 0,5%) | Dolore addominale (G3/4: 0,4%)                              |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia (persistente: <3%);<br>Alterazioni cutanee (G3/4: 0,6%);<br>Alterazioni ungueali (G3/4: 0,4%)                  |   |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        | Mialgia (G3/4: 0,7%);<br>Artralgia (G3/4: 0,2%)   |   |  |
| Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella                    | Amenorrea (G3/4: NA)  |   |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia (G3/4: 10,0%);<br>Piressia (G3/4: NA)<br>Edema periferico (G3/4: 0,2%)  |   |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento ponderale (G3/4: 0%)<br>Calo ponderale (G3/4: 0,2%) |  |

Descrizione di reazioni avverse selezionate per la terapia adiuvante con Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide nei pazienti con cancro della mammella linfonodo positivo (TAX 316) e linfonodo negativo (GEICAM 9805)

#### *Patologie del sistema nervoso*

Nello studio TAX 316 si è riscontrata neuropatia sensitiva periferica che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up in 84 pazienti (11,3%) nel braccio TAC e in 15 pazienti (2%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni), si è osservato che la neuropatia sensitiva periferica era ancora in corso in 10 pazienti (1,3%) nel braccio TAC, e in 2 pazienti (0,3%) nel braccio FAC.

Nello studio GEICAM 9805 la neuropatia sensitiva periferica che è iniziata durante il periodo di trattamento è perdurata durante il periodo di follow-up in 10 pazienti (1,9%) nel braccio TAC e in 4 pazienti (0,8%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), si è osservato che la neuropatia sensitiva periferica era ancora in corso in 3 pazienti (0,6%) nel braccio TAC, e in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

#### *Patologie cardiache*

Nello studio TAX316, 26 pazienti (3,5%) nel gruppo TAC e 17 pazienti (2,3%) nel gruppo FAC hanno manifestato insufficienza cardiaca congestizia. Tutte le pazienti, tranne una, in ciascun gruppo di trattamento hanno avuto diagnosi di insufficienza cardiaca congestizia (CHF) più di 30 giorni dopo

il periodo di trattamento. Due pazienti nel gruppo TAC e 4 pazienti nel gruppo FAC sono decedute per insufficienza cardiaca.

Nello studio GEICAM 9805, 3 pazienti (0,6%) del braccio TAC e 3 pazienti (0,6%) del braccio FAC hanno sviluppato durante il periodo di follow up una insufficienza cardiaca congestizia. Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), nessun paziente mostrava CHF nel braccio TAC e una paziente nel gruppo TAC era deceduta per cardiomiopatia dilatativa, e si è osservato che CHF era ancora in corso in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

#### *Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Nello studio TAX316 in 687 pazienti delle 744 del gruppo TAC (92,3%) e in 645 pazienti delle 736 del gruppo FAC (87,6%) alla fine della chemioterapia è stata riportata alopecia che perdurava nel periodo di follow-up.

Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano follow up 8 anni) in 29 pazienti del gruppo TAC (3,9%) e in 16 pazienti del gruppo FAC (2,2%) l'alopecia persistente ancora .

Nello studio GEICAM 9805, si è osservato che l'alopecia che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up era ancora presente in 49 pazienti (9,2%) del braccio TAC e in 35 pazienti (6,7%) del braccio FAC. L'alopecia correlata al farmaco dello studio si è manifestata o aggravata durante il periodo di follow-up in 42 pazienti (7,9%) del braccio TAC e in 30 pazienti (5,8%) del braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), si è osservato che l'alopecia era ancora presente in 3 pazienti (0,6%) nel braccio TAC, e in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

#### *Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella*

Nello studio TAX 316 si è osservato che l'amenorrea che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia è stata riportata in 202 delle 744 pazienti TAC (27,2%) e in 125 delle 736 pazienti FAC (17,0%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni) si è osservato che l'amenorrea era ancora presente in 121 delle 744 pazienti TAC (16,3%) e in 86 delle pazienti FAC (11,7%).

Nello studio GEICAM 9805, si è osservato che l'amenorrea che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up era ancora presente in 18 pazienti (3,4%) nel braccio TAC e in 5 pazienti (1,0%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi), si è osservato che l'amenorrea era ancora presente in 7 pazienti (1,3%) nel braccio TAC, e in 4 pazienti (0,8%) nel braccio FAC.

#### *Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione*

Nello studio TAX316, si è osservato edema periferico che è iniziato durante il periodo di trattamento ed è perdurato durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia in 119 delle 744 pazienti del gruppo TAC (16,0%) e in 23 delle 736 pazienti FAC (0,5%).

Nello studio TAX 316 il linfedema che è iniziato durante il periodo di trattamento ed è perdurato durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia è stato riportato in 11 delle 744 pazienti TAC (1,5%) e in 1 delle 736 pazienti FAC (0,1%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 8 anni) si è osservato che il linfedema era ancora in corso in 6 pazienti TAC (0,8%) e in 1 paziente FAC (0,1%).

Nello studio TAX 316 l'astenia che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up dopo la fine della chemioterapia è stata riportata in 236 delle 744 pazienti TAC (31,7%) e in 180 delle 736 pazienti FAC (24,5%). Alla fine del periodo di follow-up (tempo effettivo mediano di follow-up di 8 anni) si è osservato che l'astenia era in corso in 29 pazienti TAC (3,9%) e in 16 pazienti FAC (2,2%).

Nello studio GEICAM 9805, è stato riscontrato che l'edema periferico iniziato durante il periodo di trattamento è perdurato durante il periodo di follow-up in 4 pazienti (0,8%) nel braccio TAC e in 2 pazienti (0,4%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi) nessuna paziente (0%) nel braccio TAC aveva edema periferico e si è osservato che l'edema periferico era in corso in 1 paziente (0,2%) nel braccio FAC.

Il linfedema che è iniziato durante il periodo di trattamento è perdurato durante il periodo di follow-up in 5 pazienti (0,9%) nel braccio TAC e in 2 pazienti (0,4%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up, si è osservato che il linfedema era in corso in 4 pazienti (0,8%) nel braccio TAC e in 1

paziente (0,2%) nel braccio FAC.

L'astenia che è iniziata durante il periodo di trattamento ed è perdurata durante il periodo di follow-up era ancora presente in 12 pazienti (2,3%) nel braccio TAC e in 4 pazienti (0,8%) nel braccio FAC. Alla fine del periodo di follow-up, si è osservato che l'astenia era ancora presente in 2 pazienti (0,4%) nel braccio TAC e in 2 pazienti (0,4%) nel braccio FAC.

#### *Leucemia acuta / Sindrome mielodisplastica.*

Dopo 10 anni di follow-up nello studio TAX316, è stata riportata leucemia acuta in 3 delle 744 pazienti nel gruppo TAC (0,4%) e in 1 delle 736 pazienti nel gruppo FAC (0,1%). Una paziente TAC (0,1%) e 1 paziente FAC (0,1%) sono decedute per LMA (leucemia mieloide acuta) durante il periodo di follow-up (tempo mediano di follow-up di 8 anni). La sindrome mielodisplastica è stata riportata in 2 delle 744 pazienti (0,3%) del gruppo TAC e in 1 delle 736 (0,1%) pazienti nel gruppo FAC.

Dopo 10 anni di follow-up nello studio GEICAM 9805, si è verificata leucemia acuta in 1 dei 532 (0,2%) pazienti del braccio TAC. Nessun caso è stato riportato nei pazienti del braccio FAC. In nessuno dei gruppi di trattamento sono stati diagnosticati casi di sindrome mielodisplastica.

#### *Complicanze neutropeniche*

La tabella sottostante mostra che l'incidenza di neutropenia, neutropenia febbrile e infezione neutropenica di Grado 4 sono risultate ridotte nei pazienti che hanno ricevuto profilassi primaria con G-CSF dopo che questa è diventata obbligatoria nel braccio di trattamento TAC – studio GEICAM.

#### Complicanze neutropeniche nei pazienti che hanno ricevuto TAC con o senza profilassi primaria con G-CSF (GEICAM 9805)

|                                    | <b>Senza profilassi primaria con G-CSF<br/>(n = 111)<br/>n (%)</b> | <b>Con profilassi primaria con G-CSF<br/>(n = 421)<br/>n (%)</b> |
|------------------------------------|--|--|
| Neutropenia (Grado 4)              | 104 (93,7)   | 135 (32,1)   |
| Neutropenia febbrile               | 28 (25,2)  | 23 (5,5)   |
| Infezione neutropenica             | 14 (12,6)  | 21 (5,0)   |
| Infezione neutropenica (Grade 3-4) | 2 (1,8)  | 5 (1,2)  |

#### Tabella delle reazioni avverse nell'adenocarcinoma dello stomaco per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b> | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                                   |
|---|--|--|
| Infezioni ed infestazioni                                   | Infezioni neutropeniche;<br>Infezioni (G3/4: 11,7%)  |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                      | Anemia (G3/4: 20,9%);<br>Neutropenia (G3/4: 83,2%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 8,8%);<br>Neutropenia febbrile |  |
| Disturbi del sistema immunitario                            | Ipersensibilità (G3/4: 1,7%)   |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                 | Anoressia (G3/4: 11,7%)  |  |
| Patologie del sistema nervoso                               | Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 8,7%)   | Capogiri (G3/4: 2,3%);<br>Neuropatia periferica motoria (G3/4: 1,3%) |
| Patologie dell'occhio                                       |  | Aumento della lacrimazione (G3/4: 0%)                                |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto                     |  | Alterazione dell'udito (G3/4: 0%)                                    |
| Patologie cardiache   |  | Aritmia (G3/4: 1,0%)   |
| Patologie gastrointestinali                                 | Diarrea (G3/4: 19,7%);   | Stipsi (G3/4: 1,0%);   |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  |
|--|---|---|
|  | Nausea (G3/4: 16%);<br>Stomatite (G3/4: 23,7%);<br>Vomito (G3/4: 14,3%)                               | Dolore gastrointestinale (G3/4: 1,0%);<br>Esofagiti/disfagia/odinofagia (G3/4: 0,7%)                |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo                          | Alopecia (G3/4: 4,0%)   | Rash prurito (G3/4: 0,7%);<br>Alterazioni ungueali (G3/4: 0,7%);<br>Esfoliazione cutanea (G3/4: 0%) |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3/4: 19,0%);<br>Febbre (G3/4: 2,3%);<br>Ritenzione di liquidi (grave/pericolo di vita: 1%) |   |

Descrizione di reazioni avverse selezionate nell'adenocarcinoma dello stomaco per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

*Patologie del sistema emolinfopoietico*

La neutropenia febbrile e l'infezione neutropenica si sono verificate rispettivamente nel 17,2% e nel 13,5% dei pazienti, a prescindere dall'uso del G-CSF. G-CSF è stato usato per la profilassi secondaria nel 19,3% dei pazienti (10,7% dei cicli). La neutropenia febbrile e l'infezione neutropenica si sono verificate rispettivamente nel 12,1% e nel 3,4% dei pazienti che hanno ricevuto G-CSF come profilassi, nel 15,6% e nel 12,9% dei pazienti senza la profilassi con G-CSF (vedere paragrafo 4.2).

Tabella delle reazioni avverse nel cancro del collo e della testa per Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile

- Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia (TAX 323)

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>         | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>          | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|--|---|--|
| Infezioni ed infestazioni   | Infezioni (G3/4: 6,3%);<br>Neutropenia   |   |  |
| Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) |  | Dolore dovuto al tumore (G3/4: 0,6%)        |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                              | Neutropenia (G3/4: 76,3%);<br>Anemia (G3/4: 9,2%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 5,2%) | Neutropenia febbrile                        |  |
| Disturbi del sistema immunitario                                    |  | Ipersensibilità (non grave)                 |  |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                         | Anoressia (G3/4: 0,6%)   |   |  |
| Patologie del sistema nervoso                                       | Disgeusia/Parosmia<br>Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 0,6%);                | Capogiri                                    |  |
| Patologie dell'occhio   |  | Aumento della lacrimazione<br>Congiuntiviti |  |
| Patologie   |  | Alterazione dell'udito                      |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|--|--|
| dell'orecchio e del labirinto  |   |  |  |
| Patologie cardiache  |   | Ischemia del miocardio (G3/4: 1,7%)  | Aritmia (G3/4: 0,6%)                   |
| Patologie vascolari  |   | Alterazioni alle vene (G3/4: 0,6%)   |  |
| Patologie gastrointestinali.   | Nausea (G3/4: 0,6%);<br>Stomatiti (G3/4: 4,0%);<br>Diarrea (G3/4: 2,9%);<br>Vomito (G3/4: 0,6%) | Stipsi;<br>Esofagiti/disfagia/odinofagia (G3/4: 0,6%);<br>Dolore addominale;<br>Dispepsia;<br>Emorragia gastrointestinale (G3/4: 0,6%) |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo.                         | Alopecia (G3/4: 10,9%)  | Rash pruriginoso;<br>Pelle secca;<br>Esfoliazione della pelle (G3/4: 0,6%)   |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Mialgia (G3/4:0,6%)  |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3/4: 3,4%);<br>Piressia (G3/4: 0,6%);<br>Ritenzione di liquidi;<br>Edema             |  |  |
| Esami diagnostici  |   | Aumento di peso  |  |

- Chemioterapia di induzione seguita da chemioradioterapia (TAX 324).

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>         | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>   | <b>Effetti indesiderati comuni</b>                                   | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|---|--|--|--|
| Infezioni ed infestazioni   | Infezioni (G3/4: 3,6%)   | Infezione neutropenica   |  |
| Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) |  | Dolore dovuto al tumore (G3/4: 1,2%)                                 |  |
| Patologie del sistema emolinfopoietico                              | Neutropenia (G3/4: 83,5%);<br>Anemia (G3/4: 12,4%);<br>Trombocitopenia (G3/4: 4,0%);<br>Neutropenia febbrile |  |  |
| Disturbi del sistema immunitario                                    |  |  | Ipersensibilità                        |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione                         | Anoressia (G3/4: 12,0%)  |  |  |
| Patologie del sistema nervoso                                       | Disgeusia/Parosmia (G3/4: 0,4%);<br>Neuropatia sensitiva periferica (G3/4: 1,2%).                            | Capogiri (G3/4: 2,0%);<br>Neuropatia motoria periferica (G3/4: 0,4%) |  |
| Patologie dell'occhio   |  | Aumento della lacrimazione   | Congiuntiviti                          |
| Patologie dell'orecchio e del                                       | Alterazione dell'udito (G3/4: 1,2%)  |  |  |

| <b>Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA</b>              | <b>Effetti indesiderati molto comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati comuni</b>  | <b>Effetti indesiderati non comuni</b> |
|--|---|---|--|
| labirinto  |   |   |  |
| Patologie cardiache  |   | Aritmia (G3/4: 2,0%)  | Ischemia del miocardio                 |
| Patologie vascolari  |   |   | Alterazioni alle vene                  |
| Patologie gastrointestinali.   | Nausea (G3/4: 13,9%);<br>Stomatiti (G3/4: 20,7%);<br>Vomito (G3/4: 8,4%);<br>Diarrea (G3/4: 6,8%);<br>Esofagiti/disfagia/odinofagia (G3/4: 12,0%);<br>Stipsi (G3/4: 0,4%) | Dispepsia (G3/4: 0,8%);<br>Dolore gastrointestinale (G3/4: 1,2%);<br>Emorragia gastrointestinale (G3/4: 0,4%) |  |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo.                         | Alopecia (G3/4: 4,0%);<br>Rash eritematoso  | Pelle secca;<br>Esfoliazione della pelle  |  |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo        |   | Mialgia (G3/4:0,4%)   |  |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Letargia (G3/4: 4,0%);<br>Piressia (G3/4: 3,6%);<br>Ritenzione di liquidi (G3/4: 1,2%);<br>Edema (G3/4: 1,2%)   |   |  |
| Esami diagnostici  | Diminuzione di peso   |   | Aumento di peso                        |

#### Esperienza post-marketing:

##### *Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi)*

Seconde malignità primitive (frequenza non nota), incluso il linfoma non-Hodgkin, sono state osservate con docetaxel, quando usato in combinazione con altri trattamenti antitumorali noti per essere associati con seconde malignità primitive. In studi clinici registrativi nel cancro della mammella con il regime TAC, sono stati osservati casi di leucemia mieloide acuta e sindrome mielodisplastica (frequenza non nota).

##### *Patologie del sistema emolinfopoietico*

Sono state riportate soppressione midollare e altre reazioni avverse di tipo ematologico. È stata segnalata coagulazione intravascolare disseminata spesso in associazione con sepsi o insufficienza multiorgano.

##### *Disturbi del sistema immunitario*

Sono stati segnalati alcuni casi di shock anafilattico, alcuni fatali.

Sono state riscontrate reazioni di ipersensibilità (frequenza non nota) con docetaxel in pazienti che avevano avuto precedenti reazioni di ipersensibilità a paclitaxel.

##### *Patologie del sistema nervoso*

Dopo somministrazione di docetaxel sono stati osservati rari casi di convulsioni o perdita temporanea di coscienza. Tali reazioni talvolta compaiono durante l'infusione.

##### *Patologie dell'occhio*

Si sono manifestati solitamente durante l'infusione del medicinale casi molto rari di alterazioni visive transitorie (bagliori, lampi di luce, scotomi) e in associazione con reazioni di ipersensibilità. Queste sono risultate reversibili dopo interruzione dell'infusione. Raramente sono stati riportati casi di lacrimazione con o senza congiuntivite, come casi di ostruzione del dotto lacrimale come conseguenza di una eccessiva lacrimazione. In pazienti trattati con docetaxel sono stati riportati casi di edema maculare cistoide (EMC).



#### *Patologie dell'orecchio e del labirinto*

Sono stati segnalati casi rari di ototossicità, deficit dell'udito e/o perdita dell'udito.

#### *Patologie cardiache*

Sono stati riportati casi rari di infarto del miocardio.

In pazienti trattati con docetaxel in regimi di combinazione che includevano doxorubicina, 5-fluorouracile e/o ciclofosfamide è stata riportata aritmia ventricolare inclusa tachicardia ventricolare (frequenza non nota), a volte fatale.

#### *Patologie vascolari*

Sono stati segnalati raramente eventi tromboembolici venosi.

#### *Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche*

Raramente sono stati riportati sindrome da distress respiratorio acuto e casi di polmonite interstiziale/polmonite, malattia polmonare interstiziale, fibrosi polmonare e insufficienza respiratoria talvolta fatali. Sono stati riportati rari casi di polmoniti causate da radiazioni in pazienti sottoposti anche a radioterapia.

#### *Patologie gastrointestinali*

Sono stati riportati rari casi di enterocolite, inclusa colite, colite ischemica, ed enterocolite neutropenica, con esito potenzialmente fatale (frequenza non nota).

Sono stati riportati rari episodi di disidratazione come conseguenza di disturbi gastrointestinali inclusa l'enterocolite e la perforazione gastrointestinale. Sono stati riportati casi rari di occlusione ileale ed intestinale.

#### *Patologie epatobiliari*

Sono stati riportati casi molto rari di epatite, talvolta fatali prevalentemente nei pazienti con patologie epatiche pre-esistenti.

#### *Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo*

Con docetaxel sono stati riportati casi di *lupus eritematosus* cutaneo, eruzioni bollose quali eritema multiforme e gravi reazioni avverse cutanee quali sindrome di Stevens-Johnson (SJS), Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) e Pustolosi Esantematosa Generalizzata Acuta (AGEP). Durante il trattamento con docetaxel, sono state segnalate manifestazioni simili alla sclerodermia di solito precedute da linfo-edema periferico. Sono stati riportati casi di alopecia permanente (frequenza non nota).

#### *Patologie renali e urinarie*

Sono stati riportati casi di insufficienza renale e scompenso renale. In circa il 20% di tali casi non erano presenti fattori di rischio per insufficienza renale acuta quali prodotti medicinali nefrotossici e disturbi gastrointestinali.

#### *Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione*

Raramente sono stati riportati fenomeni di «recall» da radiazione.

Reazioni di «recall» in sede di iniezione (recidiva di reazione cutanea nel sito di un precedente stravasamento dopo la somministrazione di docetaxel in un sito differente) sono state osservate nel sito di uno stravasamento precedente (frequenza non nota).

La ritenzione di liquidi non era associata a episodi acuti di oliguria o ipotensione. Raramente sono stati riportati disidratazione ed edema polmonare.

#### *Disturbi del metabolismo e della nutrizione*

Sono stati riportati casi di squilibrio elettrolitico e casi di iponatriemia per lo più associati a disidratazione, vomito e polmonite. Sono state osservate ipokaliemia, ipomagnesemia e ipocalcemia, solitamente in associazione con disturbi gastrointestinali e in particolare con diarrea. È stata segnalata sindrome da lisi tumorale, a volte fatale (frequenza non nota).

#### *Patologie del sistema muscoloscheletrico*

Con docetaxel è stata segnalata miosite (frequenza non nota).

#### Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione **riportato nell'Allegato V**.

#### **4.9 Sovradosaggio**

Sono stati riportati alcuni casi di sovradosaggio. Non esiste antidoto noto per il sovradosaggio da docetaxel. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere tenuto in un'unità specializzata e le funzioni vitali strettamente monitorate. In caso di sovradosaggio, ci si può aspettare un'esacerbazione degli eventi avversi. Le complicazioni principali che si aspettano in caso di sovradosaggio consistono in soppressione del midollo osseo, neurotossicità periferica e mucosite. I pazienti devono ricevere G-CSF terapeutico al più presto dopo evidenza di sovradosaggio. Devono essere intraprese altre misure sintomatiche appropriate, secondo necessità.

### **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

#### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Categoria farmacoterapeutica: Taxani, Codice ATC: L01CD 02

#### Meccanismo d'azione

Il docetaxel è un farmaco antineoplastico che agisce favorendo l'aggregazione di tubulina in microtubuli stabili e inibisce la loro disaggregazione, portando così ad una notevole diminuzione di tubulina libera. Il legame di docetaxel ai microtubuli non altera il numero dei protofilamenti.

Il docetaxel *in vitro* spezza il sistema microtubulare cellulare che è essenziale per funzioni vitali della cellula quali la mitosi e l'interfase.

#### Effetti farmacodinamici

Il docetaxel *in vitro* è citotossico nei confronti di varie linee tumorali murine ed umane e di tumori umani asportati recentemente nelle prove clonogeniche effettuate. Docetaxel raggiunge concentrazioni intra-cellulari elevate e durature. Inoltre docetaxel è attivo su alcune delle linee cellulari (ma non tutte) che esprimono un eccesso di glicoproteina-p, codificata dal gene di multiresistenza ai farmaci. *In vivo*, docetaxel ha sperimentalmente un ampio spettro di azione nei confronti di tumori murini in stadio avanzato, e tumori umani innestati, indipendentemente dallo schema posologico.

#### Efficacia clinica e sicurezza

##### Cancro della mammella

*Docetaxel in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide: trattamento adiuvante.*

##### Pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo positivo (TAX 316)

I dati di uno studio multicentrico randomizzato, in aperto supportano l'impiego di docetaxel come trattamento adiuvante di pazienti con cancro della mammella linfonodo positivo operabile e KPS  $\geq$  80% in età compresa tra 18 e 70 anni. In seguito alla stratificazione in base al numero di linfonodi positivi (1-3, più di 4), 1.491 pazienti sono state randomizzate a ricevere docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> somministrato 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (gruppo TAC) o doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> seguita da fluorouracile 500 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (gruppo FAC). Entrambi i regimi sono stati somministrati una volta ogni 3 settimane per 6 cicli. Docetaxel

veniva somministrato mediante infusione di 1 ora, tutti gli altri medicinali venivano somministrati in bolo endovenoso al giorno 1. G-CSF veniva somministrato come profilassi secondaria alle pazienti che presentavano neutropenia complicata (neutropenia febbrile, neutropenia prolungata o infezione). Le pazienti del gruppo TAC ricevevano una profilassi antibiotica con ciprofloxacina 500 mg per os o antibiotici equivalenti due volte al giorno per 10 giorni partendo dal giorno 5 di ciascun ciclo. In entrambi i gruppi, dopo l'ultimo ciclo di chemioterapia, le pazienti positive per i recettori estrogenici e/o progestinici ricevevano tamoxifene 20 mg/die per 5 anni. Terapia radiante adiuvante veniva prescritta in accordo alle linee guida valide in ciascun centro partecipante ed è stata somministrata al 69% delle pazienti che hanno ricevuto TAC ed al 72% delle pazienti che hanno ricevuto FAC.

Sono state condotte due analisi ad interim ed una analisi finale. La prima analisi ad interim è stata pianificata 3 anni dopo l'arruolamento della metà delle pazienti. La seconda analisi ad interim è stata effettuata dopo aver registrato in totale 400 eventi DFS, ad un follow-up mediano di 55 mesi. L'analisi finale è stata condotta quando tutte le pazienti hanno raggiunto la visita di follow-up al decimo anno (tranne in caso di evento DFS o perse prima al follow-up). La sopravvivenza libera da malattia (DFS) era l'obiettivo primario di efficacia mentre la sopravvivenza globale (OS) era l'obiettivo secondario di efficacia.

L'analisi finale è stata condotta con un follow-up mediano effettivo di 96 mesi. È stata dimostrata una sopravvivenza libera da malattia significativamente aumentata nel gruppo TAC rispetto al gruppo FAC. L'incidenza di recidiva a 10 anni è risultata ridotta nelle pazienti che avevano ricevuto TAC rispetto a quelle che avevano ricevuto FAC (39% vs 45% rispettivamente) ovvero una riduzione del rischio assoluto del 6% (p=0,0043). La sopravvivenza globale a 10 anni è risultata anch'essa significativamente aumentata con TAC rispetto a FAC (76% vs 69% rispettivamente) ovvero una riduzione del rischio di morte assoluto del 7% (p=0,002). Dato che il beneficio osservato nelle pazienti con 4 o più linfonodi non è stato statisticamente significativo per DFS e OS, il positivo rapporto beneficio/ rischio per il trattamento con TAC nelle pazienti con 4 o più linfonodi non è stato pienamente dimostrato nell'analisi finale.

Globalmente, i risultati dello studio dimostrano un rapporto beneficio/rischio positivo per TAC rispetto a FAC.

I sottogruppi di pazienti trattati con TAC in accordo con i principali fattori prognostici definiti a priori sono stati analizzati:

| Sottogruppi di pazienti         | Numero di pazienti | Sopravvivenza libera da malattia |           |        | Sopravvivenza globale |           |        |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------|--------|
|                                 |                    | Rapporto di rischio*             | 95% CI    | p=     | Rapporto di rischio*  | 95% CI    | p=     |
| <b>N. di linfonodi positivi</b> |                    |                                  |           |        |                       |           |        |
| Globali                         | 745                | 0,80                             | 0,68-0,93 | 0,0043 | 0,74                  | 0,61-0,90 | 0,0020 |
| 1-3                             | 467                | 0,72                             | 0,58-0,91 | 0,0047 | 0,62                  | 0,46-0,82 | 0,0008 |
| Più di 4                        | 278                | 0,87                             | 0,70-1,09 | 0,2290 | 0,87                  | 0,67-1,12 | 0,2746 |

\*un rapporto di rischio inferiore ad 1 indica che TAC è associato ad una sopravvivenza libera da malattia e ad una sopravvivenza globale superiori rispetto a FAC

#### Pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo candidati alla chemioterapia (GEICAM 9805)

I dati di uno studio multicentrico, aperto, randomizzato supportano l'utilizzo di Docetaxel per la terapia adiuvante in pazienti con cancro della mammella operabile linfonodo negativo candidati alla chemioterapia.

Sono stati randomizzati 1.060 pazienti a ricevere Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> somministrato 1 ora dopo doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (539 pazienti nel braccio TAC), oppure doxorubicina 50 mg/m<sup>2</sup> seguita da fluorouracile 500 mg/m<sup>2</sup> e ciclofosfamide 500 mg/m<sup>2</sup> (521 pazienti nel braccio FAC) come terapia adiuvante nel cancro della mammella operabile linfonodo negativo ad elevato rischio di ricaduta secondo i criteri 1998 St. Gallen (dimensione tumorale >2 cm e/o ER e PR negativo e/o elevato grado istologico/nucleare (grado 2 a 3) e/o età <35 anni). Entrambi i trattamenti

sono stati somministrati una volta ogni 3 settimane per 6 cicli. Docetaxel è stato somministrato come infusione di 1 ora, tutti gli altri medicinali sono stati somministrati per via e.v. al giorno 1 ogni tre settimane. Una profilassi primaria con G-CSF è stata resa obbligatoria nel braccio TAC dopo la randomizzazione di 230 pazienti. L'incidenza di neutropenia, neutropenia febbrile ed infezione neutropenica di Grado 4 è risultata ridotta nei pazienti che hanno ricevuto una profilassi primaria con G-CSF (vedere paragrafo 4.8). In entrambi i gruppi di trattamento, dopo l'ultimo ciclo di chemioterapia, i pazienti con tumori ER+ e/o PgR+ hanno ricevuto tamoxifene 20 mg una volta al giorno per un periodo fino a 5 anni. La terapia radiante adiuvante è stata somministrata come previsto dalle linee guida in vigore nei centri partecipanti ed è stata somministrata al 57,3% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento TAC e al 51,2% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento FAC.

Sono state effettuate un'analisi principale e un aggiornamento dell'analisi. L'analisi principale è stata effettuata quando tutti i pazienti avevano un periodo di follow-up maggiore di 5 anni (periodo di follow-up mediano di 77 mesi). L'aggiornamento dell'analisi è stata effettuata quando tutti i pazienti hanno raggiunto la visita di follow-up dei 10 anni (tempo mediano di follow-up di 10 anni e 5 mesi) (a meno che non abbiano avuto un evento DFS o siano stati persi dal follow-up precedentemente). L'endpoint primario di efficacia era la sopravvivenza libera da malattia (DSF) e l'endpoint secondario di efficacia era la sopravvivenza complessiva (OS).

Al tempo mediano di follow-up di 77 mesi, è stato dimostrato un aumento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da malattia per il braccio TAC rispetto al braccio FAC. I pazienti trattati con TAC hanno avuto una riduzione del 32% nel rischio di ricaduta rispetto a quelli trattati con FAC (rapporto di rischio = 0,68, 95% CI (0,49-0,93), p = 0,01).

Al tempo mediano di 10 anni e 5 mesi di follow-up, i pazienti trattati con TAC hanno una riduzione del rischio di ricadute del 16,5% rispetto a quelli trattati con FAC (rapporto di rischio = 0,84, 95% CI (0,65-1,08), p=0,1646). I dati DFS non erano statisticamente significativi ma erano ancora associati ad un trend positivo in favore del braccio TAC.

Al tempo mediano di 77 mesi di follow-up, la sopravvivenza globale (OS) è risultata più lunga nel braccio TAC con una riduzione del 24% del rischio di morte per i pazienti trattati con TAC rispetto a FAC (rapporto di rischio = 0,76, 95% CI (0,46-1,26, p = 0,29). Tuttavia, la distribuzione della sopravvivenza globale non si è rivelata significativamente diversa tra i due gruppi.

Al tempo mediano di 10 anni e 5 mesi di follow-up, i pazienti trattati con TAC hanno avuto una riduzione del rischio di morte del 9% rispetto ai pazienti trattati con FAC (rapporto di rischio = 0,91, 95% CI (0,63-1,32)). Il tasso di sopravvivenza era di 93,7% nel braccio TAC e di 91,4% nel braccio FAC, al timepoint dell'ottavo anno di follow-up e di 91,3% nel braccio TAC e di 89% nel braccio FAC al timepoint del decimo anno di follow-up.

Il rapporto beneficio/rischio positivo per TAC comparato con FAC rimane invariato.

Sono stati analizzati sottogruppi di pazienti trattati con TAC suddivisi secondo fattori prognostici maggiori definiti in modo prospettico nell'analisi principale (al tempo mediano di follow-up di 77 mesi) (vedere tabella sottostante):

Analisi di sottogruppi - Studio della terapia adiuvante nei pazienti con cancro della mammella linfonodo negativo (Analisi Intent-to-Treat):

| Sottogruppo di pazienti             | Numero di pazienti nel gruppo TAC | Sopravvivenza libera da malattia |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                     |                                   | Rapporto di rischio*             | 95% CI    |
| <b>Globale</b>                      | 539                               | 0,68                             | 0,49-0,93 |
| <b>Età categoria 1</b>              |                                   |                                  |           |
| <50 anni                            | 260                               | 0,67                             | 0,43-1,05 |
| ≥50 anni                            | 279                               | 0,67                             | 0,43-1,05 |
| <b>Età categoria 2</b>              |                                   |                                  |           |
| <35 anni                            | 42                                | 0,31                             | 0,11-0,89 |
| ≥35 anni                            | 497                               | 0,73                             | 0,52-1,01 |
| <b>Stato dei recettori ormonali</b> |                                   |                                  |           |

|  |     |      |           |
|--|-----|------|-----------|
| Negativo                                 | 195 | 0,7  | 0,45-1,1  |
| Positivo                                 | 344 | 0,62 | 0,4-0,97  |
| <b>Dimensioni tumorali</b>               |     |      |           |
| ≤2 cm                                    | 285 | 0,69 | 0,43-1,1  |
| >2 cm                                    | 254 | 0,68 | 0,45-1,04 |
| <b>Grado istologico</b>                  |     |      |           |
| Grado 1 (compreso il grado non valutato) | 64  | 0,79 | 0,24-2,6  |
| Grado 2                                  | 216 | 0,77 | 0,46-1,3  |
| Grado 3                                  | 259 | 0,59 | 0,39-0,9  |
| <b>Status menopausale</b>                |     |      |           |
| Pre-Menopausa                            | 285 | 0,64 | 0,40-1    |
| Post-Menopausa                           | 254 | 0,72 | 0,47-1,12 |

\*un rapporto di rischio (TAC/FAC) inferiore a 1 indica che TAC è associato ad una sopravvivenza libera da malattia più lunga rispetto a FAC.

Le analisi esplorative dei sottogruppi per la sopravvivenza libera da malattia nei pazienti rispondenti ai criteri 2009 St. Gallen per la chemioterapia – (popolazione ITT) sono state effettuate e sono presentate nella tabella sottostante

|  | <b>TAC</b>        | <b>FAC</b>        | <b>Rapporto di rischio (TAC/FAC)</b> |                 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Sottogruppi</b>   | (n=539)           | (n=521)           | (95% CI)                             | <b>Valore p</b> |
| Rispondenti alle indicazioni per la chemioterapia <sup>a</sup> |                   |                   |                                      |                 |
| No   | 18/214<br>(8,4%)  | 26/227<br>(11,5%) | 0,796<br>(0,434 - 1,459)             | 0,4593          |
| Si   | 48/325<br>(14,8%) | 69/294<br>(23,5%) | 0,606<br>(0,42 - 0,877)              | 0,0072          |

TAC = docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide

FAC = 5-fluorouracile, doxorubicina e ciclofosfamide

CI = intervallo di confidenza; ER = recettore degli estrogeni

PR = recettore del progesterone

<sup>a</sup>ER/PR-negativo o Grado 3 o dimensione tumorale >5 cm

Il rapporto di rischio è stato stimato con il Cox proportional hazard model utilizzando il gruppo di terapia come fattore.

#### *Docetaxel come unico trattamento*

Sono stati condotti due studi comparativi randomizzati di fase III con docetaxel alle dosi raccomandate e con un regime di 100 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane, su pazienti con tumore metastatico della mammella, di cui 326 dopo fallimento di un trattamento con alchilanti e 392 dopo fallimento di un trattamento con antracicline.

Nelle pazienti nelle quali il trattamento con agenti alchilanti era risultato inefficace, il docetaxel è stato confrontato con doxorubicina (75 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane). Docetaxel ha aumentato la percentuale di risposte (52% verso 37%, p=0,01) e diminuito il tempo di risposta (12 settimane verso 23 settimane, p=0,007), senza variare il tempo di sopravvivenza (15 mesi per docetaxel verso 14 mesi per doxorubicina, p=0,38) od il tempo di progressione (27 settimane per docetaxel verso 23 settimane per doxorubicina, p=0,54). Tre pazienti trattate con docetaxel (2%) hanno dovuto sospendere il trattamento a causa di ritenzione di liquidi, mentre 15 pazienti in trattamento con doxorubicina (9%) hanno dovuto sospendere a causa di tossicità a livello cardiaco (tre decessi per scompenso cardiaco congestizio).

Nelle pazienti nelle quali il trattamento con antracicline era risultato inefficace, docetaxel è stato confrontato con la associazione di mitomicina C e vinblastina (12 mg/m<sup>2</sup> ogni 6 settimane e 6 mg/m<sup>2</sup>

ogni 3 settimane). Docetaxel ha aumentato la percentuale di risposta (33% verso 12%,  $p < 0,0001$ ), ha aumentato il tempo di progressione della malattia (19 settimane verso 11 settimane,  $p = 0,0004$ ) ed ha aumentato il tempo di sopravvivenza (11 mesi verso 9 mesi,  $p = 0,01$ ).

Il profilo di tollerabilità di docetaxel nel corso di questi due studi di fase III era in linea con il profilo di tollerabilità riscontrato negli studi di fase II (vedere paragrafo 4.8).

È stato condotto uno studio randomizzato, in aperto, multicentrico di fase III di confronto tra docetaxel in monoterapia e paclitaxel nel trattamento del carcinoma della mammella avanzato in pazienti nelle quali la terapia precedente aveva già compreso un'antraciclina. Sono state randomizzate complessivamente 449 pazienti a ricevere o docetaxel in monoterapia 100 mg/m<sup>2</sup> in infusione di 1 ora oppure paclitaxel 175 mg/m<sup>2</sup> in infusione di 3 ore. I due trattamenti sono stati somministrati ogni 3 settimane.

Docetaxel ha prolungato il tempo alla progressione mediano (24,6 settimane vs 15,6 settimane;  $p < 0,01$ ) e la sopravvivenza mediana (15,3 mesi vs 12,7 mesi;  $p = 0,03$ ) senza aver dimostrato un effetto sul tasso di risposta globale, endpoint primario dello studio (32% vs 25%,  $p = 0,10$ ).

Sono stati osservati più eventi avversi di grado 3/4 con docetaxel in monoterapia (55,4%) rispetto a paclitaxel (23,0%).

#### *Docetaxel in associazione con doxorubicina*

È stato condotto uno studio randomizzato di fase III su 429 pazienti con tumore metastatico, non pretrattate, che confrontava doxorubicina (50 mg/m<sup>2</sup>) in associazione con docetaxel (75 mg/m<sup>2</sup>) (braccio AT) a doxorubicina (60 mg/m<sup>2</sup>) in associazione con ciclofosfamide (600 mg/m<sup>2</sup>) (braccio AC). Entrambi i regimi sono stati somministrati il giorno 1 ogni tre settimane.

- Il tempo alla progressione (TTP) è risultato significativamente aumentato nel braccio AT rispetto a quello del braccio AC,  $p = 0,0138$ . Il TTP mediano è stato di 37,3 settimane (95% CI: 33,4 – 42,1) nel braccio AT e di 31,9 settimane (95% CI: 27,4 – 36,0) nel braccio AC.
- La percentuale di risposta osservata è risultata significativamente più elevata nel braccio AT rispetto al braccio AC,  $p = 0,009$ . Tale percentuale è risultata del 59,3% (95% CI: 52,8 – 65,9) nel braccio AT rispetto al 46,5% (95% CI: 39,8 – 53,2) nel braccio AC.

In questo studio, il braccio AT ha evidenziato una maggiore incidenza, rispetto al braccio AC, di neutropenia grave (90% contro 68,6%), di neutropenia febbrile (33,3% contro 10%), di infezioni (8% contro 2,4%), di diarrea (7,5% contro 1,4%), di astenia (8,5% contro 2,4%), e di dolore (2,8% contro 0%). D'altra parte, il braccio AC ha mostrato una maggiore incidenza di anemia grave rispetto al braccio AT (15,8% contro 8,5%) e una maggiore incidenza di tossicità cardiaca: insufficienza cardiaca congestizia (3,8% contro 2,8%), diminuzione assoluta del LVEF  $\geq 20\%$  (13,1% contro 6,1%), diminuzione assoluta del LVEF  $\geq 30\%$  (6,2% contro 1,1%). La morte tossica si è verificata in 1 paziente del braccio AT (insufficienza cardiaca congestizia) e in 4 pazienti del braccio AC (1 dovuta a shock settico e 3 dovute a insufficienza cardiaca congestizia).

In entrambi i bracci la qualità della vita, misurata con il questionario dell'EORTC, è risultata paragonabile e stabile durante il trattamento e il follow-up.

#### *Docetaxel in associazione con trastuzumab*

Docetaxel in associazione con trastuzumab è stato valutato nel trattamento di pazienti con cancro della mammella metastatico con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto precedenti trattamenti chemioterapici per malattia metastatica. Sono state randomizzate 186 pazienti a ricevere docetaxel (100 mg/m<sup>2</sup>) con o senza trastuzumab; il 60% delle pazienti hanno ricevuto in precedenza una chemioterapia adiuvante con antracicline. Docetaxel con trastuzumab era efficace nelle pazienti che avevano o non avevano ricevuto precedentemente terapia adiuvante con antracicline. Il test maggiormente utilizzato per determinare la positività di HER2 in questo studio registrativo è stato la immunohistochimica (IHC). Per un numero minore di pazienti è stato utilizzato il test della fluorescenza in situ (FISH). In questo studio l'87% delle pazienti presentava una malattia che era IHC 3+ e il 95% delle pazienti arruolate aveva una malattia IHC 3+ e/o FISH positivo. I risultati di efficacia sono riepilogati nella tabella seguente:

| Parametri   | Docetaxel più trastuzumab <sup>1</sup><br>n=92 | Docetaxel <sup>1</sup><br>n=94   |
|---|--|----------------------------------|
| Percentuale di risposta<br>(95% CI)                       | 61%<br>(50-71)                                 | 34%<br>(25-45)                   |
| Durata mediana della risposta (in mesi)<br>(95% CI)       | 11,4<br>(9,2-15,0)                             | 5,1<br>(4,4-6,2)                 |
| Tempo alla progressione TTP (in mesi) mediano<br>(95% CI) | 10,6<br>(7,6-12,9)                             | 5,7<br>(5,0-6,5)                 |
| Sopravvivenza (in mesi) mediana<br>(95% CI)               | 30,5 <sup>2</sup><br>(26,8-ne)                 | 22,1 <sup>2</sup><br>(17,6-28,9) |

TTP=tempo alla progressione; “ne” indica che non può essere stimato o che non è stato ancora raggiunto.

<sup>1</sup> Popolazione intent-to-treat

<sup>2</sup> Sopravvivenza mediana stimata

#### *Docetaxel in associazione con capecitabina*

I dati di uno studio clinico di fase III multicentrico, randomizzato, controllato, supportano l'utilizzo di docetaxel in associazione con capecitabina per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico dopo insuccesso di una chemioterapia citotossica che ha incluso un'antraciclina. In questo studio 255 pazienti sono state assegnate per randomizzazione al trattamento con docetaxel (75 mg/m<sup>2</sup> in infusione endovenosa di 1 ora ogni 3 settimane) e capecitabina (1.250 mg/m<sup>2</sup> due volte al giorno per 2 settimane seguite da un intervallo di 1 settimana). 256 pazienti sono state assegnate per randomizzazione al trattamento con docetaxel da solo (100 mg/m<sup>2</sup> in infusione endovenosa di 1 ora ogni 3 settimane). La sopravvivenza è stata superiore nel braccio di associazione docetaxel + capecitabina (p=0,0126). La sopravvivenza mediana è stata di 442 giorni (docetaxel + capecitabina) rispetto a 352 giorni (docetaxel da solo). La percentuale di risposta obiettiva globale riscontrabile nell'intera popolazione randomizzata (valutazione dello sperimentatore) è stata di 41,6% (docetaxel + capecitabina) rispetto a 29,7% (docetaxel da solo); p=0,0058. Il tempo alla progressione della malattia è stato superiore nel braccio di associazione docetaxel + capecitabina (p <0,0001). Il tempo mediano alla progressione è stato di 186 giorni (docetaxel + capecitabina) rispetto a 128 giorni (docetaxel da solo).

#### *Cancro del polmone non a piccole cellule*

##### *Pazienti precedentemente trattati con chemioterapici con o senza radioterapia*

In uno studio clinico di fase III, in pazienti pre-trattati, il tempo di progressione (12,3 settimane contro 7 settimane) e la sopravvivenza sono significativamente aumentati con docetaxel a 75 mg/m<sup>2</sup> rispetto al Migliore Trattamento di Supporto (MTS).

La percentuale di sopravvivenza ad 1 anno è risultata significativamente superiore con docetaxel (40%) rispetto a MTS (16%).

In pazienti trattati con docetaxel a 75 mg/m<sup>2</sup> è stato fatto minore uso di morfina (p <0,01), di analgesici non a base di morfina (p <0,01), di altri trattamenti (p=0,06) e radioterapia (p <0,01) rispetto a quelli trattati con MTS.

Nei pazienti valutabili, la percentuale di risposta globale è stata del 6,8%, e la durata media della risposta è stata di 26,1 settimane.

##### *Docetaxel in associazione con derivati del platino in pazienti mai trattati con chemioterapia*

In uno studio di fase III, 1.218 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule inoperabile di stadio IIIB o IV, con Karnofsky Performance Status di 70% e oltre, che non avevano ricevuto precedente chemioterapia per questa condizione, sono stati randomizzati a docetaxel (T) 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione di un'ora seguita immediatamente da cisplatino (Cis) 75 mg/m<sup>2</sup> in 30-60 minuti ogni tre settimane (TCis), docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> in infusione di un'ora in associazione con carboplatino (AUC 6 mg/ml.min) in 30-60 minuti ogni tre settimane, oppure vinorelbina (V) 25 mg/m<sup>2</sup> somministrata in 6-10 minuti ai giorni 1, 8, 15, 22 seguita da cisplatino 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato il

primo giorno del ciclo ripetuto ogni 4 settimane (VCis).

Nella tabella sotto riportata sono illustrati i dati di sopravvivenza, tempo medio alla progressione e tasso di risposta per due bracci dello studio.

|  | <b>TCis<br/>n=408</b> | <b>VCis<br/>n=404</b> | <b>Analisi statistica</b>  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Sopravvivenza globale<br>(Obiettivo primario):<br>Sopravvivenza media (mesi) | 11,3                  | 10,1                  | Rapporto di rischio: 1,122<br>[97,2% CI: 0,937; 1,342]*<br>Differenza tra i trattamenti 5,4%<br>[95% CI: -1,1;12,0]<br>Differenza tra i trattamenti: 6,2%<br>[95% CI: 0,2; 12,3] |
| Sopravvivenza a 1 anno (%)   | 46                    | 41                    |  |
| Sopravvivenza a 2 anni (%)   | 21                    | 14                    |  |
| Tempo mediano alla Progressione<br>(settimane)                               | 22,0                  | 23,0                  | Rapporto di rischio: 1,032 [95% CI:<br>0,876; 1,2161]  |
| Tasso globale di risposta (%)  | 31,6                  | 24,5                  | Differenza tra i trattamenti: 7,1%<br>[95% CI: 0,7; 13,5]  |

\*: Corretto per confronti multipli e aggiustato per fattori di stratificazione (stadio della malattia e regione di trattamento), sulla base della popolazione dei pazienti valutabili.

Gli obiettivi secondari comprendevano variazione nel dolore, valutazione globale della qualità della vita tramite EuroQoL-5D, scala dei sintomi del tumore polmonare (LCSS: Lung Cancer Symptom Scale) e cambiamento nel Karnofsky performance status. I risultati di questi obiettivi hanno confermato i risultati degli obiettivi primari.

Per la associazione docetaxel/carboplatino, non è stato possibile dimostrare né equivalenza né non-inferiorità di efficacia nei confronti del trattamento di riferimento: la associazione VCis.

### Cancro della prostata

#### Cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione

La tollerabilità e l'efficacia di docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone nei pazienti affetti da cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione sono state valutate in uno studio randomizzato multicentrico di fase III (TAX 327). Sono stati randomizzati complessivamente 1.006 pazienti con KPS  $\geq$  60 nei seguenti gruppi terapeutici:

- Docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 10 cicli.
- Docetaxel 30 mg/m<sup>2</sup> somministrato ogni settimana per le prime 5 settimane di un ciclo di 6 settimane per un totale di 5 cicli.
- Mitoxantrone 12 mg/m<sup>2</sup> ogni 3 settimane per 10 cicli.

Tutti i tre regimi terapeutici sono stati somministrati in associazione con prednisone o prednisolone 5 mg due volte al giorno, di continuo.

I pazienti che hanno ricevuto docetaxel ogni tre settimane hanno dimostrato una sopravvivenza globale significativamente più prolungata rispetto ai pazienti trattati con mitoxantrone. L'aumento della sopravvivenza osservato nel gruppo trattato con docetaxel ogni settimana non è risultato statisticamente significativo rispetto al gruppo di controllo trattato con mitoxantrone. I parametri di efficacia ottenuti nei gruppi trattati con docetaxel rispetto al gruppo di controllo sono riassunti nella seguente tabella:

| <b>Endpoint</b>       | <b>Docetaxel<br/>3 settimane<br/>ogni</b> | <b>Docetaxel<br/>settimana<br/>ogni</b> | <b>Mitoxantrone<br/>ogni 3 settimane</b> |
|-----------------------|---|---|--|
| Numero dei pazienti   | 335                                       | 334                                     | 337                                      |
| Sopravvivenza Mediana | 18,9                                      | 17,4                                    | 16,5                                     |



|                                  |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| (mesi)                           | (17,0-21,2)   | (15,7-19,0)   | (14,4-18,6) |
| 95% CI                           | 0,761         | 0,912         | --          |
| Rapporto di rischio              | (0,619-0,936) | (0,747-1,113) | --          |
| 95% CI                           | 0,0094        | 0,3624        | --          |
| valore di p <sup>†*</sup>        |               |               |             |
| Numero dei pazienti              | 291           | 282           | 300         |
| Tasso di risposta del PSA** (%)  | 45,4          | 47,9          | 31,7        |
| 95% CI                           | (39,5-51,3)   | (41,9-53,9)   | (26,4-37,3) |
| valore di p *                    | 0,0005        | <0,0001       | --          |
| Numero di pazienti               | 153           | 154           | 157         |
| Tasso di risposta del dolore (%) | 34,6          | 31,2          | 21,7        |
| 95% CI                           | (27,1-42,7)   | (24,0-39,1)   | (15,5-28,9) |
| valore di p *                    | 0,0107        | 0,0798        | --          |
| Numero di pazienti               | 141           | 134           | 137         |
| Risposte obiettive (%)           | 12,1          | 8,2           | 6,6         |
| 95% CI                           | (7,2-18,6)    | (4,2-14,2)    | (3,0-12,1)  |
| valore di p *                    | 0,1112        | 0,5853        | --          |

<sup>†</sup>Stratified log rank test

\*Limite per la significatività statistica=0,0175

\*\*PSA: Prostate-Specific Antigen (Antigene specifico Prostatico)

Dato che docetaxel ogni settimana ha presentato un profilo di tollerabilità leggermente migliore rispetto a docetaxel ogni 3 settimane, è possibile che alcuni pazienti possano beneficiare dalla terapia settimanale con docetaxel.

Non è stata osservata una differenza statisticamente significativa per la Qualità della Vita Globale tra i gruppi di trattamento.

#### Cancro della prostata metastatico ormono-sensibile

##### STUDIO STAMPEDE

La tollerabilità e l'efficacia di docetaxel somministrato in concomitanza con lo standard di cura (ADT) nei pazienti con cancro della prostata ormono-sensibile localmente avanzato o metastatico ad alto rischio sono state valutate in uno studio multicentrico randomizzato multi-braccio e multi-stadio (MAMS) con disegno senza soluzione di continuità di fase II/III (STAMPEDE – MRC PR08). Un totale di 1776 pazienti di sesso maschile è stato assegnato ai bracci di trattamento di interesse:

- Standard di cura + docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup>, somministrato ogni 3 settimane per 6 cicli
- Solo standard di cura

Il regime con docetaxel è stato somministrato in associazione con prednisone o prednisolone, 5 mg due volte al giorno per tutta la durata del trattamento.

Tra i 1776 pazienti randomizzati, 1086 (61%) presentavano malattia metastatica, 362 sono stati randomizzati a docetaxel in associazione con lo standard di cura e 724 hanno ricevuto solo lo standard di cura.

Nei pazienti affetti da cancro della prostata metastatico, la sopravvivenza globale mediana è risultata significativamente maggiore nei gruppi di trattamento con docetaxel rispetto al gruppo con il solo standard di cura, con un valore mediano superiore di 19 mesi con l'aggiunta di docetaxel (HR = 0,76, IC al 95% = 0,62-0,92, p=0,005).

I risultati di efficacia nei pazienti con cancro della prostata metastatico nel braccio docetaxel rispetto al braccio di controllo sono riassunti nella seguente tabella:

Efficacia di docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone e standard di cura nel trattamento di pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (STAMPEDE)

| Endpoint   | Docetaxel + standard di cura | Solo standard di cura |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Numero di pazienti con cancro della prostata metastatico | 362                          | 724                   |
| Sopravvivenza globale mediana (mesi)                     | 62                           | 43                    |
| IC al 95%  | 51-73                        | 40-48                 |
| Rapporto di rischio aggiustato                           | 0,76                         |                       |
| IC al 95%  | (0,62-0,92)                  |                       |
| valore p <sup>a</sup>                                    | 0,005                        |                       |
| Sopravvivenza senza fallimento <sup>b</sup>              |                              |                       |
| Mediana (mesi)   | 20,4                         | 12                    |
| IC al 95%  | 16,8-25,2                    | 9,6-12                |
| Rapporto di rischio aggiustato                           | 0,66                         |                       |
| IC al 95%  | (0,57-0,76)                  |                       |
| valore p <sup>a</sup>                                    | < 0,001                      |                       |

<sup>a</sup> Valore p calcolato dal test del rapporto di verosimiglianza e aggiustato per tutti i fattori di stratificazione (eccetto la terapia ormonale del centro e pianificata) e stratificato in base al periodo della sperimentazione

<sup>b</sup> Sopravvivenza senza fallimento: tempo trascorso dalla randomizzazione alla prima manifestazione di almeno uno tra i seguenti eventi: fallimento biochimico (definito come aumento del PSA del 50% oltre il nadir entro 24 settimane e superiore a 4 ng/ml, confermato mediante ripetizione del test o trattamento); progressione locale, a livello linfonodale, oppure in metastasi a distanza; evento correlato all'apparato scheletrico; o decesso da cancro della prostata.

#### Studio *CHAARTED*

La sicurezza e l'efficacia di docetaxel somministrato all'inizio della terapia di deprivazione androgenica (ADT) nei pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile sono state valutate in uno studio randomizzato di fase III (*CHAARTED*). Un totale di 790 pazienti di sesso maschile è stato assegnato ai 2 gruppi di trattamento:

- ADT + docetaxel 75 mg/m<sup>2</sup> somministrato all'inizio della terapia ADT, ogni 3 settimane per 6 cicli
- Sola ADT

La sopravvivenza globale mediana è risultata significativamente maggiore nel gruppo trattato con docetaxel rispetto al gruppo trattato con sola ADT, con un valore mediano di 13,6 mesi superiore con l'aggiunta di docetaxel all'ADT (rapporto di rischio (HR) = 0,61, intervallo di confidenza (IC) al 95% = 0,47-0,80, p=0,0003).

I risultati di efficacia per il braccio docetaxel rispetto al braccio di controllo sono riassunti nella seguente tabella:

Efficacia di docetaxel e ADT nel trattamento di pazienti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (CHAARTED)

| Endpoint  | Docetaxel +ADT | Sola ADT    |
|---|----------------|-------------|
| Numero di pazienti  | 397            | 393         |
| Sopravvivenza globale mediana (mesi)                                    |                |             |
| Tutti i pazienti  | 57,6           | 44,0        |
| IC al 95%   | 49,1-72,8      | 34,4-49,1   |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,61           | --          |
| IC al 95%   | (0,47-0,80)    | --          |
| valore p <sup>a</sup>   | 0,0003         | --          |
| Sopravvivenza libera da progressione                                    |                |             |
| Mediana (mesi)  | 19,8           | 11,6        |
| IC al 95%   | 16,7-22,8      | 10,8-14,3   |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,60           | --          |
| IC al 95%   | 0,51-0,72      | --          |
| Valore p*   | p<0,0001       | --          |
| Risposta PSA** a 6 mesi – N(%)  | 127 (32,0)     | 77 (19,6)   |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |
| Risposta PSA** a 12 mesi – N(%)   | 110 (27,7)     | 66 (16,8)   |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |
| Tempo al cancro della prostata resistente alla castrazione <sup>b</sup> |                |             |
| Mediana (mesi)  | 20,2           | 11,7        |
| IC al 95%   | (17,2-23,6)    | (10,8-14,7) |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,61           | --          |
| IC al 95%   | (0,51-0,72)    | --          |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |
| Tempo alla progressione clinica <sup>c</sup>                            |                |             |
| Mediana (mesi)  | 33,0           | 19,8        |
| IC al 95%   | (27,3-41,2)    | (17,9-22,8) |
| Rapporto di rischio aggiustato  | 0,61           | --          |
| IC al 95%   | (0,50-0,75)    | --          |
| valore p <sup>a*</sup>  | <0,0001        | --          |

a Tempo alle variabili di evento: Test dei ranghi logaritmici stratificato.

Variabili del tasso di risposta: Test esatto di Fisher

\* Valore p per scopi descrittivi.

\*\* Risposta PSA (risposta dell'antigene prostatico specifico): livello di PSA <0,2 ng/ml misurato per due volte consecutive ad almeno 4 settimane di distanza.

b Tempo al cancro della prostata resistente alla castrazione = tempo dalla randomizzazione alla progressione del PSA o alla progressione clinica (ovvero, aumento delle metastasi ossee sintomatiche, progressione secondo i criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi (*Response Evaluation Criteria in Solid Tumors*, RECIST) o peggioramento clinico dovuto al cancro secondo il parere dello sperimentatore), a seconda dell'evento che si verifica per primo.

c Tempo alla progressione clinica = tempo dalla randomizzazione fino alla progressione clinica (ovvero, aumento dei sintomi delle metastasi ossee; progressione in base ai criteri RECIST o peggioramento clinico dovuto al cancro secondo l'opinione dello sperimentatore).

### Adenocarcinoma dello stomaco

Uno studio multicentrico, randomizzato, in aperto è stato condotto per valutare la sicurezza e l'efficacia di docetaxel nel trattamento dei pazienti con adenocarcinoma dello stomaco metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che in precedenza non avevano ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica. Un totale di 445 pazienti con KPS > 70 sono stati trattati con docetaxel (T) (75 mg/m<sup>2</sup> il giorno 1) in associazione con cisplatino (C) (75 mg/m<sup>2</sup> il giorno 1) e 5-fluorouracile (F) (750 mg/m<sup>2</sup> al giorno per 5 giorni) oppure con cisplatino (100 mg/m<sup>2</sup> il giorno 1) e 5-fluorouracile (1.000 mg/m<sup>2</sup> al giorno per 5 giorni). La durata di un ciclo di trattamento è stata di

3 settimane per il braccio TCF e 4 settimane per il braccio CF.

Il numero medio di cicli somministrati per paziente è stato di 6 (con un intervallo di 1-16) per il braccio TCF e di 4 (con un intervallo di 1-12) per il braccio CF. Il tempo alla progressione (TTP) era l'end point primario. La riduzione di rischio di progressione è stata del 32,1% ed è stata associata con un TTP significativamente più lungo ( $p=0,0004$ ) per il braccio TCF. La sopravvivenza globale è stata inoltre significativamente più lunga ( $p=0,0201$ ) per il braccio TCF con una riduzione di rischio di mortalità del 22,7%. I risultati di efficacia sono riassunti nella seguente tabella:

Efficacia di docetaxel nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma dello stomaco

| <b>Endpoint</b>  | <b>TCF</b><br>n=221    | <b>CF</b><br>n=224 |
|--|------------------------|--------------------|
| Tempo Mediano alla progressione<br>TTP (mesi) - (95% CI) | 5,6<br>(4,86-5,91)     | 3,7<br>(3,45-4,47) |
| Rapporto di rischio<br>(95% CI)                          | 1,473<br>(1,189-1,825) |                    |
| Valore di p *  | 0,0004                 |                    |
| Sopravvivenza mediana (mesi)<br>(95% CI)                 | 9,2<br>(8,38-10,58)    | 8,6<br>(7,16-9,46) |
| Valutazione a 2 anni(%)                                  | 18,4                   | 8,8                |
| Rapporto di rischio<br>(95% CI)                          | 1,293<br>(1,041-1,606) |                    |
| Valore di p*   | 0,0201                 |                    |
| Tasso globale di risposta (CR+PR)<br>(%)                 | 36,7                   | 25,4               |
| Valore di p  | 0,0106                 |                    |
| Progressione come migliore risposta<br>globale (%)       | 16,7                   | 25,9               |

\*Unstratified log rank test

Le analisi dei sottogruppi per età, genere e razza hanno favorito costantemente il braccio TCF rispetto al braccio CF.

Un'analisi aggiornata della sopravvivenza condotta con un tempo medio di follow-up di 41,6 mesi non ha più mostrato una differenza statisticamente significativa, anche se sempre in favore del regime TCF e ha evidenziato che il beneficio di TCF rispetto a CF è evidente fra i 18 e i 30 mesi di follow-up.

In generale, la qualità della vita (QoL) ed i risultati clinici sui benefici hanno costantemente indicato un miglioramento in favore del braccio TCF. I pazienti trattati con TCF hanno avuto un tempo più lungo all'aggravamento dello stato della salute del 5% sul questionario QLQ-C30 ( $p=0,0121$ ) ed un tempo più lungo al peggioramento definitivo del Karnofsky performance status ( $p=0,0088$ ) a confronto con i pazienti trattati con CF.

Cancro del collo e della testa

- Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia (TAX 323)

La sicurezza e l'efficacia di docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose del collo e della testa (SCCHN) sono state valutate in uno studio randomizzato in aperto, multicentrico di fase III (TAX323). In questo studio, 358 pazienti con SCCHN localmente avanzato inoperabile con WHO performance status 0 - 1, sono stati randomizzati a uno dei due bracci di trattamento. I pazienti nel braccio con docetaxel hanno ricevuto docetaxel (T) 75 mg/m<sup>2</sup> seguito dal cisplatino (P) 75 mg/m<sup>2</sup> seguito dal 5-fluorouracile (F) 750 mg/m<sup>2</sup> al giorno in infusione continua per 5 giorni. Questo schema posologico veniva somministrato ogni tre settimane per 4 cicli nel caso in cui si fosse osservata almeno, una risposta minima (>25% riduzione del tumore misurato bidimensionalmente) dopo 2 cicli. Alla fine della chemioterapia, con un intervallo minimo di 4 settimane e massimo di 7 settimane, i pazienti per i quali la patologia non progredisce ricevono la radioterapia (RT), in accordo con le linee guida istituzionali, per 7 settimane (TPF/RT). I pazienti nel braccio di comparazione hanno ricevuto cisplatino (P) 100 mg/m<sup>2</sup> seguito da 5-fluorouracile (F)

1000 mg/m<sup>2</sup> al giorno per 5 giorni. Questo schema posologico è stato somministrato ogni tre settimane per 4 cicli nel caso in cui si fosse osservata almeno una risposta minima ( $\geq 25\%$  riduzione del formato bidimensionale misurato del tumore) dopo 2 cicli. Alla conclusione della chemioterapia, con un intervallo minimo di 4 settimane e un intervallo massimo di 7 settimane, i pazienti nei quali la malattia non era progredita hanno ricevuto la radioterapia (RT) secondo la linea guida di riferimento per 7 settimane (PF/RT). La terapia locoregionale con radiazioni è stata applicata ad una frazione convenzionale (1,8 Gy-2,0 Gy una volta al giorno, 5 giorni per settimana per una dose totale da 66 a 70 Gy), o a regimi accelerati/ipersfrzionati della radioterapia (due volte al giorno, con un intervallo minimo di frazioni di 6 ore, di 5 giorni per settimana). Un totale di 70 Gy è stato suggerito per i regimi accelerati e 74 Gy per gli schemi ipersfrzionati. La resezione chirurgica è permessa dopo la chemioterapia, prima o dopo la radioterapia. I pazienti del braccio TPF hanno ricevuto per os come profilassi antibiotica ciprofloxacina 500 mg due volte al giorno per 10 giorni iniziando il giorno 5 di ogni ciclo, o equivalente. L'endpoint primario in questo studio, la sopravvivenza libera alla progressione (PFS), era significativamente più lunga nel braccio TPF che nel braccio PF,  $p=0,0042$  (PFS mediano: 11,4 vs 8,3 mesi rispettivamente) con un tempo mediano di 33,7 mesi. La sopravvivenza mediana era inoltre significativamente più lunga per il braccio TPF rispetto al PF (OS mediano: 18,6 vs 14,5 mesi rispettivamente) con una riduzione del rischio di mortalità del 28%,  $p = 0,0128$ . I risultati di efficacia sono presentati nella tabella qui sotto:

Efficacia di docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con SCCHN localmente avanzato inoperabile. (Intent-to-Treat Analysis).

| <b>Endpoint</b>  | <b>Docetaxel +<br/>Cis+5-FU<br/>n=177</b> | <b>Cis+5-FU<br/>n=181</b>    |
|--|---|------------------------------|
| Progressione mediana della sopravvivenza (mesi) - (95% CI)                                       | 11,4<br>(10,1-14,0)                       | 8,3<br>(7,4-9,1)             |
| Rapporto di rischio aggiustato (95% CI)  | 0,70<br>(0,55-0,89)                       |                              |
| * p-value  | 0,0042                                    |                              |
| Sopravvivenza mediana (mesi) (95% CI)  | 18,6<br>(15,7-24,0)                       | 14,5<br>(11,6-18,7)          |
| Rapporto di rischio (95% CI)   | 0,72<br>(0,56-0,93)                       |                              |
| ** p-value   | 0,0128                                    |                              |
| Migliore risposta globale alla chemioterapia (%) - (95% CI)                                      | 67,8<br>(60,4-74,6)                       | 53,6<br>(46,0-61,0)          |
| *** valore di p  | 0,006                                     |                              |
| Migliore risposta globale al trattamento di studio [chemioterapia +/- radioterapia] (%) (95% CI) | 72,3<br>(65,1-78,8)                       | 58,6<br>(51,0-65,8)          |
| *** p-value  | 0,006                                     |                              |
| Durata mediana della risposta alla chemioterapia $\pm$ radioterapia (mesi) (95% CI)              | n=128<br>15,7<br>(13,4-24,6)              | n=106<br>11,7<br>(10,2-17,4) |
| Rapporto di rischio (95% CI)   | 0,72<br>(0,52-0,99)                       |                              |
| ** p-value   | 0,0457                                    |                              |

un rapporto di rischio inferiore ad 1 a favore dell'associazione docetaxel + cisplatino + 5-FU  
 \*Modello Cox (aggiustamento per sito del tumore primario, stadiazione su T e N e PS-WHO)  
 \*\*Logrank test  
 \*\*\*Chi-square test

*Parametri per definire la qualità della vita.*

I pazienti trattati con TPF manifestano significativamente una diminuzione del deterioramento della loro salute globale in confronto a quelli trattati con PF ( $p=0,01$ , usando EORTC QLQ-C30 scale).

*Parametri per definire i benefici clinici*

La scala del performance, per testa e collo (PSS-HN) che ha inteso misurare la comprensione della

parola, la possibilità di mangiare in pubblico e la normalità della dieta, è risultata significativamente a favore del braccio TPF rispetto al braccio PF. Il tempo mediano al primo deterioramento della condizione delle prestazioni del WHO era significativamente più lungo nel braccio TPF in confronto al braccio PF. La scala di intensità del dolore segna un miglioramento durante il trattamento in entrambi i gruppi, questo sta ad indicare che la gestione del dolore è adeguata.

- Chemioterapia di induzione seguita da chemio-radioterapia (TAX 324)

La sicurezza e l'efficacia del docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma del collo e della testa a cellule squamose (SCCHN) localmente avanzato sono state valutate in uno studio clinico multicentrico randomizzato in aperto, di fase III (TAX 324). In questo studio, 501 pazienti, con SCCHN localmente avanzato con WHO performance status 0 o 1 sono stati randomizzati ad uno dei due bracci. La popolazione in studio ha compreso anche pazienti tecnicamente inoperabili, pazienti con una bassa probabilità di riuscita della resezione chirurgica, e pazienti che ambivano ad una conservazione dell'organo. La valutazione del profilo di sicurezza e di efficacia ha considerato solamente gli endpoints di sopravvivenza, mentre la riuscita nella conservazione dell'organo non è stata formalmente considerata. I pazienti trattati con docetaxel hanno ricevuto 75 mg/m<sup>2</sup> di docetaxel (T) in infusione endovenosa il giorno 1 seguito dal cisplatino (P) 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in infusione endovenosa di durata da 30 minuti a tre ore, seguito da infusione endovenosa continua di 5-fluorouracile (F) 1.000 mg/m<sup>2</sup>/die dal giorno 1 al giorno 4. I cicli sono stati ripetuti ogni tre settimane per 3 cicli. Tutti i pazienti che non avevano progressione di malattia dovevano ricevere la chemioradioterapia (CRT) come da protocollo (TPF/CRT).

I pazienti nel braccio di confronto hanno ricevuto cisplatino (P) 100 mg/m<sup>2</sup> somministrato in infusione di durata da 30 minuti a 3 ore il giorno 1, seguito da 5-fluorouracile (F) 1.000 mg/m<sup>2</sup>/die dal giorno 1 al giorno 5. I cicli sono stati ripetuti ogni tre settimane per 3 cicli. Tutti i pazienti che non avevano progressione di malattia dovevano ricevere CRT come da protocollo (PF/CRT).

I pazienti, in entrambi i bracci di trattamento, hanno ricevuto 7 giorni di CRT dopo la chemioterapia di induzione con un intervallo minimo di 3 settimane e non più lungo di 8 settimane dopo l'inizio dell'ultimo ciclo (dal giorno 22 al giorno 56 dell'ultimo ciclo). Durante la radioterapia, il carboplatino (AUC 1,5) è stato somministrato in infusione endovenosa di un'ora per un massimo di 7 dosi. La radiazione è stata somministrata con uno strumento ad alto voltaggio utilizzando il frazionamento giornaliero (2 Gy al giorno, 5 giorni a settimana per 7 settimane, per una dose complessiva di 70-72 Gy). La chirurgia nel sito primario del tumore e/o del collo poteva essere presa in considerazione in qualsiasi momento dopo il completamento della CRT. Tutti i pazienti in studio nel braccio con docetaxel hanno ricevuto una profilassi antibiotica. L'endpoint primario di efficacia di questo studio, la sopravvivenza (OS) è stata significativamente più lunga (log-rank test p = 0,0058) con il regime contenente docetaxel rispetto al PF (mediana OS: 70,6 vs 30,1 mesi rispettivamente), con un 30% di riduzione del rischio di morte rispetto al PF (rapporto di rischio (HR) = 0,70, 95% intervallo di confidenza (CI) = 0,54-0,90) ad un follow-up mediano di 41,9 mesi. L'endpoint secondario, PFS, ha dimostrato una riduzione del rischio di progressione o morte del 29% ed un miglioramento del PFS mediano di 22 mesi (35,5 mesi per TPF e 13,1 per PF). Questo è stato anche statisticamente significativo con un HR di 0,71, 95% CI 0,56 – 0,90; log-rank test p=0,004. I risultati sull'efficacia sono presentati nella tabella seguente:

Efficacia di docetaxel nel trattamento di induzione dei pazienti con SCCHN localmente avanzato. (Intent-to-Treat Analysis).

| <b>Endpoint</b>  | <b>Docetaxel +Cis+5-FU<br/>n=255</b> | <b>Cis+5-FU<br/>n=246</b> |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Progressione mediana della sopravvivenza (mesi) - (95% CI) | 70,6<br>(49,0-NA)                    | 30,1<br>(20,9-51,5)       |
| Rapporto di rischio aggiustato (95% CI)                    | 0,70<br>(0,54-0,90)                  |                           |
| * p-value  | 0,0058                               |                           |
| Sopravvivenza mediana (PFS) (mesi) (95% CI)                | 35,5<br>(19,3-NA)                    | 13,1<br>(10,6-20,2)       |
| Rapporto di rischio (95% CI)                               | 0,71<br>(0,56-0,90)                  |                           |
| ** p-value   | 0,004                                |                           |
| Migliore risposta globale alla                             | 71,8                                 | 64,2                      |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| chemioterapia (CR+PR) (%) - (95% CI)   | (65,8-77,2)         | (57,9-70,2)         |
| *** p-value  | 0,070               |                     |
| Migliore risposta globale al trattamento (CR+PR) di studio [chemioterapia +/- radioterapia] (%) (95% CI) | 76,5<br>(70,8-81,5) | 71,5<br>(65,5-77,1) |
| *** p-value  | 0,209               |                     |

un rapporto di rischio inferiore ad 1 a favore dell'associazione docetaxel + cisplatino + 5-fluorouracile

\*aggiustamento log-rank test

\*\*aggiustamento log-rank test, nessun aggiustamento per comparazioni multiple

\*\*\*Chi-square test, nessun aggiustamento per comparazioni multiple

NA – non applicabile

## Popolazione Pediatrica

L'Agenzia europea per i medicinali ha concesso una deroga dall'obbligo di fornire i risultati di studi con il medicinale di riferimento contenente docetaxel in tutti i sottogruppi di pazienti della popolazione pediatrica nel cancro della mammella, cancro del polmone non a piccole cellule, cancro della prostata, carcinoma dello stomaco e cancro del collo e della testa, escluso il carcinoma nasofaringeo tipo II e III meno differenziato (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull'utilizzo pediatrico).

## 5.2 Proprietà farmacocinetiche

### Assorbimento

La farmacocinetica di docetaxel è stata studiata in pazienti con tumore dopo somministrazione di 20-115 mg/m<sup>2</sup> in studi di fase I. Il profilo cinetico di docetaxel non è dose-dipendente ed è consistente con un modello farmacocinetico a tre compartimenti, con emivite per le fasi  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $\gamma$  rispettivamente di 4 min., 36 min. e 11,1 ore. La fase tardiva è in parte dovuta al ritorno relativamente lento di docetaxel dal compartimento periferico.

### Distribuzione

Dopo la somministrazione di 100 mg/m<sup>2</sup> per infusione di un'ora è stato ottenuto un livello medio di picco plasmatico di 3,7  $\mu\text{g/ml}$ , con una corrispondente AUC di 4,6 h. $\mu\text{g/ml}$ . Valori medi di clearance totale e volume di distribuzione allo steady state erano rispettivamente 21 l/h/m<sup>2</sup> e 113 l. Le variazioni interindividuali della clearance totale sono state di circa il 50%. Il docetaxel si lega alle proteine plasmatiche per oltre il 95%.

### Eliminazione

Uno studio con <sup>14</sup>C-docetaxel è stato condotto in tre pazienti con tumore. Docetaxel era eliminato sia nelle urine sia nelle feci tramite metabolismo ossidativo mediato dal citocromo P 450 del gruppo estere tert-butilico; entro sette giorni, circa il 6% ed il 75% della radioattività somministrata viene escreta rispettivamente attraverso le urine e le feci. Circa l'80% della radioattività riscontrata nelle feci è escreta entro le prime 48 ore sotto forma di un metabolita maggiore e tre metaboliti minori inattivi e quantità molto piccole del medicinale immodificato.

### Popolazioni particolari

#### *Età e sesso*

Uno studio di farmacocinetica di popolazione è stato eseguito su 577 pazienti. I parametri farmacocinetici calcolati attraverso il modello erano molto vicini a quelli osservati negli studi di fase I. La farmacocinetica del docetaxel non è stata modificata dall'età o dal sesso del paziente.

#### *Compromissione epatica*

In un piccolo numero di pazienti (n=23) con risultati biochimici che suggerivano una moderata

disfunzione epatica (ALT, AST  $\geq 1,5$  volte il limite superiore normale, associate a fosfatasi alcalina  $\geq 2,5$  il limite superiore normale), la clearance totale è diminuita in media del 27% (vedere paragrafo 4.2).

#### *Ritenzione di liquidi*

La clearance di docetaxel non è modificata nei pazienti con ritenzione di liquidi lieve o moderata. Non sono disponibili dati in pazienti con ritenzione di liquidi grave.

#### Terapia di associazione

##### *Doxorubicina*

Quando usato in associazione, docetaxel non influenza la clearance della doxorubicina e i livelli plasmatici del doxorubicinolo (un metabolita della doxorubicina). La farmacocinetica di docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamida non è influenzata dalla loro co-somministrazione.

##### *Capecitabina*

Uno studio di fase I sulla valutazione degli effetti di capecitabina sulla farmacocinetica di docetaxel e viceversa ha dimostrato che non vi è alcun effetto di capecitabina sulla farmacocinetica di docetaxel ( $C_{max}$  e AUC) e che non vi è alcun effetto di docetaxel sulla farmacocinetica di un metabolita rilevante di capecitabina, 5'-DFUR.

##### *Cisplatino*

La clearance di docetaxel nella terapia in associazione con cisplatino è stata simile a quella osservata durante la monoterapia. Il profilo farmacocinetico di cisplatino somministrato poco dopo l'infusione di docetaxel è simile a quello osservato con cisplatino da solo.

##### *Cisplatino e 5-fluorouracile*

La somministrazione combinata di docetaxel, cisplatino e 5-fluorouracile in 12 pazienti con tumori solidi non ha avuto influenza sulla farmacocinetica dei singoli medicinali.

##### *Prednisone e desametasone*

L'effetto del prednisone sulla farmacocinetica di docetaxel somministrato con una premedicazione standard con desametasone è stato studiato in 42 pazienti.

##### *Prednisone*

Non è stato osservato alcun effetto di prednisone sulla farmacocinetica di docetaxel.

### **5.3 Dati preclinici di sicurezza**

La potenzialità cancerogena di docetaxel non è stata studiata.

Il docetaxel si è dimostrato mutageno nel test *in vitro* di aberrazione cromosomiale in cellule CHO-K1 e *in vivo* nel test del micronucleo nel topo. Tuttavia docetaxel non è mutageno nel test di Ames o nel test di mutazione genica CHO/HGPRT. Questi risultati sono consistenti con l'attività farmacologica di docetaxel.

Effetti indesiderati sugli organi genitali maschili, osservate nel corso di studi di tossicità nei roditori, suggeriscono che docetaxel può danneggiare la fertilità maschile.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

#### Concentrato

Polisorbato 80.

Etanolo, anidro



## Solvente

Acqua per preparazioni iniettabili

### **6.2 Incompatibilità**

Il medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.

### **6.3 Periodo di validità**

- 18 mesi.
- Soluzione premiscelata: la stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per 8 ore se conservata tra 2 °C e 8 °C o a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C).  
Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima del suo impiego sono sotto la responsabilità dell'operatore e non dovrebbero superare di norma le 24 ore a 2 °C-8 °C, a meno che la diluizione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e convalidate.
- Soluzione per infusione: la stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per 4 ore a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C). Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima del suo impiego sono sotto la responsabilità dell'operatore e non dovrebbero superare di norma le 24 ore a 2 °C-8 °C, a meno che la diluizione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e convalidate.

### **6.4 Precauzioni particolari per la conservazione**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non congelare.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce

Per le condizioni di conservazione del medicinale diluito, vedere paragrafo 6.3.

### **6.5 Natura e contenuto del contenitore**

Ogni confezione contiene:

- Un flaconcino di concentrato e,
- Un flaconcino di solvente.
  
- Flaconcino di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml  
Flaconcino in vetro chiaro Tipo I da 15 ml con tappo di gomma bromobutilica e capsula rimovibile.

Il flaconcino contiene 2,88 ml di una soluzione 27,73 mg/ml di docetaxel in polisorbato 80 (volume di riempimento: 94,4 mg/3,40 ml. Questo volume di riempimento è stato stabilito durante lo sviluppo di docetaxel per compensare la perdita di liquido durante la preparazione della soluzione prediluita dovuta alla formazione di schiuma, all'adesione alle pareti del flaconcino ed allo 'spazio morto'. Il sovrariempimento assicura che dopo la diluizione con l'intero contenuto del flaconcino di solvente accluso a docetaxel, il volume minimo estraibile di soluzione prediluita sia di 8 ml, contenenti 10 mg/ml di docetaxel che corrisponde al contenuto dichiarato in etichetta di 80 mg per flaconcino.

Flaconcino di solvente

Flaconcino in vetro chiaro Tipo I da 15 ml con tappo di gomma bromobutilica e capsula rimovibile.

Il flaconcino di solvente contiene 5,12 ml di acqua per preparazioni iniettabili (volume di riempimento: 6,29 ml). L'aggiunta dell'intero contenuto del flaconcino di solvente a quello di Docetaxel Teva 80 mg, concentrato per soluzione per infusione assicura l'ottenimento di una soluzione premiscelata con una concentrazione di 10 mg/ml di docetaxel.

## 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Docetaxel Teva è un farmaco antineoplastico e, come con altri prodotti potenzialmente tossici, si deve usare cautela nel maneggiarlo e nel prepararne soluzioni. Si raccomanda l'uso di guanti.

Se Docetaxel Teva in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone. Se docetaxel in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con membrane mucose, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.

### Preparazione per la somministrazione endovenosa

#### *a) Preparazione della soluzione pronta per l'uso di Docetaxel Teva (10 mg docetaxel/ml)*

Se i flaconcini sono conservati in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C) per 5 minuti il numero richiesto di scatole di Docetaxel Teva.

Usando una siringa graduata con ago aspirare l'intero contenuto del flaconcino di solvente per Docetaxel Teva capovolgendo parzialmente il flaconcino.

Iniettare l'intero contenuto della siringa nel corrispondente flaconcino di Docetaxel Teva.

Rimuovere la siringa e l'ago e mescolare la soluzione manualmente capovolgendo ripetutamente per 45 secondi. Non agitare.

Lasciare riposare il flaconcino di soluzione prediluita per 5 minuti a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C) e quindi controllare che la soluzione risulti chiara e omogenea. (La formazione di schiuma è normale anche dopo 5 minuti a causa del contenuto di polisorbato 80 nella formulazione).

La soluzione prediluita contiene 10 mg/ml di docetaxel e deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione, anche se è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica di detta soluzione per un periodo di 8 ore se conservata tra +2 °C e +8 °C o a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C).

#### *b) Preparazione della soluzione per infusione*

Per ottenere la dose richiesta per il paziente possono essere necessari più flaconcini di soluzione prediluita. Sulla base della dose necessaria per il paziente espressa in mg, prelevare in asepsi il volume corrispondente di soluzione prediluita contenente 10 mg/ml di docetaxel da un numero appropriato di flaconcini di soluzione prediluita per mezzo di una siringa graduata con ago. Ad esempio per una dose di 140 mg di docetaxel si devono prelevare 14 ml di soluzione prediluita di docetaxel.

Iniettare il volume necessario di soluzione prediluita in una sacca non-PVC di 250 ml contenenti una soluzione glucosata al 5% o soluzione per infusione con 9 mg/ml di sodio cloruro (0,9%).

Nel caso in cui sia necessaria una dose di docetaxel superiore a 200 mg, utilizzare un volume maggiore di soluzione da infusione in modo che la concentrazione di docetaxel non superi 0,74 mg/ml.

Mescolare manualmente la sacca o il flacone con movimento rotatorio.

La soluzione per infusione di Docetaxel Teva deve essere utilizzata entro 4 ore e deve essere somministrata sotto forma di infusione della durata di 1 ora, in asepsi, a temperatura ambiente (inferiore ai 25 °C) ed in normali condizioni di luce.

Come per tutti i prodotti per uso parenterale, la soluzione prediluita e la soluzione per infusione di Docetaxel Teva deve essere esaminata visivamente prima dell'uso, le soluzioni contenenti precipitati devono essere eliminate.

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Paesi Bassi

**8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/09/611/002

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data della prima autorizzazione: 26 Gennaio 2010  
Data del rinnovo più recente: 14 Luglio 2014

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali : <http://www.ema.europa.eu/>

## **ALLEGATO II**

- A. PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI**
- B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI UTILIZZO**
- C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**
- D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE**

## **A. PRODUTTORE(I) RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI**

Nome ed indirizzo del(dei) produttore(i) responsabile(i) del rilascio dei lotti

Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5  
Postbus 552  
2003RN Haarlem  
Paesi Bassi

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
Táncsics Mihály út 82  
H-2100 Gödöllő  
Ungheria

Il foglio illustrativo del medicinale deve riportare il nome e l'indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti in questione.

## **B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI UTILIZZO**

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 4.2).

## **C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

- **Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui l'articolo 107c(7) della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali europei.

## **D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE**

- **Piano di gestione del rischio (RMP)**

Non pertinente.

- **Obbligo di condurre misure post-autorizzative.**

Non pertinente.

**ALLEGATO III**  
**ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO**

## **A. ETICETTATURA**

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO  
SECONDARIO E SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO**

**SCATOLA – 20 mg/0,72 ml**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione  
docetaxel

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I)  
ATTIVO(I)**

Ogni flaconcino di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato contiene 20 mg di docetaxel. Ogni ml di concentrato contiene 27,73 mg di docetaxel.

**3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Flaconcino di concentrato di docetaxel:

polisorbato 80, etanolo anidro (per ulteriori informazioni, leggere il foglio illustrativo)

Flaconcino di solvente:

acqua per preparazioni iniettabili

**4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Concentrato e solvente per soluzione per infusione

Ogni astuccio contiene:

- un flaconcino di 0,72 ml di concentrato (20 mg di docetaxel),
- un flaconcino di 1,28 ml di solvente (acqua per preparazioni iniettabili).

**5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso endovenoso.

ATTENZIONE: è necessaria la diluizione del concentrato utilizzando l'intero contenuto del flaconcino solvente. La soluzione ricostituita deve essere ulteriormente diluita nel diluente per infusione prima della somministrazione.

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

**6 AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE  
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

CITOTOSSICO. Da somministrare sotto il controllo di un medico esperto nell'uso di agenti citotossici



**8. DATA DI SCADENZA**

Scad:

**9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non congelare.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

Flaconcini monodose.

Eliminare nel modo appropriato qualsiasi residuo non utilizzato.

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/09/611/001

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto:

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

**15. ISTRUZIONI PER L'USO****16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

Giustificazione per non apporre il Braille accettata

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI**

PC: { numero }

SN: { numero }  
NN: { numero]

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI**

**ETICHETTA DEL FLACONCINO- CONCENTRATO 20 mg/0,72 ml**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Docetaxel Teva 20 mg/0.72 ml concentrato per soluzione per infusione  
docetaxel  
Usa endovenoso

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**3. DATA DI SCADENZA**

Scad:

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lotto:

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

0,72 ml (Riempimento: 0,88 ml)

**6. ALTRO**

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI**

**ETICHETTA DEL FLACONCINO- SOLVENTE PER 20 mg/0,72 ml**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Solvente per Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**3. DATA DI SCADENZA**

Scad:

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lotto:

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

acqua per preparazioni iniettabili  
1,28 ml (Riempimento: 1,71 ml)

**6. ALTRO**

**INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO E SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO.**

**SCATOLA – 80 mg/2,88 ml**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione  
docetaxel

**2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)**

Ogni flaconcino di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato contiene 80 mg di docetaxel. Ogni ml di concentrato contiene 27,73 mg di docetaxel.

**3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI**

Flaconcino di concentrato di docetaxel:  
polisorbato 80, etanolo anidro (per ulteriori informazioni, leggere il foglio illustrativo).

Flaconcino di solvente:  
acqua per preparazioni iniettabili

**4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO**

Concentrato e solvente per soluzione per infusione  
Ogni astuccio contiene:

- un flaconcino (2,88 ml) di concentrato (80 mg di docetaxel),
- un flaconcino (5,12 ml) di solvente (acqua per preparazioni iniettabili).

**5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso endovenoso.  
ATTENZIONE: è necessaria la diluizione del concentrato utilizzando l'intero contenuto del flaconcino solvente. La soluzione ricostituita deve essere ulteriormente diluita nel diluente per infusione prima della somministrazione.

Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.

**6 AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

**7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO**

CITOTOSSICO. Da somministrare sotto il controllo di un medico esperto nell'uso di agenti citotossici.

**8. DATA DI SCADENZA**

Scad:

**9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.  
Non congelare.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce

**10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE NECESSARIO**

Flaconcini monodose.  
Eliminare nel modo appropriato qualsiasi residuo non utilizzato.

**11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Paesi Bassi

**12. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

EU/1/09/611/002

**13. NUMERO DI LOTTO**

Lotto:

**14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA**

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

**15. ISTRUZIONI PER L'USO****16. INFORMAZIONI IN BRAILLE**

Giustificazione per non apporre il Braille accettata.

**17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE**

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

**18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI**

PC: { numero }  
SN: { numero }  
NN: { numero }

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI**

**ETICHETTA DEL FLACONCINO- CONCENTRATO 80 mg/2,88 ml**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato per soluzione per infusione  
docetaxel  
Usa endovenoso

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**3. DATA DI SCADENZA**

Scad:

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lotto:

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

2,88 ml (Riempimento: 3,40 ml)

**6. ALTRO**



**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI**

**ETICHETTA DEL FLACONCINO- SOLVENTE PER 80 mg/2,88 ml**

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

Solvente per Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml

**2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE**

**3. DATA DI SCADENZA**

Scad:

**4. NUMERO DI LOTTO**

Lotto:

**5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ**

acqua per preparazioni iniettabili  
5,12 ml (Riempimento: 6,29 ml)

**6. ALTRO**

**B. FOGLIO ILLUSTRATIVO**

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione docetaxel

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista ospedaliero o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista ospedaliero o all'infermiere. (Vedere paragrafo 4).

#### **Contenuto di questo foglio**

1. Cos'è Docetaxel Teva e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Docetaxel Teva
3. Come usare Docetaxel Teva
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Docetaxel Teva
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è Docetaxel Teva e a cosa serve**

Il nome di questo farmaco è Docetaxel Teva. Il nome del principio attivo è docetaxel. Docetaxel è una sostanza derivata dalle foglie aghiformi della pianta del tasso e appartiene al gruppo di anti-tumoralici detti tassani.

Docetaxel Teva è stato prescritto dal medico per il trattamento del cancro della mammella, forme particolari di cancro del polmone (cancro del polmone non a piccole cellule), del cancro della prostata, del carcinoma dello stomaco o del cancro del collo e della testa:

- per il trattamento del cancro della mammella avanzato, Docetaxel Teva può essere somministrato da solo o in associazione con doxorubicina, o trastuzumab, o capecitabina.
- per il trattamento del cancro della mammella precoce con o senza coinvolgimento di linfonodi, Docetaxel Teva può essere somministrato in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide.
- per il trattamento del cancro del polmone, Docetaxel Teva può essere somministrato da solo o in associazione con cisplatino.
- per il trattamento del cancro della prostata, Docetaxel Teva viene somministrato in associazione con prednisone o prednisolone.
- per il trattamento del carcinoma dello stomaco metastatico, Docetaxel Teva è somministrato in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile.
- per il trattamento del cancro del collo e della testa, Docetaxel Teva è somministrato in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Docetaxel Teva**

##### **NON deve assumere Docetaxel Teva**

- se è allergico (ipersensibile) al docetaxel o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Docetaxel Teva (elencati al paragrafo 6)
- se la conta dei globuli bianchi risulta troppo bassa
- se soffre di gravi disturbi al fegato.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Prima di ogni trattamento con Docetaxel Teva è necessario effettuare gli esami del sangue necessari a stabilire se le cellule del sangue sono abbastanza numerose e se l'attività del fegato è sufficiente. In caso di alterazioni dei globuli bianchi si possono manifestare anche febbre o infezioni.

Informi immediatamente il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha dolore o dolorabilità addominale, diarrea, emorragia rettale, sangue nelle feci o febbre. Questi sintomi possono essere i primi segni di una grave tossicità gastrointestinale, che può essere fatale. Il medico se ne occuperà immediatamente.

Informi il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha problemi di vista. In caso di problemi di vista, in particolare visione offuscata, deve immediatamente farsi controllare gli occhi e la vista.

Informi il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha avuto una reazione allergica ad una precedente terapia con paclitaxel.

Informi il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha problemi di cuore.

Se lei sviluppa problemi polmonari acuti o se i sintomi già esistenti dovessero peggiorare (febbre, respiro corto o tosse), informi immediatamente il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere. Il medico può interrompere immediatamente il trattamento.

Le sarà chiesto di assumere un trattamento preventivo con corticosteroidi per via orale quale desametasone un giorno prima della somministrazione di Docetaxel Teva e di continuare per uno o due giorni successivi al fine di ridurre alcuni effetti indesiderati che potrebbero insorgere a seguito di infusione di Docetaxel Teva, in particolare reazioni allergiche e ritenzione di liquidi (gonfiore delle mani, dei piedi, delle gambe, o aumento di peso).

Durante il trattamento, potrebbe aver bisogno di altri medicinali per mantenere il numero delle cellule del sangue.

Con Docetaxel Teva sono stati riportati gravi problemi cutanei quali Sindrome di Stevens-Johnson (SJS), Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) e Pustolosi Esantematosa Generalizzata Acuta (AGEP).

- I sintomi della SJS/TEN possono includere vesciche, desquamazione o sanguinamento di una parte qualsiasi della pelle (inclusi labbra, occhi, bocca, naso, genitali, mani o piedi) con o senza rossore. Contemporaneamente potrebbe anche avere sintomi simil-influenzali, quali febbre, brividi o dolore ai muscoli.
- I sintomi dell'AGEP possono includere un rash generalizzato squamoso e arrossato con protuberanze sotto la pelle gonfia (incluse pieghe cutanee, tronco ed estremità superiori) e vesciche accompagnate da febbre.

Se sviluppa gravi reazioni cutanee o una qualsiasi delle reazioni elencate sopra contatti immediatamente il medico o un professionista sanitario.

Prima di iniziare Docetaxel Teva informi il medico, il farmacista dell'ospedale o l'infermiere se ha problemi renali o alti livelli di acido urico nel sangue.

Docetaxel Teva contiene alcol. Informi il medico se soffre di dipendenza da alcol. Vedere anche la sezione "Docetaxel Teva contiene etanolo (alcol)" riportata di seguito.

### **Altri medicinali e Docetaxel Teva**

Informi il medico o farmacista ospedaliero se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica. Questo perché Docetaxel Teva o gli altri farmaci potrebbero non funzionare così come atteso e lei potrebbe essere maggiormente soggetto ad effetti indesiderati.

La quantità di alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Chieda consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.

Docetaxel Teva **NON** deve essere somministrato in gravidanza, a meno che non sia chiaramente indicato dal medico.

Non deve rimanere incinta durante il trattamento con questo farmaco e deve adottare misure contraccettive adeguate durante la terapia perché Docetaxel Teva può essere pericoloso per il bambino. Se durante il trattamento dovesse rimanere incinta, informi immediatamente il medico.

Non deve allattare durante la terapia con Docetaxel Teva.

Se lei è un uomo in trattamento con Docetaxel Teva si consiglia di non procreare durante e fino a 6 mesi dopo il trattamento e di informarsi sulla conservazione dello sperma prima del trattamento poiché docetaxel può alterare la fertilità maschile.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

La quantità di alcol in questo medicinale può compromettere la sua capacità di guidare o usare macchinari. Può avere effetti indesiderati a questo medicinale che possono compromettere la sua capacità di guidare, usare attrezzature o macchinari (vedere paragrafo 4 Possibili effetti indesiderati). Se ciò si dovesse verificare, non guidi, e non usi alcuna attrezzatura o macchinario prima di averne discusso con il medico, l'infermiere o il farmacista ospedaliero.

### **Docetaxel Teva contiene etanolo (alcol)**

Questo medicinale contiene 181 mg di alcol (etanolo anidro) in ogni flaconcino (25,1% (w/w)). La quantità in un flaconcino di questo medicinale è equivalente a meno di 4,6 ml di birra o 1,9 ml di vino. La quantità di alcol in questo medicinale non sembra avere effetto su adulti e adolescenti e i suoi effetti nei bambini non sono evidenti. Potrebbero verificarsi alcuni effetti nei bambini piccoli, per esempio sentirsi assonnati.

L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali.

Se è incinta o sta allattando al seno, parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale.

Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale.

La quantità di alcol in questo medicinale può avere degli effetti sul sistema nervoso centrale (la parte del sistema nervoso che include il cervello e il midollo spinale).

## **3. Come usare Docetaxel Teva**

Docetaxel Teva le sarà somministrato da un operatore sanitario.

### **Dose usuale**

La dosaggio dipenderà dal suo peso e dalle sue condizioni generali di salute. Il medico calcolerà l'area di superficie corporea in metri quadrati (m<sup>2</sup>) e determinerà la dose che dovrà ricevere.

### **Modo e via di somministrazione**

Docetaxel Teva le sarà somministrato tramite infusione endovenosa (uso endovenoso). L'infusione avrà la durata approssimativa di 1 ora e avverrà in ospedale.

### **Frequenza di somministrazione**

L'infusione le verrà normalmente somministrata una volta ogni 3 settimane.

Il medico potrà variare la dose e la frequenza di somministrazione in relazione agli esami del sangue, alle sue condizioni generali e alla sua risposta a Docetaxel Teva. In particolare informi il medico in caso di diarrea, infiammazioni della bocca, senso di intorpidimento, formicolio, febbre, e gli mostri i risultati degli esami del sangue. Tali informazioni gli permetteranno di decidere se è necessaria una

riduzione della dose. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, consulti il medico o il farmacista ospedaliero.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Il medico ne parlerà con lei e le spiegherà i rischi potenziali ed i benefici del trattamento.

Le reazioni avverse, più comunemente segnalate, di Docetaxel Teva da solo sono: diminuzione del numero di globuli rossi o bianchi, perdita dei capelli, nausea, vomito, infiammazioni nella bocca, diarrea e affaticamento.

Se le viene somministrato Docetaxel Teva in associazione con altri agenti chemioterapici la gravità degli effetti indesiderati può aumentare.

Durante l'infusione in ospedale si possono verificare le seguenti reazioni allergiche (**possono manifestarsi in più di 1 persona su 10**):

- vampate, reazioni cutanee, prurito
- senso di costrizione al torace, difficoltà di respiro
- febbre o brividi
- dolore alla schiena
- pressione bassa

Possono presentarsi reazioni più gravi.

Se ha avuto una precedente reazione di ipersensibilità a paclitaxel, può sviluppare anche una reazione di ipersensibilità a docetaxel, che può essere più severa.

Durante il trattamento le sue condizioni verranno attentamente controllate dal personale ospedaliero. Informi immediatamente il personale ospedaliero se nota la comparsa di uno qualsiasi di questi effetti.

Nell'intervallo di tempo che intercorre tra due infusioni di Docetaxel Teva si possono verificare gli effetti indesiderati elencati di seguito, e la frequenza può variare in base ai farmaci in associazione che sta prendendo:

#### **Molto comune (può manifestarsi in più di 1 persona su 10):**

- infezioni, diminuzione del numero di globuli rossi (anemia) o di globuli bianchi (questi ultimi sono importanti nel combattere le infezioni) e delle piastrine
- febbre: in questo caso deve informare il medico immediatamente
- reazioni allergiche come descritte sopra
- perdita di appetito (anoressia)
- insonnia
- sensazione di intorpidimento o formicolio o dolore alle articolazioni o ai muscoli
- mal di testa
- alterazione del senso del gusto
- infiammazione dell'occhio o aumento della lacrimazione dell'occhio
- gonfiore causato da drenaggio linfatico insufficiente
- difficoltà di respirazione
- perdita di muco dal naso; infiammazione della gola e del naso; tosse
- sangue dal naso
- infiammazioni in bocca
- disturbi di stomaco compresi nausea, vomito e diarrea, stipsi
- dolore addominale
- cattiva digestione
- perdita dei capelli (nella maggior parte dei casi la crescita dei capelli torna normale). In alcuni casi (frequenza non nota) è stata osservata perdita dei capelli permanente

- rossore e gonfiore del palmo delle mani o della pianta dei piedi, che può causare desquamazione della cute (questo può anche capitare su braccia, faccia o corpo)
- variazione del colore delle unghie, che possono staccarsi
- dolori muscolari; dolore alla schiena o dolore osseo
- variazioni o assenza del periodo mestruale
- gonfiore di mani, piedi, gambe
- stanchezza o sintomi influenzali
- aumento o perdita di peso
- infezione del tratto respiratorio superiore.

**Comune (può interessare fino ad 1 persona su 10):**

- candidosi orale
- disidratazione
- capogiri
- alterazione dell'udito
- diminuzione della pressione sanguigna; battito cardiaco irregolare o rapido
- insufficienza cardiaca
- esofagite
- secchezza della bocca
- difficoltà o dolore nel deglutire
- emorragia
- aumento degli enzimi del fegato (da cui deriva la necessità di effettuare regolarmente esami del sangue)
- aumento dei livelli di zucchero nel sangue (diabete)
- riduzione del potassio, del calcio e/o del fosfato nel sangue.

**Non comune (può interessare fino ad 1 persona su 100)**

- svenimento
- in sede di iniezione reazioni cutanee, flebite (infiammazione delle vene) o gonfiore
- formazione di coaguli di sangue
- leucemia mieloide acuta e sindrome mielodisplastica (tipi di tumore del sangue) si possono manifestare in pazienti trattati con docetaxel, insieme ad alcuni altri trattamenti antitumorali.

**Raro (può interessare fino a 1 persona ogni 1.000):**

- infiammazione del colon, dell'intestino tenue, che può essere fatale (frequenza non nota); perforazione intestinale.

**Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):**

- patologie interstiziali polmonari (infiammazione polmonare che può causare tosse e difficoltà a respirare. L'infiammazione polmonare può anche svilupparsi quando il trattamento con docetaxel è somministrato in concomitanza con la radioterapia)
- polmonite (infezioni ai polmoni)
- fibrosi polmonare (cicatrizzazione e ispessimento nei polmoni che causano mancanza di respiro)
- visione offuscata dovuta al rigonfiamento della retina all'interno dell'occhio (edema maculare cistoide)
- riduzione di sodio e/o magnesio nel sangue (disturbi dell'equilibrio elettrolitico)
- aritmia ventricolare o tachicardia ventricolare (si manifesta come battiti del cuore rapidi o irregolari, severa mancanza di fiato, capogiri e/o svenimento). Alcuni di questi sintomi possono essere gravi. Se ciò accade, deve informare immediatamente un medico
- reazioni in sede di iniezione in sede di una reazione precedente
- linfoma non Hodgkin (un tumore che colpisce il sistema immunitario) e altri tumori, si possono manifestare in pazienti trattati con docetaxel, insieme ad alcuni altri trattamenti antitumorali
- Sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) (vesciche, desquamazione o sanguinamento di una parte qualsiasi della pelle (inclusi labbra, occhi, bocca, naso, genitali, mani o piedi) con o senza rossore. Contemporaneamente potrebbe anche avere sintomi simil-influenzali, quali febbre, brividi o dolore ai muscoli)

- Pustolosi Esantematosa Generalizzata Acuta (AGEP) (rash generalizzato squamoso e arrossato con protuberanze sotto la pelle gonfia (incluse pieghe cutanee, tronco ed estremità superiori) e vesciche accompagnate da febbre).
- La sindrome da lisi tumorale è una grave condizione rivelata da cambiamenti negli esami del sangue come aumento del livello di acido urico, potassio, fosforo e riduzione del livello di calcio; e provoca sintomi come convulsioni, insufficienza renale (quantità ridotta di urina o urine scure) e disturbi del ritmo cardiaco. In questi casi, è necessario informare immediatamente il medico.
- Miosite (infiammazione dei muscoli - calore, rossore e gonfiore - che produce dolore muscolare e debolezza).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista ospedaliero o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione [riportato nell'Allegato V](#).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Docetaxel Teva**

### **Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**

Questo medicinale non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza riportata sulla confezione, sul blister e sul flaconcino dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non congelare.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.

La soluzione prediluita deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione, anche se è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica di detta soluzione per un periodo di 8 ore se conservata tra +2°C e +8°C o a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C).

La soluzione per infusione deve essere utilizzata entro 4 ore se conservata a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C).

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Docetaxel Teva:**

- Il principio attivo è il docetaxel. Ogni flaconcino di concentrato di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrato contiene 20 mg di docetaxel. Ogni ml di concentrato contiene 27,73 mg di docetaxel.
- Gli eccipienti sono polisorbato 80 e 25,1% (p/p) di etanolo anidro (vedere paragrafo 2).

### **Cosa contiene il flaconcino di solvente:**

Acqua per preparazioni iniettabili.

### **Descrizione dell'aspetto di Docetaxel Teva e contenuto della confezione:**

Docetaxel Teva concentrato per soluzioni per infusione è una soluzione viscosa limpida, di colore da giallo a giallo-bruno.

Ogni astuccio contiene:

- un flaconcino in vetro chiaro da 6 ml con capsula rimovibile contenente 0,72 ml di concentrato e,



- un flaconcino in vetro chiaro da 6 ml con capsula rimovibile contenente 1,28 ml di solvente

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Paesi Bassi

**Produttore:**

Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5  
PO Box 552  
2003 RN Haarlem  
Paesi Bassi

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
Táncsics Mihály út 82  
H-2100 Gödöllő,  
Ungheria

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

**België/Belgique/Belgien**

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG  
Tel/Tél: +32 3 820 73 73

**Lietuva**

UAB Teva Baltics  
Tel: +370 5 266 02 03

**България**

Активис ЕАД  
Тел.: +359 2 489 95 85

**Luxembourg/Luxemburg**

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG  
Tél: +32 3 820 73 73

**Česká republika**

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  
Tel: +420 251 007 111

**Magyarország**

Teva Gyógyszergyár Zrt.  
Tel.: +36 1 288 64 00

**Danmark**

Teva Denmark A/S  
Tlf: +45 44 98 55 11

**Malta**

Teva Pharmaceuticals Ireland  
L-Irlanda  
Tel: +353 19127700

**Deutschland**

Teva GmbH  
Tel: +49 731 402 08

**Nederland**

Teva Nederland B.V.  
Tel: +31 800 0228 400

**Eesti**

UAB Teva Baltics Eesti filiaal  
Tel: +372 661 0801

**Norge**

Teva Norway AS  
Tlf: +47 66 77 55 90

**Ελλάδα**

Specifar A.B.E.E.  
Τηλ: +30 211 880 5000

**Österreich**

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH  
Tel: +43 1 97007 0

**España**

Teva Pharma, S.L.U.  
Tel: +34 91 387 32 80

**Polska**

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 345 93 00

**France**

Teva Santé  
Tél: +33 1 55 91 78 00

**Hrvatska**

Pliva Hrvatska d.o.o  
Tel: + 385 1 37 20 000

**Ireland**

Teva Pharmaceuticals Ireland  
Tel: +353 19127700

**Ísland**

Teva Finland Oy  
Sími: +358 20 180 5900

**Italia**

Teva Italia S.r.l.  
Tel: +39 0289 17981

**Κύπρος**

Specifar A.B.E.E.  
Ελλάδα  
Τηλ: +30 211 880 5000

**Latvija**

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā  
Tel: +371 67 323 666

**Portugal**

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda  
Tel: +351 21 476 75 50

**România**

Teva Pharmaceuticals S.R.L  
Tel: +40 21 230 65 24

**Slovenija**

Pliva Ljubljana d.o.o.  
Tel: +386 1 58 90 390

**Slovenská republika**

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 2 5726 7911

**Suomi/Finland**

Teva Finland Oy  
Puh/Tel: +358 20 180 5900

**Sverige**

Teva Sweden AB  
Tel: +46 42 12 11 00

**United Kingdom**

Teva UK Limited  
Tel: +44 1977 628 500

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il {MM/AAAA}**

**Altre fonti di informazioni**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali: <http://www.ema.europa.eu>

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:

## **GUIDA ALLA PREPARAZIONE DI DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,72 ml CONCENTRATO PER SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE**

---

*È importante che legga l'intera guida prima di preparare sia la soluzione prediluita di Docetaxel Teva che la soluzione per infusione di Docetaxel Teva.*

### **1. FORMULAZIONE**

Docetaxel Teva 20 mg /0,72 ml concentrato per soluzione per infusione è una soluzione limpida, viscosa di colore da giallo a giallo-bruno contenente 27,73 mg/ml di docetaxel in polisorbato 80. Il solvente di Docetaxel Teva è acqua per preparazioni iniettabili.

### **2. PRESENTAZIONE**

Docetaxel Teva è fornito in flaconcini monodose.

Ogni astuccio contiene un flaconcino di Docetaxel Teva (20 mg/0,72 ml) e un flaconcino del corrispondente solvente per Docetaxel Teva in una scatola di cartone.

I flaconcini di Docetaxel Teva devono essere conservati a temperatura non superiore ai 25°C e al riparo dalla luce.

Docetaxel Teva non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flaconcino.

#### **2.1 Flaconcini di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml:**

- Il flaconcino di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml, ha una capacità di 6 ml, è in vetro chiaro con un tappo di gomma bromobutilica e una capsula rimovibile.
- Il flaconcino di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml contiene una soluzione di docetaxel in polisorbato 80 a concentrazione 27,73 mg/ml.
- Ogni flaconcino contiene 20 mg/0,72 ml di soluzione da 27,73 mg/ml di docetaxel in polisorbato 80 (volume di riempimento: 24,4 mg/0,88 ml). Questo volume di riempimento è stato stabilito durante lo sviluppo di docetaxel per compensare la perdita di liquido durante la preparazione della soluzione prediluita dovuta alla formazione di schiuma, all'adesione alle pareti del flaconcino e allo «spazio morto». Questo maggior riempimento assicura che dopo la diluizione con l'intero contenuto del flaconcino di solvente accluso per docetaxel, il volume minimo estraibile di soluzione prediluita sia di 2 ml, contenenti 10 mg/ml di docetaxel, che corrisponde al contenuto dichiarato in etichetta di 20 mg/0,72 ml per flaconcino.

#### **2.2 Flaconcini di solvente di Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml:**

- Il solvente per Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml è contenuto in un flaconcino da 6 ml in vetro chiaro con tappo di gomma bromobutilica e capsula rimovibile.
- Il solvente per Docetaxel Teva è composto da acqua per preparazioni iniettabili.
- Ogni flaconcino di solvente per Docetaxel contiene 1,28 ml di acqua per preparazioni iniettabili (volume di riempimento: 1,71 ml). L'aggiunta dell'intero contenuto del flaconcino di solvente a quello del flaconcino di Docetaxel Teva concentrato per soluzione per infusione assicura l'ottenimento di una soluzione prediluita di 10 mg/ml di docetaxel.

### **3. RACCOMANDAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA**

Docetaxel Teva è un farmaco antineoplastico e, come con altri prodotti potenzialmente tossici, si deve usare cautela nel maneggiarlo e nel prepararne soluzioni. Si raccomanda l'uso di guanti.

Se Docetaxel Teva in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone. Se Docetaxel Teva in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con membrane mucose, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.

### **4. PREPARAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA**

#### **4.1 Preparazione della soluzione prediluita di Docetaxel Teva (10 mg di docetaxel/ml)**

- 4.1.1 Se i flaconcini sono conservati in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C) per 5 minuti il numero richiesto di scatole di Docetaxel Teva.
- 4.1.2 Usando una siringa graduata con un ago, in asepsi aspirare l'intero contenuto del flaconcino di solvente per Docetaxel Teva capovolgendo parzialmente il flaconcino.
- 4.1.3 Iniettare l'intero contenuto della siringa nel corrispondente flaconcino di Docetaxel Teva.
- 4.1.4 Rimuovere la siringa e l'ago e mescolare la soluzione manualmente capovolgendo ripetutamente per 45 secondi. Non agitare.
- 4.1.5 Lasciare riposare il flaconcino di soluzione prediluita per 5 minuti a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C) e quindi controllare che la soluzione risulti chiara e omogenea. (La formazione di schiuma è normale anche dopo 5 minuti a causa del contenuto di polisorbato 80 nella formulazione).

La soluzione prediluita contiene 10 mg/ml di docetaxel e deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione, anche se è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica di detta soluzione per un periodo di 8 ore se conservata tra +2°C e +8°C o a temperatura ambiente (sotto i 25°C).

---

#### **4.2 Preparazione della soluzione per infusione**

- 4.2.1 Per ottenere la dose richiesta per il paziente possono essere necessari più flaconcini di soluzione prediluita. Sulla base della dose necessaria per il paziente espressa in mg, prelevare in asepsi il volume corrispondente di soluzione prediluita contenente 10 mg/ml di docetaxel da un numero appropriato di flaconcini per mezzo di una siringa graduata con ago. Ad esempio per una dose di 140 mg di docetaxel si devono prelevare 14 ml di soluzione prediluita di docetaxel.
- 4.2.2 Iniettare il volume necessario di soluzione prediluita in una sacca non-PVC di 250 ml contenenti una soluzione glucosata al 5% o per infusione di 9 mg/ml di sodio cloruro (0,9%). Nel caso in cui sia necessaria una dose di docetaxel superiore a 200 mg, utilizzare un volume maggiore di soluzione per infusione in modo che la concentrazione di docetaxel non superi 0,74 mg/ml.
- 4.2.3 Mescolare manualmente la sacca o il flacone con movimento rotatorio.
- 4.2.4 La soluzione per infusione di Docetaxel Teva deve essere utilizzata entro 4 ore e deve essere somministrata sotto forma di infusione della durata di 1 ora, in asepsi, a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C) ed in normali condizioni di luce.
- 4.2.5 Come per tutti i prodotti per uso parenterale, la soluzione prediluita e la soluzione infusoriale di Docetaxel Teva deve essere esaminata visivamente prima dell'uso, le

---

soluzioni contenenti precipitati devono essere eliminate.

## **5. MODALITÀ DI ELIMINAZIONE**

Tutti i dispositivi che sono stati utilizzati per diluire o somministrare Docetaxel Teva devono essere trattati in accordo con le procedure standard. Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato e solvente per soluzione per infusione  
**docetaxel**

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista ospedaliero o all'infermiere.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista ospedaliero o all'infermiere. (Vedere paragrafo 4).

### Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Docetaxel Teva e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Docetaxel Teva
3. Come usare Docetaxel Teva
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Docetaxel Teva
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### 1. Cos'è Docetaxel Teva e a cosa serve

Il nome di questo farmaco è Docetaxel Teva. Il nome del principio attivo è docetaxel.

Docetaxel è una sostanza derivata dalle foglie aghiformi della pianta del tasso e appartiene al gruppo di anti-tumorali detti tassani.

Docetaxel Teva è stato prescritto dal medico per il trattamento del cancro della mammella, forme particolari di cancro del polmone (cancro del polmone non a piccole cellule), del cancro della prostata, del carcinoma dello stomaco o del cancro del collo e della testa:

- per il trattamento del cancro della mammella avanzato, Docetaxel Teva può essere somministrato da solo o in associazione con doxorubicina, o trastuzumab, o capecitabina.
- per il trattamento del cancro della mammella precoce con o senza coinvolgimento di linfonodi, Docetaxel Teva può essere somministrato in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide.
- per il trattamento del cancro del polmone, Docetaxel Teva può essere somministrato da solo o in associazione con cisplatino.
- per il trattamento del cancro della prostata, Docetaxel Teva viene somministrato in associazione con prednisone o prednisolone.
- per il trattamento del carcinoma dello stomaco metastatico, Docetaxel Teva è somministrato in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile.
- per il trattamento del cancro del collo e della testa, Docetaxel Teva è somministrato in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile.

### 2. Che cosa deve sapere prima di usare Docetaxel Teva

#### NON deve assumere Docetaxel Teva

- se è allergico (ipersensibile) al docetaxel o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Docetaxel Teva (elencati al paragrafo 6)
- se la conta dei globuli bianchi risulta troppo bassa
- se soffre di gravi disturbi al fegato

#### Avvertenze e precauzioni

Prima di ogni trattamento con Docetaxel Teva è necessario effettuare gli esami del sangue necessari a stabilire se le cellule del sangue sono abbastanza numerose e se l'attività del fegato è. In caso di alterazioni dei globuli bianchi si possono manifestare anche febbre o infezioni.

Informi immediatamente il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha dolore o dolorabilità addominale, diarrea, emorragia rettale, sangue nelle feci o febbre. Questi sintomi possono essere i primi segni di una grave tossicità gastrointestinale, che può essere fatale. Il medico se ne occuperà immediatamente.

Informi il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha problemi di vista. In caso di problemi di vista, in particolare visione offuscata, deve immediatamente farsi controllare gli occhi e la vista.

Informi il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha avuto una reazione allergica ad una precedente terapia con paclitaxel.

Informi il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere se ha problemi di cuore.

Se lei sviluppa problemi polmonari acuti o se i sintomi già esistenti dovessero peggiorare (febbre, respiro corto o tosse), informi immediatamente il medico, il farmacista ospedaliero o l'infermiere. Il medico potrebbe interrompere immediatamente il trattamento.

Le sarà chiesto di assumere un trattamento preventivo con corticosteroidi per via orale quale desametasone un giorno prima della somministrazione di Docetaxel Teva e di continuare per uno o due giorni successivi al fine di ridurre alcuni effetti indesiderati che potrebbero insorgere a seguito di infusione di Docetaxel Teva, in particolare reazioni allergiche e ritenzione di liquidi (gonfiore delle mani, dei piedi, delle gambe, o aumento di peso).

Durante il trattamento, potrebbe aver bisogno di altri medicinali per mantenere il numero delle cellule del sangue.

Con Docetaxel Teva sono stati riportati gravi problemi cutanei quali Sindrome di Stevens-Johnson (SJS), Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) e Pustolosi Esantematosa Generalizzata Acuta (AGEP).

- I sintomi della SJS/TEN possono includere vesciche, desquamazione o sanguinamento di una parte qualsiasi della pelle (inclusi labbra, occhi, bocca, naso, genitali, mani o piedi) con o senza rossore. Contemporaneamente potrebbe anche avere sintomi simil-influenzali, quali febbre, brividi o dolore ai muscoli.
- I sintomi dell'AGEP possono includere un rash generalizzato squamoso e arrossato con protuberanze sotto la pelle gonfia (incluse pieghe cutanee, tronco ed estremità superiori) e vesciche accompagnate da febbre.

Se sviluppa gravi reazioni cutanee o una qualsiasi delle reazioni elencate sopra contatti immediatamente il medico o un professionista sanitario.

Prima di iniziare Docetaxel Teva informi il medico, il farmacista dell'ospedale o l'infermiere se ha problemi renali o alti livelli di acido urico nel sangue.

Docetaxel Teva contiene alcol. Informi il medico se soffre di dipendenza da alcol. Vedere anche la sezione "Docetaxel Teva contiene etanolo (alcol)" riportata qui di seguito.

### **Altri medicinali e Docetaxel Teva**

Informi il medico o farmacista ospedaliero se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica. Questo perché Docetaxel Teva o gli altri farmaci potrebbero non funzionare così come atteso e lei potrebbe essere maggiormente soggetto ad effetti indesiderati.

La quantità di alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali.

### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

Chieda consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.

Docetaxel Teva NON deve essere somministrato in gravidanza, a meno che non sia chiaramente indicato dal suo medico.

Non deve rimanere incinta durante il trattamento con questo farmaco e deve adottare misure contraccettive adeguate durante la terapia perché Docetaxel Teva può essere pericoloso per il bambino. Se durante il trattamento dovesse rimanere incinta, informi immediatamente il medico.

Non deve allattare durante il terapia con Docetaxel Teva.

Se lei è un uomo in trattamento con Docetaxel Teva si consiglia di non procreare durante e fino a 6 mesi dopo il trattamento e di informarsi sulla conservazione dello sperma prima del trattamento poiché docetaxel può alterare la fertilità maschile.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

La quantità di alcol in questo medicinale può compromettere la sua capacità di guidare o usare macchinari. Può avere effetti indesiderati a questo medicinale che possono compromettere la sua capacità di guidare, usare attrezzature o macchinari (vedere paragrafo 4 Possibili effetti indesiderati). Se ciò si dovesse verificare, non guidi, e non usi alcuna attrezzatura o macchinario prima di averne discusso con il medico, l'infermiere o il farmacista ospedaliero.

### **Docetaxel Teva contiene etanolo (alcol)**

Questo medicinale contiene 723 mg di alcol (etanolo anidro) in ogni flaconcino (25,1% (w/w)). La quantità in un flaconcino di questo medicinale è equivalente a meno di 18,3 ml di birra o 7,6 ml di vino.

La quantità di alcol in questo medicinale non sembra avere effetto su adulti e adolescenti e i suoi effetti nei bambini non sono evidenti. Potrebbero verificarsi alcuni effetti nei bambini piccoli, per esempio sentirsi assonnati.

L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali.

Se è incinta o sta allattando al seno, parli con il medico o il farmacista prima di assumere questo medicinale.

Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale.

La quantità di alcol in questo medicinale può avere degli effetti sul sistema nervoso centrale (la parte del sistema nervoso che include il cervello e il midollo spinale).

Questo medicinale contiene piccole quantità di etanolo (alcol) inferiori a 100 mg per dose.

## **3. Come usare Docetaxel Teva**

Docetaxel Teva le sarà somministrato da un operatore sanitario.

### **Dose usuale**

Il dosaggio dipenderà dal suo peso e dalle sue condizioni generali di salute. Il medico calcolerà l'area di superficie corporea in metri quadrati (m<sup>2</sup>) e determinerà la dose che dovrà ricevere.

### **Modo e via di somministrazione**

Docetaxel Teva le sarà somministrato tramite infusione endovenosa (uso endovenoso). L'infusione avrà la durata approssimativa di 1 ora e avverrà in ospedale.

### **Frequenza di somministrazione**

L'infusione le verrà normalmente somministrata una volta ogni 3 settimane.

Il medico potrà variare la dose e la frequenza di somministrazione in relazione agli esami del sangue, alle sue condizioni generali e alla sua risposta a Docetaxel Teva. In particolare informi il medico in caso di diarrea, infiammazioni della bocca, senso di intorpidimento, formicolio, febbre, e gli mostri i



risultati degli esami del sangue. Tali informazioni gli permetteranno di decidere se è necessaria una riduzione della dose. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, consulti il medico o il farmacista ospedaliero.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Il medico ne parlerà con lei e le spiegherà i rischi potenziali ed i benefici del trattamento.

Le reazioni avverse, più comunemente segnalate, di Docetaxel Teva da solo sono: diminuzione del numero di globuli rossi o bianchi, perdita dei capelli, nausea, vomito, infiammazioni nella bocca, diarrea e affaticamento.

Se le viene somministrato Docetaxel Teva in associazione con altri agenti chemioterapici la gravità degli effetti indesiderati può aumentare.

Durante l'infusione in ospedale si possono verificare le seguenti reazioni allergiche (**possono manifestarsi in più di 1 persona su 10**):

- vampate, reazioni cutanee, prurito
- senso di costrizione al torace, difficoltà di respiro
- febbre o brividi
- dolore alla schiena
- pressione bassa.

Possono presentarsi reazioni più gravi.

Se ha avuto una precedente reazione di ipersensibilità a paclitaxel, può sviluppare anche una reazione di ipersensibilità a docetaxel, che può essere più severa.

Durante il trattamento le sue condizioni verranno attentamente controllate dal personale ospedaliero. Informi immediatamente il personale ospedaliero se nota la comparsa di uno qualsiasi di questi effetti.

Nell'intervallo di tempo che intercorre tra due infusioni di Docetaxel Teva si possono verificare gli effetti indesiderati elencati di seguito, e la frequenza può variare in base ai medicinali in associazione che sta prendendo:

**Molto comune (può manifestarsi in più di 1 persona su 10):**

- infezioni, diminuzione del numero di globuli rossi (anemia) o di globuli bianchi (questi ultimi sono importanti nel combattere le infezioni) e delle piastrine,
- febbre: in questo caso deve informare il medico immediatamente
- reazioni allergiche come descritte sopra
- perdita di appetito (anoressia)
- insonnia
- sensazione di intorpidimento o formicolio o dolore alle articolazioni o ai muscoli
- mal di testa
- alterazione del senso del gusto
- infiammazione dell'occhio o aumento della lacrimazione dell'occhio
- gonfiore causato da drenaggio linfatico insufficiente
- difficoltà di respirazione
- perdita di muco dal naso; infiammazione della gola e del naso; tosse
- sangue dal naso
- infiammazioni in bocca
- disturbi di stomaco compresi nausea, vomito e diarrea, stipsi
- dolore addominale
- cattiva digestione
- perdita dei capelli (nella maggior parte dei casi la crescita dei capelli torna normale). In alcuni

- casi (frequenza non nota) è stata osservata perdita dei capelli permanente.
- rossore e gonfiore del palmo delle mani o della pianta dei piedi, che può causare desquamazione della cute (questo può anche capitare su braccia, faccia o corpo)
- variazione del colore delle unghie, che possono staccarsi
- dolori muscolari; dolore alla schiena o dolore osseo
- variazioni o assenza del periodo mestruale
- gonfiore di mani, piedi, gambe
- stanchezza o sintomi influenzali
- aumento o perdita di peso
- infezione del tratto respiratorio superiore

**Comune (può interessare fino ad 1 persona su 10)**

- candidosi orale
- disidratazione
- capogiri
- alterazione dell'udito
- diminuzione della pressione sanguigna; battito cardiaco irregolare o rapido
- insufficienza cardiaca
- esofagite
- secchezza della bocca
- difficoltà o dolore nel deglutire
- emorragia
- aumento degli enzimi del fegato (da cui deriva la necessità di effettuare regolarmente esami del sangue)
- aumento dei livelli di zucchero nel sangue (diabete)
- riduzione del potassio, del calcio e/o del fosfato nel sangue

**Non comune (può interessare fino ad 1 persona su 100)**

- svenimento
- in sede di iniezione reazioni cutanee, flebite (infiammazione delle vene) o gonfiore
- formazione coaguli di sangue
- leucemia mieloide acuta e sindrome mielodisplastica (tipi di tumore del sangue) si possono manifestare in pazienti trattati con docetaxel, insieme ad alcuni altri trattamenti antitumorali.

**Raro (può interessare fino a 1 persona ogni 1.000):**

- infiammazione del colon, dell'intestino tenue, che può essere fatale (frequenza non nota); perforazione intestinale.

**Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):**

- patologie interstiziali polmonari (infiammazione polmonare che può causare tosse e difficoltà a respirare. L'infiammazione polmonare può anche svilupparsi quando il trattamento con docetaxel è somministrato in concomitanza con la radioterapia)
- polmonite (infezioni ai polmoni)
- fibrosi polmonare (cicatizzazione e ispessimento nei polmoni che causano mancanza di respiro)
- visione offuscata dovuta al rigonfiamento della retina all'interno dell'occhio (edema maculare cistoide)
- riduzione di sodio e/o magnesio nel sangue (disturbi dell'equilibrio elettrolitico).
- aritmia ventricolare o tachicardia ventricolare (si manifesta come battiti del cuore rapidi o irregolari, severa mancanza di fiato, capogiri e/o svenimento). Alcuni di questi sintomi possono essere gravi. Se ciò accade, deve informare immediatamente un medico
- reazioni in sede di iniezione in sede di una reazione precedente
- linfoma non Hodgkin (un tumore che colpisce il sistema immunitario) e altri tumori, si possono manifestare in pazienti trattati con docetaxel, insieme ad alcuni altri trattamenti antitumorali
- Sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e Necrolisi Epidermica Tossica (TEN) (vesciche, desquamazione o sanguinamento di una parte qualsiasi della pelle (inclusi labbra, occhi, bocca,

- naso, genitali, mani o piedi) con o senza rossore. Contemporaneamente potrebbe anche avere sintomi simil-influenzali, quali febbre, brividi o dolore ai muscoli)
- Pustolosi Esantematoso Generalizzato Acuto (AGEP) (rash generalizzato squamoso e arrossato con protuberanze sotto la pelle gonfia (incluse pieghe cutanee, tronco ed estremità superiori) e vesciche accompagnate da febbre).
  - La sindrome da lisi tumorale è una grave condizione rivelata da cambiamenti negli esami del sangue come aumento del livello di acido urico, potassio, fosforo e riduzione del livello di calcio; e provoca sintomi come convulsioni, insufficienza renale (quantità ridotta di urina o urine scure) e disturbi del ritmo cardiaco. In questi casi, è necessario informare immediatamente il medico.
  - Miosite (infiammazione dei muscoli - calore, rossore e gonfiore - che produce dolore muscolare e debolezza).

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista ospedaliero o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione **riportato nell'Allegato V**. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Docetaxel Teva**

### **Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**

Questo medicinale non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza riportata sulla confezione, sul blister e sul flaconcino dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non congelare.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.

La soluzione prediluita deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione, anche se è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica di detta soluzione per un periodo di 8 ore se conservata tra +2°C e +8°C o a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C).

La soluzione per infusione deve essere utilizzata entro 4 ore se conservata a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C).

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Docetaxel Teva:**

- Il principio attivo è il docetaxel. Ogni flaconcino di concentrato di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato contiene 80 mg di docetaxel. Ogni ml di concentrato contiene 27,73 mg di docetaxel.
- Gli eccipienti sono polisorbato 80 e 25,1% (p/p) di etanolo anidro (vedere paragrafo 2).

### **Cosa contiene il flaconcino di solvente:**

Acqua per preparazioni iniettabili.

### **Descrizione dell'aspetto di Docetaxel Teva e contenuto della confezione:**

Docetaxel Teva concentrato per soluzioni per infusione è una soluzione viscosa limpida, di colore da giallo a giallo-bruno.

Ogni astuccio contiene:

- un flaconcino in vetro chiaro da 15 ml con capsula rimovibile contenente 2,88 ml di concentrato e,
- un flaconcino in vetro chiaro da 15 ml con capsula rimovibile contenente 5,12 ml di solvente

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Paesi Bassi

**Produttore:**

Pharmachemie B.V.  
Swensweg 5  
PO Box 552  
2003 RN Haarlem  
Paesi Bassi

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
Táncsics Mihály út 82  
H-2100 Gödöllő,  
Ungheria

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

**België/Belgique/Belgien**

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG  
Tel/Tél: +32 3 820 73 73

**Lietuva**

UAB Teva Baltics  
Tel: +370 5 266 02 03

**България**

Активис ЕАД  
Тел.: +359 2 489 95 85

**Luxembourg/Luxemburg**

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG  
Tél: +32 3 820 73 73

**Česká republika**

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.  
Tel: +420 251 007 111

**Magyarország**

Teva Gyógyszergyár Zrt.  
Tel.: +36 1 288 64 00

**Danmark**

Teva Denmark A/S  
Tlf: +45 44 98 55 11

**Malta**

Teva Pharmaceuticals Ireland  
L-Irlanda  
Tel: +353 19127700

**Deutschland**

Teva GmbH  
Tel: +49 731 402 08

**Nederland**

Teva Nederland B.V.  
Tel: +31 800 0228 400

**Eesti**

UAB Teva Baltics Eesti filiaal  
Tel: +372 661 0801

**Norge**

Teva Norway AS  
Tlf: +47 66 77 55 90

**Ελλάδα**

Specifar A.B.E.E.  
Τηλ: +30 211 880 5000

**Österreich**

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH  
Tel: +43 1 97007 0

**España**

Teva Pharma, S.L.U.  
Tel: +34 91 387 32 80

**France**

Teva Santé  
Tél: +33 1 55 91 78 00

**Hrvatska**

Pliva Hrvatska d.o.o  
Tel: + 385 1 37 20 000

**Ireland**

Teva Pharmaceuticals Ireland  
Tel: +353 19127700

**Ísland**

Teva Finland Oy  
Sími: +358 20 180 5900

**Italia**

Teva Italia S.r.l.  
Tel: +39 0289 17981

**Κύπρος**

Specifar A.B.E.E.  
Ελλάδα  
Τηλ: +30 211 880 5000

**Latvija**

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā  
Tel: +371 67 323 666

**Polska**

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 345 93 00

**Portugal**

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda  
Tel: +351 21 476 75 50

**România**

Teva Pharmaceuticals S.R.L  
Tel: +40 21 230 65 24

**Slovenija**

Pliva Ljubljana d.o.o.  
Tel: +386 1 58 90 390

**Slovenská republika**

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 2 5726 7911

**Suomi/Finland**

Teva Finland Oy  
Puh/Tel: +358 20 180 5900

**Sverige**

Teva Sweden AB  
Tel: +46 42 12 11 00

**United Kingdom**

Teva UK Limited  
Tel: +44 1977 628 500

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'ultima volta il {MM/AAAA}**

**Altre fonti di informazioni**

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia europea dei medicinali: <http://www.ema.europa.eu>

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:

## **GUIDA ALLA PREPARAZIONE DI DOCETAXEL TEVA 80 mg/2,88 ml CONCENTRATO E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE**

---

*È importante che legga l'intera guida prima di preparare sia la soluzione prediluita di Docetaxel Teva che la soluzione per infusione di Docetaxel Teva.*

### **1. FORMULAZIONE**

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml concentrato per soluzione per infusione è una soluzione limpida, viscosa di colore da giallo a giallo-bruno contenente 27,73 mg/ml di docetaxel in polisorbato 80. Il solvente di Docetaxel Teva è acqua per preparazioni iniettabili.

### **2. PRESENTAZIONE**

Docetaxel Teva è fornito in flaconcini monodose.

Ogni astuccio contiene un flaconcino di Docetaxel Teva (80 mg/2,88 ml) e un flaconcino del corrispondente solvente per Docetaxel Teva in una scatola di cartone.

I flaconcini di Docetaxel Teva devono essere conservati a temperatura non superiore ai 25°C. e al riparo dalla luce.

Docetaxel Teva non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flaconcino.

#### **2.1 Flaconcini di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml:**

- Il flaconcino di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml, ha una capacità di 15 ml, è in vetro chiaro con un tappo di gomma bromobutilica e una capsula rimovibile.
- Il flaconcino di Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml contiene una soluzione di docetaxel in polisorbato 80 a concentrazione 27,73 mg/ml.

Ogni flaconcino contiene 80 mg/2,88 ml di soluzione da 27,73 mg/ml di docetaxel in polisorbato 80 (volume di riempimento: 94,4 mg/3,40 ml). Questo volume di riempimento è stato stabilito durante lo sviluppo di docetaxel per compensare la perdita di liquido durante la preparazione della soluzione prediluita dovuta alla formazione di schiuma, all'adesione alle pareti del flaconcino e allo «spazio morto». Questo maggior riempimento assicura che dopo la diluizione con l'intero contenuto del flaconcino di solvente accluso per docetaxel, il volume minimo estraibile di soluzione prediluita sia di 8 ml, contenenti 10 mg/ml di docetaxel, che corrisponde al contenuto dichiarato in etichetta di 80 mg/2,88 ml per flaconcino.

#### **2.2 Flaconcini di solvente di Docetaxel Teva 80mg/2,88 ml:**

- Il solvente per Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml è contenuto in un flaconcino da 15 ml in vetro chiaro con tappo di gomma bromobutilica e capsula rimovibile.
- Il solvente per Docetaxel Teva è composto da acqua per preparazioni iniettabili.
- Ogni flaconcino di solvente per Docetaxel contiene 5,12 ml di acqua per preparazioni iniettabili (volume di riempimento: 6,29 ml). L'aggiunta dell'intero contenuto del flaconcino di solvente a quello del flaconcino di Docetaxel Teva 80 mg concentrato per soluzione per infusione assicura l'ottenimento di una soluzione prediluita di 10 mg/ml di docetaxel.

### **3. RACCOMANDAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA**

Docetaxel Teva è un farmaco antineoplastico e, come con altri prodotti potenzialmente tossici, si deve usare cautela nel maneggiarlo e nel prepararne soluzioni. Si raccomanda l'uso di guanti.

Se Docetaxel Teva in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone. Se Docetaxel Teva in forma concentrata, prediluita o in soluzione per infusione dovesse entrare in contatto con membrane mucose, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.

### **4. PREPARAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA**

#### **4.1 Preparazione della soluzione prediluita di Docetaxel Teva (10 mg di docetaxel/ml)**

- 4.1.1 Se i flaconcini sono conservati in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C) per 5 minuti il numero richiesto di scatole di Docetaxel Teva.
- 4.1.2 Usando una siringa graduata con un ago, in asepsi aspirare l'intero contenuto del flaconcino di solvente per Docetaxel Teva capovolgendo parzialmente il flaconcino.
- 4.1.3 Iniettare l'intero contenuto della siringa nel corrispondente flaconcino di Docetaxel Teva.
- 4.1.4 Rimuovere la siringa e l'ago e mescolare la soluzione manualmente capovolgendo ripetutamente per 45 secondi. Non agitare.
- 4.1.5 Lasciare riposare il flaconcino di soluzione prediluita per 5 minuti a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C) e quindi controllare che la soluzione risulti chiara e omogenea. (La formazione di schiuma è normale anche dopo 5 minuti a causa del contenuto di polisorbato 80 nella formulazione).

La soluzione prediluita contiene 10 mg/ml di docetaxel e deve essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione, anche se è stata dimostrata la stabilità chimico-fisica di detta soluzione per un periodo di 8 ore se conservata tra +2°C e +8°C o a temperatura ambiente (sotto i 25°C).

---

#### **4.2 Preparazione della soluzione per infusione**

- 4.2.1 Per ottenere la dose richiesta per il paziente possono essere necessari più flaconcini di soluzione prediluita. Sulla base della dose necessaria per il paziente espressa in mg, prelevare in asepsi il volume corrispondente di soluzione prediluita contenente 10 mg/ml di docetaxel da un numero appropriato di flaconcini per mezzo di una siringa graduata con ago. Ad esempio per una dose di 140 mg di docetaxel si devono prelevare 14 ml di soluzione prediluita di docetaxel.
- 4.2.2 Iniettare il volume necessario di soluzione prediluita in una sacca non-PVC di 250 ml contenenti una soluzione glucosata al 5% o per infusione di 9mg/ml di sodio cloruro (0,9%). Nel caso in cui sia necessaria una dose di docetaxel superiore a 200 mg, utilizzare un volume maggiore di soluzione per infusione in modo che la concentrazione di docetaxel non superi 0,74 mg/ml.
- 4.2.3 Mescolare manualmente la sacca o il flacone con movimento rotatorio.
- 4.2.4 La soluzione per infusione di Docetaxel Teva deve essere utilizzata entro 4 ore e deve essere somministrata sotto forma di infusione della durata di 1 ora, in asepsi, a temperatura ambiente (inferiore ai 25°C) ed in normali condizioni di luce.
- 4.2.5 Come per tutti i prodotti per uso parenterale, la soluzione prediluita e la soluzione infusionale di Docetaxel Teva deve essere esaminata visivamente prima dell'uso, le

---

soluzioni contenenti precipitati devono essere eliminate.

## **5. MODALITÀ DI ELIMINAZIONE**

Tutti i dispositivi che sono stati utilizzati per diluire o somministrare Docetaxel Teva devono essere trattati in accordo con le procedure standard. Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.