

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

Episalvan għell

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 g ta' ġell fiha: 100 mg ta' estratt (bħala estratt niexef, raffinat) mill-qoxra tal-betula minn *Betula pendula* Roth, *Betula pubescens* Ehrh. kif ukoll minn ibridi taż-żewġ speċi (ekwivalenti għal 0.5-1.0 g ta' qoxra tal-betula), li jikkorrespondu għal 72-88 mg betulin.

Solvent ta' estrazzjoni n-Heptane

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAČEWTIKA

Ġell.

Bla kulur għal kemxejn safrani, opalexxtenti.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura ta' ġrieħi ta' ħxuna parzjali fl-adulti. Ara sezzjoni 4.4 u 5.1 rigward it-tip ta' ġrieħi studjati.

4.2 Pożologija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożologija

Il-ġell għandu jiġi applikat fuq wiċċi il-gerħa fi ħxuna ta' madwar 1 mm u għandu jitgħatta b'garża sterili ghall-ġrieħi. Il-ġell għandu jerġa' jiġi applikat ma' kull darba li l-garża għall-ġrieħi tinbidel, sakemm il-ġerħa tfieq, sa 4 ġimħat (ara sezzjoni 4.4 “daqs tal-gerħa” u “dewmien tal-użu”).

Popolazzjonijiet specjali

Indeboliment renali u epatiku

Ma twettaq ebda studju b'Episalvan f'pazjenti b'indeboliment renali u epatiku. M'huwa mistenni l-ebda aġġustament tad-doża jew kunsiderazzjoni speċjali għal pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani

M'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċċja ta' Episalvan fit-tfal u l-adolexxenti taħbi it-18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għal applikazzjoni fuq il-ġilda.

Ġrieħi friski għandhom jilħqu emostażi qabel ma jiġi applikat Episvalan. Jekk hemm bżonn, il-ġrieħi (ġrieħi aċċidentalji) għandhom jitnaddfu skont il-proċedura standard, bl-użu ta' eż. soluzzjoni antisettika tal-ġrieħi, qabel ma jiġi applikat Episalvan.

Episalvan għandu jintuża darba biss.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjent elenkat fis-sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet ghall-użu

Infezzjonijiet fil-ġrieħi

Episalvan ġell hu sterili. Madankollu, l-infezzjoni tal-ġrieħi hija kumplikazzjoni importanti u serja li tista' sseħħi waqt li l-gerħa tkun qed tfieq. F'każ ta' infezzjoni, huwa rrakkommandat li l-kura b'Episalvan titwaqqaf. Kura oħra standard tista' tkun meħtieġa (ara sezzjoni 4.5).

Daqs tal-ġerħa

Id-daqs medju tal-ġerħa kkurata b'Episalvan fi studji kliniči fi ġrieħi ta' grafts tal-ġilda tas-sit tad-donatur fi ħxuna maqsuma kien ta' 40.7 cm² (medda 8-300 cm²). Fl-istudju Grad 2a dwar il-ġrieħi tal-ħruq, id-daqs medju tal-ġrieħi ikkurati b'Episalvan kien ta' 108 cm² (range 23-395 cm²).

Tul ta' żmien tal-użu

Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli fuq l-użu kliniku ta' Episalvan għal aktar minn 4 ġimħat.

Ġrieħi tal-ħruq bi ħxuna parżjali

Valutazzjoni kritika ripetuta tal-profondità tal-ħruq u tal-progress tal-fejqan hija meħtieġa. Ġrieħi li huma meqjusin li ma jistgħux ifiequ fi żmien qafas ta' żmien aċċettabbli jiusta' jkollhom bżonn miżuri kirurgici (eż. trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma) biex jitnaqqas ir-riskju ta' cikatriċi ipertrofika.

Tipi oħra ta' ġrieħi

Ma hemm l-ebda esperjenza klinika mill-użu ta' Episalvan ghall-kura ta' ġrieħi kronici, eż. ulċeri dijabetici tas-sieq, ulċeri venuži tar-rigel jew ġrieħi f'pazjenti b'epidermolysis bullosa.

Allergija għal għabrab tad-dakra tal-betula

Episalvan huwa sikur ghall-użu minn persuni li huma allergici għall-ġhabra tad-dakra tal-betula, minħabba li dawn l-allerġeni mhumiex preżenti f'Episalvan.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta' interazzjoni. Minħabba li l-esponent sistematiku ta' Episalvan wara l-applikazzjoni fuq il-ġilda huwa negliġibbli, l-ebda interazzjoni ma' kuri sistematici mhu mistenni. Interazzjonijiet ma' prodotti topiċi ma gewx investigati fi provi kliniči. Prodotti topiċi oħrajn ma għandhomx jintużaw flimkien ma' Episalvan imma b'mod sekwenzjali jew alternattivament skont il-ħtieġa klinika.

4.6 Fertility, tqala u treddiġi

Tqala

Ma twettaq l-ebda studju f'nisa tqal.

Mhumiex anticipati effetti matul it-tqala, peress li l-esponiment sistemiku huwa negligibbli. Episalvan jista' jintuża waqt it-tqala.

Treddiġħ

Mhemmx tagħrif disponibbli biex jiġi evalwat jekk Episalvan jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem.

L-ebda effett fuq it-tarbija tat-tweliż/tarbija misqija bit-treddiġħ mhuwa previst billi l-esponiment sistemiku ġhal Episalvan tan-nisa li jreddgħu huwa negligibbli. Episalvan jista' jintuża waqt it-treddiġħ, sakemm l-erja tas-sider mhijiex soġġetta għall-kura.

Fertilità

Ma sarux studji ta' fertilità. Mhumiex anticipati effetti matul it-tqala, peress li l-esponiment sistematiku huwa negligibbli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u thaddem magni

Episalvan ma għandu l-ebda effett jew ffit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u thaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi osservati b'mod frekwenti kienu kumplikazzjoni tal-gerħa (fi 2.9% tal-pazjenti), uġiġħi tal-ġilda (2.5%) u prurite (1.3%). Ir-reazzjonijiet avversi kienu reazzjonijiet tal-post mnejn jingħata biss. Reazzjonijiet avversi tal-kumplikazzjoni tal-gerħa bħal infezzjoni tal-gerħa u nekroži tal-gerħa huma kumplikazzjonijiet tal-fejqan ta' għriehi tal-ġilda bi ħxuna parżjali u jistgħu jkunu serji (ara sezzjoni 4.4).

Lista f'tabbera tar-reazzjonijiet avversi

Fit-tabbera li jmiss, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkti permezz tas-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u t-terminu ppreferut. F'kull grupp ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla bl-aktar serju l-ewwel segwit minn dawk anqas serji.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita kif ġej: komuni ħafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), rari ħafna ($< 1/10,000$), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi rrapporati fi provi kliniči

| Sistema tal-klassifika tal-organi | Komuni | Mhux komuni |
|--|---------------------------|------------------------|
| Infezzjoni u infestazzjoni | | Infezzjoni fil-ġriehi |
| Disturbi fis-sistema immuni | | Sensittività eċċessiva |
| Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda | Uġiġħ tal-ġilda | Dermatite |
| | Prurite | Raxx pruritiku |
| | | Purpura |
| Disturbi ġenerali u kondizzjoni ta' mnejn jingħata | | Uġiġħ |
| Korriement, avvelenament u komplikazzjoni ta' xi proċedura | Komplikazzjoni tal-gerħa* | |

* Komplikazzjoni tal-gerha tikkonsisti minn tipi differenti ta' komplikazzjonijiet lokali bhal komplikazzjonijiet ta' wara l-procedura, nekrozi tal-gerha, tnixxija tal-gerha, fejjan imfixkel jew infammazjoni tal-gerha.

Barra minn hekk, hemm rapport tal-każ wieħed ta' dermatite tal-kuntatt irrappurtat minn letteratura fpazjent wara użu mtawwal ta' estratt topiku tal-qoxra tal-betula li fih prodott kożmetiku.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi sospettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi sospettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott medicinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott medicinali. Il-professionisti tal-kura tas-saħħha huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa sospettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'Appendici V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva b'Episalvan hija improbabbli: fpazjenti fejn id-daqsijiet tal-ġrieħi $>300 \text{ cm}^2$ kienu kkurati ripetutament b'Episalvan, l-ebda livell tal-plažma ta' betulin ma ġie osservat.

L-ebda dejta ma ġiet iġġenerata biex jiġi studjat l-effett ta' ingestjoni aċċidentalni ta' Episalvan.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĞIĊI

5.1 Proprietajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Preparazzjoni għal trattament ta' feriti u ulċeri; Kodiċi ATC: D03AX13.

Mekkaniżmu ta' azzjoni u effetti farmakodinamiċi

Is-sustanza attiva aċċellerat epitelizzazzjoni mill-ġdid fassaqgħ tal-grif tal-gerha *in vitro* bl-użu ta' keratinotiċi primarji umani fid-dożagg ta' 1 µg/ml, u f'mudell ta' fejjan ta' gerha *ex vivo* porċina ta' 10 µg/ml. Il-mekkaniżmu ta' azzjoni preċiż tas-sustanza attiva fil-fejjan tal-ġerha fl-umani mhuwiex magħruf.

Efīkaċċja klinika u sigurtà

Saru tliet studji tal-Faži III sabiex jivvalutaw l-effikaċċja u s-sigurtà ta' Episalvan fil-kura ta' ġrieħi tal-ġilda bi ħxuna parżjali: żewġ studji li investigaw ġrieħi tas-sit tad-donatur tat-trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma, li inkludew total ta' 219-il pazjent (ITT: N=217), u studju ieħor f'61 pazjent bi ġrieħi tal-ħruq ta' Grad 2a (ITT: N=57). Pazjenti bi ġrieħi tal-ħruq aktar fondi (Grad 2b) ma kinux inkluži.

Il-219-il pazjent bi ġrieħi tas-sit donatur tat-trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma kellhom età medja ta' 53 sena; id-daqs medju tal-gerha tas-sit donatur kien ta' 81.5 cm². Fl-istudju dwar il-ġrieħi tal-ħruq b'61 pazjent, l-erja medja tal-gerha tal-istudju kienet 216 cm²; il-korriement totali tal-ħruq kien akbar u affetwa 5.8% tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem.

L-istudji tal-Faži III kien provi vvalutati fl-agħma, prospettivi, ikkontrollati intra-individwalment, randomizzati, multiċentriċi. L-erja tal-gerha fil-mira ta' kull pazjent kienet maqsuma f'żewġ żoni ta' kura ta' madwar l-istess daqs, l-allokazzjoni tal-kura liż-żewġ nofsijiet tal-gerha (distali vs. prossimali) għet id-determinata permezz ta' randomizzazzjoni (fil-prova tal-ħruq, jistgħu jintużaw żewġt iġriehi simili). Episalvan flimkien ma' garża ghall-ġrieħi ġie applikat għal nofs l-erja tal-gerha, u l-istess tip ta' garża ghall-ġrieħi li ma teħilx ġiet applikata lin-nofs l-ieħor bħala l-kontroll

fl-istudji ta' ġrieħi tas-sit donatur tat-trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma. Fl-istudju Grad 2a tal-ġrieħi tal-ħruq, ġell antisettiku għall-ġrieħi li fih octenidine u garži xaħmija ntużaw bħala kontroll. L-applikazzjoni kienet ma' kull bidla tal-garža għall-ġrieħi kull tielet jew raba' jum sakemm għalqet kompletament il-gerħa sa 28 jum għall-provi tat-trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma, u jum iva u jum le sa 21 jum għall-prova tal-ħruq ta' Grad 2a.. Ittieħdu ritratti tal-gerħa ma' kull viżta għall-evalwazzjoni fl-agħma.

Il-punt aħħari primarju għaż-żewġ provi tat-trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma kien id-differenza intra-individwali fiż-żmien għall-gheluq tal-gerħa (tal-inqas 95% epitelizzazzjoni) ibbażati fuq valutazzjonijiet fotografiċi fl-agħma. Iż-żmien medjan għall-fejqan tal-ġrieħi kien ta' 14-il jum. Nofsijiet tal-ġrieħi kkurati b'Episalvan fiequ aktar malajr min-nofsijiet ikkurati b'kura standard (medju 1.1 ijiem skont il-punti aħħari primarji, $p<0.0001$, test-t fpar fuq żewġ naħat).

Tabella 2: Harsa ġenerali tar-riżultati tal-effikaċja: differenza bejn pazjent u ieħor fiż-żmien għall-gheluq tal-gerħa

| Differenza medja bejn pazjent u ieħor fiż-żmien għall-gheluq tal-gerħa (95% epitelizzazzjoni) | Studji ta' ġrieħi tas-sit tad-donatur tat-trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma (miġbura flimkien) | Studju Grad 2a tal-ġrieħi tal-ħruq |
|--|--|---|
| | N=217 | N=57 |
| Valutazzjoni fotografika fl-agħma mill-osservatur (qari agħma), evalwazzjoni esperta medja | | |
| qari agħma primarju / kalkolazzjoni konservattiva hafna (punt aħħari primarju għal studji STSG) | -1.1 ijiem (CI: -1.5, -0.7) għeluq aktar malajr tal-gerħa b'Episalvan, $p<0.0001^a$ | -1.0 ijiem (CI: -1.4, -0.6) għeluq aktar malajr tal-gerħa b'Episalvan, $p<0.0001^a$ |

^a Ibbażat fuq test-t fpar fuq 2 naħat

Sett tad-dejta ta' intenzjoni ta' kura (ITT).

Qari agħma 'primarju' vs. 'sekondarju': Fl-evalwazzjoni tal-qari agħma primarju, ġie implimentat kontroll tal-kwalità rigoruz biex jassigura li l-osservaturi jkunu fl-agħma. Riżultat ta' dan kien li numru sostanziali ta' ritratti ġew esku li u ma kinux ipprezentati fil-qari agħma primarju minħabba residwi apparenti tal-għad. Il-qari agħma sekondarju sar bir-ritratti kollha pprezentati lill-osservaturi miż-żmura fl-agħma.

"Kalkolazzjoni konservattiva hafna" tħisser li l-ewwel osservazzjoni tal-gheluq tal-gerħa saret fil-ħin tal-gheluq tal-gerħa. Id-differenza fil-ħin tal-gheluq tal-gerħa kien iffissat għal 0 għal serje fotografika ikkl-klassifikata bhala 'ma jistgħux jiġi evalwati'. Jekk l-gheluq tal-gerħa ma kienx osservat fnoxs serje fotografika tal-gerħa, kien ikkalkulat li seħħet jum wieħed wara l-ahħar ritratt fis-serje.

"Kalkolazzjoni inqas konservattiva" hija differenti minn "kalkolazzjoni konservattiva hafna" f'aspert wieħed: Jekk l-gheluq tal-gerħa ma kienx osservat fis-serje fotografika ta' nofs il-gerħa, kien ikkalkulat li seħħ mhux jum wieħed, imma madwar 3 ijiem wara (l-intervall tal-ħin medju bejn il-bidliet tal-garža tal-gerħa fl-istudji).

CI: 95% intervall ta' fiduċja; MTWDC: ħin medju għall-bidla fil-garža tal-gerħa; N: numru ta' pazjenti fis-sett tal-analizi; STSG: trapjant tal-ġilda bi ħxuna maqsuma

Il-punt aħħari primarju għall-prova ta' Grad 2a tal-gerħa tal-ħruq kien il-persentaġġ ta' pazjenti b'fejqan aktar kmieni (tal-inqas 95% epitelizzazzjoni) ibbażati fuq valutazzjonijiet fotografiċi fl-agħma. Iż-żmien medjan għall-fejqan tal-ġrieħi kien ta' 7.3 ijiem. Mill-pazjenti b'differenza ta' bejn il-kura fil-fejqan tal-gerħa (N=35), il-persentaġġ ta' pazjenti li wrew fejqan aktar kmieni (punt aħħari primarju) fin-noxs tal-gerħa kkorata b'Episalvan (85.7% [95% CI: 69.7%, 95.2%]) kien ogħla minn dawk li wrew fejqan aktar kmieni ta' nofs il-gerħa kkorata b'kura standard (14.3% [95% CI: 4.8%, 30.3%]) ($p<0.0001$, test binomali).

Fil-viżti ta' segwit fi 3 xħar u 12-il xahar wara l-jum tal-kirurgija jew tal-gerħa tal-ħruq in-nofsijiet tal-ġrieħi kkorati nstabu li kienu ndaqs fil-maġgoranza tal-pazjenti fir-rigward ta' pigmentazzjoni, ħmura, struttura u tkabbir tax-xagħar tal-epidermis riġenerata. Għal sottogrupp ta' pazjenti evalwazzjoni fotografika fl-agħma indikat riżultati aħjar għal nofsijiet tal-ġrieħi kkorati b'Episalvan meta mqabbla ma' kura standard ta' pigmentazzjoni, ħmura u struttura tal-erjas tal-ġrieħi ta' qabel.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu pprezentati riżultati tal-istudji b'Episalvan f'wieħed jew iktar sottogruppi tal-popolazzjoni pedjatrika għall-kura ta' ġrieħi tal-ġilda (ara sezzjoni 4.2 għal tagħrif dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Episalvan ġell jingħata topikament fuq ġrieħi tal-ġilda u juri assorbiment fqir. Abbaži ta' dejta minn tliet studji kliniči b'total ta' 280 pazjent, l-applikazzjoni ta' Episalvan ġell fuq ġrieħi miftuħha ma wassalx għal livelli tal-plażma betulin ogħla minn livelli tal-isfond naturali li joriġinaw eż. minn sorsi nutrizzjonali.

Minħabba li l-ebda livell ta' betulin bijologikament relevanti ma nstab fil-pazjenti, ma saru l-ebda studju relatat mad-distribuzzjoni, bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn doži ripetuti, tolleranza lokali u fototossicità, ma juri l-ebda periklu specjalisti għall-bnedmin. L-effett tossiku minn doži ripetuti u t-tolleranza lokali ġew studjati għal massimu ta' 4 ġimħat. Studji fuq it-tossicità ta' aktar minn 4 ġimħat ma sarux. Is-sustanza attiva ma kinitx ġenotossika fassaqġi *in vitro*.

Ma sarux studji dwar it-tossicità karċinoġenika u riproduttiva u tal-iżvilupp ma sarux.

6. TAGħrif FARMAČEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Żejt tal-ġirasol, raffinat.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

Ladarba jinfetaħ, il-prodott għandu jintuża minnufih u għandu jintrema wara l-użu.

6.4 Prekawzjonijiet specjalisti għall-ħażna

Aħżeen f'temperatura taħbi it-30°C.

6.5 In-natura tal-kontenit u ta' dak li hemm go fih

Tubu kollassabbli tal-aluminju abjad, bl-intern tiegħi ivverniċċat b'kisja ta' epossi fenoliku, u b'kompost li jissiegħi fit-tinja. It-tubi huma magħluqin b'membrana tal-aluminju kontra t-tbagħbis u b'tapp abjad tal-polipropilin b'kamin. It-tubu huwa ppakkjat f'kaxxa tal-kartun.

Daqs tal-pakkett: Tubu wieħed li fih 23.4 g ta' għell.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġgar iehor

L-ebda ġtiġi jiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Amryt GmbH
Streiflingsweg 11
75223 Niefern-Öschelbronn
Il-Ġermanja
tel +49 (0) 7233 9749 - 0
fax +49 (0) 7233 9749 – 210
Email: info.de@amrytpharma.com

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

UE/1/15/1069/001

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĞDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 14 Jannar 2016

Data tal-aħħar tiġid:

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Ägenzija Ewropea ghall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

ANNESS II

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĞ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŽU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŽU SIGUR U EFFIKAČI TAL-PRODOTT MEDIĆINALI**

A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĞ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbi għall-hruġ tal-lott

Amryt GmbH
Streiflingsweg 11
75223 Niefern-Oeschelbronn
IL-GERMANJA

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŽU

Prodott medicinali li jingħata b'riċetta ta' tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott medicinali huma mniżza fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeħid fis-suq (MAH) għandu jippreżenta l-ewwel PSUR għal dan il-prodott fi żmien 6 xhur mill-awtorizzazzjoni.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŽU SIGUR U EFFIKAČI TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

- Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtiega ta' farmakovigilanza dettaljati fl-RMP maqbıl ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqeħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbıl tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tīġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni gdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakovigilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI
JMISS MAL-PRODOTT**

KARTUNA TA' BARRA u TUBU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

Episalvan gell
estratt tal-qoxra tal-betula

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1g ta' gell fiha: 100 mg ta' estratt tal-qoxra tal-betula (bhala estratt niexef, raffinat) minn *Betula pendula/Betula pubescens*, li jikkorespondi għal 72-88 mg betulin.

3. LISTA TA' EĆCIPJENTI

Eċċipjent: Żejt tal-ġirasol, raffinat.

4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT

Ġell
23.4 g

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu għal fuq il-ġilda.
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Għal użu ta' darba biss. Armi wara l-użu.

**6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN
MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhix u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEċJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżeen f'temperatura taħbi it-30°C.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI
MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK
HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-
TQEGHID FIS-SUQ**

Amryt GmbH
Streiflingsweg 11
75223 Niefern-Öschelbronn
Il-Germanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

UE/1/15/1069/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA

Prodott mediciinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Episalvan għell

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDDEM

PC
SN
NN

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Episalvan ġell
estratt tal-qoxra tal-betula

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Episalvan u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Episalvan
3. Kif għandek tuża Episalvan
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Episalvan
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Episalvan u għalxiex jintuża

Episalvan ġell huwa prodott mediċinali erbali li fih estratt niexef mill-qoxra tal-betula.

Dan jintuża f'adulti għall-kura ta' ġrieħi tal-ġilda, li jirriżultaw minn pereżempju ġrieħi tal-ħruq ta' grad 2a jew minn trapjant kirurġiku tal-ġilda. M'hemmx esperjenza dwar l-użu ta' Episalvan għall-kura ta' ġrieħi kroniči, eż. ulċeri dijabetiċi tas-sieq jew ulċeri venuži tar-riġel.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Episalvan

Tużax Episalvan

- jekk inti allerġiku għal qoxra tal-betula jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek qabel tuża Episalvan.

Episalvan ma fihx għabrab tad-dakra tal-betula, għalhekk jista' jintuża' min-nies li għandhom allergija għall-għabra tad-dakra tal-betula.

L-infezzjoni tal-ġrieħi hija kumplikazzjoni serja li tista' sseħħ waqt li l-gerħa tkun fil-process ta' fejjan.

Sinjal possibbli ta' infezzjoni tal-gerħa huma meta l-gerħa tibda tnixxi fluwidu isfar jew hadrani (materja), jew meta l-ġilda madwar il-gerħa ssir hamra, shuna, minfuha, jew dejjem iżżejjid fl-ugħiġi.

Tfal u adolexxenti

Tagħtix din il-mediċina lil tfal u adolexxenti b'età ta' inqas minn 18-il sena peress li m'hemmx biżżejjed esperjenza dwar l-użu ta' Episalvan f'dawn il-pazjenti.

Mediċini oħra u Episalvan

Jekk għandek infezzjoni fil-gerħa jista' jkun meħtieġ aktar trattament.

Għid lit-tabib jew l-infermier tiegħek jekk qiegħed tieħu, ġadu dan l-ahħar jew tista' tieħu xi mediciċina oħra.

Ma sar l-ebda studju biex jistabbilixxi jekk Episalvan jinteragħixx ma' mediciċini oħra. Madankollu, minħabba li l-ammont ta' Episalvan assorbit fil-ġisem hu baxx ħafna mhuwiex mistenni li Episalvan jinteraġġixxi ma' mediciċini oħrajn.

Mhemmx dejta disponibbli fuq l-interazzjoni possibbli bejn Episalvan u mediciċini oħrajn użati fuq il-ġilda. Tużax prodotti oħrajn fuq l-erja tal-gerħa fuq il-ġilda fl-istess hin meta tuża Episalvan.

Tqala, treddiġi u fertilità

Ma sar l-ebda studju fuq l-effetti ta' Episalvan fuq nisa tqal, imma minħabba li l-ammont ta' Episalvan assorbit fil-ġisem hu baxx ħafna, ir-riskju għat-tarbija mhux imwielda huwa negliġibbli. Episalvan jista' jintuża waqt it-tqala.

Mhuwiex magħruf jekk Episalvan jgħaddix għal ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem, imma minħabba li l-ammont ta' Episalvan assorbit fil-ġisem hu baxx ħafna, ir-riskju għat-tarbija huwa negliġibbli. Episalvan jista' jintuża waqt it-treddiġi, sakemm l-erja tas-sider mhijiex tiġi kkurata.

L-effett ta' Episalvan fuq il-fertilità ma giex studjat, imma minħabba li l-assorbiment ta' din il-mediciċina fil-ġisem hu baxx ħafna, mhuwiex mistenni li jkollu effett fuq il-fertilità tiegħek.

Sewqan u thaddim ta' magni

Il-ħila tiegħek biex issuq u thaddem magni mhijiex se tiġi affettwata b'din il-mediciċina.

3. Kif għandek tuża Episalvan

Dejjem għandek tieħu din il-mediciċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-infermier tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-infermier tiegħek jekk ikkollok xi dubju.

Metodu ta' kif għandu jingħata

- Jekk hemm bżonn, il-ġrieħi għandhom jitnaddfu bl-użu ta' soluzzjoni antisettika xierqa qabel l-użu ta' Episalvan.
- Episalvan għandu jiġi applikat fuq wiċċi il-gerħha fi ħxuna ta' madwar 1 mm u għandu jinkesa b'garża sterili ghall-ġrieħi.
- Erġa' applika l-ġell kull darba li l-garża titbiddel, sakemm il-gerħha tkun fieqet.

Tul ta' żmien tal-użu

It-tabib jew l-infermier tiegħek ser jgħidulek għal kemm żmien għandek tuża dan il-ġell. Episalvan għandu jintuża sakemm il-gerħha tkun fieqet jew sa 4 ġimħat. Ma hemm l-ebda esperjenza mill-użu fit-tul ta' Episalvan għal aktar minn 4 ġimħat.

Jekk tuża Episalvan aktar milli suppost

Episalvan jiġi applikat fuq il-ġilda u l-assorbiment ta' Episalvan fil-ġisem huwa minimu. Dan jaġħmel doża eċċessiva improbabbli ħafna, anke jekk użat fuq erjas kbar tal-ġilda u għal perjodu twil ta' żmien.

Jekk tinsa tuża Episalvan

M'għandekx tuża doża doppja biex tpatti għal doża li tkun insejt tuża. Applika Episalvan fil-bidla ppjanata li jmiss tal-garża tal-gerħha, filwaqt li tkompli bir-rutina normali tiegħek.

Jekk tieqaf tuża Episalvan

Episalvan għandu jintuża skont il-parir tat-tabib jew l-infermier tiegħek. Tiqafx tużah mingħajr ma tikkonsulta mat-tabib jew l-infermier tiegħek. Jekk il-gerħha tiegħek ma turi l-ebda sinjal ta' titjib biż-żmien, tkellem mat-tabib jew l-infermier tiegħek.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-užu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tinnota xi effetti sekondarji inklużi dawk elenkti hawn taħt.

L-effetti sekondarji rrapportati b'mod l-aktar komuni huma:

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

- komplikazzjonijiet fil-proċess tal-fejqan tal-ġerħha
- uġiġħ tal-ġilda
- ħakk

Effetti sekondarji oħra jinkludu:

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100)

- infezzjonijiet tal-ġrieħi
- reazzjoni allerġika (sensittività eċċessiva)
- irritazzjoni tal-ġilda (dermatite)
- raxx bil-ħakk
- raxx ta' kulur vjola
- uġiġħ

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'Appendici V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tīgi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Episalvan

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintlaħhaqx mit-tfal.

Aħżeen f'temperatura taħt it-30°C.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara 'JIS'. Id-data ta' skadenza tirreferi ghall-aħħar jum ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott għandu jintuża darba biss u ladarba jinfetah dan il-prodott għandu jintuża minnufih. Armi t-tubu wara l-ewwel užu.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għaddekk tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fi Episalvan

Is-sustanza attiva hija estratt niexef mill-qoxra tal-betula.

1 g ta' ġell fiha: 100 mg ta' estratt (bħala estratt niexef, raffinat) mill-qoxra tal-betula minn *Betula pendula*, *Betula pubescens* kif ukoll minn ibridi taż-żewġ speċi (ekwivalenti għal 0.5-1.0 g ta' qoxra tal-betula), li jikkorrespondu għal 72-88 mg betulin.

Solvent ta' estrazzjoni n-heptane.

L-ingredjent l-iehor hu žejt tal-ġirasol raffinat.

Kif jidher Episalvan u l-kontenut tal-pakkett

Episalvan huwa ġell bla kulur sa kemxejn safrani, opalexxti.

Episalvan ġell huwa ppakkjat f'tubi tal-aluminju abjad kollassabbli. It-tubi huma magħluqin b'membrana tal-aluminju kontra t-tbagħbis u b'tapp abjad tal-polipropilin b'kamin. It-tubu huwa ppakkjat f'kaxxa tal-kartun.

Daqs tal-pakkett: tubu wieħed ta' 23.4 g ta' ġell.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Amryt GmbH

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Il-Ġermanja

tel +49 (0) 7233 9749 - 0

fax+49 (0) 7233 9749 – 210

Email: info.de@amrytpharma.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Ägenzija Ewropea għall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

ANNESS IV
RAĠUNIJET GHALL-TIĞDID ADDIZZJONALI IEHOR

Raġunijiet għall-tiġdid addizzjonal iehor

Abbaži tad-*data* li saret disponibbli wara l-ghoti inizjali tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, is-CHMP jikkunsidra li l-bilanc tal-benefiċċju u r-riskju ta' Episalvan jibqa' pozittiv, iżda jqis li l-profil tas-sigurtà tiegħu huwa limitat għar-raġunijiet li ġejjin:

Għal Episalvan hemm disponibbli informazzjoni limitata dwar is-sigurtà minħabba esponenti limitat minħabba bejgħi limitat tal-prodott mediciċinali. Wara d-DLP, Episalvan tqiegħed fis-suq f'pajjiż fl-UE wieħed biss.

Episalvan għadu mhux disponibbli b'mod kummerċjali u ma tpoġġiex fis-suq fl-ebda pajjiż iehor tal-UE u għalhekk, bħalissa mhix disponibbli *data* ta' wara l-awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, ma kienet irrapprtata l-ebda *data* dwar l-użu wara l-awtorizzazzjoni f'popolazzjonijiet speċjali peress li wara l-ghoti tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma twettqux studju mhux intervezjonali b'Episalvan, inkluži riċerka dwar is-suq u reġistri.

Għalhekk, abbaži tal-profil tas-sigurtà limitat ta' Episalvan, is-CHMP ikkonkluda li l-MAH għandu jissottometti applikazzjoni għal tiġdid addizzjonal iehor fi żmien 5 snin.