

**LIITE I**  
**VALMISTEYHTEENVETO**

## 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Equilis Prequenza Te injektioneste suspensio hevoselle

## 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

Jokainen 1 ml annosisältää:

### Vaikuttavat aineet:

Hevosen influenssaviruskannat :

A/equine-2/South Africa/4/03	50 AU <sup>1</sup>
A/equine-2/ Newmarket/2/93	50 AU

Tetanustoksoidi	40 Lf <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

<sup>1</sup> Antigeeniyksikkö

<sup>2</sup> Flokkulaatioyksikkö; vastaa  $\geq 30$  IU/ml marsun seerumia Ph.Eur:n tehotestissä

### Adjuvantit:

ISCOM-mIscom-atrrix sisältäen: sisältää:

Puhdistettu saponiini	375	mikrogrammaa
Kolesteroli	125	mikrogrammaa
Fosfatidyylikoliini	62,5	mikrogrammaa

Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

## 3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste:

Kirkas läpinäkyvä suspensio

## 4. KLIINiset TIEDOT

### 4.1 Kohde-eläinlaji

Hevonen

### 4.2 Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain

Hevosten aktiivinen immunisointi 6 kuukauden iästä lähtien hevosinfluenssaa vastaan vähentämään kliinisiä oireita ja viruseritystä tartunnan jälkeen sekä tetanusta vastaan kuolleisuuden vähentämiseksi.

#### Influenssa

Immunitetin kehittyminen:	2 viikkoa perusrokotusten jälkeen
Immunitetin kesto:	5 kuukautta perusrokotusten jälkeen
	12 kuukautta 1. tehosterokotuksen jälkeen

#### Tetanus

Immunitetinkehittyminen:	2 viikkoa perusrokotusten jälkeen
Immunitetin kesto:	17 kuukautta perusrokotusten jälkeen

24 kuukautta 1. tehosterokotuksen jälkeen

### **4.3 Vasta-aiheet**

Ei ole.

### **4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain**

Varsat suositellaan rokotettavaksi aikaisintaan 6 kuukauden ikäisinä, etenkin jos varsan emä on rokotettu uudelleen synnytystä edeltäneen kahden kuukauden aikana, maternaalisten vasta-aineiden mahdollisen häiritsemisen vuoksi.

Rokota vain terveitä eläimiä.

### **4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet kohde-eläinlajeittain**

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Ei oleellinen.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Injisoihtaessa valmistetta vahingossa itseensä on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä hänelle pakkausselostetta tai myyntipäällystyä.

### **4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus)**

Injektiokohdassa voi esiintyä harvoin hajanaista kovaa tai pehmeää turvotusta (halkaisijaltaan korkeintaan 5 cm). Turvotus häviää kahden päivän kuluessa. Injektiokohdassa voi harvinaisissa tapauksissa esiintyä kipua, mikä saattaa johtaa väliaikaiseen toiminnalliseen haittaan (jäykkyys). Hyvin harvinaisissa tapauksissa paikallinen turvotus voi olla halkaisijaltaan enemmän kuin 5 cm ja kestää pidempään kuin 2 vuorokautta. Kuumetta, joskus myös letargiaa ja ruokahaluttomuutta, voi hyvin harvoin esiintyä vuorokauden ajan. Poikkeustapauksissa nämä oireet voivat kestää kolme vuorokautta.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

### **4.7 Käyttö tiineyden, laktaation tai muninnan aikana**

Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana.

### **4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Turvallisuus- ja tehotietojen perusteella tätä rokotetta voidaan antaa samana päivänä Intervetin Tetanus Serum -valmisteen kanssa (ks. kappale 4.9).

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muun kuin yllämainitun eläinlääkevalmisteen kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti.

### **4.9 Annostus ja antotapa**

Lihaksensisäisesti.

Anna rokotteen lämmitä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

### Rokotusohjelma:

#### *Perusrokotukset*

1 annos (1 ml) injisoidaan tarkasti lihakseen seuraavan rokotusohjelman mukaisesti:

- Perusrokotukset: Ensimmäinen injektio 6 kuukauden iästä lähtien, toinen injektio 4 viikkoa myöhemmin.

#### *Tehosterokotus*

### Influenssa

On suositeltavaa, että tehosterokotus annetaan vain hevosille, jotka ovat saaneet perusrokotuksen samantyyppisiä hevosinfluenssaviruksia sisältävällä rokotteella. Perusrokotusten antaminen voi olla tarpeellista hevosille, joita ei ole perusrokotettu vastaavalla rokotteella.


Ensimmäinen tehosterokotus (kolmas annos) hevosinfluenssaa vastaan annetaan 5 kuukautta perusrokotusten jälkeen. Tämän tehosterokotuksen jälkeen immuniteetti hevosinfluenssaa vastaan säilyy vähintään 12 kuukautta.

Toinen tehosterokotus annetaan 12 kuukautta ensimmäisen tehosterokotuksen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti voidaan 12 kuukauden välein käyttää jotakin muuta sopivaa hevosinfluenssarokotetta, joka sisältää kantoja A/equine-2/ South Africa/4/03 ja A/equine- 2/Newmarket-2/93 immuniteetin säilyttämiseksi influenssaa vastaan (ks. rokotusohjelma).

### Tetanus

Ensimmäinen tehosterokotus annetaan viimeistään 17 kuukautta perusrokotusten jälkeen. Tämän jälkeen rokotusväliksi suositellaan korkeintaan kaksi vuotta (ks. rokotuskaavio).



Jos infektioriski on lisääntynyt tai jos varsa ei ole saanut riittävästi ternimaitoa, voidaan lisäksi antaa ensimmäinen injektio 4 kuukauden iässä, minkä jälkeen rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti (perusrokotukset 6 kuukauden iässä ja 4 viikkoa myöhemmin).

#### *Samanaikainen aktiivinen ja passiivinen immunisointi (hätärokotus)*

Rokotetta voidaan käyttää Intervetin Tetanus-Serum-valmisteiden kanssa sellaisten loukkaantuneiden hevosten hoitoon, joita ei ole rokotettu tetanusta vastaan. Siinä tapauksessa ensimmäinen perusrokotusannos (V1) voidaan antaa samanaikaisesti sopivan, ennaltaehkäisevän Intervetin Tetanus-Serum-annoksen kanssa eri injektiokohtaan erillisellä ruiskulla ja neulalla. Samanaikaisilla injektioilla saadaan aikaan passiivinen suoja tetanusta vastaan vähintään 21 vuorokaudeksi. Toinen rokotusannos (V2) tulee antaa 4 viikkoa myöhemmin. Kolmas rokotus Equilis Prequenza Te:llä tulee antaa vähintään neljä viikkoa myöhemmin. Samanaikainen Equilis Prequenza Te- ja Intervetin Tetanus-Serum-valmisteiden käyttö voi heikentää aktiivista immuniteettia tetanusta vastaan verrattuna hevosiin, jotka on immunisoitu Equilis Prequenza Te:llä ilman tetanusantitoksiiniserumia.

## **4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa)**

Kaksinkertaisen rokoteannoksen jälkeen ei ole havaittu muita haittavaikutuksia kuin kohdassa 4.6 kuvatut lukuun ottamatta rokotuspäivänä ilmennyttä lievää alakuloisuutta.

#### **4.11 Varoaika**

0 vrk

### **5. IMMUNOLOGISET OMINAISUUDET**

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Hevoseläinten immunologiset valmisteet, inaktivoituneet virusrokotteet ja inaktivoituneet bakteerirokotteet hevoseläimille, inaktivoituneet.  
ATCvet-koodi: QI05AL01

Aktiivisen immuniteetin stimulointiin hevosinfluenssaa ja tetanusta vastaan hevosissahevosille.

### **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

#### **6.1 Apuaineet**

Fosfaattipuskuri, tiomersaalijäämiä, formaldehydijäämiä.

#### **6.2 Pääasialliset yhteensopimattomuudet**

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

#### **6.3 Kesto aika**

Avaamattoman pakkauksen kesto aika: 2 vuotta

#### **6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet**

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

#### **6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus**

Tyypin I lasinen 1 ml (1 annos) injektio pullo, jossa on halogenobutyylilikumitulppa ja alumiinikorkki.

Tyypin I lasinen 1 ml (1 annos) esitäytetty ruisku, jossa on halogenobutyylilikumia oleva männän kärki ja halogenobutyylitulppa.

Pakkaus koko:

Pahvipakkaus, jossa on 10 lasista 1 ml:n (1 annoksen) injektio pulloa.

Pahvipakkaus, jossa on 1, 5 tai 10 esitäytettyä (1 annoksen) ruiskua ja neulaa.

Kaikkia pakkaus kokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

#### **6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jättemateriaalien hävittämiselle**

Käyttämättömät lääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jättemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

### **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Alankomaat

**8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

EU/2/05/057/001-004

**9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ  
/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivämäärä  
8.7.2005  
Uudistamispäivämäärä 27.7.2010

**10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

11/2020  
Yksityiskohtaista tietoa tästä eläinlääkkeestä on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulta  
<http://www.ema.europa.eu/>.

**MYyntiä, TOIMITTAMISTA JA/TAI Käyttööä Koskeva Kielto**

Ei oleellinen.

## **LIITE II**

- A. BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA**
- B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**
- C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ**

**A. BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJAT JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA**

Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite

GSK Vaccines GmbH  
Emil-von-Behring-Str. 76  
35 041 Marburg  
Saksa

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.  
Poligono Ind. El Montalvo I  
C/Zepelin 6, Parcela 38  
37008 Carbajosa de la Sagrada  
Salamanca  
Espanja

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Alankomaat

**B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**

Eläinlääkemääräys

**C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ**

Asetusta (EY) No 470/2009 ei sovelleta biologista alkuperää oleviin vaikuttaviin aineisiin, joilla on tarkoitus saada aikaan aktiivinen immuniteetti.

Valmisteyhteenvedon kappaleessa 6.1. luetellut apuaineet (mukaan lukien adjuvantit) ovat joko sallittuja aineita, joille Komission asetuksen 37/2010 liitteen taulukon 1 mukaisesti ei tarvita jäämien enimmäismäärää tai lueteltujen apuaineiden (mukaan lukien adjuvanttien) ei katsota kuuluvan Asetuksen (EU) No 470/2009 soveltamisalaan kun niitä käytetään kuten tässä eläinlääkevalmisteessa.



**LIITE III**  
**MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE**

## **A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT**

**SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA**

**Pahvipakkaus, jossa 10 injektiopulloa**  
**Pahvipakkaus, jossa 1, 5, tai 10 esitäytettyä ruiskua**

**1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI**

Equilis Prequenza Te injektioneste suspensio hevoselle

**2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET**

Jokainen 1 ml annos sisältää:

A/equine-2/South Africa/4/03 50 AU

A/equine 2/Newmarket/2/93 50 AU

Tetanustoksoidi 40 Lf.

**3. LÄÄKEMUOTO**

Injektioneste, suspensio

**4. PAKKAUSKOKO**

10 x 1 annos

1 annos esitäytetyssä ruiskussa

5 x 1 annosta esitäytetyssä ruiskussa

10 x 1x1 annosta esitäytetyssä esitäytetssä ruiskussa

**5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)**

Hevonen

**6. KÄYTTÖAIHEET**

**7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)**

Lihakseen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

**8. VAROAIKA**

Varoaika: nolla vuorokautta.

**9. ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET), TARVITTAESSA**

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

**10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP { KK/VVVV }

**11. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Säilytä jääkaapissa,  
Ei saa jäättyä.  
Säilytä valolta suojassa.

**12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI  
JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Hävittäminen: lue pakkausselosteesta

**13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN  
JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen**

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

**14. MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE”**

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

**15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
NL-5831 AN Boxmeer

**16. MYYNTILUPIEN NUMEROT**

EU/2/05/057/001 (10 injektiopulloa)  
EU/2/05/057/002 (10 esitäytettyä ruiskua)  
EU/2/05/057/003 (1 esitäytetty ruisku)  
EU/2/05/057/004 (5 esitäytettyä ruiskua)injektiopulloa)

**17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO**


Lot {numero}

**PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT  
TIEDOT**

Etiketti

1 ml injektiopullo, 1 ml esitäytetty injektioruisku

**1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Equilis Prequenza Te 

**2. VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT**

Kaksi hevosinfluenssaviruskantaaequine influenssavirusta ja tetanustoksoidi

**3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ**

1 annos

**4. ANTOREITIT**

i.m.

**5. VAROAIKA**

Varo aika: nolla vuorokauttavuorokautaa

**6. ERÄNUMERO**

Lot {numero}

**7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP {kuukausi/vuosi}

**8. MERKINTÄ "ELÄIMILLE"**

Eläimille

## **B. PAKKAUSSELOSTE**

## PAKKAUSSELOSTE

Equilis Prequenza Te injektioneste suspensio hevoselle

### 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Alankomaat

### 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Equilis Prequenza Te injektioneste, suspensio, hevoselle

### 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Jokainen 1 ml annos sisältää:

#### Vaikuttavat aineet

Hevosien influenssaviruskannat :

A/equine-2/ South Africa/4/03	50 AU <sup>1</sup>
A/equine-2/ Newmarket/2/93	50 AU

Tetanustoksoidi	40 Lf <sup>2</sup>
-----------------	--------------------

<sup>1</sup> Antigeeniyksikkö (ELISA)

<sup>2</sup> Flokkulaatioyksikkö; vastaa  $\geq 30$  IU/ml marsun seerumia Ph.Eur:n tehotestissä

#### Adjuvantti

ISCOM-mIscom-atrrix sisältäen sisältää:

Puhdistettu saponiini	375 mikrogrammaa
Kolesteroli	125 mikrogrammaa
Fosfatidyylkoliini	62,5 mikrogrammaa

Kirkas läpinäkyvä suspensio

### 4. KÄYTTÖAIHEET

Hevosten aktiivinen immunisointi 6 kuukauden iästä lähtien hevosinfluenssaa vastaan vähentämään kliinisiä oireita ja viruseritystä tartunnan jälkeen sekä tetanusta vastaan kuolleisuuden vähentämiseksi.

#### Influenssa

Immunitetin kehittyminen:	2 viikkoa perusrokotusten jälkeen
Immunitetin kesto:	5 kuukautta perusrokotusten jälkeen
	12 kuukautta 1. tehosterokotuksen jälkeen

#### Tetanus

Immunitetin kehittyminen:	2 viikkoa perusrokotusten jälkeen
Immunitetin kesto:	17 kuukautta perusrokotusten jälkeen
	24 kuukautta 1. tehosterokotuksen jälkeen

### 5. VASTA-AIHEET

Ei ole.

## 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Injektiokohdassa voi esiintyä harvoin hajanaista kovaa tai pehmeää turvotusta (halkaisijaltaan korkeintaan 5 cm). Turvotus häviää kahden päivän kuluessa. Injektiokohdassa voi harvinaisissa tapauksissa esiintyä kipua, mikä saattaa johtaa väliaikaiseen toiminnalliseen haittaan (jäykkyys). Hyvin harvinaisissa tapauksissa paikallinen turvotus voi olla halkaisijaltaan enemmän kuin 5 cm ja kestää pidempään kuin 2 vuorokautta. Kuumetta, joskus myös letargiaa ja ruokahaluttomuutta, voi hyvin harvoin esiintyä vuorokauden ajan Poikkeustapauksissa nämä oireet voivat kestää kolme vuorokautta.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen hoidon aikana)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myösellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai epäilet, ettei lääke ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

## 7. KOHDE-ELÄINLAJI (KOHDE-ELÄINLAJIT)

Hevonen



## 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

1 ml lihaksensisäisesti.

### Rokotusohjelma:

#### *Perusrokotukset*

1 annos (1 ml) hevosta kohti injisoidaan tarkasti lihakseen seuraavan rokotusohjelman mukaisesti:

- Perusrokotukset: ensimmäinen injektio 6 kuukauden iästä lähtien, toinen injektio 4 viikkoa myöhemmin

#### *Tehosterokotus*

##### Influenssa

On suositeltavaa, että tehosterokotus annetaan vain hevosille, jotka ovat saaneet perusrokotuksen samantyyppisiä hevosinfluenssaviruksia sisältävällä rokotteella. Perusrokotusten antaminen voi olla tarpeellista hevosille, joita ei ole perusrokotettu vastaavalla rokotteella.

Ensimmäinen tehosterokotus (kolmas annos) hevosinfluenssaa vastaan annetaan 5 kuukautta perusrokotusten jälkeen. Tämän tehosterokotuksen jälkeen immuniteetti hevosinfluenssaa vastaan säilyy vähintään 12 kuukautta.


Toinen tehosterokotus annetaan 12 kuukautta ensimmäisen tehosterokotuksen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti voidaan 12 kuukauden välein käyttää jotakin muuta sopivaa hevosinfluenssarokotetta, joka sisältää kantoja A/equine-2/ South Africa/4/03 ja A/equine-2/Newmarket-2/93 immuniteetin säilyttämiseksi influenssaa vastaan (ks. rokotusohjelma).



## Tetanus

Ensimmäinen tehosterokotus annetaan viimeistään 17 kuukautta perusrrokotusjakson jälkeen. Sen jälkeen rokotusväliksi suositellaan korkeintaan kaksi vuotta (ks. rokotuskaavio).



Jos infektioriski on lisääntynyt tai jos varsa ei ole saanut riittävästi ternimaitoa, voidaan lisäksi antaa ensimmäinen injektio 4 kuukauden iässä, minkä jälkeen rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti (perusrrokotukset 6 kuukauden iässä ja 4 viikkoa myöhemmin).

### *Samanaikainen aktiivinen ja passiivinen immunisointi (hätärokotus)*

Rokotetta voidaan käyttää Intervetin Tetanus Serum -valmisteen kanssa sellaisten loukkaantuneiden hevosten hoitoon, joita ei ole rokotettu tetanusta vastaan. Siinä tapauksessa ensimmäinen perusrrokotusannos (V1) voidaan antaa samanaikaisesti sopivan, ennaltaehkäisevän Intervetin Tetanus-Serum-annoksen kanssa eri injektiokohtaan erillisellä ruiskulla ja neulalla. Samanaikaisilla injektioilla saadaan aikaan passiivinen suoja tetanusta vastaan vähintään 21 vuorokaudeksi. Toinen rokoteannos (V2) tulee antaa 4 viikkoa myöhemmin. Kolmas rokotus Equilis Prequenza Te:llä tulee antaa vähintään neljä viikkoa myöhemmin. Samanaikainen Equilis Prequenza Te- ja Intervetin Tetanus-Serum-valmisteiden käyttö voi heikentää aktiivista immuniteettia tetanusta vastaan verrattuna hevosiin, jotka on immunisoitu Equilis Prequenza Te:llä ilman tetanusantitoksiiniserumia.

## 9. ANNOSTUSOHJEET

Anna rokotteen lämmitä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

## 10. VAROAIKA

Nolla vuorokautta.

## 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä jääkaapissa (-)..

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

Ei saa käyttää etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä viittaa kyseisen kuukauden viimeiseen päivään.

## 12. ERITYISVAROITUKSET

a

### Erityiset kohde-eläinlajikohtaisetlajikohtaiset varotoimet:

Varsat suositellaan rokotettavaksi aikaisintaan 6 kuukauden ikäisinä maternaalisten vasta-aineiden takia, etenkin jos varsan emä on uudelleenrokotettu synnytystä edeltäneen kahden kuukauden aikana.

Rokota vain terveitä eläimiä.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Jos ruiskutat vahingossa itseesi tätä valmistetta, haeainetta, viipymättä lääkinnällistä apua ja näytä lääkärille tätä pakkausselostetta tai pakkausmerkintöjä.

Tiineys ja imetys:

Voidaan käyttää tiineydenraskauden ja imetyksen aikana.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Turvallisuus- ja tehotietojen perusteella tätä rokotetta voidaan antaa samana päivänä Intervetin Tetanus Serum -valmisteen kanssa (ks. kappale 8: annostus, antoreitit ja antotavat kohde-eläinlajeittain). Valmisteita ei saa kuitenkaan sekoittaa keskenään.

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden muun kuin yllämainitun eläinlääkevalmisteen kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Kaksinkertaisen rokoteannoksen jälkeen ei ole havaittu muita haittavaikutuksia kuin kohdassa 6 kuvatut lukuun ottamatta rokotuspäivänä ilmennyt lievää alakuloisuutta.

Yhteensopimattomuudet

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

### **13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

### **14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY**

PP/KK/VVVV

Yksityiskohtaista tietoa tästä eläinlääkkeestä on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulta <http://www.ema.europa.eu/>.

### **15. MUUT TIEDOT**

Pahvipakkaus, jossa on 10 lasista 1 ml:n injektioipulloa (1 annos).

Pahvipakkaus, jossa on 1, 5 tai 10 1 ml:n (1 annos) esitäytettyä ruiskua ja neulaa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla