

**LIITE I**  
**VALMISTEYHTEENVETO**

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

## **1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Evkeeza 150 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

## **2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT**

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 150 mg evinakumabia.

Yksi 2,3 ml:n injektioampulli konsentraattia sisältää 345 mg evinakumabia.

Yksi 8 ml:n injektioampulli konsentraattia sisältää 1 200 mg evinakumabia.

Evinakumabi on tuotettu yhdistelmä-DNA-menetelmällä kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

## **3. LÄÄKEMUOTO**

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti)

Kirkas tai hieman opalisoiva, väritön tai vaaleankeltainen steriili liuos, jonka pH on 6,0 ja osmolaliteetti noin 500 mmol/kg.

## **4. KLIINiset TIEDOT**

### **4.1 Käyttöaiheet**

Evkeeza on tarkoitettu ruokavalion ja muiden LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävien hoitojen lisänä homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian (HoFH) hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille.

### **4.2 Annostus ja antotapa**

Potilaalla on oltava optimaalinen LDL-kolesterolipitoisuutta pienentävä hoito-ohjelma ennen evinakumabihoidon aloittamista.

Evinakumabihoidon aloittaa ja sitä valvoo lääkäri, jolla on kokemusta lipidihäiriöiden hoidosta.

#### Annostus

Suosittelun annos on 15 mg/kg 60 minuutin kestoisena laskimoinfuusiona kerran kuukaudessa (4 viikon välein).

Jos annos jää väliin, se on annettava mahdollisimman pian. Tämän jälkeen evinakumabihoidon annetaan kuukausittain viimeisen annoksen päivämäärästä.

Infuusionopeutta voidaan hidastaa tai infuusio keskeyttää tai lopettaa, jos potilaalla ilmenee haittavaikutuksen merkkejä, infuusion liittyvät oireet mukaan lukien.

Evkeeza voidaan antaa lipoproteiiniafereesista huolimatta.

### *Iäkkäät*

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille (ks. kohdat 5.1 ja 5.2).

### *Munuaisten vajaatoiminta*

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).

### *Maksan vajaatoiminta*

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).

### *Pediatriset potilaat*

Annosta ei tarvitse muuttaa 12–17 vuoden ikäisille pediatrisille potilaille (ks. kohdat 4.8, 5.1 ja 5.2). Evkeeza-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

### Antotapa

Evkeeza annetaan infuusiona laskimoon.

### *Anto*

- Jos liuos on säilytetty kylmässä, anna sen lämmitä huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C) ennen antoa.
- Evinakumabi annetaan 60 minuutin kestoisena laskimoinfuusiona sellaisen laskimoyhteyden kautta, jossa on steriili kiinteä tai irrallinen 0,2–5 mikronin suodatin. Evinakumabia ei saa antaa nopeana infuusiona tai boluksena.
- Evinakumabia ei saa sekoittaa muihin lääkevalmisteisiin tai antaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa saman infuusioletkun kautta.

Infuusionopeutta voidaan hidastaa tai infuusio keskeyttää tai lopettaa, jos potilaalla ilmenee haittavaikutuksen merkkejä, infuusioon liittyvät oireet mukaan lukien.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

## **4.3 Vasta-aiheet**

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

## **4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

### Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyuden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

### Yliherkkyys- ja infuusioreaktiot

Yliherkkyysreaktioita, kuten anafylaksiaa, ja infuusioreaktioita on raportoitu evinakumabin käytön yhteydessä (ks. kohta 4.8). Jos vakavan yliherkkyys- tai infuusioreaktion merkkejä tai oireita esiintyy, keskeytä evinakumabihoito, hoida tavanomaisten hoito-ohjeiden mukaisesti ja seuraa potilasta, kunnes merkit tai oireet häviävät.

## **4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Evinakumabin ja muiden lipidipitoisuuksia pienentävien lääkkeiden välillä ei ole havaittu yhteisvaikutusmekanismia.

## **4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys**

### Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä evinakumabihoiton aikana ja vähintään 5 kuukauden ajan viimeisen evinakumabiannoksen jälkeen.

### Raskaus

On vain vähän tietoja evinakumabin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Ihmisen IgG-vasta-aineiden tiedetään läpäisevän istukkaesteen; siksi on mahdollista, että evinakumabi siirtyy äidistä kehittyvään sikiöön. Evinakumabi saattaa olla vahingollinen sikiölle, kun sitä annetaan raskaana olevalle naiselle, eikä sen käyttöä suositella raskauden aikana tai sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä tehokasta ehkäisyä, ellei odotettu hyöty potilaille ole mahdollista sikiöön kohdistuvaa riskiä suurempi.

### Imetys

Ei tiedetä, erittykö evinakumabi ihmisen rintamaitoon. Ihmisen IgG-vasta-aineiden tiedetään erittyvän rintamaitoon muutaman ensimmäisen päivän ajan syntymän jälkeen. Pian tämän jälkeen pitoisuudet vähenevät pieniksi. Rintaruokittuun imeväiseen kohdistuvaa riskiä tänä lyhyenä ajanjaksona ei voida poissulkea. Tämän jälkeen Evkeeza-valmistetta voisi käyttää imetyksen aikana, jos se on kliinisesti tarpeen.

### Hedelmällisyys

Tietoja evinakumabin vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Eläinkokeet eivät viittaa haitallisiin miesten ja naisten hedelmällisyyteen kohdistuviin vaikutuksiin (ks. kohta 5.3).

## **4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn**

Evkeeza-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

## **4.8 Haittavaikutukset**

### Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Useimmin esiintyneet haittavaikutukset ovat nasofaryngiitti (13,7 %), influenssan kaltainen sairaus (7,7 %), heitehuimaus (6,0 %), selkäkipu (5,1 %) ja pahoinvointi (5,1 %). Vakavin haittavaikutus on anafylaksia (0,9 %).

### Haittavaikutustaulukko

Taulukossa 1 on lueteltu niiden haittavaikutusten esiintymistiheys, joita esiintyi evinakumabin yhdistetyissä kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Tutkimuksiin osallistui 117 potilasta, joilla oli HoFH ja jatkuva hyperkolesterolemia. Haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmäluokan ja esiintyvyyden mukaan. Esiintyvyydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen ( $\geq 1/10$ ), yleinen ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), melko harvinainen ( $\geq 1/1\,000$ ,  $< 1/100$ ), harvinainen ( $\geq 1/10\,000$ ,  $< 1/1\,000$ ), hyvin harvinainen ( $< 1/10\,000$ ) tai tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin esiintyvyydsuokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

**Taulukko 1: Haittavaikutukset**

MedDRA-elinjärjestelmäluokka	Suosittelutermi	Esiintyvyyssuokat
Infektiot	Nasofaryngiitti	Hyvin yleinen
	Ylähengitysteiden infektio	Yleinen
Immuunijärjestelmä	Anafylaksia	Melko harvinainen
Hermosto	Heitehuimaus	Yleinen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina	Nuha	Yleinen
Ruoansulatuselimistö	Pahoinvointi	Yleinen
	Vatsakipu	Yleinen
	Ummetus	Yleinen
Luusto, lihakset ja sidekudos	Selkäkipu	Yleinen
	Raajakipu	Yleinen
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat	Influenssan kaltainen sairaus	Yleinen
	Astenia	Yleinen
	Infuusioon liittyvä reaktio	Yleinen
	Infuusiokohdan reaktiot	Yleinen

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus*Yliherkkyysoireet*

Anafylaksiaa raportoitiin yhdellä (0,9 %:lla) evinakumabihoitoa saaneista potilaista (ks. kohta 4.4).

*Infuusioreaktiot*

Infuusioreaktioita (esim. infuusiokohdan kutinaa) raportoitiin yhdeksällä (7,7 %:lla) evinakumabihoitoa saaneista potilaista ja kahdella (3,7 %:lla) lumehoitoa saaneista potilaista.

Pediatriset potilaat

13 nuorella HoFH-potilaalla todettu turvallisuusprofiili oli yhdenmukainen aikuisten HoFH-potilaiden turvallisuusprofiilin kanssa. Nuoret olivat iältään 12–17-vuotiaita ja saivat evinakumabia laskimoon 15 mg/kg neljän viikon välein. Evinakumabin turvallisuutta alle 12 vuoden ikäisten pediatristen potilaiden hoidossa ei ole varmistettu (ks. kohta 5.1).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista [liitteessä V](#) luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

**4.9 Yliannostus**

Evinakumabin yliannostukseen ei ole erityistä hoitoa. Yliannostuksen sattuessa potilasta on hoidettava oireenmukaisesti ja elintoimintoja tukevat toimet on aloitettava tarpeen mukaan.

**5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET****5.1 Farmakodynamiikka**

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut lipidejä muuntavat lääkkeaineet, ATC-koodi: C10AX17

## Vaikutusmekanismi

Evinakumabi on rekombinantti ihmisen monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu spesifisesti ANGPTL3-proteiiniin ja estää sitä. ANGPTL3 on angiopoietiinin kaltaisen proteiiniperheen jäsen, jota ilmenee pääasiassa maksassa. Se säätelee lipidien metaboliaa estämällä lipoproteiinilipaasia (LPL) ja endoteelilipaasia (EL).

Evinakumabi salpaa ANGPTL3:n, jolloin ANGPTL3 ei pysty estämään lipoproteiinilipaasin ja endoteelilipaasin toimintaa ja triglyseridi- ja HDL-kolesterolipitoisuudet vastaavasti pienenevät. Evinakumabi pienentää LDL-kolesterolipitoisuuksia riippumatta LDL-reseptorien (LDLR) esiintymisestä, sillä se edistää hyvin matalatiheyksisen lipoproteiinin (VLDL) prosessointia ja VLDL:n jäännöshiukkasten puhdistumaa ennen LDL:n muodostumista EL-riippuvaisen mekanismin välityksellä.

## Kliininen teho ja turvallisuus

*Homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia (HoFH)*

### ELIPSE-HoFH-tutkimus

Tämä oli kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioitiin evinakumabin tehoa ja turvallisuutta lumelääkkeeseen verrattuna 65 HoFH-potilaan hoidossa. Tutkimuksessa oli 24 viikon kaksoissokkoutettu hoitajakso ja 24 viikon avoin hoitajakso. Kaksoissokkoutetussa hoitajaksossa 43 potilasta satunnaistettiin saamaan evinakumabia laskimoon 15 mg/kg neljän viikon välein ja 22 potilasta satunnaistettiin saamaan lumelääkettä. Potilaat käyttivät samanaikaisesti muita lipidipitoisuutta pienentäviä hoitoja (esim. statiinit, etsetimibi, PCSK9:n estäjät, lomitapidi ja lipoproteiiniafereesi). HoFH-diagnoosi määritettiin geneettisellä testillä tai seuraavien kliinisten kriteerien täyttymisellä: aiempi hoitamaton kokonaiskolesteroli > 500 mg/dl (13 mmol/l) sekä joko alle 10-vuotiaana todettu ksantooma tai kummallakin vanhemmalla todettu kokonaiskolesteroli > 250 mg/dl (6,47 mmol/l). Potilaat otettiin mukaan tutkimukseen mutaatiostatukseen katsomatta. Potilailla määriteltiin olevan nolla/nolla- tai negatiivinen/negatiivinen-variantti, jos variaatioiden seurauksena LDL-reseptoreiden toiminta oli vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan; nolla/nolla-varianttien määritelmänä oli LDL-reseptoreiden toiminta < 15 % *in vitro* -määritysten perusteella, ja negatiivinen/negatiivinen-varianttien määritelmänä olivat ennenaikaiset lopetuskodonit, silmukointikohtavariaatiot, vaiheistusmutaatiot, liittymät/häviämät tai kopiomäärän vaihtelut. Tässä tutkimuksessa 32,3 %:lla potilaista (21/65) oli nolla/nolla-variantteja ja 18,5 %:lla potilaista (12/65) oli negatiivinen/negatiivinen-variantteja.

Lähtötilanteen keskimääräinen LDL-kolesterolipitoisuus oli 255,1 mg/dl (6,61 mmol/l); tämä luku oli 311,5 mg/dl (8,07 mmol/l) niiden potilaiden alaryhmässä, joilla oli nolla/nolla-variantteja, ja 289,4 mg/dl (7,50 mmol/l) niiden potilaiden alaryhmässä, joilla oli negatiivinen/negatiivinen-variantteja. Lähtötilanteessa 93,8 % potilaista käytti statiineja, 75,4 % etsetimibiä, 76,9 % PCSK9:n estäjiä, 21,5 % lomitapidia ja 33,8 % sai lipoproteiiniafereesihoitoa. Keski-ikä lähtötilanteessa oli 42 vuotta (vaihteluväli 12–75) ja 12,3 % oli ≥ 65-vuotiaita; 53,8 % oli naisia, 73,8 % valkoahoisia, 15,4 % aasialaisia, 3,1 % mustaihoisia ja 7,7 % muita tai tietoa ei ilmoitettu.

Tehon ensisijainen päätetapahtuma oli LDL-kolesterolipitoisuuden prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta viikolle 24. Evinakumabin ja lumelääkkeen pienimmän neliösumman (LS) keskiarvojen ero LDL-kolesterolipitoisuuden prosentuaalisessa muutoksessa lähtötilanteesta oli viikolla 24 –49,0 % (95 %:n luottamusväli: –65,0 %; –33,1 %; p < 0,0001). Ks. tehoa koskevat tulokset taulukosta 2.

**Taulukko 2: Evinakumabin vaikutus lipidiparametreihin HoFH-potilailla ELIPSE-HoFH-tutkimuksessa**


	Lähtötilanne (keskiarvo), mmol/l (N = 65)	LS-keskiarvon prosentuaalinen muutos tai muutos lähtötilanteesta viikolla 24		Ero lumelääkkeeseen (95 %:n luottamusväli)	P-arvo
		evinakumabi (N = 43)	lumelääke (N = 22)		
<b>LDL-kolesteroli (prosentuaalinen muutos)</b>	6,6	-47,1 %	+1,9 %	-49 % (-65,0; -33,1)	< 0,0001
<b>LDL-kolesteroli (absoluuttinen muutos) (mmol/l)</b>	6,6	-3,5	-0,1	-3,4 (-4,5; -2,3)	< 0,0001
<b>ApoB (g/l)</b>	1,7	-41,4 %	-4,5 %	-36,9 % (-48,6; -25,2)	< 0,0001
<b>Ei-HDL-kolesteroli</b>	7,2	-49,7 %	+2,0 %	-51,7 % (-64,8; -38,5)	< 0,0001
<b>Kokonaiskolesteroli</b>	8,3	-47,4 %	+1,0 %	-48,4 % (-58,7; -38,1)	< 0,0001
<b>Triglyseridit</b>	1,4	-55,0 %	-4,6 %	-50,4 % (-65,6; -35,2)	< 0,0001 <sup>a</sup>
<b>HDL-kolesteroli<sup>b</sup></b>	1,2	-29,6 %	+0,8 %	-	-

<sup>a</sup> nimellinen p-arvo, sillä triglyseridipitoisuus ei ole keskeinen toissijainen päätetapahtuma

<sup>b</sup> Viikon 24 keskimääräisen prosentuaalisen muutoksen tulokset on esitetty turvallisuuspopulaation saaman todellisen hoidon perusteella (evinakumabi, n = 44; lumelääke, n = 20); turvallisuuspopulaatiossa ei tehty muodollista tilastollista testausta.

Kaksoissokkoutetun hoitojakson jälkeen evinakumabia sai 64 potilasta niistä 65 satunnaistetusta potilaasta, jotka siirtyivät avoimeen hoitojaksoon. LDL-kolesterolipitoisuuden keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta viikolla 48 vaihteli -42,7 %:sta -55,8 %:iin. Kuvassa 1 on esitetty LDL-kolesterolipitoisuuden keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta kaksoissokkoutetussa hoitojaksossa ja havaittu keskimääräinen prosentuaalinen muutos avoimessa hoitojaksossa niiden potilaiden osalta, jotka saivat evinakumabia tai lumelääkettä kaksoissokkoutetun hoitojakson aikana.

**Kuva 1:** Laskennallinen LDL-kolesterolipitoisuuden LS-keskiarvojen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta viikolle 24 ja havaittu keskimääräinen prosentuaalinen muutos viikolta 28 viikolle 48 ELIPSE-HoFH-tutkimuksessa



Potilasmäärä														
lumelääke/evinakumabi	22	19	20	21	20	20	20	21	19	19	18	19	19	16
evinakumabi	43	38	43	42	42	40	43	43	41	42	42	41	39	42

Viikon 24 kohdalla evinakumabihoidon yhteydessä havaittu LDL-kolesterolipitoisuuden pieneneminen oli samankaltaista kaikissa ennalta määritetyissä alaryhmissä, jotka olivat ikä, sukupuoli, nolla/nolla- tai negatiivinen/negatiivinen-variantit, samanaikainen lipoproteiinaferesihoito ja samanaikainen käytössä ollut lipidipitoisuutta pienentävä lääkitys (statiinit, etsetimibi, PCSK9:n estäjät ja lomitapidi). Evinakumabin vaikutusta kardiovaskulaariseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ei ole määritetty.

### ELIPSE-OLE-tutkimus

Meneillään olevassa avoimessa, jatkovaiheen monikeskustutkimuksessa, jossa on mukana 81 HoFH-potilasta, LDL-kolesterolipitoisuuden havaittiin pienentyneen 43 %:lla 24 viikon altistumisen kohdalla, kun potilaat olivat saaneet evinakumabihoitoa laskimoon 15 mg/kg neljän viikon välein muiden lipidipitoisuutta pienentävien hoitojen (esim. statiinit, etsetimibi, PCSK9:n estäjät, lomitapidi ja lipoproteiinaferesi) lisäksi. Potilaat otettiin mukaan tutkimukseen mutaatiostatukseen katsomatta, mukaan lukien potilaat, joilla oli nolla/nolla-variantteja tai negatiivinen/negatiivinen-variantteja.

### Pediatriiset potilaat

ELIPSE-HoFH-tutkimuksessa yksi teini-ikäinen potilas sai evinakumabia laskimoon 15 mg/kg neljän viikon välein ja yksi teini-ikäinen potilas sai lumelääkettä muiden lipidipitoisuutta pienentävien hoitojen (esim. statiinit, etsetimibi, PCSK9:n estäjät ja lipoproteiinaferesi) lisänä. Kummallakin teini-ikäisellä potilaalla oli nolla/nolla-variantteja LDL-reseptoreissa. Viikolla 24 LDL-



kolesterolipitoisuuden prosentuaalinen muutos oli  $-73,3\%$  evinakumabia saaneella potilaalla ja  $+60\%$  lumelääkettä saaneella potilaalla.

ELIPSE-OLE-tutkimuksessa 13 teini-ikäistä potilasta sai evinakumabia laskimoon  $15\text{ mg/kg}$  neljän viikon välein muiden lipidipitoisuutta pienentävien hoitojen (esim. statiinit, etsetimibi, PCSK9:n estäjät ja lipoproteiiniafereesi) lisänä. Kaksi potilasta siirtyi tutkimukseen päätettyään ELIPSE-HoFH-tutkimuksen, ja 11 potilasta ei ollut aiemmin saanut evinakumabia. Näiden teini-ikäisten potilaiden keskimääräinen LDL-kolesterolipitoisuus lähtötilanteessa oli  $310,3\text{ mg/dl}$  ( $8,04\text{ mmol}$ ). Keski-ikä oli 14 vuotta (vaihteluväli: 12–17 vuotta), ja  $61,5\%$  oli poikia ja  $38,5\%$  tyttöjä. Lähtötilanteessa kaikki potilaat käyttivät statiineja,  $69,2\%$  etsetimibiä,  $46,2\%$  PCSK9:n estäjää ja  $61,5\%$  sai lipoproteiiniafereesihoitoa. Neljällä potilaalla ( $30,8\%$ ) oli nolla/nolla-variantteja ja neljällä potilaalla ( $30,8\%$ ) oli negatiivinen/negatiivinen-variantteja LDL-reseptoreiden mutaatioissa. Viikolla 24 LDL-kolesterolipitoisuuden prosentuaalinen muutos oli  $-52,4\%$  ( $n = 9$ ) evinakumabia saaneilla potilailla.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset evinakumabin käytöstä homotsygoottisen familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa yhdessä tai useammassa pediatriisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatrien potilaiden hoidossa).

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden harvinaisuuden vuoksi. Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain mahdolliset uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä valmisteyhteenveto päivitetään.

## 5.2 Farmakokinetiikka

### Imeytyminen

Evinakumabi annetaan laskimoon HoFH-potilaille. Populaatiofarmakokineettisen mallinnuksen perusteella  $C_{\max}$  on  $689 \pm 157\text{ mg/l}$  infuusion lopussa vakaassa tilassa neljän viikon välein annetun annoksen  $15\text{ mg/kg}$  jälkeen. Kertymäsuhte on 2. Vakaan tilan keskimääräinen pienin pitoisuus on  $241 \pm 96,5\text{ mg/l}$ .

### Jakautuminen

Populaatiofarmakokineettisen analyysin arvion perusteella kokonaisjakautumistilavuus oli tyyppillisellä  $74,1\text{ kg}$  painavalla henkilöllä  $4,8\text{ l}$  ja muuttuu suhteessa painoon, mikä viittaa siihen, että evinakumabi jakautuu ensisijaisesti verenkiertoelimistöön.

### Biotransformaatio

Erityisiä metaboliatutkimuksia ei tehty, koska evinakumabi on proteiini. Evinakumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG4-vasta-aine, joten sen odotetaan hajoavan pieniksi peptideiksi ja aminohapoiksi samoja kataboliareittejä kuin endogeeninen IgG.

### Eliminaatio

Evinakumabi eliminoituu rinnakkaisia reittejä lineaarisesti ja ei-lineaarisesti. Suuremmilla pitoisuuksilla evinakumabi eliminoituu pääasiassa ei-saturoituvan proteolyyttisen reitin kautta, kun taas pienemmillä pitoisuuksilla vallitsee ei-lineaarinen saturoituva ANGPTL3-kohdevälitteinen eliminaatio. Eliminaation puoliintumisaika ei ole vakio, sillä se on seerumin evinakumabipitoisuuden funktio.

Kun viimeinen vakaan tilan annos  $15\text{ mg/kg}$  laskimoon neljän viikon välein on annettu, mediaaniaika evinakumabipitoisuuden pienenemiseen alle havaittavan pitoisuuden ( $78\text{ ng/ml}$ ) on 19 viikkoa.

## Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Ei-lineaarisen puhdistuman takia annoksen suurentaminen 3-kertaiseksi 5 mg:sta/kg 15 mg:aan/kg laskimoon neljän viikon välein suurensi pitoisuus-aikakuvaajan alle jäänyttä pinta-alaa vakaassa tilassa ( $AUC_{\text{tau,ss}}$ ) 4,3-kertaisesti eli hieman enemmän kuin suhteessa annoksen suuruuteen.

## Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Evinakumabin farmakodynaaminen vaikutus LDL-kolesterolin pienentämisessä on epäsuora ja välittyä ANGPTL3:een sitoutumisen kautta. ANGPTL3:n kokonaispitoisuus suurenee lähtötilanteesta evinakumabin annon myötä ja suurenee tasannevaiheeseen, kun kohteen saturaatiota lähestytään. Kun kohde on saturoitunut, evinakumabipitoisuuksien suureneminen ei oletettavasti pienennä LDL-kolesterolipitoisuutta enempää.

## Erityisryhmät

Populaatiofarmakokineettinen analyysi, joka tehtiin 183 terveeltä tutkittavalta ja 95 HoFH-potilaalta saaduista tiedoista, viittaa siihen, ettei seuraavilla tekijöillä ole kliinisesti merkittävää vaikutusta evinakumabialtistukseen: ikä (12–75 vuotta), sukupuoli, paino (42–152 kg) ja etninen tausta. Afereesi ei näyttänyt vaikuttavan merkittävästi evinakumabin farmakokinetiikkaan.

### *Pediatriiset potilaat*

Kaksi 12–17-vuotiasta HoFH-potilasta sai evinakumabia laskimoon 15 mg/kg neljän viikon välein; vakaan tilan pienin pitoisuus ja pitoisuus infuusion lopussa olivat samaa luokkaa kuin aikuisilla potilailla todetut pitoisuudet. Evinakumabin farmakokinetiikkaa alle 12 vuoden ikäisten pediatrien HoFH-potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

### *Munuaisten vajaatoiminta*

Evinakumabi ei oletettavasti eliminoidu munuaisten kautta merkittävässä määrin. Havaitut pienimmät pitoisuudet vakaassa tilassa olivat vastaavanlaisia lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja potilailla, joilla on normaali munuaisten toiminta. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei ole tietoja.

### *Maksan vajaatoiminta*

Evinakumabi ei oletettavasti eliminoidu maksan kautta merkittävässä määrin. Maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei ole tietoja.

## **5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta**

Farmakologista turvallisuutta ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten ei-kliiniset tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

## Karsinogeenisuus ja mutageenisuus

Evinakumabilla ei ole tehty karsinogeenisuutta ja genotoksisuutta koskevia tutkimuksia. Monoklonaaliset vasta-aineet eivät oletettavasti muuta DNA:ta tai kromosomeja.

## Lisääntymistoksikologia

Kuusi kuukautta kestäneessä pitkäkestoisessa toksikologiatutkimuksessa sukukypsillä jaavanmakakeilla ei todettu hedelmällisyyden sijaismarkkereihin kohdistuvia vaikutuksia koiraiden ja naaraiden lisääntymiselimissä. Eläimillä tehdyissä lisääntymistutkimuksissa evinakumabia annettiin tiineenä oleville kaniineille ihon alle kolmen päivän välein gestaatiopäivästä 7 gestaatiopäivään 19 asti organogeneesin aikana. Emon toksisuutta (ennenaikainen neonataalikuolema, keskenmeno ja/tai ennenaikainen synnytys) havaittiin kaikilla annoksilla, ja sikiölöydöksiä (pehmytkudosten ja luuston epämuodostumia) havaittiin kaikilla muilla paitsi pienimmällä annoksella (1 mg/kg). Kaniineilla gestaatiojakson aikana mitattu keskimääräinen systeeminen altistus oli pienempi kuin mitä on mitattu

ihmisille suositellulla suurimmalla annoksella (MRHD) 15 mg/kg neljän viikon välein. Näiden tulosten kliininen merkitys on epävarma, sillä kaniinien lipidiprofiili eroaa merkittävästi ihmisten lipidiprofiilista, etenkin raskauden aikana.

Alkion/sikiön kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia ei ollut, kun evinakumabia annettiin rotille ihon alle kolmen päivän välein gestaatiopäivästä 6 gestaatiopäivään 18 asti organogeneesin aikana. Rotilla gestaatiojakson aikana mitattu keskimääräinen systeeminen altistus oli pienempi kuin mitä on mitattu ihmisille suositellulla suurimmalla annoksella 15 mg/kg neljän viikon välein.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

Proliini  
Arginiinihydrokloridi  
Histidiinihydrokloridimonohydraatti  
Polysorbaatti 80  
Histidiini  
Injektionesteisiin käytettävä vesi

### **6.2 Yhteensopimattomuudet**

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

### **6.3 Kesto aika**

#### Avaamaton injektio pullo

3 vuotta

#### Laimennuksen jälkeen

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytön aikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Jos laimennettua liuosta ei anneta välittömästi, sitä voidaan säilyttää tilapäisesti joko:

- jääkaapissa 2 °C:ssa – 8 °C:ssa enintään 24 tuntia laskettuna infuusion valmistusajankohdasta infuusion loppuun asti
- tai
- huoneenlämmössä enintään 25 °C:ssa enintään 6 tunnin ajan laskettuna infuusion valmistusajankohdasta infuusion loppuun asti.

### **6.4 Säilytys**

#### Avaamaton injektio pullo

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).  
Säilytä alkuperäisessä kotelossa. Herkkä valolle.  
Ei saa jäätyä.  
Ei saa ravistaa.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

## **6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)**

2,3 ml konsentraattia 3 ml:n kirkkaassa tyyppin 1 lasisessa injektiopullossa, jossa on harmaa klooributyylitulppa ja päällyste sekä sinetti ja repäisykorkki sisältäen 345 mg evinakumabia. Pakkauskoko: 1 injektiopullo.

8 ml konsentraattia 20 ml:n kirkkaassa tyyppin 1 lasisessa injektiopullossa, jossa on harmaa klooributyylitulppa ja päällyste sekä sinetti ja repäisykorkki sisältäen 1 200 mg evinakumabia. Pakkauskoko: 1 injektiopullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

## **6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet**

### Liuoksen valmistelu

Evkeeza on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Valmistelun ja käyttökuntoon saattamisen aikana on noudatettava tarkkaa aseptista tekniikkaa.

- Lääkevalmiste on tarkistettava silmämääräisesti sameuden, värimuutosten tai hiukkasten varalta ennen antoa.
- Injektiopullo on hävitettävä, jos liuos on sameaa tai siinä on värimuutoksia tai hiukkasia.
- Injektiopulloa ei saa ravistaa.
- Ota evinakumabia injektiopullostasta (-pulloista) tarvittava tilavuus potilaan painon perusteella ja siirrä infuusiopussiin, jossa on natriumkloridia 9 mg/ml (0,9 %) tai glukoosia 50 mg/ml (5 %) sisältävää infuusionestettä. Sekoita laimennettu liuos kääntämällä varovasti ylösalaisin.
- Laimennetun liuoksen lopullisen pitoisuuden on oltava 0,5–20 mg/ml.
- Liuos ei saa jäätyä eikä sitä saa ravistaa.
- Hävitä injektiopulloon jäänyt käyttämätön liuos.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Ultragenyx Germany GmbH  
Rahel-Hirsch-Str. 10  
10557 Berlin  
Saksa

## **8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

EU/1/21/1551/001  
EU/1/21/1551/002

## **9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 17 kesäkuuta 2021

## **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla <http://www.ema.europa.eu>

## **LIITE II**

- A. BIOLOGISEN (BIOLOGISTEN) VAIKUTTAVAN (VAIKUTTAVIEN) AINEEN (AINEIDEN) VALMISTAJA (VALMISTAJAT) JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTAJA(T)**
- B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**
- C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET**
- D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ**
- E. ERITYISVELVOITE TOTEUTTAA MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEISIÄ TOIMENPITEITÄ, KUN KYSEESSÄ ON POIKKEUSOLOSUHTEISSA MYÖNNETTY MYYNTILUPA**

**A. BIOLOGISEN (BIOLOGISTEN) VAIKUTTAVAN (VAIKUTTAVIEN) AINEEN (AINEIDEN) VALMISTAJA (VALMISTAJAT) JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T) VALMISTAJA(T)**

Biologisen (biologisten) vaikuttavan aineen (vaikuttavien aineiden) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet)

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.  
81 Columbia Turnpike  
Rensselaer, NY 12144  
Yhdysvallat

Erän vapauttamisesta vastaavan (vastaavien) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet)

Ultragenyx Netherlands B. V.  
Evert van de Beekstraat 1, Unit 104  
1118 CL Schiphol  
Alankomaat

**B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2).

**C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET**

• **Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset**

Tämän lääkevalmisteen osalta veloitteet määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisesta on määritelty Euroopan unionin viitepäivämäärät (EURD) ja toimittamisvaatimukset sisältävässä luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EY 107 c artiklan 7 kohdassa, ja kaikissa luettelon myöhemmissä päivityksissä, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla.

Myyntiluvan haltijan tulee toimittaa tälle valmisteelle ensimmäinen määräaikainen turvallisuuskatsaus kuuden kuukauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä.

**D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ**

• **Riskienhallintasuunnitelma (RMP)**

Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa 1.8.2 esitetyn sovitun riskienhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen riskienhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti.

Päivitetty RMP tulee toimittaa

- Euroopan lääkeviraston pyynnöstä
- kun riskienhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite (lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa).

**E. ERITYISVELVOITE TOTEUTTAA MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISEN JÄLKEISIÄ TOIMENPITEITÄ, KUN KYSEESSÄ ON POIKKEUSOLOSUHTEISSA MYÖNNETTY MYYNTILUPA**

Koska tämä myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein asetuksen (EY) N:o 726/2004 14 artiklan 8 kohdan nojalla, myyntiluvan haltijan on toteutettava seuraavat toimenpiteet mainittuun määräaikaan mennessä:

<b>Kuvaus</b>	<b>Määräaika</b>
Myyntiluvan myöntämisen jälkeinen non-interventionaalinen turvallisuustutkimus (PASS): pitkäaikaisten turvallisuustulosten, myös homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa (HoFH) sairastavien, $\geq 12$ -vuotiaiden ja evinakumabilla hoidettujen potilaiden sekä evinakumabihoitoa saavien naispuolisten HoFH-potilaiden raskauksien esiintyvyyden ja lopputulosten, arvioimiseksi, ja ajan myötä tapahtuvan ateroskleroosiprosessin arvioimiseksi HoFH-potilailla, joita hoidetaan evinakumabilla ja seurataan sydämen kuvantamisella, myyntiluvan haltijan on tehtävä tutkimus HoFH-potilaiden rekisteristä saatujen tietojen perusteella ja toimitettava tutkimuksen tulokset.	Vuosittaiset tutkimusraportit toimitetaan vuosittaisen uudelleenarvioinnin yhteydessä.

**LIITE III**

**MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE**



## **A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT**

**ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT  
KOTELO**

**1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Evkeeza 150 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
evinakumabi

**2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)**

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 150 mg evinakumabia.  
Yksi 2,3 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 345 mg evinakumabia.  
Yksi 8 ml:n injektiopullo konsentraattia sisältää 1 200 mg evinakumabia.

**3. LUETTELO APUAINEISTA**

Apuaineet: proliini, arginiinihydrokloridi, histidiini, histidiinihydrokloridimonohydraatti,  
polysorbaatti 80 ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

**4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ**

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

345 mg/2,3 ml  
1 200 mg/8 ml  
1 injektiopullo

**5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)**

Laskimoon.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.  
Vain kertakäyttöön.

**6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN  
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

**7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN**

**8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP

**9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Säilytä jääkaapissa.  
Säilytä alkuperäisessä kotelossa. Herkkä valolle.  
Ei saa jäättyä.  
Ei saa ravistaa.

**10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN****11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE**

Ultragenyx Germany GmbH  
Rahel-Hirsch-Str. 10  
10557 Berlin  
Saksa

**12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

EU/1/21/1551/001  
EU/1/21/1551/002

**13. ERÄNUMERO**

Lot

**14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU****15. KÄYTTÖOHJEET****16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA**

Vapautettu pistekirjoituksesta.

**17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI**

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

**18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT**

PC  
SN  
NN

**PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT  
INJEKTIOPULLON ETIKETTI**

**1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)**

Evkeeza 150 mg/ml steriili konsentraatti  
evinakumabi  
i.v.

**2. ANTOTAPA**

**3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP

**4. ERÄNUMERO**

Lot

**5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ**

345 mg/2,3 ml  
1 200 mg/8 ml

**6. MUUTA**

## **B. PAKKAUSSELOSTE**

## Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

### Evkeeza 150 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten evinakumabi

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Evkeeza on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Evkeeza-valmistetta
3. Miten Evkeeza-valmistetta annetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Evkeeza-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Evkeeza on ja mihin sitä käytetään

##### Mitä Evkeeza on

Evkeeza-valmisteen vaikuttava aine on evinakumabi. Se on lääketyyppi, jota kutsutaan monoklonaaliseksi vasta-aineeksi. Monoklonaaliset vasta-aineet ovat proteiineja, jotka kiinnittyvät elimistössä oleviin muihin aineisiin.

##### Mihin Evkeeza-valmistetta käytetään

Evkeeza-valmistetta käytetään aikuisille ja vähintään 12 vuoden ikäisille lapsille homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia -nimisen sairauden aiheuttaman hyvin korkean kolesteroliarvon hoitoon. Evkeeza-valmistetta käytetään vähärasvaisen ruokavalion ja muiden lääkkeiden kanssa kolesteroliarvon pienentämiseen.

Homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia on perinnöllinen sairaus, joka periytyy yleensä sekä äidiltä että isältä.

Tässä sairaudessa LDL-kolesterolin (”pahan kolesterolin”) pitoisuudet ovat erittäin suuria syntymästä lähtien. Näin suuret pitoisuudet voivat johtaa sydänkohtauksiin, sydämen läppävikaan tai muihin ongelmiin nuorella iällä.

##### Miten Evkeeza vaikuttaa?

Evkeeza-valmisteen vaikuttava aine evinakumabi kiinnittyy elimistössä olevaan ANGPTL3-proteiiniin ja estää sen vaikutukset. ANGPTL3-proteiini osallistuu kolesterolin tuotannon säätelyyn, ja sen vaikutuksen esto vähentää kolesterolin tuotantoa. Tällä tavoin Evkeeza voi pienentää veren LDL-kolesterolipitoisuuksia ja estää korkeasta LDL-kolesterolipitoisuudesta aiheutuvia ongelmia.

## 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Evkeeza-valmistetta

### Sinulle ei pidä antaa Evkeeza-valmistetta

- jos olet allerginen evinakumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

### Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, ennen kuin sinulle annetaan Evkeeza-valmistetta.

### Tarkkaile vakavia haittavaikutuksia

Evkeeza voi aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita.

- Jos havaitset vaikean allergisen reaktion oireita, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle välittömästi. Oireet on lueteltu kohdassa 4 ”Vakavat haittavaikutukset”.

### Lapset

Evkeeza-valmistetta ei suositella alle 12 vuoden ikäisille lapsille, koska vielä ei ole tarpeeksi tietoa sen käytöstä tässä potilasryhmässä.

### Muut lääkevalmisteet ja Evkeeza

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

### Raskaus ja ehkäisy

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

- Evkeeza voi olla haitallinen syntymättömälle lapsellesi.
- Kerro lääkärille välittömästi, jos tulet raskaaksi saadessasi Evkeeza-hoitoa.

Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä raskauden ehkäisemiseksi.

- Käytä tehokasta ehkäisyä saadessasi Evkeeza-hoitoa ja
- Käytä tehokasta ehkäisyä vähintään 5 kuukauden ajan viimeisen Evkeeza-annoksen jälkeen.

Keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä on sinulle sopivin ehkäisymenetelmä tänä aikana.

### Imetys

- Jos imetät tai suunnittelet imettämistä, kysy lääkäriltä neuvoa, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä.
- Ei tiedetä, erittyykö Evkeeza rintamaitoon.

### Ajaminen ja koneiden käyttö

Evkeeza ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää työvälineitä tai koneita.

## 3. Miten Evkeeza-valmistetta käytetään

### Kuinka paljon Evkeeza-valmistetta annetaan

Lääkärisi määrittää, kuinka paljon lääkettä sinulle annetaan. Määrä riippuu painostasi.

- Suositeltu annos on 15 mg painokiloa kohti.
- Sinulle annetaan lääkettä noin kerran kuukaudessa.

### Miten Evkeeza-valmistetta annetaan

Evkeeza-valmisteen antaa yleensä lääkäri tai sairaanhoitaja. Se annetaan tiputuksena laskimoon (laskimonsisäisenä infuusiona) 60 minuutin kuluessa.

### Jos Evkeeza-annos jää väliin

Jos olet unohtanut vastaanottokäynnin, jolla Evkeeza annetaan, ota yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan mahdollisimman pian.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

##### **Vakavat haittavaikutukset**

**Vaikeat allergiset reaktiot** (melko harvinaisia: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle välittömästi, jos havaitset seuraavia vaikean allergisen reaktion (anafylaktisen reaktion) oireita. Tiputus lopetetaan välittömästi, ja sinun on ehkä otettava muita lääkkeitä reaktion hoitamiseksi:

- turvotus – pääasiassa huulten, kielen ja nielun, mikä vaikeuttaa nielemistä ja hengittämistä
- hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen
- huimaus tai pyörtyminen
- ihottuma, nokkosihottuma
- kutina.

##### **Muut haittavaikutukset**

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos havaitset joitakin seuraavia haittavaikutuksia:

**Hyvin yleiset** (saattaa esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

- vilustumisoireet, kuten nuha (nenänielun tulehdus).

**Yleiset** (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

- huimaus
- kurkkukipu tai poskiontelotulehdus (ylähengitysteiden infektiio)
- huonovointisuus (pahoinvointi)
- vatsakipu
- ummetus
- selkäkipu
- kipu käsissä ja jaloissa (raajakipu)
- influenssan oireet
- väsymys
- infuusioreaktio, kuten kutina tiputuksen antokohdassa.

##### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan [liitteessä V](#) luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

#### 5. Evkeeza-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä. Ei saa ravistaa.

Säilytä alkuperäisessä kotelossa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että se on sameaa tai että siinä on värimuutoksia tai hiukkasia.



Älä säilytä jäljelle jäänyttä infuusioliuosta uudelleen käytettäväksi. Jäljelle jäänyttä infuusioliuosta ei pidä käyttää uudelleen, vaan se on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Evkeeza sisältää**

- Vaikuttava aine on evinakumabi.

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia, liuosta varten, sisältää 150 mg evinakumabia.

Yksi injektiopullo sisältää joko 345 mg evinakumabia 2,3 ml:ssa konsentraattia tai 1 200 mg evinakumabia 8 ml:ssa konsentraattia.

- Muut aineet ovat proliini, arginiinihydrokloridi, histidiinihydrokloridimonohydraatti, polysorbaatti 80, histidiini ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)**

Evkeeza infuusiokonsentraatti, liuosta varten, on kirkas tai hieman opalisoiva, väritön tai vaaleankeltainen liuos.

Se on saatavana seuraavissa pakkauksissa: 1 lasinen injektiopullo, jossa on 2,3 ml konsentraattia, tai 1 lasinen injektiopullo, jossa on 8 ml konsentraattia.

### **Myyntiluvan haltija**

Ultragenyx Germany GmbH  
Rahel-Hirsch-Str. 10  
10557 Berlin  
Saksa

### **Valmistaja**

Ultragenyx Netherlands B. V.  
Evert van de Beekstraat 1, Unit 104  
1118 CL Schiphol  
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

**BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, XI**

Ultragenyx Germany GmbH, DE  
Tel/Tél /Тел./Тlf/Τηλ/Пuh/Сími : + 49 30 20179810

### **FR**

Ultragenyx France SAS, FR  
Tél: + 33 185 653761 ou 0800 91 79 24 (numéro vert)

### **Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi <kuukausi VVVV>**

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden harvinaisuuden vuoksi. Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.

### **Muut tiedonlähteet**

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla <http://www.ema.europa.eu>

---

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

### Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja erännumero dokumentoitava selkeästi.

### Käyttöohjeet

#### *Liuoksen valmistelu*

Evkeeza on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Valmistelun ja käyttökuntoon saattamisen aikana on noudatettava tarkkaa aseptista tekniikkaa.

- Lääkevalmiste on tarkistettava silmämääräisesti sameuden, värimuutosten tai hiukkasten varalta ennen antoa.
- Injektiopullo on hävitettävä, jos liuos on sameaa tai siinä on värimuutoksia tai hiukkasia.
- Injektiopulloa ei saa ravistaa.
- Ota evinakumabia injeksiopullost (pulloista) tarvittava tilavuus potilaan painon perusteella ja siirrä infuusiopussiin, jossa on natriumkloridia 9 mg/ml (0,9 %) tai glukoosia 50 mg/ml (5 %) sisältävää infuusionestettä. Sekoita laimennettu liuos kääntämällä varovasti ylösalaisin.
- Laimennetun liuoksen lopullisen pitoisuuden on oltava 0,5–20 mg/ml.
- Liuos ei saa jäätyä eikä sitä saa ravistaa.
- Hävitä injeksiopulloon jäänyt käyttämätön liuos.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

#### *Laimennuksen jälkeen*

Anna laimennettu liuos välittömästi valmistelun jälkeen. Jos laimennettua liuosta ei anneta välittömästi, sitä voidaan säilyttää tilapäisesti joko:

- jääkaapissa 2 °C:ssa – 8 °C:ssa enintään 24 tuntia laskettuna infuusion valmistusajankohdasta infuusion loppuun asti
- tai
- huoneenlämmössä enintään 25 °C:ssa enintään 6 tunnin ajan laskettuna infuusion valmistusajankohdasta infuusion loppuun asti.

#### *Anto*

- Jos liuos on säilytetty kylmässä, anna sen lämmitä huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C) ennen antoa.
- Evinakumabi annetaan 60 minuutin kestoisena laskimoinfuusiona sellaisen laskimoyhteyden kautta, jossa on steriili kiinteä tai irrallinen 0,2–5 mikronin suodatin. Evinakumabia ei saa antaa nopeana infuusiona tai boluksena.
- Evinakumabia ei saa sekoittaa tai antaa samanaikaisesti muiden lääkevalmisteiden kanssa saman infusioletkun kautta.

Infuusionopeutta voidaan hidastaa tai infuusio keskeyttää tai lopettaa, jos potilaalla ilmenee haittavaikutuksen merkkejä, infuusion liittyvät oireet mukaan lukien.