

BILAGA I
PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvätska, lösning

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml injektionsvätska, lösning innehåller 300 MBq florbetaben (^{18}F) vid dag och tidpunkt för kalibrering.

Aktiviteten per injektionsflaska varierar mellan 300 MBq och 3000 MBq vid dag och tidpunkt för kalibrering.

Fluor (^{18}F) sönderfaller till stabilt syre (^{18}O) med en halveringstid på cirka 110 minuter genom emission av en positronstrålning på 634 keV följt av en fotonisk annihilationsstrålning på 511 keV.

Hjälpämne(n) med känd effekt

Detta läkemedel innehåller upp till 1,2 g etanol och upp till 33 mg natrium per dos (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnena, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Klar färglös vätska.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Endast avsett för diagnostik.

Neuraceq är ett radioaktivt läkemedel avsett för positronemissionstomografi (PET) för avbildning av neuritiska beta-amyloida plack i hjärnan hos vuxna patienter med kognitiv nedsättning vilka utreds avseende Alzheimers sjukdom (AD) och andra orsaker till den kognitiva nedsättningen. Neuraceq ska användas i anslutning till en klinisk bedömning.

En negativ undersökning tyder på få eller inga plack, vilket inte är förenligt med diagnosen Alzheimers sjukdom. För begränsningar i tolkningen av positiv undersökning, se avsnitt 4.4 och 5.1.

4.2 Dosering och administreringsätt

En PET-undersökning med florbetaben (^{18}F) bör ordinerars av läkare med erfarenhet av klinisk behandling av neurodegenerativa sjukdomar.

Neuraceq-bilder ska endast tolkas av bildgranskare som är utbildade i tolkning av PET-bilder framställda med florbetaben (^{18}F). Vid osäkerhet angående lokaliseringen av den grå substansen och gränsen mellan grå/vit substans i PET-bilden, rekommenderas att samtidigt titta på en nyligen tagen datortomografi (DT)- eller magnetisk resonans (MR)-bild av patienten, för att få en sammanslagen PET-DT- eller PET-MR-bild (se avsnitt 4.4).

För varje patient måste strålningsexponeringen vara motiverad av den sannolika nyttan. Den aktivitet som administreras ska i varje enskilt fall vara så låg som rimligen är möjligt för att erhålla den nödvändiga diagnostiska informationen.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Nytta-riskförhållandet måste nogt utvärderas för dessa patienter eftersom det finns en risk för ökad strålningsexponering. Florbetaben (¹⁸F) utsöndras huvudsakligen via det hepatobiliära systemet och patienter med nedsatt leverfunktion löper risk för ökad strålningsexponering (se avsnitt 4.2).

Pediatrik population

För information om användning för en pediatrik population, se avsnitt 4.2 eller 5.1.

Tolkning av Neuraceq-bilder

Neuraceq-bilder ska endast tolkas av bildgranskare som är utbildade i tolkning av PET-bilder framställda med florbetaben (¹⁸F). En negativ bild indikerar att densiteten av kortikala beta-amyloida plack är låg eller obefintlig. En positiv bild indikerar måttlig till hög densitet. Bildtolkningsfel har förekommit när det gäller bestämning av densiteten neuritiska beta-amyloida plack i hjärnan, inklusive falskt negativa och falskt positiva resultat.

PET-bilder granskas i transaxiell vy i gråskala. Bildgranskaren ska jämföra signalintensiteten i hjärnbarkens grå substans med den maximala signalintensiteten i den vita hjärnsubstansen. Bilderna ska granskas på ett systematiskt sätt (figur 1) med början vid nivån för cerebellum och vidare upp genom de laterala temporal- och frontalloberna, sedan till området för bakre cingulum cortex och precuneus och slutligen till parietalloben.


Tolkningen av bilderna bygger på en visuell jämförelse mellan aktiviteten i hjärnbarkens grå substans och aktiviteten i intilliggande vit substans. Vart och ett av dessa hjärnområden – laterala temporallobes, frontallobes, bakre cingulum, precuneus och parietallobes – ska systematiskt utvärderas visuellt och poängsättas enligt regionalt kortikalt upptag av spårsubstans (RCTU, regional cortical tracer uptake) (tabell 1).

Tabell 1: Definitioner av regionalt kortikalt upptag av spårsubstans (RCTU)

Poäng för regionalt kortikalt upptag av spårsubstans (RCTU)	Tillstånd för utvärdering
1 (Inget upptag av spårsubstans)	Upptag av spårsubstans(dvs. signalintensitet) i grå substans i regionen är lägre än i vit substans.
2 (Måttligt upptag av spårsubstans)	Mindre område(n) med lika stort eller större upptag av spårsubstans som i vit substans: sträcker sig bortom den vita substansens kant till den kortikala yttre gränsen och involverar flertalet snitt inom respektive region.
3 (Uttalat upptag av spårsubstans)	Ett större sammanflytande område med lika stort eller större upptag av spårsubstans som i vit substans som sträcker sig bortom den vita substansens kant till den kortikala yttre gränsen och inkluderar flertalet snitt inom respektive region.

Obs! För poäng för upptag av spårsubstans i hjärnbarken ska fyndet ha påvisats i flertalet snitt inom regionen i fråga.

Figur 1: Neuraceq PET-bilder som visar exempel på negativa PET-undersökningar med florbetaben (¹⁸F) (överst) och positiva undersökningar (underst).



Den övergripande bedömningen av en visuell PET-undersökning utgår från patienter och grundar sig på ett binärt utfall som antingen positiv eller negativ. En patient klassificeras som positiv eller negativ baserat på poängen för mängd amyloida plack i hjärnan (BAPL, brain amyloid plaque load) (tabell 2) vilken härleds från poängen för regionalt kortikalt upptag av spårsubstans (RCTU) i de fyra hjärnområdena (tabell 1).

Tabell 2: Definitioner av mängd amyloida plack i hjärnan (BAPL, brain amyloid plaque load)

Bedömning	BAPL-poäng		Regel för utvärdering
Negativ undersökning	1	Bild utan utfällning av beta-amyloid	RCTU-poäng 1 i var och en av de fyra hjärnregionerna (laterala temporallober, frontallober, bakre cingulum/precuneus, parietallober)
Positiv undersökning	2	Bild med måttlig utfällning av beta-amyloid	RCTU-poäng 2 i någon eller alla av de fyra hjärnregionerna och ingen poäng på 3 i dessa fyra regioner
	3	Bild med uttalad utfällning av beta-amyloid	RCTU-poäng 3 i minst en av de fyra hjärnregionerna

Begränsningar för användning

Det går inte att ställa diagnos på AD eller annan kognitiv nedsättning enbart baserat på ett positivt resultat eftersom utfällning av neuritiska plack i grå substans kan finnas hos asymtomatiska äldre samt vid vissa neurodegenerativa demenssjukdomar (AD, Lewykroppsdemens, Parkinsons sjukdom).

För begränsningar avseende användning till patienter med lindrig kognitiv nedsättning (MCI, mild cognitive impairment), se avsnitt 5.1.

Hur effektivt florbetaben (^{18}F) kan förutsäga utveckling av AD eller undersöka terapivaret har inte fastställts (se avsnitt 5.1).

Vissa bilder kan vara svåra att tolka på grund av bildbrus, atrofi med en uttunnad kortikal linje eller oskarpa bilder, vilket kan leda till tolkningsfel. Om det råder osäkerhet om lokaliseringen av grå substans och gränsen mellan grå/vit substans i PET-bilden och en DT- eller MR-bild tagits samtidigt bör bildgranskaren undersöka den sammanslagna PET-DT eller PET-MR-bilden för att klargöra förhållandet mellan radioaktivitet respektive grå substans på PET-bilden.

Ökat upptag har identifierats i extracerebrala strukturer som t.ex. ansikte, hårbotten och i några fall skelett. Restaktivitet i midsagittala sinus kan ibland observeras (se avsnitt 5.2).

Efter undersökningen

Nära kontakt med spädbarn och gravida kvinnor ska undvikas under de första 24 timmarna efter injektionen.

Särskild varning

Detta läkemedel innehåller 33 mg natrium per dos, motsvarande 1,6 % av WHO:s högsta rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna).

Detta läkemedel innehåller 15 vol % etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1,2 g per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin per dos.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Försiktighetsåtgärder med avseende på miljöfara finns i avsnitt 6.6.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts *in vitro*.

I analyser av radioligandbindning med en bred panel av receptorer, jonkanaler och transportörer från människa och djur sågs ingen signifikant bindning.

In vitro-studier med humana levermikrosomer visade inte på någon potential att hämma cytokrom P450-enzymssystemet.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

När radiofarmaka övervägs till en fertil kvinna är det viktigt att fastställa eventuell graviditet. Alla kvinnor vars menstruation har uteblivit en gång ska betraktas som gravida tills motsatsen har bevisats. Om tveksamhet råder avseende eventuell graviditet (om en menstruation uteblivit, eller om menstruationerna är väldigt oregelbundna osv.) ska alternativa metoder där joniserande strålning inte används erbjudas patienten (om sådana finns).

Graviditet

När gravida kvinnor undersöks med radioisotoper utsätts även fostret för stråldoser. Under graviditet ska därför bara undersökningar som är absolut nödvändiga utföras och endast om den sannolika nyttan vida överstiger den risk som moder och foster utsätts för.

Inga studier har utförts på gravida kvinnor. Inga djurstudier för att undersöka reproduktionseffekterna av florbetaben (^{18}F) har utförts (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är okänt om florbetaben (^{18}F) utsöndras i bröstmjöl. Innan radiofarmaka ges till en kvinna som ammar ska man överväga möjligheten att skjuta upp administreringen av radionukliden tills kvinnan har slutat amma, samt vilket som är det lämpligaste valet av radiofarmaka, med hänsyn till utsöndring av aktivitet i bröstmjöl. Om administrering bedöms nödvändig ska ett uppehåll göras i amningen under 24 timmar och all utpumpad mjöl kastas.

Nära kontakt med spädbarn ska undvikas under de första 24 timmarna efter injektionen.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier har utförts.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Neuraceq har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den övergripande säkerhetsprofilen för Neuraceq är baserad på data från 1 295 administreringar av Neuraceq till 1 077 patienter och 12 patienter som fick vehikel. Upprepad dosering med ett års mellanrum visade att säkerhetsprofilen efter det första, andra och tredje doseringstillfället inte skilde sig åt.

Lista över biverkningar i tabellform

Frekvenser av förekommande biverkningar definieras enligt följande konvention: mycket vanliga ($\geq 1/10$), vanliga ($\geq 1/100$, $< 1/10$), mindre vanliga ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), sällsynta ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$), mycket sällsynta ($< 1/10\ 000$), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna enligt fallande svårighetsgrad.

Tabell 3: lista över biverkningar

Organsystem	Vanliga	Mindre vanliga
<u>Centrala och perifera nervsystemet</u>		Neuralgi Huvudvärk Svidande känsla Tremor
<u>Blodkärl</u>		Hypotoni Värmevallningar Hematom
<u>Magtarmkanalen</u>		Diarré Illamående
<u>Lever och gallvägar</u>		Onormal leverfunktion
<u>Hud och subkutan vävnad</u>		Toxiskt utslag Utslag Hyperhidros
<u>Muskuloskeletala systemet och bindväv</u>		Smärta i extremiteter Obehag i extremiteter
<u>Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället</u>	Smärta vid injektionsstället Erytem vid injektions- /appliceringsstället	Pyrex Trötthet Värmekänsla Smärta vid kärlpunktionsstället Smärta vid kateterstället Hematom vid injektionsstället Irritation vid injektionsstället Reaktion vid punktionsstället Obehag vid injektionsstället Värmekänsla vid injektionsstället
<u>Undersökningar</u>		Förhöjt blodkreatinin

Exponering för joniserande strålning är kopplat till cancerutveckling och risk för medfödda missbildningar. Eftersom den effektiva dosen är cirka 5,8 mSv när den högsta rekommenderade aktiviteten på 300 MBq florbetaben (^{18}F) administreras, är sannolikheten låg att dessa biverkningar ska uppstå.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i [bilaga V](#).

4.9 Överdoser

På grund av den lilla mängden florbetaben (^{18}F) i varje dos förväntas inte överdosering orsaka några farmakologiska effekter. Vid en strålningsöverdos ska den absorberade dosen till patienten om möjligt reduceras genom att elimineringen av radionukliden ur kroppen påskyndas genom frekvent miktion och defekation. Det kan underlätta att beräkna den effektiva dos som har använts.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diagnostiska radiofarmaka, centrala nervsystemet, ATC-kod: V09AX06

Verkningsmekanism

Florbetaben (^{18}F) binder till beta-amyloida neuritiska plack i hjärnan. *In vitro* visar florbetaben (^{18}F) nanomolär bindningsaffinitet till syntetiska beta-amyloidfibriller och till homogenat från AD-hjärna. Bindning av florbetaben (^{18}F) till beta-amyloida plack demonstrerades dessutom postmortem i AD-hjärnor med hjälp av autoradiografi, resultat som stöddes av immunhistokemi eller Bielschowsky-färgning.

Den kvantitativa korrelationen mellan upptaget av florbetaben (^{18}F) i kortikal grå substans och beta-amyloida plack bedömdes inte i obduktionsprover *in vivo*. Bindningen *in vivo* av florbetaben (^{18}F) till andra amyloida strukturer, eller andra hjärnstrukturer eller receptorer är hittills okänd.

Farmakodynamisk effekt

Vid de låga kemiska koncentrationerna som finns i Neuraceq har florbetaben (^{18}F) inte någon detekterbar farmakologisk effekt.

I avslutade kliniska prövningar mättes upptaget av florbetaben (^{18}F) kvantitativt på 7 fördefinierade ställen i hjärnbarken (frontallob, parietallob, lateral och medial temporallob, occipitallob, nucleus caudatus och bakre cingulum/precuneus och främre gyrus cinguli) samt lillhjärnans bark med hjälp av standardiserade upptagsvärden (SUV, standardised uptake values). Kvot för kortikalt SUV (SUVR, i förhållande till lillhjärnans bark) är högre hos AD-patienter jämfört med friska frivilliga försökspersoner.

Klinisk effekt

En pivotal studie av 31 patienter i livets slutskede syftade till att bedöma florbetabens (^{18}F) diagnostiska värde vad gäller att detektera densiteten kortikala neuritiska plack (ingen eller låg jämfört med måttlig eller hög) enligt CERAD-kriterierna. PET-resultaten jämfördes med den maximala neuritiska plackdensiteten mätt på sektioner av gyrus precentralis, övre och centrala temporala gyri, undre parietallob, hippocampus och andra hjärnregioner vid obduktion av patienten.

Patienternas kognitiva status kunde inte fastställas med tillförlitlighet. För samtliga 31 patienter gjordes en blindad visuell PET-bedömning utförd av tre blindade bildgranskare. För majoriteten av bedömarna var sensitiviteten 100 % (95 % KI: 80,5-100 %) och specificitet 85,7 % (95 % KI: 67,4-100 %). I en analys av sensitivitet och specificitet *post hoc* var flertalet visuella PET-bedömningar jämfört med histopatologi i en större population (74 patienter) 97,9 % (95 % KI: 93,8-100 %) respektive 88,9 % (95 % KI: 77-100%).

Florbetabens (^{18}F) sensitivitet och specificitet för att upptäcka beta-amyloida plack undersöktes ytterligare i en tilläggsstudie, där en annan grupp av fem blindade, elektroniskt utbildade bedömare tolkade bilder från 54 patienter som följts fram till obduktion i den pivotala studien. De histopatologiska kriterierna överensstämde inte med CERAD-kriterierna. Resultaten låg under resultaten som setts i den pivotala prövningen: sensitivitet låg mellan 77,5 och 90 % och specificitet mellan 62,5 % och 85,7 %. Överensstämmelse mellan bedömarna visades med Fleiss kappa-värden mellan 0,68 och 0,87. Vid en jämförelse av resultat från PET-undersökning med bedömningen av histopatologi insamlad för samtliga patienter (samma som användes för den ursprungliga pivotala studien och *post hoc*-analysen) var för majoriteten av bedömarna sensitivitet 100 % (95 % KI: 89,4-100 %) och specificitet 71,4 % (95 % KI: 52,1-90,8 %).

I en longitudinell studie undersöktes 45 patienter, kliniskt diagnostiserade med lindrig kognitiv nedsättning (MCI) med en PET-undersökning med florbetaben (^{18}F) vid studiens start, och följdes upp under 24 månader för att utvärdera sambandet mellan florbetaben (^{18}F)-avbildning och förändringar i diagnostiskt status. 29 (64,4 %) av MCI-patienter visade positiva resultat med PET-undersökning med

florbetaben (^{18}F). Vid uppföljningen efter 24 månader hade 19 personer (42,2 %) försämrats till klinisk AD. Av de 29 MIC-patienterna med en positiv PET-undersökning klassades 19 (65,5 %) kliniskt som försämrade till klinisk AD efter 24 månader jämfört med 0 (0 %) av 16 personer med en negativ undersökning. Sensitiviteten för florbetaben (^{18}F)-undersökningar att visa omvandling från MCI till AD hos 19 personer som försämrades var 100 %, specificiteten hos 26 personer som inte försämrades var 61,5 % (95 % KI: 42,8–80,2 %) och den positiva sannolikhetskvoten var 2,60 (1,60–4,23). Utformningen av denna studie gör det inte möjligt att uppskatta risken för progression av MCI till klinisk AD.

Pediatrik population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för florbetaben (^{18}F) för alla grupper av den pediatrika populationen eftersom sjukdomen eller tillståndet mot vilket läkemedlet är avsett endast förekommer hos den vuxna populationen och eftersom det inte finns någon signifikant terapeutisk fördel med det specifika läkemedlet över befintliga behandlingar för pediatrika patienter (se avsnitt 4.2 för information om pediatrik användning).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Efter intravenös bolusinjektion uppnås en koncentration radioaktivitet på 2–3 % injicerad dos/L i arteriell plasma 10 minuter efter injektionen.

Florbetaben (^{18}F) binder i hög grad till plasmaproteiner (>98,5 %).

Organupptag

Upptag av radioaktivitet i hjärnan sker snabbt och uppnår cirka 6 % av den injicerade radioaktiviteten 10 minuter efter injektion.

Friska kontrollpersoner visar relativt låga nivåer av florbetabenretention (^{18}F) i hjärnbarken. De högsta nivåerna av upptag sker i pons och andra regioner av vit substans. Hos AD-patienter visar kortikala regioner och striatumregioner signifikant större upptag jämfört med hos kontrollpersoner. Hos både AD-patienter och kontrollpersoner är retentionen hög i pons och områden med vit substans.

Upptag har även identifierats i vissa fall i extracerebrala strukturer som t.ex. ansikte, hårbotten och skelett. Orsaken till denna ackumulation är inte känd men kan bero på ackumulering av florbetaben (^{18}F) eller någon av dess radioaktiva metaboliter, eller på radioaktivitet i blodet. Restaktivitet i midsagittala sinus kan ibland observeras, sannolikt på grund av närvaro av spårsubstans i blodpoolen.

Den biofysiska grunden till att florbetaben (^{18}F) lagras i den vita substansen i den levande humana hjärnan kan inte förklaras slutgiltigt. Det antas att ospecifik bindning av det radioaktiva läkemedlet till den lipidinnehållande myelinskidan bidrar till retention i den vita substansen.

Eliminering

Florbetaben (^{18}F) elimineras från plasma hos AD-patienter med en genomsnittlig biologisk halveringstid på cirka 1 timme. Ingen radioaktivitet gick att mäta i blodet cirka 4 timmar efter injektionen.

Baserat på undersökningar *in vitro* metaboliseras florbetaben (^{18}F) främst via CYP2J2 och CYP4F2.

12 timmar efter injektion har upp till cirka 30 % av injicerad radioaktivitet utsöndrats i urinen. Det gick inte att ytterligare kvantifiera aktivitet i urinen vid tidpunkter efter denna tidsram.

Halveringstid

Fysisk halveringstid för fluor (^{18}F) är 110 minuter.

12 timmar efter injektionen har 98,93 % av aktiviteten sönderfallit, 24 timmar efter injektion har 99,99 % av aktiviteten sönderfallit.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Farmakokinetiken hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion har inte fastställts.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gångse studier avseende säkerhetsfarmakologi toxicitet, allmäntoxicitet, toxicitet vid enstaka doser och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. NOAEL var minst 20 gånger den högsta dosen till människa när eventuell toxicitet efter 28 dagars upprepade intravenösa injektioner av florbetaben (¹⁸F) testades på råtta och hund.

Kroniska studier och karcinogenicitetsstudier har inte utförts eftersom läkemedlet inte är avsett för regelbunden eller kontinuerlig administrering.

Studier avseende reproduktionstoxicitet har inte utförts.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Askorbinsyra
Vattenfri etanol
Makrogol 400
Natriumaskorbat (för pH-justering)
Vatten för injektionsvätskor.

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Upp till 10 timmar efter avslutad syntes.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Förvaring av radioaktiva läkemedel skall ske i enlighet med nationella bestämmelser om radioaktivt material.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Färglös 15 ml injektionsflaska av typ I glas, försluten med en propp av klorbutyl och aluminiumförsegling.

Varje flerdos injektionsflaska innehåller 1 till 10 ml lösning motsvarande 300 till 3000 MBq vid dag och tidpunkt för kalibrering (ToC).

Till följd av skillnader i tillverkningsprocessen är det möjligt att vissa injektionsflaskor levereras med en punkterad gummipropp.

Förpackningsstorlekar: en injektionsflaska.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Allmän varning

Radiofarmaka ska endast tas emot, användas och administreras av behöriga personer i avsedd klinisk miljö. Mottagning, förvaring, användning, transport och avfallshantering omfattas av bestämmelser och/eller kräver tillämpliga tillstånd från behörig myndighet.

Radioaktiva läkemedel ska beredas på sätt som uppfyller krav på både strålskydd och farmaceutisk kvalitet. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas.

Om det kan ifrågasättas att injektionsflaskan är hel ska den inte användas.

Administreringsprocedurer ska utföras på ett sätt som minimerar risken för kontaminering av läkemedlet och bestrålning av operatörerna. Adekvat skyddsutrustning är obligatorisk.

Administrering av radiofarmaka innebär risker för andra personer (inklusive gravid sjukvårdspersonal) från extern strålning eller kontaminering från spill av urin, uppkastningar osv. Strålskyddsåtgärder i enlighet med nationella föreskrifter måste därför följas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Life Radiopharma Berlin GmbH
Max-Planck-Straße 4
12489 Berlin
Tyskland
e-post: gra@life-mi.com

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/906/001

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännande: 20. februari 2014
Datum för den senaste förnyelsen:

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

11. ABSORBERAD DOS OCH EFFEKTIV DOS

I nedanstående tabell visas dosimetrin beräknad med hjälp av programmet OLINDA (**O**rgan **L**evel **I**Nternal **D**ose **A**ssessment).

Beräknade absorberade strålningsdoser i organ visas i tabell 3, med data från vita friska frivilliga (n=17). Dosimetriberäkningar har anpassats till vuxenmodellen (kroppsvikt på 70 kg).

Tabell 4: Beräknade absorberade strålningsdoser från intravenös injektion av Neuraceq till vita patienter

Organ	Absorberad dos per administrerad aktivitet (mGy/MBq)
Binjurar	0,0130
Hjärna	0,0125
Bröst	0,0074
Gallblåsa	0,137
Magtarmkanalen	
Nedre tjocktarm	0,0351
Tunntarm	0,0314
Magsäck	0,0116
Övre tjocktarm	0,0382
Hjärta	0,0139
Njurar	0,0238
Lever	0,0386
Lungor	0,0148
Muskler	0,00948
Äggstockar	0,0156
Bukspottkörtel	0,0139
Röd benmärg	0,0122
Benbildande celler	0,0148
Hud	0,00689
Mjälte	0,0102
Testiklar	0,00913
Thymus	0,00892
Sköldkörtel	0,00842
Urinblåsa	0,0695
Livmoder	0,0163
Övriga organ	0,0110
Effektiv dos (mSv/MBq)	0,0193

Den effektiva dosen till följd av administrering av en högsta rekommenderad aktivitet på 360 MBq till en vuxen person som väger 70 kg är cirka 7,0 mSv. Om datortomografi (DT) utförs samtidigt, som en del av PET-undersökningen, kommer exponeringen för joniserande strålning att öka i mängd beroende på inställningarna i datortomografen. Vid en administrerad aktivitet på 360 MBq är typisk strålningsdos till målorganet (hjärnan) 4,5 mGy.

Vid en administrerad aktivitet på 360 MBq är typisk strålningsdos till de viktiga organen, gallblåsan, urinblåsan, övre tjocktarmsväggen, nedre tjocktarmsväggen, tunntarmen och levern 49,3 mGy, 25,0 mGy, 13,8 mGy, 12,6 mGy, 11,3 mGy respektive 13,9 mGy.

12. INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV RADIOFARMAKA

Beredningsmetod

Förpackningen måste kontrolleras före användning och aktiviteten mäts med en aktivitetmätare.

Uppdragning ska göras under aseptiska förhållanden. Injektionsflaskorna får inte öppnas innan proppen har desinficerats. Lösningen ska dras upp via proppen med hjälp av en endosspruta utrustad med lämplig skyddsskärning och en steril engångsnål eller med hjälp av ett godkänt automatiserat applikationssystem. Om det kan ifrågasättas att injektionsflaskan är hel ska läkemedlet inte användas.

Florbetaben (¹⁸F) ska inte spädas.

Dosen administreras långsamt som en intravenös bolusinjektion (6 sekunder per ml), följt av spolning med cirka 10 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning för att hela dosen säkert ska levereras. Om injektionsvolymen ligger mellan 0,5 och 1 ml ska endast sprutor av lämplig storlek (1 ml) användas och sprutan måste spolas med koksaltlösning.

Florbetaben (^{18}F) måste injiceras intravenöst för att undvika bestrålning till följd av lokal extravasering samt bildartefakter.

Kvalitetskontroll

Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar, fria från synliga partiklar ska användas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats <http://www.ema.europa.eu>.

BILAGA II

- A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS**
- B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING**
- C. ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING**
- D. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET**

**A. TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS**

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningsatts

Alliance Medical Radiopharmacy Ltd.
Unit 19, Quadrum Park, Old Portsmouth Road, Peasmarsh, Guildford, Surrey, GU3 1LU
Storbritannien

BV Cyclotron VU -
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
Nederländerna

Cis Bio International
CHU de Brabois
Avenue de Bourgogne
54500 Vandoeuvre les Nancy
Frankrike

Cis Bio International
Parc scientifique Georges Besse
180 Allée Von Neumann
30000 Nîmes
Frankrike

Cis Bio International
14 rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
Frankrike

Cis Bio International
Centre Eugene Marquis
Rue de la Bataille Flandres Dunkerque, CS 44229
35042 Rennes
Frankrike

Cis Bio International
Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lévêque
33600 Pessac (Bordeaux)
Frankrike

Life Radiopharma Berlin GmbH
Max-Planck-Strasse 4
12489 Berlin
Tyskland

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH
Marchioninistrasse 15
81377 Munich
Tyskland

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 3
05-850 Szeligi
Polen

Life Radiopharma Bonn GmbH
Spessartstr. 9
53119 Bonn
Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L.
via Pergolesi, 330052 Monza
Italien

IBA Molecular Italy S.R.L.
Viale Oxford 81 (Tor Vergata)
00133 Rome
Italien

IBA Molecular Italy S.R.L.
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15
33100 Udine
Italien

IBA Molecular Spain, S.A.
Thomas Alba Edison, s/n
41092 Seville
Spanien

IBA Molecular Spain, S.A.
Pol. Ind. Compisa, C/ Veguillas, 2 Nave 16,
Ajavir 28864 (Madrid)
Spanien

Seibersdorf Labor GmbH
Grundstueck Nr. 482/2 EZ 98 KG
2444 Seibersdorf
Österrike

BetaPlus Pharma SA
Avenue Hippocrate 10 bte 1527
1200 Brussels
Belgien

I läkemedlets tryckta bipacksedel ska namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet av den relevanta tillverkningsatsen anges.

B. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

C. ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

- **Periodiska säkerhetsrapporter**

Kraven för att lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel anges i den förteckning över referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och eventuella uppdateringar och som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

- **Riskhanteringsplan**

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga farmakovigilansaktiviteter och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna riskhanteringsplanen (Risk Management Plan, RMP) som finns i modul 1.8.2. i godkännandet för försäljning samt eventuella efterföljande överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen.

En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in

- på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,
- när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda till betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.

- **Ytterligare riskminimeringsåtgärder**

Före lansering i varje medlemsstat ska innehavaren av godkännandet för försäljning komma överens om det slutliga utbildningsprogrammets innehåll och format tillsammans med nationell behörig myndighet.

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska se till att, efter samtal och enligt överenskommelse med nationell behörig myndighet i varje medlemsstat där Neuraceq marknadsförs vid lansering och efter lansering, alla läkare som förväntas använda Neuraceq har tillgång till ett utbildningspaket för att säkerställa pålitlig tolkning av PET-bilder.

Utbildningsprogrammet ska innehålla följande nyckelelement:

- Information om amyloid patologi vid Alzheimers sjukdom
- Relevant information om Neuraceq som en PET-spårs substans för beta-amyloid, inklusive godkänd indikation enligt produktresumén, begränsningar med Neuraceq -användning, bildtolkningsfel, säkerhetsinformation och resultaten av kliniska prövningar som informerar om diagnostisk användning av Neuraceq
- Granskning av PET-bedömningskriterierna, inklusive bildtolkningsmetod, kriterier för tolkning och bilder som demonstrerar bildtolkningsmetodologin
- Utbildningsmaterialet ska omfatta demonstrationsfall av Neuraceq-PET med korrekt tolkning av PET-undersökning av en erfaren bildtolkare, Neuraceq-PET-undersökningar för självbedömning och en självkvalificeringsprocedur som ska erbjudas till alla praktikanter. Utbildningen ska omfatta ett tillräckligt antal tydligt positiva och negativa fall samt fall på en intermediär nivå. Fall ska om möjligt bekräftas med histopatologi. Utbildarnas expertis och kvalifikationer ska säkerställas.

BILAGA III
MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

A. MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

METALLBEHÅLLARE (med ”blue box”)

1. LÄKEMEDELTS NAMN

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvätska, lösning
florbetaben (¹⁸F)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml injektionsvätska, lösning innehåller 300 MBq florbetaben (¹⁸F) vid dag och tidpunkt för kalibrering.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Ascorbinsyra, vattenfri etanol, makrogol 400, natriumaskorbat (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor
Se bipacksedel för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELFORM OCH FÖRPACKNINGSTORLEK

Injektionsvätska, lösning
Kundnr.

Aktivitet: {XXX} MBq i {XX} ml

ToC: {DD/MM/ÅÅÅÅ}{tt}:{mm} {tidszon}

Volym: {XX} ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Intravenös användning.
Flerdos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDELLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT



Radioaktivt material.

Alliance Medical Radiopharmacy Ltd., Storbritannien

BV Cyclotron VU, Nederländerna

Cis Bio International, Nancy, Frankrike

Cis Bio International, Nîmes, Frankrike

Cis Bio International, Paris, Frankrike

Cis Bio International, Rennes, Frankrike

Cis Bio International, Pessac, Frankrike

Life Radiopharma Berlin GmbH, Tyskland

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH, Tyskland

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o., Polen

Life Radiopharma Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italien

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanien

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanien

Seibersdorf Labor GmbH, Österrike

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgien

8. UTGÅNGSDATUM

EXP {DD/MM/ÅÅÅÅ} {tt}:{mm} {tidszon}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt nationella föreskrifter.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Life Radiopharma Berlin GmbH, Max-Planck-Straße 4, 12489 Berlin, DE

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/906/001

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Ej relevant.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

Ej relevant.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BLYKÄRL (utan "blue box")

1. LÄKEMEDELTS NAMN

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvätska, lösning
florbetaben (¹⁸F)

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml injektionsvätska, lösning innehåller 300 MBq florbetaben (¹⁸F) vid dag och tidpunkt för kalibrering.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Ascorbinsyra, vattenfri etanol, makrogol 400, natriumaskorbat, vatten för injektionsvätskor.
Se bipacksedel för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELFORM OCH FÖRPACKNINGSTORLEK

Injektionsvätska, lösning
En flerdos injektionsflaska

Aktivitet: {XXX} MBq i {XX} ml

ToC: {DD/MM/ÅÅÅÅ}{tt}:{mm} {tidszon}

Volym: {XX} ml

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Intravenös användning
Flerdos

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDELLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT



Radioaktivt material

Alliance Medical Radiopharmacy Ltd., Storbritannien

BV Cyclotron VU, Nederländerna

Cis Bio International, Nancy, Frankrike

Cis Bio International, Nîmes, Frankrike

Cis Bio International, Paris, Frankrike

Cis Bio International, Rennes, Frankrike

Cis Bio International, Pessac, Frankrike

Life Radiopharma Berlin GmbH, Tyskland

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH, Tyskland

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o., Polen

Life Radiopharma Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italien

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanien

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanien

Seibersdorf Labor GmbH, Österrike

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgien

8. UTGÅNGSDATUM

EXP {DD/MM/ÅÅÅÅ} {tt}:{mm} {tidszon}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot joniserande strålning (blyskydd).

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Life Radiopharma Berlin GmbH, Max-Planck-Straße 4, 12489 Berlin, DE

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/906/001

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Ej relevant.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

Ej relevant

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1. LÄKEMEDELETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvätska, lösning
florbetaben (¹⁸F)
Intravenös användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

EXP: ToC + 6 t

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Aktivitet: ≤ 3 000 MBq vid ToC (se ytterförpackning)

6. ÖVRIGT



Radioaktivt material

Alliance Medical Radiopharmacy Ltd., Storbritannien

BV Cyclotron VU, Nederländerna

Cis Bio International, Nancy, Frankrike

Cis Bio International, Nîmes, Frankrike

Cis Bio International, Paris, Frankrike

Cis Bio International, Rennes, Frankrike

Cis Bio International, Pessac, Frankrike

Life Radiopharma Berlin GmbH, Tyskland

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH, Tyskland

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o., Polen

Life Radiopharma Bonn GmbH, Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L., Monza, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Rome, Italien

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Italien

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Spanien

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Spanien

Seibersdorf Labor GmbH, Österrike

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Belgien

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Neuraceq 300 MBq/ml injektionsvätska, lösning florbetaben (¹⁸F)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till röntgenläkaren som överser proceduren.
- Om du får biverkningar, tala med röntgenläkaren. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Neuraceq är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Neuraceq
3. Hur Neuraceq används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Neuraceq ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Neuraceq är och vad det används för

Detta läkemedel är ett radioaktivt läkemedel, endast avsett för diagnostik.

Neuraceq innehåller den aktiva substansen florbetaben (¹⁸F).

Neuraceq ges till personer som har problem med minnet, för att läkarna ska kunna göra en sorts hjärnundersökning som kallas PET-undersökning. En PET-undersökning med Neuraceq kan, tillsammans med andra hjärnfunktionstester, hjälpa din läkare att avgöra om du kan ha beta-amyloida plack i hjärnan. Detta läkemedel är endast avsett för användning till vuxna.

Du bör diskutera resultatet av undersökningen med den läkare som ordinerat den.

Användning av Neuraceq innebär exponering för små mängder radioaktivitet. Din läkare och röntgenläkaren har bedömt att fördelen med undersökningen med det radioaktiva läkemedlet överväger risken med att utsättas för strålning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Neuraceq

Neuraceq får inte användas

- om du är allergisk mot florbetaben (¹⁸F) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med röntgenläkaren innan du får Neuraceq om du:

- har njurproblem
- har leverproblem
- är gravid eller tror att du kan vara gravid
- ammar.

Barn och ungdomar

Neuraceq är inte avsett för användning till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Neuraceq

Tala om för röntgenläkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom dessa kan störa tolkningen av bilderna från PET- undersökningen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga röntgenläkaren innan du får detta läkemedel.

Du måste tala om för röntgenläkaren innan du får Neuraceq om det finns en möjlighet att du är gravid, vid utebliven menstruation eller om du ammar. Om du är osäker är det viktigt att du rådfrågar röntgenläkaren som överinser undersökning.

Graviditet

Röntgenläkaren ger endast detta läkemedel under graviditet om nyttan förväntas överväga riskerna.

Amning

Du måste sluta amma i 24 timmar efter injektionen. Pumpa ut bröstmjölk under denna period och kasta utpumpad bröstmjölk. Fråga röntgenläkaren som överinser undersökningen när du kan börja amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Neuraceq har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Neuraceq innehåller etanol och natriumskorbat

- Detta läkemedel innehåller 15 vol % etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1,2 g per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin per dos.
Skadligt för personer som lider av alkoholism.
Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.
- Detta läkemedel innehåller 33 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos.
Detta motsvarar 1,6 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3. Hur Neuraceq används

Det finns strikta bestämmelser om hur radioaktiva läkemedel ska användas, hanteras och kasseras. Neuraceq kommer endast att användas på särskilda kontrollerade platser. Detta läkemedel kommer endast att hanteras och ges till dig av personal som är utbildad och kvalificerad att använda det på ett säkert sätt. Personalen ser till att läkemedlet används på ett riskfritt sätt och håller dig informerad om vad de gör.

Dos

Röntgenläkaren som överinser undersökningen avgör hur stor mängd Neuraceq som ska användas i ditt fall. Du får den minsta mängd som behövs för att få önskad information.

Den mängd som oftast rekommenderas till en vuxen person är 300 MBq (megabecquerel, den enhet som används för att ange radioaktivitet).

Hur Neuraceq ges och hur undersökningen utförs

Neuraceq ges som injektion i en ven (intravenös injektion), följt av spolning med koksaltlösning för att hela dosen säkert ska levereras.

En injektion är tillräckligt för denna undersökning.

Procedurens varaktighet

En hjärnundersökning görs vanligtvis 90 minuter efter att du har fått Neuraceq. Röntgenläkaren informerar dig om hur länge proceduren vanligtvis varar.

Efter administrering av Neuraceq ska du:

Undvika nära kontakt med små barn och gravida kvinnor i 24 timmar efter injektionen.

Röntgenläkaren talar om för dig om du behöver vidta några särskilda försiktighetsåtgärder när du har fått detta läkemedel. Kontakta röntgenläkaren om du har några frågor.

Om du har fått för stor mängd av Neuraceq

Det är osannolikt att du skulle få en överdos eftersom du endast får en engångsdos Neuraceq noggrant kontrollerad av röntgenläkaren som överinser undersökningen.

Om en överdos trots allt skulle inträffa kommer du att få lämplig behandling. I synnerhet kan röntgenläkaren som överinser undersökningen påskynda passagen av urin och avföring för att radioaktiviteten ska försvinna fortare ur kroppen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta röntgenläkaren som överinser undersökningen.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar omfattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

- Reaktionen vid injektionsstället: smärta vid injektionsstället, rodnad av huden runt injektionsstället (erytem vid injektions-/appliceringsstället)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

- Svidande känsla, huvudvärk, neuralgi (intensiv, oftast periodvis smärta längs en nerv), tremor (ofrivilliga darrningar)
- Blodkärl: värmevallningar (plötslig rodnad i ansikte och/eller hals), hematom (blåmärke, blåsvart märke), hypotoni (lågt blodtryck)
- Magen: diarré, illamående (kväljningar)
- Lever: onormal leverfunktion
- Hud: hyperhidros (ökad svettning), utslag, toxiska hudutslag (akut hudåkomma med mässlingliknande hudrodnad som kan omfatta blåsor och sår)
- Muskler och ben: obehag i extremiteter, smärta i extremiteter
- Symtom vid injektionsstället: irritation vid injektionsstället, smärta och obehag runt injektionsstället, hematom (blåmärke, blåsvart märke) vid injektionsstället, värme vid injektionsstället, trötthet, värmekänsla, pyrexia (förhöjd kroppstemperatur, feber)
- Onormala blodprover: förhöjda kreatininnivåer i blodet (nedsatt njurfunktion)

Detta radioaktiva läkemedel avger små mängder joniserande strålning vilket är kopplat till den lägsta risken för cancer och medfödda missbildningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med röntgenläkaren. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via [det nationella rapporteringssystemet](#) listat i [bilaga V](#). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Neuraceq ska förvaras

Du behöver inte själv förvara detta läkemedel. Detta läkemedel förvaras under överinseende av röntgenläkaren i lämpliga lokaler. Förvaring av radioaktiva läkemedel sker i enlighet med nationella bestämmelser om radioaktiva material.

Följande uppgifter är endast avsedda för röntgenläkaren:

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på metallbehållaren, blykärletoch injektionsflaskans etikett efter EXP.
- Inga särskilda förvaringsanvisningar.
- Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är florbetaben (^{18}F). Varje ml injektionsvätska, lösning innehåller 300 MBq florbetaben (^{18}F) vid dag och tidpunkt för kalibrering. Aktiviteten per injektionsflaska varierar från 300 MBq till 3000 MBq vid dag och tidpunkt för kalibrering.
- Övriga innehållsämnen är askorbinsyra, vattenfri etanol, makrogol 400, natriumaskorbat och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2 "Neuraceq innehåller etanol och natriumaskorbat").

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Neuraceq är en klar, färglös injektionsvätska, lösning. Den levereras i en färglös 15 ml injektionsflaska av glas, försluten med en gummipropp och aluminiumförsegling.

Varje flerdos injektionsflaska innehåller 1 till 10 ml lösning motsvarande 300 till 3000 MBq florbetaben (^{18}F) vid dag och tidpunkt för kalibrering.

Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska

Innehavare av godkännande för försäljning

Life Radiopharma Berlin GmbH

Max-Planck-Straße 4

12489 Berlin

Tyskland

e-post: gra@life-mi.com

Tillverkare

Alliance Medical Radiopharmacy Ltd.

Unit 19, Quadrum Park, Old Portsmouth Road

Peasmarsh, Guildford, Surrey, GU3 1LU

Storbritannien

BV Cyclotron VU

De Boelelaan 1081

1081 HV Amsterdam

Nederländerna

Cis Bio International

CHU de Brabois

Avenue de Bourgogne

54500 Vandoeuvre les Nancy

Frankrike

Cis Bio International

Parc scientifique Georges Besse

180 Allée Von Neumann

30000 Nîmes

Frankrike

Cis Bio International

14, rue de la Grange aux Belles

75010 Paris

Frankrike

Cis Bio International

Centre Eugene Marquis

Rue de la Bataille Flandres Dunkerque, CS 44229

35042 Rennes

Frankrike

Cis Bio International

Hôpital Xavier Arnozan

Avenue du Haut Lévêque

33600 Pessac (Bordeaux)

Frankrike

Life Radiopharma Berlin GmbH

Max-Planck-Strasse 4

12489 Berlin

Tyskland

Advanced Accelerator Applications Germany GmbH

Marchioninistrasse 15

81377 Munich

Tyskland

Life Radiopharma Warszawa Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 3
05-850 Szeligi
Polen

Life Radiopharma Bonn GmbH
Spessartstr. 9
53119 Bonn
Tyskland

IBA Molecular Italy S.R.L.
via Pergolesi, 33
20052 Monza
Italien

IBA Molecular Italy S.R.L.
Viale Oxford 81 (Tor Vergata)
00133 Rome
Italien

IBA Molecular Italy S.R.L.
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15
33100 Udine
Italien

IBA Molecular Spain, S.A.
Thomas Alba Edison, s/n
41092 Seville
Spanien

IBA Molecular Spain, S.A.
Pol. Ind. Compisa,
C/ Veguillas - 2 Nave 16,
Ajalvir 28864 (Madrid)
Spanien

Seibersdorf Labor GmbH
Grundstueck Nr. 482/2 EZ 98 KG
2444 Seibersdorf
Österrike

BetaPlus Pharma SA
Avenue Hippocrate 10 bte 1527
1200 Brussels
Belgien

Kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Denna bipacksedel ändrades senast {månad ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats
<http://www.ema.europa.eu/>.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Den fullständiga produktresumén för Neuraceq finns i ett separat dokument i produktförpackningen, för att förse hälso- och sjukvårdspersonal med ytterligare vetenskaplig och praktisk information om administrering och användning av detta radioaktiva läkemedel.

Läs produktresumén {Produktresumén ska finnas i förpackningen}.