

- süsteemisised polüetersulfoonmembraaniga filtrid, mille pooride suurus on 0,2 µm kuni 1,2 µm.

Pärast annuse manustamist loputage süsteemi 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega või 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahusega.

Säilitamistingimused ja kõlblikkusaeg

Avamata viaal

Nivolumab BMS'i peab **hoidma külmkapis** (2°C...8°C). Viaale tuleb hoida originaalpakendis, et kaitsta neid valguse eest. Nivolumab BMS'il ei tohi lasta külmuda.

Ärge kasutage Nivolumab BMS'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali sildil „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Nivolumab BMS'i infusioon

Nivolumab BMS'i infusiooni peab läbi viima 24 tunni jooksul alates ettevalmistamisest. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel, lahust võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°...8°C ja valguse eest kaitstult [maksimaalselt 4 tundi kokku 24-st tunnist võib ravim olla toatemperatuuril (20...25°C) siseruumi valgustuses].

Hävitamine:

Ärge säilitage kasutamata jäänud infusioonilahust korduvaks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.