

















































Ja Jums rodas kāda no šīm blaknēm, būtu ieteicams apmeklēt ārstu. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

## 5. KĀ UZGLABĀT NONAFAC

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes.

Uzglabāt ledusskapī (2°C–8°C temperatūrā).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

No mikrobioloģiskā viedokļa produkts pēc izšķīdināšanas jāizlieto nekavējoties, taču ne ilgāk kā 3 stundas pēc šķīduma izgatavošanas.

Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai šķīdums ir dzidrs. Produktu nedrīkst lietot, ja ir redzamas duļķes, recekļi vai sīkas daļiņas.

## 6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

### Nonafact 100 SV/ml cilvēka XI asinsreces faktors

#### Ko Nonafact satur:

- Aktīvā viela ir cilvēka XI asinsreces faktors. Katrs flakons satur 500 SV vai 1000 SV cilvēka XI asinsreces faktora.
- Citas sastāvdaļas ir nātrijs hlorīds, saharoze, histalīns un ūdens injekcijām.

#### Nonafact ārējais izskats un iepakojums:

Nonafact ir pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (5 ml vai 10 ml flakonos)

#### Nonafact ir kārbīņa, kurā atrodas:

- Nonafact flakons ar 500 SV vai 1000 SV faktora IX
- Flakons ar 5 ml vai 10 ml ūdens injekcijām

#### Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs

Sanquin, Plesmanlaan 125 NL, 1066 CX Amsterdam, Nīderlande

#### Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājas lapā

<http://www.ema.europa.eu/>