





























































































Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)

Jerga' jidher l-effett tar-radjazzjoni (raxx tal-ġilda bħal meta tinharraq b' mod sever minhabba tixmix żejjed), li jista' jsehh fuq ġilda li tkun ġiet esposta qabel għar-radjoterapija, minn granet sa snin wara li tkun saret ir-radjazzjoni.

Kundizzjonijiet bullozi (mard tal-ġilda b' hafna nfafet)- li jinkludu s-sindromu ta' Stevens-Johnson u Nekrozi epidermali tossika

Anemija emolitika (anemija minhabba li jinqerdu ċ-ċelluli ħomor tad-demm)

Epatite (infjammazzjoni tal-fwied)

Xokk anafilattiku (reazzjoni allergika severa)

*Mhux magħruf: il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli*

Nefha fir-riġlejn b' uġiġh u ħmura

Żieda fl-ammont ta' produzzjoni ta' awrina

Għatx u żieda fil-konsum tal-ilma

Ipernatremija - żieda fl-ammont ta' sodju fid-demm

Infjammazzjoni tal-ġilda, l-aktar fil-parti t' isfel tar-riġel, b' nefha, uġiġh u ħmura

### Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju li mhux elenkat f' dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizzla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tghin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

## 5. Kif taħzen Pemetrexed Pfizer

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlax minn mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-folja u l-kartuna wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħhar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Pemetrexed Pfizer 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infuzjoni  
Aħžen il-kunjett ta' 100 mg f' temperatura taħt 30°C.

Pemetrexed Pfizer 500 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infuzjoni  
Il-kunjett ta' 500 mg m' għandux bżonn hażna speċjali.

Pemetrexed Pfizer 1,000 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infuzjoni  
Il-kunjett ta' 1,000 mg m' għandux bżonn hażna speċjali.

Soluzzjonijiet rikostitwiti u ta' Infuzjoni: Meta ppreparati kif suppost, l-istabbiltà kimika u fizika ta' waqt l-użu ġiet ippruvata għal 24 siegħa f' temperatura ta' frigg (2°C sa 8°C) u f' 25°C.

Mil-lat mikrobijologiku, il-prodott għandu jintuza immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żminijiet ta' hażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta' qabel l-użu huma r-responsabbiltà ta' min qed juża l-prodott u m' għandhomx ikunu itwal minn 24 siegħa f' temperaturi ta' bejn 2°C u 8°C.

Is-soluzzjoni rikostitwita hija ċara u tvarja fil-kulur minn mingħajr kulur għal safra jew hadra-safranija mingħajr ma taffettwa b' mod avvers il-kwalità tal-prodott. Medicini parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel ma jingħataw. Jekk jinstab il-frac, m' għandekx tagħti.

Din il-medicina għandha tintuża darba biss: kull fdal ta' soluzzjoni li ma jkunx intuża għandu jintrema kif jitlob ir-reqwizit lokali.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih Pemetrexed Pfizer

Is-sustanza attiva hija pemetrexed.

Pemetrexed Pfizer 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni: Kull kunjett fih 100 milligramma ta' pemetrexed (bħala pemetrexed ditromethamine).

Pemetrexed Pfizer 500 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni: Kull kunjett fih 500 milligramma ta' pemetrexed (bħala pemetrexed ditromethamine).

Pemetrexed Pfizer 1,000 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni: Kull kunjett fih 1,000 milligramma ta' pemetrexed (bħala pemetrexed ditromethamine).

Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni jkun fiha 25 mg/ml ta' pemetrexed. Qabel ma tingħata, ikun hemm bżonn ta' iżjed dilwazzjoni mill-persuna inkarigata li ttiprovdi l-kura.

Is-sustanza mhux attiva l-oħra hi mannitol.

### Kif jidher Pemetrexed Pfizer u l-kontenut tal-pakkett

Pemetrexed Pfizer huwa trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ġo kunjett tal-ħġieġ. Huwa trab lijoofilizzat bejn abjad u isfar ċar jew isfar hadrani.

Kull pakkett fih kunjett wieħed tal-ħġieġ ta' 100 mg, 500 mg jew 1,000 mg pemetrexed ).

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Pfizer Europe MA EEIG  
Boulevard de la Plaine 17  
1050 Bruxelles  
Il-Belġju

### Manifattur

Hospira UK Limited  
Horizon  
Honey Lane  
Hurley  
Maidenhead  
SL6 6RJ  
Ir-Renju Unit

Pfizer Service Company BVBA  
Hoge Wei 10  
1930 Zaventem  
Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

**BE**  
Pfizer SA/NV  
Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

**LU**  
Pfizer SA/NV  
Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

**BG**

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България  
Тел.: +359 2 970 4333

**CZ**

Pfizer, spol. s r.o.  
Tel: +420-283-004-111

**DK**

Pfizer ApS  
Tlf: + 45 44 20 11 00

**DE**

Pfizer Pharma PFE GmbH  
Tel: + 49 (0) 800 8535555

**EE**

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal  
Tel: +372 666 7500

**EL**

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Τηλ.: +30 210 6785 800

**ES**

Pfizer, S.L.  
Tel: +34 91 490 99 00

**FR**

Pfizer  
Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

**HR**

Pfizer Croatia d.o.o.  
Tel: +385 1 3908 777

**IE**

Pfizer Healthcare Ireland  
Tel: 1800 633 363 (toll free)  
+44 (0) 1304 616161

**IS**

Icepharma hf.  
Sími: +354 540 8000

**IT**

Pfizer Italia Srl  
Tel: +39 06 33 18 21

**CY**

Pharmaceutical Trading Co Ltd  
Τηλ: 24656165

**LT**

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje  
Tel. + 370 52 51 4000

**HU**

Pfizer Kft.  
Tel: + 36 1 488 37 00

**MT**

Drugsales Ltd  
Tel: + 356 21 419 070/1/2

**NL**

Pfizer bv  
Tel: +31 (0)10 406 43 01

**NO**

Pfizer AS  
Tlf: +47 67 52 61 00

**AT**

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0)1 521 15-0

**PL**

Pfizer Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 335 61 00

**PT**

Laboratórios Pfizer, Lda.  
Tel: + 351 21 423 55 00

**RO**

Pfizer România S.R.L.  
Tel: +40 (0)21 207 28 00

**SI**

Pfizer Luxembourg SARL  
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja  
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana  
Tel: +386 (0)1 52 11 400

**SK**

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka  
Tel: +421-2-3355 5500

**FI**

Pfizer PFE Finland Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

**SE**

Pfizer AB  
Tel: +46 (0)8 550 520 00

**LV**  
Pfizer Luxembourg SARL fil-iaġla Latvijā  
Tel.: +371 670 35 775

**UK**  
Hospira UK Ltd  
Tel: + 44 (0) 1628 515500

**Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {xahar SSSS}.**

### **Sorsi oħra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

### **Istruzzjonijiet għall-użu, l-immaniġġar u rimi**

1. Uża teknika aseptika matul ir-rikostituzzjoni u għal iżjed dilwazzjoni ta' pemetrexed għall-ġhoti ta' l-infuzjoni fil-vini.
2. Ikkalkula d-doża u n-numru ta' kunjetti ta' Pemetrexed Pfizer li hemm bżonn. Kull kunjett fih ammont żejjed ta' pemetrexed sabiex jiffaċilita l-ġhoti tal-ammont miktub fuq it-tikketta.
3. Pemetrexed Pfizer għandu jiġi rrikostitwit biss b' ilma sterili għall-injezzjonijiet.

Pemetrexed Pfizer kunjett ta' 100 mg:  
Irrikostitwixxi kull kunjett ta' 100 mg b' 4.2 ml ta' ilma sterili għall-injezzjonijiet, li jirriżulta f' soluzzjoni li jkollha 25 mg/ml pemetrexed.

Pemetrexed Pfizer kunjett ta' 500 mg: Irrikostitwixxi kull kunjett ta' 500 mg b' 20 ml ta' ilma sterili għall-injezzjonijiet, li jirriżulta f' soluzzjoni li jkollha 25 mg/ml pemetrexed.

Pemetrexed Pfizer kunjett ta' 1,000 mg: Irrikostitwixxi kull kunjett ta' 1,000 mg b' 40 ml ta' ilma sterili għall-injezzjonijiet, li jirriżulta f' soluzzjoni li jkollha 25 mg/ml pemetrexed.

Dawwar bil-mod kull kunjett sakemm it-trab ikun inhall kompletament. Is-soluzzjoni li tirriżulta hija ċara u tvarja minn bla kulur sa kulur safrani jew safrani fl-aħdar mingħajr ma tiġi affettwata b' mod negattiv il-kwalità tal-prodott. Il-pH tas-soluzzjoni rikostitwita hi bejn 5.7 u 7.7. **Ikun meħtieġ iżjed dilwizzjoni.**

4. Pemetrexed Pfizer irid jerga' jiġi dilwit biss b' soluzzjoni ta' 5% glukozju, mingħajr preservattiv. Il-volum xieraq tas-soluzzjoni rikostitwita ta' pemetrexed irid jerga' jiġi dilwit sa 100 ml b' soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 5% glukozju, mingħajr preservattiv, u jingħata bħala infuzjoni fil-vini għal 10 minuti.

5. Soluzzjonijiet ta' infuzjoni ta' pemetrexed ippreparati kif indikat hawn fuq huma kompatibbli ma' settijiet għall-ġhoti u boroż tal-infuzjoni miksija bil-polyvinyl chloride u b' inforra tal-polyolefin. Pemetrexed mhux kompatibbli ma' diluwent li fihom il-kalċju, li jinkludu l-injezzjoni ta' lactated Ringer u l-injezzjoni ta' Ringer.

6. Qabel ma jingħataw, prodotti mediċinali parenterali għandhom jiġu eżaminati viżwalment għal preżenza ta' xi frak u telf ta' kulur. Tinjettax jekk jiġi osservat xi frak.

7. Soluzzjonijiet ta' pemetrexed għandhom jintużaw darba biss.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott ghandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

**Prekawzjonijiet fil-preparazzjoni u l-amministrazzjoni:** L-immaniġġar u l-preparazzjoni ta' soluzzjonijiet ta' infużjoni ta' pemetrexed ghandhom isiru b'attenzjoni kif isir b'sustanzi oħra kontra l-kanċer u potenzjalment tossiċi. Hu rakkomandat li jintużaw l-ingwanti. F'każ li s-soluzzjoni ta' pemetrexed tiġi f'kuntatt mal-ġilda, aħsel sew il-ġilda bis-sapun u bl-ilma immedjament. Jekk soluzzjonijiet ta' pemetrexed jiġu f'kuntatt mar-riti mukużi, laħlah sew bl-ilma. Pemetrexed mhuwiex visikant. M'hemmx antidotu speċifiku għall-estraważjoni ta' pemetrexed. Ġew irrapportati xi każijiet ta' estravażjoni ta' pemetrexed, li ma ġewx meqjusa bħala serji mill-investigatur. L-estraważjoni ghandha tiġi kontrollata permezz tal-prattika lokali standardizzata kif issir b'sustanzi oħra li mhumiex visikanti.

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati