









































































---

Norādījumi par rīkošanos  
Portrazza 800 mg  
koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai  
*necitumumab*

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Sagatavojiet šķīdumu infūzijai, ievērojot aseptiskas metodes, lai nodrošinātu pagatavotā šķīduma sterilitāti.

Katrs flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Pārbaudiet, vai flakona saturā nav daļiņu un vai tā krāsa nav mainījusies. Koncentrātam infūziju šķīduma pagatavošanai pirms atšķaidīšanas ir jābūt dzidram vai nedaudz opalescējošam un bezkrāsainam līdz iedzeltenam. Ja šķīdumā ir daļiņas vai mainījusies tā krāsa, flakons ir jāizmet.

Flakons satur 800 mg necitumumaba 16 mg/ml šķīduma veidā; viens 50 ml flakons satur pilnu devu. Koncentrāta atšķaidīšanai izmantojiet tikai nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām.

Zāļu ievadīšanai, izmantojot iepriekš uzpildītu intravenozu infūziju tvertni

No iepriekš uzpildītas 250 ml tvertnes aseptiski paņemiet 50 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīduma injekcijām un pārsiet tvertnē 50 ml necitumumaba zāļu, lai kopējais tilpums atkal būtu 250 ml. Uzmanīgi apgrieziet trauku, lai sajauktu šķīdumu. Infūziju šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI SAKRATĪT. Šķīdumu NEDRĪKST atšķaidīt ar citiem šķīdumiem vai ievadīt vienlaikus ar citiem elektrolītiem vai zālēm.

Zāļu ievadīšanai, izmantojot tukšu intravenozu infūziju tvertni

Aseptiski pārsiet tukšā intravenozas infūzijas tvertnē 50 ml necitumumaba zāļu un pievienojiet 200 ml nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīduma injekcijām, lai kopējais tilpums atkal būtu 250 ml. Uzmanīgi apgrieziet trauku, lai sajauktu šķīdumu. Infūziju šķīdumu NEDRĪKST SASALDĒT VAI SAKRATĪT. Šķīdumu NEDRĪKST atšķaidīt ar citiem šķīdumiem vai ievadīt vienlaikus ar citiem elektrolītiem vai zālēm.

Ievadīt ar infūziju sūkni. Jāizņem atsevišķa infūzijas sistēma un infūzijas beigās tā jāizskalo ar nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām.

Pirms parenterālas ievadīšanas zāles vizuāli jāpārbauda, vai tajās nav daļiņu. Ja tajās ir daļiņas, infūziju šķīdums ir jāizmet.

Flakonā atlikušais neizlietotais necitumumabs ir jāizmet, jo zāles nesatur pretmikrobu konservantus.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.