









































































V prípade, ak použijete vopred naplnenú nádobu s intravenóznou infúziou:

Asepticky odoberte 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) injekčného roztoku chloridu sodného z naplnenej 250 ml nádoby a pridajte do nej 50 ml necitumumabu, aby bol konečný objem infúzie opäť 250 ml. Opatrne nádobu obráťte, aby sa obsah premiešal. Infúzny roztok NEZMRAZUJTE ANI ním NETRASTE. NERIEĎTE inými roztokmi ani nepodávajte spolu s inými elektrolytmi ani liekmi.

V prípade, ak použijete nenaplnenú nádobu na infúzny roztok

Asepticky preneste 50 ml necitumumabu do prázdnej nádoby na infúzny roztok a pridajte 200 ml 0,9 % (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného na injekciu, tak aby celkový objem infúzie bol 250 ml. Opatrne nádobu obráťte, aby sa obsah premiešal. Infúzny roztok NEZMRAZUJTE ANI ním NETRASTE. NERIEĎTE inými roztokmi ani nepodávajte spolu s inými elektrolytmi ani liekmi.

Podávajte pomocou infúznej pumpy. Musí sa použiť samostatná infúzna súprava a táto súprava na konci podávania infúzie musí prepláchnuť 9 mg/ml (0,9 %) injekčným roztokom chloridu sodného.

Parenterálne lieky sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc. Ak sa objavia častice, infúzny roztok zlikvidujte.

Všetko nepoužitú množstvo necitumumabu, ktoré ostalo vo injekčnej liekovke, zlikvidujte, pretože liek neobsahuje žiadne antimikrobiálne konzervačné prostriedky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Liek s ukončenou platnosťou registrácie