

**PŘÍLOHA I**  
**SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU**

- ▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoliv podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

## 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky  
Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky

## 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

### Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 100 mg entrektinibu.

*Pomocné látky se známým účinkem*

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 65 mg laktózy.

### Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg entrektinibu.

*Pomocné látky se známým účinkem*

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 130 mg laktózy a 0,6 mg azobarviva oranžové žluti (E 110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

## 3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

### Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka velikosti 2 (délka 18 mm), žluté neprůhledné tělo a víčko, s modrým nápisem ENT 100 vytištěným na těle tobolky.

### Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka velikosti 0 (délka 21,7 mm), oranžové neprůhledné tělo a víčko, s modrým nápisem ENT 200 vytištěným na těle tobolky.

## 4. KLINICKÉ ÚDAJE

### 4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Rozlytrek je v monoterapii indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů od 12 let se solidními nádory s fúzí genu neurotrofního tyrosinkinázového receptoru (*NTRK*),

- kteří mají onemocnění, které je lokálně pokročilé, metastazující nebo kde chirurgická resekce může vyústit v závažnou morbiditu, a
- kteří neobdrželi předchozí léčbu inhibitory *NTRK*
- kteří nemají jiné vhodné možnosti léčby (viz body 4.4 a 5.1).

Přípravek Rozlytrek je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s *ROS1*-pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez předchozí léčby inhibitory *ROS1*.

## 4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Rozlytrek má být zahájena lékařem se zkušenostmi v používání protinádorových léčivých přípravků.

### Výběr pacientů

#### *Solidní nádory s fúzí genu *NTRK**

K výběru pacientů se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* se požaduje validované vyšetření. Před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek musí být prokázána pozitivita na fúzi genu *NTRK* (viz bod 5.1).

#### *ROS1-pozitivní nemalobuněčný karcinom plic*

K výběru pacientů s *ROS1*-pozitivním NSCLC se požaduje validované vyšetření. Před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek musí být prokázána pozitivita na *ROS1* (viz bod 5.1).

### Dávkování

#### *Dospělí*

Doporučená dávka pro dospělé je 600 mg entrektinibu jednou denně.

#### *Pediatrická populace*

Doporučená dávka entrektinibu pro pediatrické pacienty od 12 let je 300 mg/m<sup>2</sup> plochy povrchu těla (BSA) jednou denně (viz tabulka 1).

**Tabulka 1: Doporučené dávkování pro pediatrické pacienty**

| <b>Plocha povrchu těla (BSA)</b>           | <b>Dávka jednou denně</b> |
|--|---------------------------|
| 1,11 m <sup>2</sup> až 1,50 m <sup>2</sup> | 400 mg                    |
| ≥ 1,51 m <sup>2</sup>                      | 600 mg                    |

#### *Délka léčby*

Doporučuje se pokračovat v léčbě přípravkem Rozlytrek do progresu onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.

#### *Opožděné nebo vynechané dávky*

Vynechanou dávku přípravku Rozlytrek lze užít později, pokud do podání další dávky zbývá nejméně 12 hodin. Pokud se bezprostředně po užití přípravku Rozlytrek objeví zvracení, mohou pacienti dávku zopakovat.

#### Úpravy dávkování

V případě stanovených nežádoucích účinků (viz tabulka 4) nebo podle úsudku předepisujícího lékaře po zvážení bezpečnosti nebo snášenlivosti u konkrétního pacienta může léčba nežádoucích účinků vyžadovat dočasné vysazení, snížení dávky nebo ukončení léčby přípravkem Rozlytrek.

#### *Dospělí*

Dávku přípravku Rozlytrek pro dospělé pacienty lze snížit až dvakrát podle snášenlivosti (viz tabulka 2). V případě pacientů, kteří nesnesou dávku 200 mg jednou denně, má být přípravek Rozlytrek trvale vysazen.

**Tabulka 2: Snížení dávky pro dospělé pacienty**

| Snížení dávky       | Velikost dávky      |
|---------------------|---------------------|
| Doporučená dávka    | 600 mg jednou denně |
| První snížení dávky | 400 mg jednou denně |
| Druhé snížení dávky | 200 mg jednou denně |

*Pediatrická populace*

Dávku přípravku Rozlytrek pro pediatrické pacienty od 12 let lze snížit až dvakrát podle snášenlivosti (viz tabulka 3).

Někteří pediatrickí pacienti potřebují k dosažení doporučeného celkového týdenního snížení dávky přerušované podávání. V případě pacientů, kteří nesnesou nejnižší sníženou dávku, má být přípravek Rozlytrek trvale vysazen.

**Tabulka 3: Snížení dávky pro pediatrické pacienty**

| Opatření   | BSA = 1,11 m <sup>2</sup> až 1,50 m <sup>2</sup><br>(jednou denně) | BSA ≥ 1,51 m <sup>2</sup><br>(jednou denně) |
|--|--|---|
| Doporučená dávka   | 400 mg   | 600 mg                                      |
| První snížení dávky  | 300 mg   | 400 mg                                      |
| Druhé snížení dávky  | 200 mg, 5 dnů každý týden*   | 200 mg                                      |
| * 5 dnů každý týden: pondělí, středa, pátek, sobota a neděle |  |   |

Doporučení pro úpravu dávky přípravku Rozlytrek pro dospělé a pediatrické pacienty v případě stanovených nežádoucích účinků jsou uvedena v tabulce 4 (viz body 4.4 a 4.8).

**Tabulka 4: Doporučená úprava dávky přípravku Rozlytrek pro dospělé a pediatrické pacienty v případě stanovených nežádoucích účinků**

| Nežádoucí účinek                | Závažnost*  | Úprava dávky   |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Městnavé srdeční selhání</b> | Symptomatické při středně namáhavé činnosti včetně případů s indikovaným zákrokem (stupeň 2 nebo 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 1 nebo nižší stupeň</li> <li>• Pokračujte se sníženou dávkou</li> </ul>  |
|                                 | Těžké s příznaky v klidu, při minimální námaze nebo v případech s indikovaným zákrokem (stupeň 4)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 1 nebo nižší stupeň</li> <li>• Pokračujte se sníženou dávkou nebo přípravek Rozlytrek vysad'te dle klinické potřeby</li> </ul>   |
| <b>Kognitivní poruchy</b>       | Netolerovatelné, ale středně těžké změny narušující každodenní činnosti (netolerovatelný stupeň 2)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 1 nebo nižší stupeň anebo na výchozí stav</li> <li>• Pokračujte se stejnou dávkou nebo se sníženou dávkou dle klinické potřeby</li> </ul>  |
|                                 | Těžké změny omezující každodenní činnosti (stupeň 3)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 1 nebo nižší stupeň anebo na výchozí stav</li> <li>• Pokračujte se sníženou dávkou</li> </ul>  |
|                                 | Akutní zákrok indikovaný kvůli nežádoucí příhodě (stupeň 4)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě déletrvajících, těžkých nebo netolerovatelných příhod přípravek Rozlytrek vysad'te dle klinické potřeby</li> </ul>  |
| <b>Hyperurikemie</b>            | Symptomatická nebo stupeň 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahajte podávání léků ke snížení hladiny solí kyseliny močové</li> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení známek nebo příznaků</li> <li>• Pokračujte s přípravkem Rozlytrek ve stejné nebo snížené dávce</li> </ul>   |
| <b>Prodloužení intervalu QT</b> | QTc 481 – 500 ms  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na výchozí stav</li> <li>• Pokračujte v léčbě se stejnou dávkou</li> </ul>   |
|                                 | QTc delší než 500 ms  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení QTc na výchozí stav</li> <li>• Pokračujte se stejnou dávkou, pokud byly určeny a odstraněny faktory vyvolávající prodloužení intervalu QT</li> <li>• Pokračujte se sníženou dávkou, pokud <u>nebyly</u> určeny jiné faktory vyvolávající prodloužení intervalu QT</li> </ul> |
|                                 | Torsades de pointes; polymorfní ventrikulární tachykardie; známky/příznaky těžké arytmie            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přípravek Rozlytrek trvale vysad'te</li> </ul>  |

| Nežádoucí účinek   | Závažnost*  | Úprava dávky  |
|--|---|---|
| <b>Zvýšení aminotransferáz</b>   | Stupeň 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 1 nebo nižší stupeň anebo na výchozí stav</li> <li>● Pokračujte se stejnou dávkou, pokud dojde k ústupu během 4 týdnů</li> <li>● Trvale vysad'te, pokud nežádoucí účinek neustoupí během 4 týdnů</li> <li>● Pokračujte se sníženou dávkou při opakujících se příhodách stupně 3, které ustoupí během 4 týdnů</li> </ul> |
|  | Stupeň 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 1 nebo nižší stupeň anebo na výchozí stav</li> <li>● Pokračujte se sníženou dávkou, pokud dojde k ústupu během 4 týdnů</li> <li>● Trvale vysad'te, pokud nežádoucí účinek neustoupí během 4 týdnů</li> <li>● Trvale vysad'te při opakujících se příhodách stupně 4</li> </ul>   |
|  | ALT nebo AST vyšší než třikrát ULN se současně celkovým bilirubinem vyšším než 2krát ULN (při nepřítomnosti cholestázy nebo hemolýzy) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Přípravek Rozlytrek trvale vysad'te</li> </ul>   |
| <b>Anémie nebo neutropenie</b>   | Stupeň 3 nebo 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Přípravek Rozlytrek vysad'te do zlepšení na stupeň 2 nebo nižší stupeň nebo na výchozí hodnotu</li> <li>● Pokračujte se stejnou dávkou nebo se sníženou dávkou dle klinické potřeby</li> </ul>   |
| <b>Další klinicky významné nežádoucí účinky</b>  | Stupeň 3 nebo 4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Přípravek Rozlytrek vysad'te do ústupu nebo zlepšení nežádoucího účinku na stupeň 1 anebo na výchozí stav</li> <li>● Pokračujte se stejnou nebo sníženou dávkou, pokud dojde k ústupu během 4 týdnů</li> <li>● Zvažte trvalé vysazení, pokud nežádoucí účinek neustoupí během 4 týdnů</li> <li>● Trvale vysad'te při opakujících se příhodách stupně 4</li> </ul>          |
| <p>* Závažnost definovaná pomocí kritérií National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) verze 4.0</p> |   |   |

#### *Léčba silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A*

Je třeba se vyhnout souběžné léčbě silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A u dospělých i pediatrických pacientů od 12 let (viz bod 4.4).

Je-li u dospělých pacientů souběžné podávání nevyhnutelné, použití silných nebo středně silných inhibitorů CYP3A s přípravkem Rozlytrek má být omezeno na 14 dnů a dávka přípravku Rozlytrek má být snížena takto:

- 100 mg jednou denně v případě silných inhibitorů CYP3A (viz bod 4.5)
- 200 mg jednou denně v případě středně silných inhibitorů CYP3A.

Po ukončení souběžné léčby silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A se lze vrátit k dávce přípravku Rozlytrek užívané před nasazením silného nebo středně silného inhibitoru CYP3A. V případě inhibitorů CYP3A4 s dlouhým poločasem může být zapotřebí vymývací období (viz bod 4.5).

#### Zvláštní populace

##### *Starší pacienti*

U pacientů ve věku  $\geq 65$  let se nevyžaduje žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

##### *Porucha funkce jater*

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater se nedoporučuje žádná úprava dávkování. U pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater nebyl entrektinib studován (viz bod 5.2).

##### *Porucha funkce ledvin*

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není požadována úprava dávkování. Podávání entrektinibu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebylo studováno (viz bod 5.2).

##### *Pediatrická populace*

Bezpečnost a účinnost entrektinibu u dětí do 12 let nebyla stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

#### Způsob podání

Přípravek Rozlytrek je určen k perorálnímu podání. Tvrdé tobolky mají být polykány celé a nesmí být otvírány ani rozpouštěny, protože obsah tobolky je velmi hořký. Přípravek Rozlytrek lze užívat nezávisle na jídle (viz bod 5.2), nemá se ale užívat spolu s grapefruitem ani grapefruitovou šťávou (viz bod 4.5).

### **4.3 Kontraindikace**

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

### **4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití**

#### Účinnost mezi typy nádorů

Přínos přípravku Rozlytrek byl stanoven v jednoramenných klinických studiích, které zahrnovaly relativně malý vzorek pacientů, jejichž nádory projevovaly fúze genu *NTRK*. Příznivé vlivy přípravku Rozlytrek byly ukázány na základě celkového výskytu odpovědi a trvání odpovědi v omezeném počtu typů nádorů. Vliv může být kvantitativně odlišný v závislosti na typu nádoru stejně tak jako na průvodních genomových změnách (viz bod 5.1). Z těchto důvodů přípravek Rozlytrek má být použit pouze tehdy, pokud nejsou jiné vhodné možnosti léčby (tj. pro které klinický přínos nebyl stanoven nebo kde takové možnosti léčby byly vyčerpány).

#### Kognitivní poruchy

V rámci klinických studií přípravku Rozlytrek byly hlášeny kognitivní poruchy včetně zmatenosti, změn psychiky, zhoršení paměti a halucinací (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí příhody se vyskytovaly častěji u pacientů nad 65 let než u mladších. U pacientů má být sledován výskyt projevů kognitivních změn.

Léčba přípravkem Rozlytrek má být upravena podle závažnosti kognitivních poruch tak, jak je uvedeno v tabulce 4 v bodě 4.2.

Pacienti mají být informováni o možnosti kognitivních změn při léčbě přípravkem Rozlytrek. Pacienti mají být poučeni o tom, že při výskytu kognitivních poruch nesmí do odeznění příznaků řídit ani obsluhovat stroje (viz bod 4.7).

### Fraktury

V klinických studiích byly u 21,9 % (7/32) pediatrických pacientů léčených přípravkem Rozlytrek hlášeny fraktury (viz bod 4.8). U pacientů do 12 let byly hlášeny fraktury dolní končetiny (především proximálního femuru, femuru a tibie). Zlomeniny kostí u pediatrických pacientů byly obecně spojeny s minimálním zraněním nebo byly bez zranění. U 3 pacientů se vyskytlo několik zlomenin a u 3 pacientů byla léčba přípravkem Rozlytrek kvůli zlomenině přerušena. Všichni pacienti pokračovali v léčbě přípravkem Rozlytrek a zlomeniny se u všech pacientů kromě jednoho zhojily.

Pacienty se známkami nebo příznaky fraktur (např. bolest, porucha chůze, porucha hybnosti, deformace) je třeba neprodleně vyšetřit.

### Hyperurikemie

Hyperurikemie byla pozorována u pacientů léčených entrektinibem. Před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek a pravidelně během léčby mají být vyšetřeny hladiny kyseliny močové v séru. U pacientů mají být sledovány známky a příznaky hyperurikemie. Podávání léčivých přípravků snižujících uráty má být zahájeno dle klinické potřeby a přípravek Rozlytrek má být vysazen v případě známek a příznaků hyperurikemie. Dávka přípravku Rozlytrek má být upravena podle závažnosti tak, jak je uvedeno v tabulce 4 v bodě 4.2.

### Městnavé srdeční selhání

V rámci klinických studií s přípravkem Rozlytrek byly hlášeny případy městnavého srdečního selhání u méně než 5 % pacientů (viz bod 4.8). Tyto případy byly zjištěny u pacientů s anamnézou i bez anamnézy srdečního onemocnění a byly vyřešeny u 70 % těchto pacientů zavedením vhodné klinické léčby a/nebo snížením/vysazením dávky přípravku Rozlytrek.

U pacientů s příznaky nebo známými rizikovými faktory městnavého srdečního selhání je před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek třeba zhodnotit ejekční frakci levé komory. Pacienti užívající přípravek Rozlytrek mají být pečlivě sledováni a v případě výskytu klinických projevů a příznaků městnavého srdečního selhání včetně dušnosti nebo otoku mají být vyšetřeni a léčeni, pokud je to klinicky vhodné.

Léčba přípravkem Rozlytrek má být upravena podle závažnosti městnavého srdečního selhání tak, jak je uvedeno v tabulce 4 v bodě 4.2.

### Prodloužení intervalu QTc

U pacientů léčených přípravkem Rozlytrek v klinických studiích byly pozorovány případy prodloužení intervalu QTc (viz bod 4.8).

Pacienti s výchozím intervalem QTc delším než 450 ms, pacienti s vrozeným syndromem dlouhého intervalu QTc a pacienti užívající léčivé přípravky prokazatelně prodlužující interval QTc nemají přípravek Rozlytrek užívat.

Pacienti s elektrolytovou nerovnováhou nebo s významným srdečním onemocněním, včetně nedávného infarktu myokardu, městnavého srdečního selhání, nestabilní anginy pectoris a bradyarytmie, nemají přípravek Rozlytrek užívat. V případě, že u pacienta s kterýmkoli z těchto onemocnění převáží podle



ošetřujícího lékaře potenciální prospěch přípravku Rozlytrek potenciální riziko, má být provedeno další sledování a má být zvažena konzultace u odborného lékaře.

Doporučuje se provést výchozí posouzení EKG a elektrolytů a posouzení EKG a elektrolytů po 1 měsíci léčby přípravkem Rozlytrek. Zároveň se doporučuje pravidelné monitorování EKG a elektrolytů podle klinické indikace během léčby přípravkem Rozlytrek.

Léčba přípravkem Rozlytrek má být upravena podle závažnosti prodloužení QTc tak, jak je uvedeno v tabulce 4 v bodě 4.2.

#### Ženy ve fertilním věku

Přípravek Rozlytrek může při užívání během těhotenství poškodit plod. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a až 5 týdnů po poslední dávce přípravku Rozlytrek používat vysoce účinné metody antikoncepce.

Muži s partnerkou ve fertilním věku musí během léčby přípravkem Rozlytrek a nejméně 3 měsíce po poslední dávce používat vysoce účinné metody antikoncepce (viz body 4.6 a 5.3).

#### Lékové interakce

Souběžné podávání přípravku Rozlytrek se silným nebo středně silným inhibitorem CYP3A zvyšuje koncentrace entrektinibu v plazmě (viz bod 4.5), a tím může zvyšovat četnost nebo závažnost nežádoucích účinků. U dospělých i pediatrických pacientů od 12 let je třeba se vyvarovat souběžného podávání přípravku Rozlytrek se silným nebo středně silným inhibitorem CYP3A. Je-li souběžné podávání u dospělých pacientů nevyhnutelné, je nutné snížit dávku přípravku Rozlytrek (viz bod 4.2).

Během léčby přípravkem Rozlytrek je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitu i grapefruitových produktů.

Souběžné podávání přípravku Rozlytrek se silným nebo středně silným induktorem CYP3A nebo P-gp snižuje koncentrace entrektinibu v plazmě (viz bod 4.5), a tím může snižovat účinnost přípravku Rozlytrek; je proto třeba se mu vyhnout.

#### Intolerance laktózy

Přípravek Rozlytrek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

#### Oranžová žlut' (E 110)

Přípravek Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky obsahuje oranžovou žlut' (E 110), která může způsobit alergické reakce.

## 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

### Účinky entrektinibu na jiné léčivé přípravky

#### *Účinek entrektinibu na substráty CYP*

Entrektinib je slabým inhibitorem CYP3A4. Souběžné podávání entrektinibu v dávce 600 mg jednou denně s perorálním midazolamem (citlivý substrát CYP3A) zvýšilo u pacientů AUC midazolamu o 50 %, ale snížilo  $C_{\max}$  midazolamu o 21 %. Při podávání entrektinibu společně s citlivými substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým rozmezím (např. cisaprid, cyklosporin, ergotamin, fentanyl, pimozid, chinidin, takrolimus, alfentanil a sirolimus) se doporučuje opatrnost kvůli zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

#### *Účinek entrektinibu na substráty P-gp*

*In vitro* údaje naznačují, že entrektinib je potenciálním inhibitorem P-glykoproteinu (P-gp).

Při souběžném podání jednorázové 600mg dávky entrektinibu s digoxinem (citlivý substrát P-gp) se  $C_{\max}$  digoxinu zvýšila o 28 % a AUC o 18 %. Renální clearance digoxinu byla podobná při monoterapii digoxinem i při souběžném podání digoxinu s entrektinibem; to naznačuje minimální účinek entrektinibu na renální clearance digoxinu.

Účinek entrektinibu na absorpci digoxinu se nepovažuje za klinicky významný, ale není známo, zda vliv entrektinibu může být větší na citlivější perorální substráty P-gp, jako je dabigatran-etexilát.

#### *Účinek entrektinibu na substráty BCRP*

Ve studiích *in vitro* byla pozorována inhibice BCRP.

Klinický význam této inhibice není znám, při souběžném podávání citlivých perorálních substrátů BCRP (např. methotrexát, mitoxantron, topotekan, lapatinib) s entrektinibem se ale doporučuje opatrnost kvůli riziku zvýšené absorpce.

#### *Účinek entrektinibu na substráty jiných transportérů*

*In vitro* údaje naznačují, že entrektinib je slabým potenciálním inhibitorem polypeptidu přenášejícího organické anionty (OATP)1B1. Klinický význam této inhibice není znám, při souběžném podávání citlivých perorálních substrátů OATP1B1 (např. atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin, repaglinid, bosentan) s entrektinibem se ale doporučuje opatrnost kvůli riziku zvýšené absorpce.

#### *Účinek entrektinibu na substráty enzymů regulovaných PXR*

Podle studií *in vitro* může entrektinib indukovat enzymy regulované receptorem pregnanu X (PXR) (např. skupina CYP2C a UGT). Souběžné podávání entrektinibu se substráty CYP2C8, CYP2C9 nebo CYP2C19 (např. repaglinid, warfarin, tolbutamid nebo omeprazol) může snížit jejich expozici.

#### *Perorální antikoncepce*

V současnosti není známo, zda může entrektinib snižovat účinnost systémově působící hormonální antikoncepce. Ženy užívající systémově působící hormonální antikoncepci mají proto zároveň používat bariérovou metodu (viz bod 4.6).

### Účinky jiných léčivých přípravků na entrektinib

Podle *in vitro* údajů je CYP3A4 hlavním enzymem zprostředkujícím metabolismus entrektinibu a tvorbu jeho hlavního aktivního metabolitu M5.

#### *Účinek induktorů CYP3A nebo P-gp na entrektinib*

Souběžné podání vícečetných dávek perorálního rifampicinu, silného induktoru CYP3A, s jednorázovou dávkou perorálního entrektinibu snížilo  $AUC_{\text{inf}}$  entrektinibu o 77 % a  $C_{\max}$  o 56 %.

Souběžné podávání entrektinibu a induktorů CYP3A/P-gp (mimo jiné karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, třezalka tečkovaná - *Hypericum perforatum*, apalutamid, ritonavir) má být vyloučeno.

#### *Účinek inhibitorů CYP3A nebo P-gp na entrektinib*

Souběžné podání itraconazolu, silného inhibitoru CYP3A4, s jednorázovou dávkou perorálního entrektinibu zvýšilo  $AUC_{inf}$  o 600 % a  $C_{max}$  o 173 %.

Je třeba se vyvarovat souběžného podávání silných a středně silných inhibitorů CYP3A (mimo jiné ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itraconazol, vorikonazol, posakonazol, grapefruitů nebo hořké pomeranče). Je-li souběžné užívání silných nebo středně silných inhibitorů CYP3A4 nevyhnutelné, je nutné upravit dávku entrektinibu (viz bod 4.2).

Významný účinek inhibitorů P-gp na farmakokinetiku entrektinibu se sice nepředpokládá, při souběžném podávání silných nebo středně silných inhibitorů P-gp (např. verapamil, nifedipin, felodipin, fluvoxamin, paroxetin) s entrektinibem se přesto doporučuje opatrnost vzhledem k riziku vyšší expozice entrektinibu (viz bod 5.2).

#### *Účinek léčivých přípravků ke zvýšení žaludečního pH na entrektinib*

Souběžné podání inhibitoru protonové pumpy (PPI) lansoprazolu s jednorázovou dávkou entrektinibu 600 mg snížilo AUC entrektinibu o 25 % a  $C_{max}$  o 23 %.

Při souběžném podání entrektinibu s PPI nebo jinými přípravky ke zvýšení žaludečního pH (např. antagonisté H<sub>2</sub>-receptoru nebo antacida) není požadována žádná úprava dávky.

## **4.6 Fertilita, těhotenství a kojení**

### Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku mají před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek absolvovat těhotenský test pod lékařským dohledem.

Ženy ve fertilním věku musí během léčby a nejméně 5 týdnů po poslední dávce přípravku Rozlytrek používat vysoce účinné metody antikoncepce.

V současnosti není známo, zda může entrektinib snižovat účinnost systémově působící hormonální antikoncepce (viz bod 4.5). Ženy užívající systémově působící hormonální antikoncepci mají proto zároveň používat bariérovou metodu.

Muži s partnerkou ve fertilním věku musí během léčby a nejméně 3 měsíce po poslední dávce přípravku Rozlytrek používat vysoce účinné metody antikoncepce (viz bod 5.3).

### Těhotenství

Údaje o podávání entrektinibu těhotným ženám nejsou k dispozici. Podle studií na zvířatech a mechanismu účinku může entrektinib při užívání během těhotenství způsobit poškození plodu (viz body 4.4 a 5.3).

Podávání přípravku Rozlytrek se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Pacientky užívající přípravek Rozlytrek mají být poučeny o možném riziku pro plod. Pacientky mají být poučeny, že v případě otěhotnění se mají obrátit na lékaře.

## Kojení

Není známo, zda se entrektinib a jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojenečtí děti nelze vyloučit. Kojení má být během léčby přípravkem Rozlytrek přerušeno.

## Fertilita

Nebyly provedeny žádné studie na zvířatech hodnotící účinky entrektinibu na fertilitu (viz bod 5.3).

### 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Rozlytrek má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti mají být poučeni, aby během léčby přípravkem Rozlytrek, pokud se u nich vyskytnou nežádoucí účinky na kognici, synkopa, rozmazané vidění nebo závrať, neřídili ani neobsluhovali stroje (viz body 4.4 a 4.8).

### 4.8 Nežádoucí účinky

#### Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky ( $\geq 20\%$ ) byly únava, zácpa, porucha chuti, otok, závrať, průjem, nauzea, porucha čítí, dušnost, anémie, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení kreatininu v krvi, bolest, kognitivní poruchy, zvracení, kašel a horečka. Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky ( $\geq 2\%$ ) byly plicní infekce (5,2 %), dušnost (4,6 %), kognitivní porucha (3,8 %), pleurální výpotek (3,0 %) a fraktury (2,4 %). K trvalému ukončení léčby kvůli nežádoucímu účinku došlo u 4,6 % pacientů.

#### Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Tabulky 5 a 6 uvádí přehled nežádoucích účinků, které se vyskytly u dospělých a pediatrických pacientů léčených přípravkem Rozlytrek ve třech klinických studiích u dospělých (ALKA, STARTRK-1, STARTRK-2) a jedné klinické studii u pediatrických pacientů (STARTRK-NG). Medián trvání expozice byl 5,5 měsíce.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA. Jsou použity následující kategorie četnosti: velmi časté ( $\geq 1/10$ ), časté ( $\geq 1/100$  až  $< 1/10$ ), méně časté ( $\geq 1/1\,000$  až  $< 1/100$ ), vzácné ( $\geq 1/10\,000$  až  $< 1/1\,000$ ) a velmi vzácné ( $< 1/10\,000$ ). V každé třídě orgánových systémů jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající četnosti.

**Tabulka 5: Nežádoucí účinky u dospělých a pediatrických pacientů léčených přípravkem Rozlytrek v klinických studiích (n = 504)**

| Třídy orgánových systémů            | Nežádoucí účinek            | Všechny stupně (%) | Kategorie četnosti (všechny stupně) | Stupeň $\geq 3$ (%) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Infekce a infestace                 | Plicní infekce <sup>1</sup> | 13,1               | Velmi časté                         | 6,0*                |
|                                     | Infekce močových cest       | 12,7               | Velmi časté                         | 2,6                 |
| Poruchy krve a lymfatického systému | Anémie                      | 28,2               | Velmi časté                         | 9,7                 |
|                                     | Neutropenie <sup>2</sup>    | 11,3               | Velmi časté                         | 4,4                 |
| Poruchy metabolismu a výživy        | Zvýšení tělesné hmotnosti   | 26,4               | Velmi časté                         | 7,3                 |
|                                     | Snížená chuť k jídlu        | 11,9               | Velmi časté                         | 0,2                 |
|                                     | Hyperurikemie               | 9,1                | Časté                               | 1,8                 |
|                                     | Dehydratace                 | 7,9                | Časté                               | 1,0                 |
|                                     | Syndrom nádorového rozpadu  | 0,2                | Méně časté                          | 0,2*                |
| Poruchy nervového systému           | Dysgeuzie                   | 42,3               | Velmi časté                         | 0,4                 |
|                                     | Závrať <sup>3</sup>         | 39,7               | Velmi časté                         | 1,2                 |

| Třídy orgánových systémů                                    | Nežádoucí účinek                                | Všechny stupně (%) | Kategorie četnosti (všechny stupně) | Stupeň ≥ 3 (%) |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|
|   | Dysestezie <sup>4</sup>                         | 29,0               | Velmi časté                         | 0,2            |
|   | Kognitivní poruchy <sup>5</sup>                 | 24,2               | Velmi časté                         | 4,4            |
|   | Bolest hlavy                                    | 17,5               | Velmi časté                         | 1,0            |
|   | Periferní senzoričká neuropatie <sup>6</sup>    | 15,7               | Velmi časté                         | 1,0            |
|   | Ataxie <sup>7</sup>                             | 15,7               | Velmi časté                         | 0,8            |
|   | Poruchy spánku <sup>8</sup>                     | 13,5               | Velmi časté                         | 0,4            |
|   | Poruchy nálady <sup>9</sup>                     | 9,1                | Časté                               | 0,6            |
|   | Synkopa   | 4,6                | Časté                               | 3,0            |
| <b>Poruchy oka</b>  | Rozmazané vidění <sup>10</sup>                  | 11,9               | Velmi časté                         | 0,4            |
| <b>Srdeční poruchy</b>                                      | Městnavé srdeční selhání <sup>11</sup>          | 3,0                | Časté                               | 2,2            |
|   | Prodloužení intervalu QTc na elektrokardiogramu | 2,0                | Časté                               | 0,6            |
| <b>Cévní poruchy</b>  | Hypotenze <sup>12</sup>                         | 16,5               | Velmi časté                         | 2,4            |
| <b>Respirační, hrudní a mediastinální poruchy</b>           | Dušnost   | 27,0               | Velmi časté                         | 5,8*           |
|   | Kašel   | 21,4               | Velmi časté                         | 0,6            |
|   | Pleurální výpotek                               | 6,9                | Časté                               | 2,8            |
| <b>Gastrointestinální poruchy</b>                           | Zácpa   | 42,9               | Velmi časté                         | 0,4            |
|   | Průjem  | 33,5               | Velmi časté                         | 2,6            |
|   | Nauzea  | 32,1               | Velmi časté                         | 0,8            |
|   | Zvracení  | 23,2               | Velmi časté                         | 1,2            |
|   | Bolest břicha                                   | 11,1               | Velmi časté                         | 0,6            |
|   | Dysfagie  | 10,1               | Velmi časté                         | 0,4            |
| <b>Poruchy jater a žlučových cest</b>                       | Zvýšení AST                                     | 17,5               | Velmi časté                         | 3,6            |
|   | Zvýšení ALT                                     | 16,1               | Velmi časté                         | 3,4            |
| <b>Poruchy kůže a podkožní tkáně</b>                        | Vyrážka <sup>13</sup>                           | 11,5               | Velmi časté                         | 1,4            |
|   | Fotosenzitivní reakce                           | 2,8                | Časté                               | 0              |
| <b>Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně</b> | Myalgie   | 19,6               | Velmi časté                         | 0,6            |
|   | Artralgie                                       | 19,0               | Velmi časté                         | 0,6            |
|   | Svalová slabost                                 | 12,3               | Velmi časté                         | 1,2            |
|   | Fraktury <sup>14</sup>                          | 6,2                | Časté                               | 2,4            |
| <b>Poruchy ledvin a močových cest</b>                       | Zvýšení kreatininu v krvi                       | 25,4               | Velmi časté                         | 0,6            |
|   | Retence moči <sup>15</sup>                      | 10,9               | Velmi časté                         | 0,6            |

| Třídy orgánových systémů                         | Nežádoucí účinek     | Všechny stupně (%) | Kategorie četnosti (všechny stupně) | Stupeň ≥ 3 (%) |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Celkové poruchy a reakce v místě aplikace</b> | Únava <sup>16</sup>  | 45,0               | Velmi časté                         | 5,0            |
|  | Otok <sup>17</sup>   | 37,3               | Velmi časté                         | 1,4            |
|  | Bolest <sup>18</sup> | 24,4               | Velmi časté                         | 1,6            |
|  | Horečka              | 20,0               | Velmi časté                         | 0,8            |

\* Stupně 3 až 5, zahrnující nežádoucí účinky končící úmrtím (včetně 2 pneumonií, 2 dušností a 1 syndromu nádorového rozpadu)

<sup>1</sup> Plicní infekce (bronchitida, infekce dolních cest dýchacích, plicní infekce, pneumonie, infekce dýchacích cest, infekce horních cest dýchacích)

<sup>2</sup> Neutropenie (neutropenie, snížení počtu neutrofilů)

<sup>3</sup> Závrať (závrať, vertigo, posturální závrať)

<sup>4</sup> Porucha čítí (parestezie, hyperestezie, hypestezie, dysestezie)

<sup>5</sup> Kognitivní poruchy (kognitivní porucha, zmatenost, porucha pozornosti, zhoršení paměti, amnézie, změny mentálního stavu, halucinace, delirium, vizuální halucinace a mentální porucha)

<sup>6</sup> Periferní sensorická neuropatie (neuralgie, periferní neuropatie, periferní motorická neuropatie, periferní sensorická neuropatie)

<sup>7</sup> Ataxie (ataxie, porucha rovnováhy, porucha chůze)

<sup>8</sup> Poruchy spánku (hypersomnie, insomnie, porucha spánku, somnolence)

<sup>9</sup> Poruchy nálady (úzkost, afektivní labilita, afektivní porucha, agitovanost, depresivní nálada, euforická nálada, změny nálady, výkyvy nálady, podrážděnost, deprese, trvalá depresivní porucha, psychomotorická retardace)

<sup>10</sup> Rozmazané vidění (diplopie, rozmazané vidění, postižení zraku)

<sup>11</sup> Městnavé srdeční selhání (akutní pravostranné srdeční selhání, srdeční selhání, městnavé srdeční selhání, chronické pravostranné srdeční selhání, nízká ejekční frakce, otok plic)

<sup>12</sup> Hypotenze (hypotenze, ortostatická hypotenze)

<sup>13</sup> Vyrážka (vyrážka, makulopapulózní vyrážka, svědivá vyrážka, erytematózní vyrážka, papulózní vyrážka)

<sup>14</sup> Fraktury (zlomenina kotníku, zlomenina krčku femuru, zlomenina femuru, zlomenina fibuly, zlomenina nohy, zlomenina, zlomenina humeru, zlomenina čelisti, zlomenina dolní končetiny, patologická zlomenina, zlomenina žebra, kompresivní zlomenina páteře, zlomenina páteře, únavová zlomenina, zlomenina tibie, zlomenina zápěstí)

<sup>15</sup> Retence moči (retence moči, močová inkontinence, opožděný začátek močení, porucha močení, urgentní močení)

<sup>16</sup> Únava (únava, tělesná slabost)

<sup>17</sup> Otok (otok obličeje, retence tekutin, generalizovaný otok, místní otok, otok, periferní edém, periferní otok)

<sup>18</sup> Bolest (bolest zad, bolest krku, muskuloskeletální bolest na hrudi, muskuloskeletální bolest, bolest končetiny)

**Tabulka 6: Nežádoucí účinky u pediatrických pacientů léčených přípravkem Rozlytrek v klinických studiích**

| Třídy orgánových systémů                                   | Četnost výskytu | Dospívající <sup>1</sup><br>(n = 7)  | Všichni pediatričtí pacienti<br>(n = 32)  |
|--|-----------------|--|---|
| <b>Infekce a infestace</b>                                 | Velmi časté     |  | Infekce močových cest (18,8 %),<br>plicní infekce (12,5 %)  |
| <b>Poruchy krve a lymfatického systému</b>                 | Velmi časté     | Anémie (57,1 %),<br>neutropenie (42,9 %)   | Anémie (59,4 %),<br>neutropenie (43,8 %)  |
| <b>Poruchy metabolismu a výživy</b>                        | Velmi časté     | Zvýšení tělesné hmotnosti (57,1 %),<br>snížená chuť k jídlu (14,3 %)   | Zvýšení tělesné hmotnosti (50 %),<br>snížená chuť k jídlu (31,3 %),<br>dehydratace (25 %)   |
| <b>Poruchy nervového systému</b>                           | Velmi časté     | Dysgeuzie (42,9 %),<br>dysestezie (28,6 %),<br>poruchy nálady (28,6 %),<br>kognitivní poruchy (14,3 %),<br>bolest hlavy (14,3 %),<br>synkopa (14,3 %),<br>periferní senzoričká neuropatie (14,3 %),<br>poruchy spánku (14,3 %) | Bolest hlavy (31,3 %),<br>dysgeuzie (21,9 %),<br>poruchy nálady (28,1 %),<br>ataxie (15,6 %),<br>poruchy spánku (13,3 %),<br>závrať (12,5 %),<br>periferní senzoričká neuropatie (12,5 %) |
| <b>Poruchy oka</b>   | Velmi časté     | Rozmazané vidění (14,3 %)  |   |
| <b>Cévní poruchy</b>                                       | Velmi časté     | Hypotenze (14,3 %)   | Hypotenze (18,8 %)  |
| <b>Respirační, hrudní a mediastinální poruchy</b>          | Velmi časté     | Dušnost (28,6 %),<br>kašel (28,6 %)  | Dušnost (18,8 %),<br>kašel (50 %),<br>pleurální výpotek (12,5 %)  |
| <b>Gastrointestinální poruchy</b>                          | Velmi časté     | Nauzea (71,4 %),<br>bolest břicha (28,6 %),<br>zácpa (28,6 %)  | Nauzea (46,9 %),<br>bolest břicha (28,1 %),<br>zácpa (43,8 %),<br>zvracení (34,4 %),<br>průjem (37,5 %)   |
| <b>Poruchy jater a žlučových cest</b>                      | Velmi časté     | Zvýšení AST (57,1 %),<br>zvýšení ALT (42,9 %)  | Zvýšení AST (50 %),<br>zvýšení ALT (50 %)   |
| <b>Poruchy kůže a podkožní tkáň</b>                        | Velmi časté     |  | Vyrážka (25 %)  |
| <b>Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáň</b> | Velmi časté     | Artralgie (14,3 %),<br>myalgie (14,3 %)  | Fraktury (21,9 %)   |
|  | Velmi časté     | Svalová slabost (28,6 %)   | Svalová slabost (18,8 %)  |
| <b>Poruchy ledvin a močových cest</b>                      | Velmi časté     | Zvýšení kreatininu v krvi (57,1 %)   | Zvýšení kreatininu v krvi (43,8 %),<br>retence moči (21,9 %)  |
| <b>Celkové poruchy a reakce v místě aplikace</b>           | Velmi časté     | Únava (42,9 %),<br>bolest (57,1 %),<br>horečka (57,1 %)  | Únava (43,8 %),<br>bolest (46,9 %),<br>horečka (56,3 %),<br>otok (18,8 %)   |

% odkaz na všechny stupně  
<sup>1</sup> Dospívající (od 12 do < 18 let): k hlášeným nežádoucím účinkům stupně ≥ 3 patřila neutropenie a bolest hlavy

## Popis vybraných nežádoucích účinků

### *Kognitivní poruchy*

V rámci klinických studií byla hlášena řada kognitivních symptomů (bod 4.4). Hlášené příhody zahrnovaly kognitivní poruchy (6,3 %), zmatenost (7,3 %), poruchu pozornosti (3,8 %), zhoršení paměti (4,2 %), amnézii (2,8 %), změny mentálního stavu (1,2 %), halucinace (1,0 %), delirium (0,8 %), vizuální halucinace (0,4 %) a mentální poruchu (0,2 %). U 4,4 % pacientů byly hlášeny kognitivní poruchy stupně 3. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků byla vyšší u dospělých pacientů s výchozím onemocněním CNS (29,7 %) ve srovnání s pacienty bez onemocnění CNS (23,1 %). Medián doby do nástupu kognitivních poruch byl 0,92 měsíce.

### *Fraktury*

Fraktury se vyskytly u 5,3 % (25/475) dospělých pacientů a u 21,8 % (7/32) pediatrických pacientů. Obecně nebyl dostatečně vyhodnocen vliv nádoru v místě fraktury, ale u některých dospělých pacientů byly hlášeny radiologické abnormality naznačující možný vliv nádoru. U 2 pediatrických pacientů se vyskytly bilaterální fraktury krčku femuru. U dospělých i pediatrických pacientů většina zlomenin byly fraktury celkového proximálního femuru nebo dolních končetin (např. diafýzy femuru nebo tibie). Žádní pacienti neukončili léčbu přípravkem Rozlytrek kvůli zlomeninám.

U dospělých pacientů se některé fraktury vyskytly při pádu nebo jiném zranění postižené oblasti. Medián doby do výskytu fraktury byl 3,4 měsíce (rozmezí: 0,26 měsíce až 18,5 měsíce) u dospělých. Podávání přípravku Rozlytrek bylo přerušeno u 36,0 % dospělých, u kterých došlo ke zlomeninám.

U pediatrických pacientů byly všechny fraktury spojeny s minimálním zraněním nebo byly bez zranění. Celkem bylo hlášeno 11 nežádoucích účinků zlomenin u 7 pediatrických pacientů. Medián doby do výskytu fraktury u pediatrických pacientů byl 4,3 měsíce (rozmezí: 2,46 měsíce až 7,39 měsíce). Léčba přípravkem Rozlytrek byla přerušena u 42,9 % (3/7) pediatrických pacientů, u kterých došlo ke zlomeninám. Tři fraktury byly stupně 2 a čtyři fraktury byly stupně 3. Tři fraktury stupně 3 byly závažné. V žádném případě nebyl hlášen vliv nádoru v místě fraktury. Všechny fraktury kromě jedné se zhojily.

### *Ataxie*

Ataxie (zahrnující příhody ataxie, poruchy rovnováhy a poruchy chůze) byla hlášena u 15,7 % pacientů. Medián doby do nástupu ataxie byl 0,4 měsíce (rozmezí: 0,03 měsíce až 28,19 měsíce) a medián trvání byl 0,7 měsíce (rozmezí: 0,03 měsíce až 11,99 měsíce). Většina (67,1 %) pacientů se z ataxie zotavila. Nežádoucí účinky související s ataxií byly častěji pozorovány u starších pacientů (23,8 %) ve srovnání s pacienty do 65 let (12,8 %).

### *Synkopa*

Synkopa byla hlášena u 4,6 % pacientů. U některých pacientů byla synkopa hlášena spolu s hypotenzí, dehydratací nebo prodloužením QTc intervalu, zatímco u jiných pacientů nebyly hlášeny žádné souběžné související stavy.

### *Prodloužení intervalu QTc*

U 17 z 504 (4,0 %) pacientů, kteří užívali entrektinib v rámci klinických studií a kteří absolvovali nejméně jedno měření EKG po výchozím měření, došlo k prodloužení intervalu QTcF > 60 ms od zahájení léčby entrektinibem a u 12 (2,8 %) pacientů byl interval QTcF ≥ 500 ms (bod 4.4).

### *Periferní sensorická neuropatie*

Periferní sensorická neuropatie byla hlášena u 15,7 % pacientů. Medián doby do nástupu byl 0,49 měsíce (rozmezí: 0,03 měsíce až 20,93 měsíce) a medián trvání byl 0,8 měsíce (rozmezí: 0,07 měsíce až 6,01 měsíce). Většina (55,7 %) pacientů se z periferní neuropatie zotavila.



### *Poruchy oka*

Poruchy oka hlášené v rámci klinických studií zahrnovaly rozmazané vidění (8,5 %), diplopii (2,6 %) a postižení zraku (1,6 %). Medián doby do nástupu poruch oka byl 1,9 měsíce (rozmezí: 0,03 měsíce až 21,59 měsíce). Medián trvání poruch oka byl 1 měsíc (rozmezí: 0,03 měsíce až 14,49 měsíce). Většina (61,7 %) pacientů se z poruchy oka zotavila.

### Pediatrická populace

Celkový bezpečnostní profil přípravku Rozlytrek v pediatrické populaci je podobný bezpečnostnímu profilu u dospělých.

Bezpečnost přípravku Rozlytrek u pediatrických pacientů byla stanovena na základě extrapolace údajů ze tří otevřených, jednoramenných klinických studií s dospělými pacienty se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* (ALKA, STARTRK-1 a STARTRK-2) a údajů od 32 pediatrických pacientů (30 pacientů zařazených do STARTRK-NG a 2 pacienti zařazení do STARTRK-2). Z těchto pacientů byli 2 pacienti do 2 let, 23 pacientů bylo od 2 do 11 let, 7 pacientů bylo od 12 do 17 let.

K nežádoucím účinkům a abnormálním výsledkům laboratorních vyšetření stupně 3 nebo 4 závažnosti, které se u pediatrických pacientů vyskytovaly častěji (incidence vyšší nejméně o 5 %) než u dospělých pacientů, patřily neutropenie (28,1 % vs. 3,4 %), zvýšení tělesné hmotnosti (21,9 % vs. 6,9 %), bolest hlavy (6,3 % vs. 0,6 %) a fraktury kostí (12,5 % vs. 1,9 %).

U dospívajících jsou k dispozici omezené údaje o bezpečnosti, avšak bezpečnostní profil u dospívajících je podobný celkovému bezpečnostnímu profilu přípravku Rozlytrek. Hlášené nežádoucí účinky stupně  $\geq 3$  u dospívajících byly neutropenie a bolest hlavy.

### Starší pacienti

Z 504 pacientů, kteří dostávali entrektinib v rámci klinických studií, 130 (25,8 %) pacientů bylo ve věku nejméně 65 let a 34 (6,7 %) bylo ve věku nejméně 75 let. Celkový bezpečnostní profil entrektinibu u starších pacientů je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u pacientů do 65 let. K nežádoucím účinkům, které se u starších pacientů vyskytovaly častěji než u pacientů do 65 let, patřily závrať (48,5 % vs. 36,6 %), zvýšení kreatininu v krvi (31,5 % vs. 23,3 %), hypotenze (21,5 % vs. 14,7 %) a ataxie (23,8 % vs. 12,8 %).

### Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím **národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v [Dodatku V](#)**.

## **4.9 Předávkování**

Pacienti, u kterých dojde k předávkování, mají být pečlivě sledováni a má jim být poskytnuta podpůrná péče. Není známo žádné antidotum entrektinibu.

## **5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI**

### **5.1 Farmakodynamické vlastnosti**

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, inhibitory proteinkináz, ATC kód: L01EX14

## Mechanismus účinku

Entrektinib je inhibitor tropomyosinových tyrosinkinázových receptorů TRKA, TRKB a TRKC (kódovaných geny neurotrofního tyrosinkinázového receptoru [*NTRK*] *NTRK1*, *NTRK2*, resp. *NTRK3*), protoonkogenu tyrosinkinázového receptoru ROS (*ROS1*) a anaplastické lymfomové kinázy (ALK) s hodnotami IC<sub>50</sub> od 0,1 do 2 nM. Hlavní účinný metabolit entrektinibu, M5, vykazoval podobnou sílu i účinek vůči TRK, ROS1 i ALK *in vitro*.

Fúzní proteiny obsahující TRK, ROS1 nebo ALK kinázové domény přispívají k potenciální tvorbě nádorů hyperaktivací downstreamových signálních drah s následnou neomezenou buněčnou proliferací. Entrektinib inhiboval *in vitro* i *in vivo* linie nádorových buněk pocházejících z několika typů nádorů, včetně subkutánních a intrakraniálních nádorů s fúzí genů *NTRK*, *ROS1* a *ALK*.

Předchozí léčba jinými přípravky inhibujícími tytéž kinázy může vyvolat rezistenci vůči entrektinibu. Rezistentní mutace v doméně TRK kinázy identifikované po ukončení podávání entrektinibu zahrnují *NTRK1* (G595R, G667C) a *NTRK3* (G623R, G623E a G623K). Rezistentní mutace v doméně kinázy ROS1 identifikované po ukončení podávání entrektinibu zahrnují G2032R, F2004C a F2004I.

Molekulární příčiny pro primární rezistenci vůči entrektinibu nejsou známy. Proto není známo, jestli přítomnost průvodních onkogenních stěžejních mutací kromě fúze genu *NTRK* ovlivňuje účinnost inhibice TRK.

## Klinická účinnost a bezpečnost

### Solidní nádory s fúzí genu *NTRK*

#### *Účinnost u dospělých pacientů*

Účinnost přípravku Rozlytrek byla hodnocena ve společné podskupině dospělých pacientů s neresekovatelnými nebo metastazujícími solidními nádory s fúzí genu *NTRK* zařazených do jedné ze tří multicentrických, jednoramenných, otevřených klinických studií (ALKA, STARTRK-1 a STARTRK-2). Podmínkou k zařazení do společné podskupiny byl průkaz solidního nádoru s fúzí genu *NTRK*, měřitelné onemocnění podle kritérií Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) v1.1, nejméně 12měsíční sledování od prvního zahájení hodnocení nádoru po léčbě a absence předchozí léčby inhibitory TRK (pacienti s průvodními stěžejními mutacemi, pokud byly známy, byli vyloučeni). Pacienti s primárními nádory v CNS byli hodnoceni samostatně za použití Response Assessment in Neuro-Oncology Criteria (RANO). Pacienti užívali přípravek Rozlytrek v dávce 600 mg perorálně jednou denně do nepřijatelné toxicity nebo progresse onemocnění. Primárními cílovými parametry účinnosti byly výskyt objektivní odpovědi (ORR) a trvání odpovědi (DOR) hodnocené zaslepenou nezávislou centrální komisí (BICR) podle kritérií RECIST v1.1.

Účinnost byla hodnocena u 150 dospělých pacientů se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* zařazenými do těchto klinických studií. Výchozí demografické údaje a charakteristiky onemocnění byly následující: 49,3 % muži, medián věku 59 let (rozmezí od 21 let do 88 let), 38 % ve věku 65 let nebo starší, 12 % ve věku 75 let nebo starší, 58,7 % běloši, 26 % Asiaté, 5,4 % Hispánci a 63 % vždy nekuřáci. Výchozí výkonnostní stav podle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) byl 0 (41,3 %), 1 (50 %) nebo 2 (8,7 %). Většina pacientů (95,3 %) měla metastazující onemocnění [nejčastěji metastázy v plicích (60,7 %), mízních uzlinách (54,7 %), kostech (27,3 %), játrech (36 %) a mozku (20 %)], 4,7 % pacientů měla lokálně pokročilé onemocnění. Kvůli nádorovému onemocnění 81,3 % pacientů podstoupilo operaci a 60,7 % pacientů radioterapii. Celkem 77,3 % pacientů absolvovalo předchozí systémovou terapii včetně chemoterapie (69,3 %) a 34 % pacientů nemělo žádné předchozí systémové terapie kvůli metastazujícímu onemocnění. Nejčastějšími typy onemocnění byly sarkom (21,3 %), karcinom plic (20,7 %), karcinom slinných žláz (17,3 %), karcinom štítné žlázy (10,7 %), kolorektální karcinom (7,3 %) a karcinom prsu (6 %). Fúze genu *NTRK* byla prokázána pomocí sekvenování nové generace (NGS) u většiny pacientů (87,3 %) a pomocí jiných vyšetření na bázi nukleové kyseliny u 12,7 % pacientů. Celkový medián trvání sledování byl 30,6 měsíce.

Přehled parametrů účinnosti pro pacienty se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* uvádí tabulka 7.

**Tabulka 7: Celková účinnost podle BICR u dospělých pacientů se solidními nádory s fúzí genu *NTRK***

| <b>Cílový parametr účinnosti</b>  | <b>Rozlytrek<br/>n = 150</b> |
|---|------------------------------|
| <b>Primární cílové parametry (hodnocení BICR podle kritérií RECIST v1.1)</b>  |                              |
| Výskyt objektivní odpovědi  |                              |
| Počet odpovědí  | 92/150                       |
| ORR % (95% CI)  | 61,3 % (53,0; 69,2)          |
| Úplná odpověď, n (%)  | 25 (16,7 %)                  |
| Částečná odpověď, n (%)   | 67 (44,7 %)                  |
| Trvání odpovědi*  |                              |
| Počet (%) pacientů s příhodou   | 50/92 (54,3 %)               |
| Medián, měsíce (95% CI)   | 20 (13,2; 31,1)              |
| 6měsíční odpověď % (95% CI)   | 83 % (75; 91)                |
| 9měsíční odpověď % (95% CI)   | 77 % (68; 86)                |
| 12měsíční odpověď % (95% CI)  | 66 % (56; 76)                |
| Intervaly spolehlivosti (CI) byly stanoveny výpočtem pomocí Clopper-Pearsonovy metody.<br>* Medián a percentily byly stanoveny pomocí Kaplan-Meierových odhadů. |                              |

Výskyt objektivní odpovědi a trvání odpovědi podle typu nádoru u dospělých pacientů se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* uvádí tabulka 8 níže.

**Tabulka 8: Účinnost podle typu nádoru u dospělých pacientů se solidními nádory s fúzí genu *NTRK***

| Typ nádoru                            | Pacienti<br>(n = 150) | ORR       |              | DOR                 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|
|                                       |                       | n (%)     | 95% CI       | Rozmezí<br>(měsíce) |
| Sarkom                                | 32                    | 19 (59,4) | (40,6; 76,3) | 2,8; 44,6*          |
| Nemalobuněčný karcinom plic           | 31                    | 20 (64,5) | (45,4; 80,8) | 3,7; 58,8*          |
| Karcinom slinných žláz<br>(MASC)      | 26                    | 22 (84,6) | (65,1; 95,6) | 2,8; 49,7*          |
| Karcinom prsu (sekreční)              | 6                     | 5 (83,3)  | (35,9; 99,6) | 5,5; 53,4*          |
| Karcinom prsu (nesekreční)            | 2                     | NE, PR    | NA           | 4,2                 |
| Karcinom prsu (NOS)                   | 1                     | NE        | NA           | NA                  |
| Karcinom štítné žlázy                 | 16                    | 10 (62,5) | (35,4; 84,8) | 5,6; 44,2*          |
| Kolorektální karcinom                 | 11                    | 3 (27,3)  | (6,0; 61,0)  | 1,9*; 20,0          |
| Neuroendokrinní karcinomy             | 5                     | 2 (40,0)  | (5,3; 85,3)  | 11,1; 31,1          |
| Hlava a krk                           | 5                     | 3 (60,0)  | (14,7; 94,7) | 4,0; 32,6*          |
| Karcinom pankreatu                    | 4                     | 3 (75,0)  | (19,4; 99,4) | 7,1; 12,9           |
| Neznámý primární karcinom             | 3                     | 1 (33,3)  | (0,8; 90,6)  | 9,1                 |
| Karcinom ovaria                       | 1                     | Non CR/PD | NA           | NA                  |
| Endometriální karcinom                | 1                     | PR        | NA           | 38,2                |
| Cholangiokarcinom                     | 1                     | PR        | NA           | 9,3                 |
| Gastrointestinální karcinom<br>(jiné) | 1                     | CR        | NA           | 30,4                |
| Neuroblastom                          | 1                     | NE        | NA           | NA                  |
| Karcinom prostaty                     | 1                     | PD        | NA           | NA                  |
| Karcinom penisu                       | 1                     | PD        | NA           | NA                  |
| Karcinom nadledvin                    | 1                     | PD        | NA           | NA                  |

\* Cenzorováno  
 ORR: výskyt objektivní odpovědi; DOR: trvání odpovědi; MASC: sekreční karcinom slinných žláz mamárního typu;  
 NA: neuplatňuje se kvůli malému počtu nebo nedostatku odpovědi; NOS: není jinak specifikováno; CR: úplná odpověď;  
 PR: částečná odpověď; PD: progresivní onemocnění; NE: nelze odhadnout.

Vzhledem k vzácnosti nádorů s fúzí genu *NTRK* byli studováni pacienti s různými typy nádorů s tím, že u některých typů nádorů byl počet pacientů omezený, což způsobuje nejistotu v odhadu ORR u jednotlivých typů nádorů. ORR v celkové populaci nemusí odrážet očekávanou odpověď u určitého typu nádoru.

ORR u 78 pacientů, kteří měli před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek širokou molekulární charakteristiku, byl 53,8 % (42,2; 65,2); z toho: ORR u 61 pacientů, kteří měli jiné genomové změny kromě fúze genu *NTRK*, byl 47,5 % (34,6; 60,7) a ORR u 17 pacientů bez jiných genomových změn, byl 76,5 % (50,1; 93,2).

#### *Intrakraniální odpověď*

Podle hodnocení BICR měla podskupina 22 dospělých pacientů výchozí metastázy v CNS, a to včetně 13 pacientů s měřitelnými lézemi v CNS. Intrakraniální (IC) odpověď hodnocená pomocí BICR podle kritérií RECIST v1.1 byla hlášena u 9 z těchto 13 pacientů (3 x CR a 6 x PR) při ORR 69,2 % (95% CI: 38,6; 90,9) a medián DOR 17,2 měsíců (95% CI: 7,4; NE). Pět z těchto 13 pacientů absolvovalo intrakraniální radioterapii mozku během 2 měsíců před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek.

#### *Primární nádor v CNS*

V uvedených 3 studiích užívalo přípravek Rozlytrek 12 dospělých pacientů s primárními nádory v CNS s nejméně 12měsíčním sledováním. Jeden z 12 dospělých pacientů měl objektivní odpověď hodnocenou pomocí BICR podle kritérií RANO.

### *Účinnost u pediatrických pacientů*

Účinnost přípravku Rozlytrek u pediatrických pacientů od 12 let byla stanovena na základě extrapolace údajů ze tří otevřených, jednoramenných klinických studií s dospělými pacienty se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* (ALKA, STARTRK-1 a STARTRK-2) a údajů o účinnosti a farmakokinetice u pediatrických pacientů zařazených do STARTRK-NG. Nejlepší celková odpověď vyhodnocená BICR u 5 pediatrických pacientů (všichni pacienti byli do 12 let a absolvovali více než 6 měsíců sledování; 3 pacienti měli solidní nádory a 2 pacienti měli primární nádory v CNS) zahrnovala 2 úplné odpovědi (epiteloidní glioblastom a infantilní fibrosarkom) a 3 částečné odpovědi (gliom s vysokým stupněm malignity, infantilní fibrosarkom a metastazující melanom). Odpovědi u 4 z 5 pediatrických pacientů ještě probíhaly v době ukončení sběru údajů (viz bod 4.2).

### ROS1-pozitivní NSCLC

Účinnost přípravku Rozlytrek byla hodnocena ve společné podskupině pacientů s *ROS1*-pozitivním metastazujícím NSCLC užívajících přípravek Rozlytrek v dávce 600 mg perorálně jednou denně a zařazených do jedné ze tří multicentrických, jednoramenných, otevřených klinických studií (ALKA, STARTRK-1 a STARTRK-2). Podmínkou zařazení do společné podskupiny byl histologický průkaz rekurentního nebo metastazujícího *ROS1*-pozitivního NSCLC, výkonnostní stav ECOG  $\leq 2$ , měřitelné onemocnění podle kritérií RECIST v1.1,  $\geq 6$  měsíční sledování a absence předchozí léčby inhibitorem *ROS1*. Všichni pacienti absolvovali výchozí vyšetření lézí v CNS.

Primárními cílovými parametry účinnosti byly ORR a DOR hodnocené BICR podle kritérií RECIST v1.1. Sekundární cílové parametry účinnosti zahrnovaly PFS, OS a u pacientů s výchozími metastázami v CNS také IC-ORR a IC-DOR (rovněž stanovené pomocí BICR podle kritérií RECIST v1.1).

Účinnost byla hodnocena u 161 pacientů s *ROS1*-pozitivním NSCLC. Výchozí demografické údaje a charakteristiky onemocnění byly následující: 35,4 % muži, medián věku 54 let (rozmezí od 20 let do 86 let), 24,2 % starších 65 let, 4,3 % starších 75 let, 44,1 % běloši, 45,3 % Asiaté, 4,3 % černoši, 2,6 % Hispánci a 62,7 % vždy nekuřáci. Výchozí výkonnostní stav podle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) byl 0 (41 %), 1 (49,1 %) nebo 2 (9,9 %). Většina pacientů (98,1 %) měla metastazující onemocnění (nejčastěji byly zasaženy mízní uzliny [69,6 %], plíce [50,3 %] a mozek [32,9 %]), 1,9 % pacientů měla lokálně pokročilé onemocnění a 37,3 % pacientů nemělo žádné předchozí linie systémové léčby kvůli metastazujícímu onemocnění. Pozitivita *ROS1* byla stanovena pomocí NGS u 83 % pacientů, pomocí FISH u 9 % pacientů a pomocí RT-PCR u 8 % pacientů. Celkový medián trvání sledování od první dávky byl 15,8 měsíce.

Přehled parametrů účinnosti pro pacienty s *ROS1*-pozitivním NSCLC uvádí tabulka 9.

**Tabulka 9: Celková účinnost podle BICR u pacientů s ROSI-pozitivním NSCLC**

| Cílový parametr účinnosti  | Rozlytrek<br>n = 161  |
|--|-----------------------|
| <b>Primární cílové parametry (hodnocení BICR podle kritérií RECIST v1.1)</b>           |                       |
| Výskyt objektivní odpovědi   | 108/161               |
| Počet odpovědí   | 67,1 % (59,25; 74,27) |
| ORR % (95% CI)   | 14 (8,7 %)            |
| Úplná odpověď, n (%)   | 94 (58,4 %)           |
| Částečná odpověď, n (%)  |                       |
| <b>Trvání odpovědi*</b>  |                       |
| Počet (%) pacientů s příhodou  | 48/108 (44,4 %)       |
| Rozmezí (měsíce)   | 1,8**; 42,3**         |
| 6měsíční odpověď % (95% CI)  | 83 % (76; 90)         |
| 9měsíční odpověď % (95% CI)  | 75 % (67; 84)         |
| 12měsíční odpověď % (95% CI)   | 63 % (53; 73)         |
| <b>Sekundární cílové parametry (hodnocení BICR podle kritérií RECIST v1.1)</b>         |                       |
| <b>PFS</b>   |                       |
| Počet (%) pacientů s příhodou  | 82/161 (50,9 %)       |
| 6měsíční PFS % (95% CI)  | 77 % (70; 84)         |
| 9měsíční PFS % (95% CI)  | 66 % (58; 74)         |
| 12měsíční PFS % (95% CI)   | 55 % (47; 64)         |
| <b>Celkové přežití*</b>  |                       |
| Počet (%) pacientů s příhodou  | 38/161 (23,6 %)       |
| 6měsíční OS % (95% CI)   | 91 % (87; 96)         |
| 9měsíční OS % (95% CI)   | 86 % (81; 92)         |
| 12měsíční OS % (95% CI)  | 81 % (74; 87)         |
| NE - nelze odhadnout.  |                       |
| Intervaly spolehlivosti (CI) byly stanoveny výpočtem pomocí Clopper-Pearsonovy metody. |                       |
| * Výskyt bez příhody byl stanoven pomocí Kaplan-Meierových odhadů.                     |                       |
| ** Censorováno.  |                       |

Pacienti s ROSI-pozitivním NSCLC s hodnotitelnou účinností s  $\geq$  12měsíčním sledováním (n = 94) měli ORR 73,4 % (95% CI: 63,3 – 82), medián DOR 16,5 měsíců (95% CI: 14,6 – 28,6) a medián PFS 16,8 měsíce (95% CI: (12 – 21,4)).

#### *Intrakraniální odpověď*

Podle hodnocení BICR měla podskupina 46 pacientů s ROSI-pozitivním NSCLC výchozí metastázy v CNS, a to včetně 24 pacientů s měřitelnými metastázami v CNS. Intrakraniální odpověď hodnocená pomocí BICR podle kritérií RECIST v1.1 byla hlášena u 19 z těchto 24 pacientů (3 x CR a 16 x PR) při ORR = 79,2 % (95% CI: 57,8 – 92,9). Procento pacientů (95% CI) s DOR  $\geq$  6 měsíců bylo 76 % (56 – 97), s DOR  $\geq$  9 měsíců bylo 62 % (38 – 86) a s DOR  $\geq$  12 měsíců bylo 55 % (29 – 80) (Kaplan-Meierovy odhady). Devět z těchto 24 pacientů absolvovalo intrakraniální radioterapii mozku během 2 měsíců před zahájením léčby přípravkem Rozlytrek.

#### Podmínečné schválení

Tento léčivý přípravek byl registrován postupem tzv. podmíněčného schválení. Znamená to, že jsou očekávány další důkazy o jeho přínosech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

## Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Rozlytrek u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v indikaci lokálně pokročilých nebo metastazujících solidních nádorů s fúzí genu *NTRK* (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

## **5.2 Farmakokinetické vlastnosti**

Farmakokinetické parametry entrektinibu a jeho hlavního aktivního metabolitu (M5) byly charakterizovány u pacientů se solidními nádory s fúzí genu *NTRK* a *ROS1*-pozitivním NSCLC a u zdravých dobrovolníků. Farmakokinetika entrektinibu a M5 je lineární a nezávislá na dávce i na čase. Při každodenním užívání přípravku Rozlytrek je rovnovážného stavu dosaženo po jednom týdnu v případě entrektinibu a po dvou týdnech v případě M5.

Podle údajů *in vitro* je entrektinib slabým substrátem P-gp. Přesný vliv P-gp *in vivo* není znám. M5 je substrátem P-gp. Entrektinib není substrátem BCRP, ale M5 je substrátem BCRP. Entrektinib a M5 nejsou substráty OATP1B1 ani OATP1B3.

### Absorpce

Po jednorázovém perorálním podání přípravku Rozlytrek v dávce 600 mg pacientům s fúzí genu *NTRK* a *ROS1*-pozitivním NSCLC po jídle byl entrektinib rychle absorbován a přibližně po 4 až 6 hodinách dosáhl maximální plazmatické koncentrace ( $T_{max}$ ). Podle populační farmakokinetické analýzy bylo při dávkování entrektinibu 600 mg jednou denně dosaženo rovnovážného stavu po 5 dnech.

Nebyl zjištěn žádný klinicky významný účinek jídla na biologickou dostupnost entrektinibu.

### Distribuce

Entrektinib a jeho hlavní aktivní metabolit M5 se ve vysoké míře váží na bílkoviny v lidské plazmě bez ohledu na koncentrace léku. Entrektinib i M5 mají podobnou vazebnou sílu na bílkoviny v lidské plazmě a při klinicky relevantní koncentraci je vázáno > 99 %.

Po jednorázové perorální dávce entrektinibu byl geometrický průměrný distribuční objem ( $V_z/F$ ) 600 l; to nasvědčuje rozsáhlé distribuci léku. Entrektinib vykazoval rovnovážné poměry koncentrací v mozku a plazmě od 0,4 do 2,2 u několika druhů zvířat (myši, potkani a psi) při klinicky relevantních systémových expozicích.

### Biotransformace

Entrektinib je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4 (~ 76 %). Odhadovaný celkový příspěvek ostatních CYP a UGT1A4 byl < 25 %. Dvěma hlavními zjištěnými cirkulujícími metabolity jsou aktivní metabolit M5 (vytvářený prostřednictvím CYP3A4) a přímý N-glukuronidový konjugát M11 (vytvářený prostřednictvím UGT1A4).

### Eliminace

Průměrná hodnota kumulace v rovnovážném stavu po podání entrektinibu v dávce 600 mg jednou denně odhadovaná v populačním farmakokinetickém (PK) modelu byla 1,89 ( $\pm$  0,381) pro entrektinib a 2,01 ( $\pm$  0,437) pro M5. Po podání jednorázové dávky [ $^{14}C$ ] entrektinibu bylo 83 % radioaktivity vyloučeno stolicí (36 % dávky v podobě nezměněného entrektinibu a 22 % jako M5); močí bylo vyloučeno minimální množství (3 %).

Entrektinib a M5 představují přibližně 73 % radioaktivity v systémové cirkulaci při  $C_{max}$  a přibližně polovinu celkové radioaktivity při  $AUC_{inf}$ .

Zdánlivá clearance ve vztahu k biologické dostupnosti (Cl/F) odhadovaná v populační PK analýze byla 19,6 l/h pro entrektinib a 52,4 l/h pro M5. Odhadované eliminační poločasy byly 20 hodin pro entrektinib a 40 hodin pro M5.

#### Linearita/nelinearita

Entrektinib má lineární farmakokinetiku v intervalu dávek od 100 mg do 600 mg.

#### Farmakokinetika ve zvláštních populacích

##### Pediatrická populace

Podle údajů z populačních farmakokinetických analýz dávka přípravku Rozlytrek 400 mg jednou denně pro rozmezí plochy povrchu těla (BSA) od 1,11 m<sup>2</sup> do 1,50 m<sup>2</sup> a dávka přípravku Rozlytrek 600 mg jednou denně pro rozmezí BSA  $\geq$  1,51 m<sup>2</sup> u pediatrických pacientů od 12 let vede k podobné systémové expozici jako u dospělých léčených přípravkem Rozlytrek v dávce 600 mg jednou denně.

##### Starší pacienti

U pacientů nad 65 let nebyly při farmakokinetické analýze zjištěny žádné rozdíly v expozici entrektinibu v porovnání s mladšími dospělými.

##### Porucha funkce ledvin

Močí se vylučují zanedbatelné objemy (~ 3 % dávky) entrektinibu a aktivního metabolitu M5; renální clearance tak hraje menší úlohu v eliminaci entrektinibu. Podle populačních farmakokinetických analýz nemá porucha funkce ledvin významný vliv na farmakokinetiku entrektinibu. Vliv těžké poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku entrektinibu není znám.

##### Porucha funkce jater

Hlavní cestou eliminace entrektinibu je jaterní metabolismus; při poruše funkce jater tak může docházet ke zvýšení plazmatické koncentrace entrektinibu a/nebo jeho hlavního aktivního metabolitu M5. U pacientů s poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené klinické údaje.

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice entrektinibu způsobené lehkou poruchou funkce jater. Vliv středně těžké až těžké poruchy funkce jater na farmakokinetiku entrektinibu není znám.

##### Vliv věku, tělesné hmotnosti, rasového původu a pohlaví

Nebyly zjištěny žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice entrektinibu dané věkem (4 roky až 86 let), pohlavím, rasovým původem (asijský, černošský a bělošský) a tělesnou hmotností (32 kg až 130 kg).

### **5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti**

#### Kancerogenita

Nebyly provedeny žádné studie kancerogenity stanovující kancerogenní potenciál entrektinibu.



## Genotoxicita

Bakteriální reverzní mutační vyšetření (Amesův test) *in vitro* neprokázalo mutagenitu entrektinibu, ale kultivace lidských periferních lymfocytů prokázala potenciál pro abnormální chromozomovou segregaci (aneugenita). Entrektinib nebyl klastogenní ani aneugenní v *in vivo* mikronukleárním testu na potkanech a nevyvolával poškození DNA v kometových testech na potkanech.

## Porucha fertility

Nebyly provedeny speciální studie na zvířatech hodnotící účinky entrektinibu na fertilitu. V toxikologických studiích s opakovaným podáním prováděných na potkanech a psech s expozicí přibližně 2,4x, resp. 0,6x větší než u člověka měřenou pomocí AUC při doporučené dávce pro člověka, nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky entrektinibu na samčí a samičí pohlavní orgány.

## Reprodukční toxicita

V embryofetální studii na potkanech byla zjištěna toxicita pro matku (snížený přírůstek tělesné hmotnosti a spotřeba potravy) a malformace plodu (včetně defektního uzávěru těla a malformace obratlů a žebér) při dávce entrektinibu 200 mg/kg/den, která odpovídá přibližně dvojnásobku humánní expozice měřené pomocí AUC při doporučené dávce. Při expozicích odpovídajících < 2násobku humánní expozice měřené pomocí AUC při doporučené dávce byla zjištěna na dávce závislá snížená tělesná hmotnost plodu (nízká, střední a vysoká dávka) a redukce kosterní osifikace (střední a vysoká dávka).

## Studie toxicity po opakované dávce

Ve studiích po opakované dávce u dospělých potkanů a psů a potkaních mládřat byly zjištěny toxicity v CNS (konvulze, porucha chůze, třes) související s entrektinibem při  $\geq 0,2$ násobku expozic u člověka podle  $C_{max}$  doporučené dávky, toxicity kůže (strupy/oděrky) a zhoršení červeného krevního obrazu při  $\geq 0,1$ násobku expozice u člověka podle AUC doporučené dávky. U dospělých potkanů a psů byly zjištěny jaterní účinky (zvýšená ALT a hepatocelulární nekróza) při  $\geq 0,6$ násobku humánní expozice podle AUC doporučené dávky. U psů byl dále zjištěn průjem při  $\geq 0,1$ násobku humánní expozice podle AUC doporučené dávky a prodloužení intervalu QT/QTc při  $\geq 0,1$ násobku humánní expozice podle  $C_{max}$  doporučené dávky.

## Toxikologická studie na potkaních mládřatech

Ve 13týdenní toxikologické studii na potkaních mládřatech zvířata dostávala dávku každý den od 7. do 97. dne po narození (odpovídající přibližně věku od narození do dospělosti u člověka). Kromě účinků na CNS, ptózy a účinků na kůži byly také zjištěny zhoršení červeného krevního obrazu a účinky na růst a vývoj ve fázích podávání dávek a zotavení včetně sníženého přírůstu tělesné hmotnosti a zpožděného pohlavního zrání (při dávce  $\geq 4$  mg/kg/den odpovídající přibližně 0,1 násobku humánní expozice měřené pomocí AUC při doporučené dávce). Byly pozorovány neurobehaviorální deficity hodnocené pomocí funkční observační baterie (snížená schopnost reakce nohy při pádu, snížená síla úchopu předních a zadních končetin projevující se v pozdějším věku) a poruchy učení a paměti (při dávce  $\geq 8$  mg/kg/den odpovídající přibližně 0,2 násobku humánní expozice měřené pomocí AUC při doporučené dávce) a zkrácená délka femuru (při dávce  $\geq 16$  mg/kg/den odpovídající přibližně 0,3 násobku humánní expozice měřené pomocí AUC při doporučené dávce).

## **6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE**

### **6.1 Seznam pomocných látek**

#### Obsah tobolky

Kyselina vinná  
Laktóza  
Hypromelóza  
Krospovidon  
Mikrokrytalická celulóza  
Koloidní bezvodý oxid křemičitý  
Magnesium-stearát

#### Tobolka

Hypromelóza  
Oxid titaničitý (E 171)  
Žlutý oxid železitý (E 172 - tvrdá tobolka 100 mg)  
Oranžová žluť (E 110 - tvrdá tobolka 200 mg)

#### Potiskový inkoust

Šelak  
Propylenglykol  
Indigokarmín (E 132)

### **6.2 Inkompatibility**

Neuplatňuje se.

### **6.3 Doba použitelnosti**

4 roky

### **6.4 Zvláštní opatření pro uchování**

Uchovávejte v původním obalu a v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

### **6.5 Druh obalu a obsah balení**

#### Rozlytek 100 mg tvrdé tobolky

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem garantujícím neporušenost obalu a silikagelovým desikantem ve víčku, obsahující 30 tvrdých tobolek.

#### Rozlytek 200 mg tvrdé tobolky

Lahvičky z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem garantujícím neporušenost obalu a silikagelovým desikantem ve víčku, obsahující 90 tvrdých tobolek.

### **6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku**

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

## **7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Roche Registration GmbH  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Německo

## **8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA**

EU/1/20/1460/001  
EU/1/20/1460/002

## **9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE**

Datum první registrace: 31. července 2020  
Datum posledního prodloužení registrace: 21. června 2021

## **10. DATUM REVIZE TEXTU**

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky <http://www.ema.europa.eu>.

## **PŘÍLOHA II**

- A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ**
- B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ**
- C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE**
- D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**
- E. ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODMÍNĚNOU REGISTRACI PŘÍPRAVKU**

## A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Roche Pharma AG  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Německo

## B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

## C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

### • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR)

Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoliv následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) předloží první PSUR pro tento léčivý přípravek do 6 měsíců od jeho registrace.

## D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

### • Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

- na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
- při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení významného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

### • Povinnost uskutečnit poregistrační opatření

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření:

| Popis   | Termín splnění    |
|---|-------------------|
| Poregistrační studie účinnosti (PAES): Z důvodu další charakterizace účinnosti entrektinibu u pacientů s výchozím onemocněním centrální nervové soustavy držitel rozhodnutí o registraci provede a předloží výsledky randomizované kontrolované studie srovnávající krizotinib v léčbě dříve neléčených pacientů s ROSI-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Primární cílový parametr účinnosti bude PFS v podskupině pacientů s výchozími metastázami v centrální nervové soustavě. Zpráva z klinické studie bude předložena do: | 31. prosince 2027 |

## E. ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODMÍNĚNOU REGISTRACI PŘÍPRAVKU

Tato registrace byla schválena postupem tzv. podmíněného schválení, a proto podle čl. 14a odst. 4 nařízení (ES) č. 726/2004 držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření:

| Popis  | Termín splnění  |
|--|-----------------|
| Z důvodu dalšího potvrzení histologicky nezávislé účinnosti entrektinibu u dospělých a pediatrických pacientů držitel rozhodnutí o registraci předloží společnou analýzu zvětšeného vzorku pacientů s fúzí genu <i>NTRK</i> z probíhajících studií STARTRK-2, STARTRK-NG a z jakékoli dodatečné klinické studie provedené podle schváleného protokolu.<br>Držitel rozhodnutí o registraci předloží výsledky interim analýzy bezpečnosti a účinnosti dospělých a pediatrických pacientů včetně dospívajících s fúzí genu <i>NTRK</i> s hodnotitelnou účinností, které jsou k dispozici podle integrovaného plánu statistické analýzy. | 31. března 2027 |
| Z důvodu dalšího zkoumání vlivu přítomnosti/absence jiných molekulárních alterací na účinnost entrektinibu držitel rozhodnutí o registraci předloží výsledky nádorového genomického profilování z plazmy a/nebo tkáně, jakmile to bude možné, pro výchozí stav a progresi, a to společně s klinickými výsledky podle histologie nádoru pro pacienty z aktualizované společné analýzy.  | 31. března 2027 |

**PŘÍLOHA III**  
**OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE**

## **A. OZNAČENÍ NA OBALU**



## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky  
entrektinib

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 100 mg entrektinibu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu. Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tvrdá tobolka

30 tvrdých tobolek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu a v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Roche Registration GmbH  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

EU/1/20/1460/001

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

rozlytek 100 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM**

PC  
SN  
NN

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

**ŠTÍTEK LAHVIČKY**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky  
entrektinib

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 100 mg entrektinibu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje laktózu. Další informace naleznete v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Tvrdá tobolka

30 tobolek

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu a v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA****13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM**

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABIČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky  
entrektinib

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg entrektinibu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu a azobarvivo oranžovou žlut' (E 110). Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tvrdá tobolka

90 tvrdých tobolek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu a v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Roche Registration GmbH  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

EU/1/20/1460/002

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ****15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

rozlytek 200 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM**

PC  
SN  
NN

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

### ŠTÍTEK LAHVIČKY

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky  
entrektinib

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg entrektinibu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu a azobarvivo oranžovou žlut' (E 110). Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tvrdá tobolka

90 tobolek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání  
Před použitím si přečtete příbalovou informaci

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu a v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM**



## **B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE**

## Příbalová informace: informace pro pacienta

**Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky**

**Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky**

entrectinib

- ▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Rozlytrek a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rozlytrek užívat
3. Jak se přípravek Rozlytrek užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Rozlytrek uchovávat
6. Obsah balení a další informace

### 1. Co je přípravek Rozlytrek a k čemu se používá

#### Co je přípravek Rozlytrek

Rozlytrek je protinádorový lék obsahující léčivou látku entrectinib.

#### K čemu se přípravek Rozlytrek používá

Rozlytrek se používá k léčbě:

- dospělých a dětí od 12 let se solidním (pevným) nádorem v různých částech těla, který je způsoben změnou v genu neurotrofního tyrozinkinázového receptoru (anglická zkratka je *NTRK*), nebo
- dospělých s plicním nádorem nazývaným „nemalobuněčný karcinom plic“ (anglická zkratka je NSCLC), který je způsoben změnou v genu *ROS1*.

#### Solidní nádor s fúzí genu *NTRK*

Přípravek se používá, jestliže:

- máte v nádorových buňkách testem prokázanou změnu v genech nazývaných „*NTRK*“ a nádor se rozšířil uvnitř postiženého orgánu nebo do jiných orgánů v těle nebo operace k odstranění nádoru by pravděpodobně vedla k závažným komplikacím (viz níže „Jak přípravek Rozlytrek působí“) a
- neužíval(a) jste léčivé přípravky nazývané inhibitory *NTRK*
- jiné způsoby léčby byly neúčinné nebo pro Vás nejsou vhodné.

## ROS1-pozitivní nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Přípravek se používá, jestliže máte plicní nádor, který:

- je ROS1-pozitivní, tzn. nádorové buňky mají změnu v genu nazývaném „ROS1“ (viz níže „Jak přípravek Rozlytrek působí“),
- je pokročilý – např. rozšířil se do jiných částí těla (metastazoval) a
- nebyl(a) jste doposud léčen(a) léčivými přípravky nazývanými inhibitory ROS1.

### **Jak přípravek Rozlytrek působí**

Přípravek Rozlytrek působí tak, že blokuje účinek abnormálních enzymů způsobený změnou v genech *NTRK* nebo *ROS1*, které se podílejí na tvorbě těchto enzymů. Vadné enzymy podporují růst nádorových buněk.

Přípravek Rozlytrek tak může zpomalit nebo zastavit růst nádoru. Může také přispět ke zmenšení nádoru.

## **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rozlytrek užívat**

### **Neužívejte přípravek Rozlytrek**

- jestliže jste alergický(á) na entrektinib nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek Rozlytrek užívat.

### **Upozornění a opatření**

Před užitím přípravku Rozlytrek se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

- nedávno u Vás došlo ke ztrátě paměti, zmatenosti, halucinacím nebo ke změnám duševního stavu.
- jste měl(a) zlomeniny nebo onemocnění, které může zvýšit riziko lámání kostí, nazývané „osteoporóza“ nebo „osteopenie“.
- užíváte léčivé přípravky ke snížení hladin kyseliny močové v krvi.
- máte srdeční selhání (srdce nedokáže čerpat dostatečné množství krve k zásobování těla kyslíkem) – známky mohou zahrnovat kašel, dušnost a otoky nohou nebo rukou.
- máte nebo jste měl(a) poruchy srdce nebo poruchu vedení vzruchu na elektrokardiogramu (EKG) nazývanou „prodloužený interval QTc“ nebo nízké hladiny elektrolytů (draslík, hořčík, vápník nebo fosfor) v krvi.
- máte vrozenou poruchu nazývanou „intolerance galaktózy“, „úplný nedostatek laktázy“ nebo „malabsorpci glukózy a galaktózy“.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Rozlytrek**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Přípravek Rozlytrek může ovlivnit působení některých jiných léčivých přípravků. Některé jiné léčivé přípravky zároveň mohou ovlivnit působení přípravku Rozlytrek.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména tehdy, jestliže užíváte kterýkoliv z následujících přípravků:

- přípravky k léčbě plíšňových infekcí (antimykotika), např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol
- přípravky k léčbě syndromu získaného imunodeficitu (AIDS)/infekce virem lidské imunodeficiency (HIV), např. ritonavir nebo sachinavir
- rostlinný přípravek proti depresi – třezalka tečkovaná

- přípravky k léčbě záchvatovitých stavů (antiepileptika), např. fenytoin, karbamazepin nebo fenobarbital
- přípravky k léčbě tuberkulózy, např. rifampicin, rifabutin
- přípravky k léčbě solidních nádorů a nádorů krve – topotekan, lapatinib, mitoxantron, apalutamid, methotrexát
- přípravek k léčbě zánětu kloubů nebo autoimunitního onemocnění kloubů (revmatoidní artritida) – methotrexát
- přípravek k léčbě bolestí hlavy typu migrény – ergotamin
- přípravek k úlevě od těžkých bolestí – fentanyl
- přípravek k léčbě duševního onemocnění (psychóz) nebo mimovolních pohybů a zvuků, nazývaných také Tourettův syndrom – pimozid
- přípravek k léčbě nepravidelného srdečního tepu – chinidin
- přípravky proti tvorbě krevních sraženin – warfarin, dabigatran-etexilát
- přípravky k léčbě žaludečního refluxu (pálení žáhy) – cisaprid, omeprazol
- přípravky ke snížení cholesterolu v krvi – atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin
- přípravky k potlačení imunitního systému nebo k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu – sirolimus, takrolimus, cyklosporin
- přípravky k léčbě deprese – paroxetin, fluvoxamin
- přípravky ke snížení hladiny krevního cukru – repaglinid, tolbutamid
- přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku – bosentan, felodipin, nifedipin, verapamil.

Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Rozlytrek užívat.

### **Užívání přípravku Rozlytrek s jídlem a pitím**

Během léčby přípravkem Rozlytrek nepijte grapefruitovou šťávu a nejezte grapefruity nebo hořké pomeranče. Mohou zvýšit množství přípravku v krvi na škodlivou úroveň.

### **Těhotenství, kojení a plodnost**

#### Ženy a antikoncepce

Během užívání tohoto přípravku nemáte otěhotnět, protože přípravek by mohl poškodit dítě. Můžete-li otěhotnět, musíte během léčby a nejméně 5 týdnů po ukončení léčby používat vysoce účinnou antikoncepci.

Není známo, zda přípravek Rozlytrek snižuje účinnost antikoncepčních přípravků (tablet nebo hormonálních implantátů). Je třeba používat jinou spolehlivou antikoncepční metodu, jako je bariérová metoda (např. kondom) k zabránění otěhotnění během užívání přípravku Rozlytrek a po dobu 5 týdnů po ukončení léčby.

Poradte se se svým lékařem o správných metodách antikoncepce pro sebe a pro svého partnera.

#### Muži a antikoncepce

Během užívání tohoto přípravku nemá Vaše partnerka otěhotnět, protože přípravek by mohl poškodit dítě. Může-li Vaše partnerka otěhotnět, musíte během léčby a nejméně 3 měsíce po ukončení léčby používat vysoce účinnou antikoncepci. Poradte se se svým lékařem o správných metodách antikoncepce pro sebe a pro svou partnerku.

#### Těhotenství

- Pokud jste těhotná, přípravek Rozlytrek neužívejte. Přípravek může nenarozené dítě poškodit.
- Pokud během užívání přípravku nebo během 5 týdnů po poslední dávce otěhotníte, okamžitě to sdělte svému lékaři.

## Kojení

Během užívání přípravku nekojte. Není známo, zda přípravek Rozlytrek může přecházet do mateřského mléka, a mohl by tak poškodit dítě.

## **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek Rozlytrek může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Rozlytrek Vám může způsobit, že:

- máte rozmazané vidění
- cítíte závrať
- omdléváte (ztrácíte vědomí)
- cítíte únavu
- máte změny psychiky, cítíte se zmatený(á) nebo máte zrakové halucinace (vidíte věci, které neexistují).

V takovém případě nesmíte řídit, jezdit na kole ani obsluhovat stroje, dokud příznaky neodezní. Porad'te se s lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti řízení a obsluhování strojů.

## **Přípravek Rozlytrek obsahuje:**

- **laktózu** (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, porad'te se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
- **oranžová žlut'** (E 110) **pouze v 200mg tvrdé tobolce**. To je azobarvivo, které může způsobit alergické reakce.

## **3. Jak se přípravek Rozlytrek užívá**

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### **Užívaná dávka**

#### Dospělí

- Doporučená dávka přípravku je 3 tobolky obsahující 200 mg jednou denně (celkem 600 mg).
- Pokud Vám nebude dobře, lékař může v některých případech dávku snížit, krátkodobě léčbu přerušit nebo může přípravek úplně vysadit.

#### Děti

- Přípravek Rozlytrek mohou užívat děti od 12 let.
- Lékař na základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti stanoví správnou dávku, kterou budete užívat.

### **Jak se přípravek užívá**

Přípravek Rozlytrek se užívá ústy s jídlem nebo bez jídla. Tobolka se polyká celá. Tobolky neotevírejte ani nerozpouštějte, protože obsah tobolky je velmi hořký.

### **Jestliže po užití přípravku Rozlytrek zvracíte**

Jestliže zvracíte bezprostředně po užití přípravku Rozlytrek, vezměte si novou dávku.

### **Jestliže jste užil(a) více přípravku Rozlytrek, než jste měl(a)**

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rozlytrek, než jste měl(a), vyhledejte okamžitě lékaře nebo jděte do nemocnice. Vezměte si s sebou balení s přípravkem a tuto příbalovou informaci.

### **Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rozlytrek**

- Jestliže do další dávky zbývá více než 12 hodin, vezměte si zapomenutou dávku, jakmile si na ni vzpomenete.
- Jestliže do další dávky zbývá méně než 12 hodin, vynechanou dávku si neberte. Vezměte si až další dávku v obvyklém čase.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

### **Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rozlytrek**

Před vysazením přípravku se poraďte s lékařem. Je důležité, abyste přípravek Rozlytrek užíval(a) každý den, dokud Vám jej lékař bude předepisovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky.

### **Závažné nežádoucí účinky**

Pokud se u Vás vyskytne po užití přípravku Rozlytrek cokoli z následujícího, sdělte to okamžitě svému lékaři. Lékař může snížit dávku, krátkodobě léčbu přerušit nebo může přípravek úplně vysadit:

- máte kašel, dušnost a otoky nohou nebo rukou (zadržování tekutin). Tyto nežádoucí účinky mohou být známkami srdečních problémů
- cítíte se zmatený(á), máte změny nálady, zhoršení paměti nebo zrakové halucinace (vidíte věci, které neexistují)
- cítíte závrať nebo točení hlavy nebo cítíte nepravidelný nebo zrychlený tlukot srdce, což může být známkou abnormálního srdečního rytmu
- všimnete si jakékoli bolesti kloubů, bolesti kostí, deformit nebo změn ve Vaší schopnosti se hýbat
- máte problémy s ledvinami nebo artritidu (zánět kloubu), což může být výsledek vysoké hladiny kyseliny močové v krvi.

### **Další nežádoucí účinky**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře:

**Velmi časté:** mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

- únava
- zácpa
- změny chutě
- pocit nerovnováhy nebo točení hlavy
- otok
- průjem
- nevolnost (pocit na zvracení)
- poruchy čítí, jako je svědění, brnění nebo pálení

- nedostatek červených krvinek (chudokrevnost)
- dušnost
- zvýšení tělesné hmotnosti
- zvýšení hladiny kreatininu v krvi (kreatinin je látka běžně vylučovaná ledvinami do moči)
- bolest včetně bolesti zad, bolesti v zátylku (krku), bolesti svalů a kostí, bolesti v končetinách
- zvracení
- kašel
- horečka
- bolest svalů
- bolest kloubů
- bolest hlavy
- nízký krevní tlak
- zvýšení hladiny některých jaterních enzymů (AST/ALT) v krvi
- abnormální nepříjemné vjemy v rukou nebo nohou
- porucha svalové koordinace, nejistota při chůzi
- spánkové poruchy
- plicní infekce
- infekce močových cest
- svalová slabost
- snížená chuť k jídlu
- rozmazané vidění
- vyrážka
- snížení počtu bílých krvinek nazývaných neutrofilů
- bolest břicha
- neschopnost úplně vyprázdnit močový měchýř
- obtížné polykání.

**Časté:** mohou postihnout až 1 z 10 osob:

- poruchy nálady
- dehydratace (nedostatek tekutin)
- tekutina v plicích
- mdloba
- zvýšená citlivost kůže na slunce.

**Méně časté:** mohou postihnout méně než 1 ze 100 osob:

- změny v určitých chemických látkách v krvi, které jsou způsobené rychlým rozpadem nádorových buněk, což může poškodit orgány včetně ledvin, srdce a jater.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím **národního systému hlášení nežádoucích účinků** uvedeného v [Dodatku V](#). Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Rozlytrek uchovávat**

- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Uchovávejte v původním obalu a v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
- Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. Obsah balení a další informace

### Co přípravek Rozlytrek obsahuje

Léčivou látkou je entrektinib.

Rozlytrek 100 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje 100 mg entrektinibu

Rozlytrek 200 mg: jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg entrektinibu

Dalšími složkami jsou:

- *Obsah tobolky:* kyselina vinná, laktóza (viz bod 2 „Přípravek Rozlytrek obsahuje laktózu), hypromelóza, krosповidon, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
- *Tobolka:* hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172; Rozlytrek 100 mg tobolky), oranžová žluť (E 110; Rozlytrek 200 mg tobolky). Viz bod 2 „Přípravek Rozlytrek obsahuje oranžovou žluť (E 110)“.
- *Potiskový inkoust:* šelak, propylenglykol, indigokarmín (E 132).

### Jak přípravek Rozlytrek vypadá a co obsahuje toto balení

Rozlytrek 100 mg tvrdé tobolky jsou neprůhledné žluté tobolky s modrým potiskem ENT 100 na těle tobolky.

Rozlytrek 200 mg tvrdé tobolky jsou neprůhledné oranžové tobolky s modrým potiskem ENT 200 na těle tobolky.

Tobolky jsou baleny v lahvičkách obsahujících:

- 30 tvrdých tobolek přípravku Rozlytrek 100 mg, nebo
- 90 tvrdých tobolek přípravku Rozlytrek 200 mg.

### Držitel rozhodnutí o registraci

Roche Registration GmbH  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Německo

### Výrobce

Roche Pharma AG  
Emil-Barell-Strasse 1  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Německo



Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

**België/Belgique/Belgien**

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

**България**

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

**Česká republika**

Roche s.r.o.

Tel.: +420 - 2 20382111

**Danmark**

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

**Deutschland**

Roche Pharma AG

Tel.: +49 (0) 7624 140

**Eesti**

Roche Eesti OÜ

Tel.: + 372 6 177 380

**Ελλάδα**

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

**España**

Roche Farma S.A.

Tel.: +34 - 91 324 81 00

**France**

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

**Hrvatska**

Roche d.o.o.

Tel.: +385 1 4722 333

**Ireland**

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel.: +353 (0) 1 469 0700

**Ísland**

Roche a/s c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

**Italia**

Roche S.p.A.

Tel.: +39 - 039 2471

**Lietuva**

UAB "Roche Lietuva"

Tel.: +370 5 2546799

**Luxembourg/Luxemburg**

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

**Magyarország**

Roche (Magyarország) Kft.

Tel.: +36 - 1 279 4500

**Malta**

(See Ireland)

**Nederland**

Roche Nederland B.V.

Tel.: +31 (0) 348 438050

**Norge**

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

**Österreich**

Roche Austria GmbH

Tel.: +43 (0) 1 27739

**Polska**

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 - 22 345 18 88

**Portugal**

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel.: +351 - 21 425 70 00

**România**

Roche România S.R.L.

Tel.: +40 21 206 47 01

**Slovenija**

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel.: +386 - 1 360 26 00

**Slovenská republika**

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel.: +421 - 2 52638201

**Suomi/Finland**

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

**Κύπρος**

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.  
Τηλ: +357 - 22 76 62 76

**Sverige**

Roche AB  
Tel.: +46 (0) 8 726 1200

**Latvija**

Roche Latvija SIA  
Tel.: +371 - 6 7039831

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Roche Products (Ireland) Ltd.  
Tel.: +44 (0) 1707 366000

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována.**

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněčné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

**Další zdroje informací**

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky <http://www.ema.europa.eu>.