

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEPIOGLIN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Sepioglin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sepioglin

- Substancją czynną jest pioglitazon. Każda tabletki zawiera 45 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodoru).
- Inne substancje to laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, sól sodowa karmelozy oraz magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Sepioglin i co zawiera opakowanie

Tabletki Sepioglin 45 mg są białe, okrągłe i płaskie, z wypukłym oznaczeniem „45” po jednej stronie i o średnicy około 8,0 mm. Tabletki są pakowane w blistry PA/aluminium/PVC/aluminium zawierające 14, 28, 30, 50, 56, 90 lub 98 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
VAIA S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara
123 51 Ateny, Grecja

Wytwórca
Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara
123 51 Ateny, Grecja

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
<http://www.ema.europa.eu/>.