

- Pārliecinieties, ka pacienta identitāte atbilst unikālajai pacienta identifikācijas informācijai uz Skysona infūzijas maisa(-iem) un sērijas informācijas lapā. Skysona ir paredzēts tikai autologai lietošanai. Neveiciet Skysona infūziju, ja informācija pacientam specifiskajā etiķetē uz infūzijas maisa neatbilst paredzētajam pacientam.
- Pārliecinieties, ka Jums ir pareizais infūzijas maisu skaits un, izmantojot pievienoto sērijas informācijas lapu, pārbaudiet, ka uz infūzijas maisa norādītais sērijas derīguma termiņš nav beidzies.
- Pirms atkausēšanas un infūzijas katrs infūzijas maisis jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas nav bojāts. Ja infūzijas maisis ir bojāts, ievērojiet vietējos drošības norādījumus par atkritumu, kas radušies no cilvēka iegūtiem materiāliem, apstrādi un nekavējoties sazinieties ar bluebird bio.

Atkausēšana

- Ja ir piegādāts vairāk nekā viens infūzijas maisis, atkausējiet un ievadiet katru infūzijas maisu pilnībā, pirms sākat atkausēt nākamo infūzijas maisu.
- Neņemiet zāļu paraugus, nemainiet, neapstarojiet un atkārtoti neatdzesējiet zāles.
- Atkausējiet Skysona 37 °C temperatūrā, izmantojot ūdens peldi vai sauso atkausēšanas metodi. Katra maisa atkausēšanai vajadzīgas aptuveni 2–4 minūtes.
- Neatkausējiet zāles pārāk ilgi. Neatstājiet zāles bez uzraudzības un neļaujiet infūzijas pieslēgvietas ūdens vannā.
- Pēc atkausēšanas saudzīgi samaisiet zāles, grozot rokās infūzijas maisu, lai tā saturs kļūtu viendabīgs.

Ievadīšana

- Neņemiet aizsargpārklājumu, lai atsegtu infūzijas maisa sterilo pieslēgvietu.
- Nodrošiniet pieeju zāļu infūzijas maisa ievadīšanai un veiciet infūziju saskaņā ar ievadīšanas vietā ievērotajām standarta procedūrām šūnu terapijas produktu ievadīšanai. Nelietojiet intravenozās sistēmas ar filtru vai infūzijas sūkni.
- Veiciet Skysona infūziju, cik ātri vien iespējams, un glabājiet ne ilgāk par 4 stundām istabas temperatūrā (20 °C – 25 °C) pēc atkausēšanas.
- Ievadiet katru Skysona infūzijas maisu intravenozas infūzijas veidā 60 minūšu laikā.
- Ievadīšanas beigās izskalojiet Skysona infūzijas maisu un sistēmu ar vismaz 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīduma injekcijām, lai pacientam ievadītu maksimāli daudz šūnu.

Piesardzības pasākumi zāļu ievadīšanā

Neizlietotās zāles un visi materiāli, kas bijuši saskarē ar Skysona (cietie un šķidrie atkritumi), jāpārstrādā un jāiznīcina kā iespējami infekciozi atkritumi, ievērojot vietējās bioloģiskās drošības vadlīnijas par rīcību ar cilvēka izcelsmes materiāliem.

Nejausa pakļaušana iedarbībai

Ja notikusī nejausa pakļaušana šo zāļu iedarbībai, jāievēro vietējās vadlīnijas rīcībai ar cilvēka izcelsmes materiāliem, kas var ietvert notraipītās ādas mazgāšanu un netīrā apģērba novilkšanu. Darba virsmas un materiāli, kas, iespējams, nonākuši saskarē ar Skysona, ir jādezinficē ar atbilstošu dezinfekcijas līdzekli.