

Toediening

- Leg de steriele poort van de infuuszak bloot door het beschermende verpakkingsmateriaal dat de poort bedekt eraf te trekken.
- Open de infuuszak met het geneesmiddel en infundeer volgens de standaardprocedures van de instelling voor toediening van celtherapieproducten. Gebruik geen in-line bloedfilter of infuuspomp.
- Infundeer Skysona zo snel mogelijk en bewaar niet langer dan 4 uur bij kamertemperatuur (20°C – 25°C) na het ontdooien.
- Dien elke infuuszak van Skysona toe via een intraveneuze infusie gedurende een periode van minder dan 60 minuten.
- Spoel al het Skysona dat nog in de infuuszak overblijft en alle bijbehorende slangen met ten minste 50 ml natriumchloride 9 mg/ml (0,9%), oplossing voor injectie, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk cellen bij de patiënt worden geïnfundeerd.

Voorzorgen die genomen moeten worden voor het afvoeren van het geneesmiddel

Ongebruikt geneesmiddel en al het materiaal dat in aanraking is gekomen met Skysona (vast en vloeibaar afval) dienen te worden behandeld en afgevoerd als mogelijk besmettelijk afval volgens de lokale richtlijnen voor het omgaan met van mensen afkomstig materiaal.

Accidentele blootstelling

In geval van accidentele blootstelling moeten plaatselijke richtlijnen voor het hanteren van mensen afkomstig materiaal gevolgd worden, wat onder andere het wassen van de besmette huid en uitdoen van besmette kleding omvat. Werkoppervlakken en materialen die mogelijk met Skysona in contact zijn gekomen, moeten worden ontsmet met een geschikt ontsmettingsmiddel.

Geneesmiddel niet langer geregistreerd