

- Dezghețați Skysona la 37°C în baie de apă sau baie uscată. Dezghețarea fiecărei pungi de perfuzie durează aproximativ 2 până la 4 minute. Nu dezghețați prea mult medicamentul. Nu lăsați medicamentul nesupravegheat și nu scufundați porturile de perfuzare în baie de apă.
- După dezghețare, amestecați ușor medicamentul masând punga de perfuzie până când întreg conținutul este uniform.

Administrare

- Expuneți portul steril al pungii de perfuzie rupând învelișul protector care acoperă portul.
- Accesați punga de perfuzie a medicamentului și perfuzați conform procedurilor standard de la locul administrării în ceea ce privește administrarea medicamentelor de terapie celulară. Nu utilizați un filtru de sânge încorporat sau o pompă de perfuzie.
- Perfuzia cu Skysona trebuie efectuată cât mai curând posibil și păstrată timp de maximum 4 ore la temperatura camerei (20 °C – 25 °C) după dezghețare.
- Administrați fiecare pungă de perfuzie cu Skysona prin perfuzie intravenoasă pe parcursul unei perioade de mai puțin de 60 de minute.
- Clătiți întreaga cantitate de Skysona rămasă în punga de perfuzie și orice tubulatură asociată cu cel puțin 50 ml de soluție de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) pentru preparate injectabile pentru a asigura perfuzarea unui număr cât mai mare posibil de celule în pacient.

Precauții care trebuie luate pentru eliminarea medicamentului

Orice cantitate de medicament și toate materialele care au intrat în contact cu Skysona (deșeuri solide și lichide) trebuie manipulate și eliminate ca deșeu potențial infecțios, în conformitate cu liniile directoare locale privind manipularea materialelor de origine umană.

Expunere accidentală

În caz de expunere accidentală, trebuie urmate liniile directoare locale privind manipularea materialelor de origine umană, care pot include spălarea pielii contaminate și dezbrăcarea hainelor contaminate. Suprafețele de lucru și materialele care este posibil să fi intrat în contact cu Skysona trebuie decontaminate cu un dezinfectant adecvat.