

ANEXO I

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver secção 4.8.

1. NOME DO MEDICAMENTO

Strimvelis 1-10 milhões de células/ml dispersão para perfusão.

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

2.1 Descrição geral

Fração celular autóloga enriquecida com CD34⁺ que contém células CD34⁺ transduzidas com vetor retroviral que codifica a sequência cADN da adenosina desaminase (ADA) humana a partir de células (CD34⁺) estaminais/progenitoras hematopoéticas humanas.

2.2 Composição qualitativa e quantitativa

O produto acabado é composto por um ou mais sacos de acetato de etil vinil (EVA), que contém uma fração celular autóloga enriquecida com CD34⁺ que contém células CD34⁺ transduzidas com vetor retroviral que codifica a sequência cADN da ADA humana.

A informação quantitativa referente às células CD34⁺/kg e células totais no produto é apresentada na rotulagem de cada lote. A concentração é de 1-10 milhões de células CD34⁺/ml.

Excipiente com efeito conhecido

Este medicamento contém 0,15 mmol de sódio por ml (ver secção 4.4).

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Dispersão para perfusão.

Dispersão de células turva a límpida, incolor a cor-de-rosa.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Strimvelis está indicado para o tratamento de doentes com imunodeficiência combinada grave por deficiência de adenosina desaminase (ADA-SCID), para os quais não está disponível um dador familiar adequado de células estaminais compatível com o antígeno leucocitário humano (HLA) (ver secção 4.2 e secção 4.4).

4.2 Posologia e modo de administração

Strimvelis deve ser administrado num centro de transplantes especializado, por um médico com experiência anterior no tratamento e gestão de doentes com ADA-SCID e na utilização de produtos de terapia genética *ex vivo* com CD34⁺ autólogas. Strimvelis deve ser administrado apenas após consulta com o doente e/ou família. Espera-se que os doentes participem num registo pós-tratamento e que sejam seguidos a longo prazo.

É requerida uma reserva de células estaminais CD34⁺ que contenha, pelo menos, 1 milhão de células CD34⁺ por kg. Esta deverá ser recolhida do doente pelo menos três semanas antes do tratamento com Strimvelis. A reserva de células estaminais é recolhida para utilização como tratamento de emergência caso ocorra uma falha durante o fabrico do produto, insucesso no transplante ou aplasia prolongada da medula óssea após o tratamento com Strimvelis.

O doente deve ser capaz de doar células CD34⁺ adequadas, de modo a fornecer a quantidade mínima de 4 milhões de células CD34⁺ purificadas/kg requerida para o fabrico de Strimvelis.

Strimvelis destina-se apenas para utilização autóloga (ver secção 4.4).

Antes da perfusão, deve confirmar-se que a identidade do doente coincide com a informação única essencial do doente no(s) sacos(s) de perfusão e/ou recipiente de Strimvelis (ver secções 4.4 e 6.6).

Condicionamento pré-tratamento

Recomenda-se que sejam administradas 0,5 mg/kg de bussulfano por via intravenosa a cada 6 horas em dois dias consecutivos, com início três dias antes da administração de Strimvelis. A dose total de bussulfano é de 4 mg/kg, dividida em 8 doses de 0,5 mg/kg. Os níveis plasmáticos de bussulfano devem ser medidos após a primeira dose de cada dia, através de amostras de sangue em série utilizando um método adequado. Se a AUC de bussulfano exceder os 4.000 nanogramas/ml*h (974 µmol/L.minuto), a dose deve ser devidamente reduzida com base na AUC.

Pré-medicação

Recomenda-se que seja administrado um anti-histamínico por via intravenosa 15-30 minutos antes da perfusão de Strimvelis.

Posologia

O intervalo posológico recomendado de Strimvelis oscila entre 2 e 20 milhões de células CD34⁺/kg.

Se o produto contiver menos de 2 milhões de células CD34⁺/kg, o médico responsável terá de tomar a decisão de realizar ou não a administração, com base na avaliação individual do benefício/risco. Foi observado insucesso no tratamento num doente tratado nos ensaios clínicos com <2 milhões de células CD34⁺/kg.

Strimvelis deve ser administrado apenas uma vez.

Populações especiais

Idosos

Strimvelis não se destina a utilização em doentes com idade >65 anos, e não foi estudado neste grupo etário.

Compromisso renal

Strimvelis não foi estudado em doentes com compromisso renal. Não é expectável a necessidade de ajuste posológico.

Compromisso hepático

Strimvelis não foi estudado em doentes com compromisso hepático. Não é expectável a necessidade de ajuste posológico.

População pediátrica

A segurança e eficácia de Strimvelis em crianças com menos de seis meses de idade ou mais de 6 anos e 1 mês não foram estabelecidas (ver secção 4.4). Não existem dados disponíveis.

Modo de administração

Strimvelis destina-se a perfusão intravenosa.

Deverá ser utilizado um conjunto de administração de transfusão com filtro. Apenas devem ser utilizados filtros destinados a utilização com conjuntos de transfusão para prevenir a remoção inadvertida de células do produto.

A taxa de perfusão não deverá exceder 5 ml/kg/h. O período de administração é de, aproximadamente, 20 minutos (ver secção 6.6). Após a administração, deve ser utilizada uma seringa com 50 ml de soro fisiológico para limpar o saco.

Precauções a ter em conta antes de manusear ou administrar o medicamento

Este medicamento contém células geneticamente modificadas. Devem ser seguidas as diretrizes locais de biossegurança aplicáveis para tais produtos (ver secção 6.6).

Strimvelis não está testado para agentes infecciosos transmissíveis. Por conseguinte, os profissionais de saúde que manuseiem Strimvelis devem tomar as devidas precauções para prevenir a potencial transmissão de doenças infecciosas.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade ao produto ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

História atual ou antecedentes de leucemia ou mielodisplasia.

Teste positivo para o vírus da imunodeficiência humana (VIH) ou presença de qualquer outro agente infeccioso transmissível listado na atual Diretiva de Células e Tecidos da UE antes da colheita de medula óssea.

Antecedentes de terapia genética.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Strimvelis destina-se apenas para utilização autóloga e nunca deverá ser administrado a outro doente que não o dador original das células CD34⁺.

Nalguns casos, o doente poderá estar impossibilitado de receber Strimvelis, devido a problemas de fabrico. Após notificação, o médico responsável poderá ter de modificar o programa de tratamento do doente em conformidade (isto é, cessar o condicionamento com bussulfano e/ou administração do tratamento com a reserva de células estaminais, se apropriado).

Os resultados do controlo de qualidade de fase dois só estarão disponíveis após a perfusão do produto. Se forem identificados problemas de qualidade clinicamente relevantes, tais como resultados fora das especificações, após a perfusão de Strimvelis, o médico responsável será notificado. O médico deverá monitorizar e/ou tratar o doente em conformidade.

Strimvelis deve ser utilizado com precaução em doentes com idade superior a 6 anos e 1 mês e inferior a 6 meses, uma vez que não existem dados provenientes de ensaios clínicos para esses intervalos etários. Doentes mais velhos são tipicamente menos capazes de doar grandes quantidades de células CD34⁺, o que poderá significar que doentes mais velhos não poderão ser tratados. A produção bem-sucedida de células T após Strimvelis poderá também ser afetada pela função tímica residual que poderá ficar comprometida em crianças mais velhas. A utilização de Strimvelis em doentes mais velhos do que os anteriormente estudados deve ser cuidadosamente considerada e reservada apenas para situações em que todas as outras opções de tratamento razoáveis tenham sido esgotadas.

Doentes que tenham obtido previamente resultados positivos para Hepatite C podem ser tratados com Strimvelis, desde que demonstrem ausência de infeção através do teste de ácido nucleico com um limite de

quantificação ≤ 15 unidades internacionais/ml. São necessários resultados negativos em, pelo menos, 3 ocasiões sequenciais durante um período de 4 semanas, após completar o tratamento para a Hepatite C, com um teste final realizado no máximo 3 dias antes da colheita celular.

Strimvelis deve ser administrado com precaução em doentes com hipersensibilidade aos aminoglicosídeos ou à albumina sérica bovina.

Não foram notificados casos de leucemia ou mielodisplasia após o tratamento com Strimvelis. Contudo, têm sido documentadas inserções vetoriais em regiões cromossómicas anteriormente associadas à leucemia em ensaios comparáveis de terapia genética na síndrome de Wiskott Aldrich, SCID ligada ao cromossoma X e Doença Granulomatosa Crónica. Foram detetados locais de inserção retroviral (RIS) adjacentes ou no interior de CCND2 e de LMO2 e existe potencial risco de transformação leucémica após o tratamento com Strimvelis. Recomenda-se que os doentes sejam monitorizados a longo prazo com, pelo menos, visitas anuais durante os primeiros onze anos e depois aos 13 e 15 anos após o tratamento com Strimvelis, que incluam um hemograma completo diferencial, bioquímico e tirotopina.

Os efeitos a longo prazo e a duração da resposta a Strimvelis na ADA-SCID são desconhecidos (ver secção 5.1).

Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados para a ocorrência de infeções graves e oportunistas, parâmetros de reconstituição imunitária e necessidade de imunoglobulina intravenosa de substituição (IVIG); em caso de falta de resposta, recomenda-se introduzir outros tratamentos para a ADA-SCID sob a supervisão de um médico.

Existiram casos em que o tratamento com Strimvelis não teve êxito. Alguns doentes tiveram de retomar a terapêutica de substituição enzimática prolongada e/ou receber um transplante de células estaminais (ver secção 5.1).

Manifestações não-imunológicas de ADA-SCID podem não responder a Strimvelis.

Não foram conduzidos estudos de imunogenicidade com Strimvelis.

Os doentes podem desenvolver autoimunidade. 67% (12 de 18) dos doentes tratados com Strimvelis tiveram anticorpos autoimunes ou outras manifestações (p. ex. trombocitopenia autoimune, anemia aplástica autoimune, hepatite autoimune e Síndrome de Guillain-Barré) (ver secção 4.8).

Os doentes tratados com Strimvelis não devem doar sangue, órgãos, tecidos e células para transplante, em nenhum momento no futuro. Esta informação é disponibilizada no Cartão de Alerta do Doente.

A contagem de células de linfócitos T (CD3+) e NK (CD56+) melhorou após o tratamento com Strimvelis. Os valores medianos aos 3 anos pós-terapia genética estavam abaixo do nível normal. Recomenda-se um acompanhamento contínuo. Foram notificados casos de papilomas cutâneos, eletroforese das proteínas séricas anormal e um caso de cada de lipofibroma, massa pulmonar e um repertório de células T beta V reduzido. Não foi estabelecida uma evidência de causalidade com o produto.

Foram notificados acontecimentos adversos relacionados com a utilização de cateteres venosos centrais (CVCs) (p. ex. infeções graves devido a CVC e trombos no dispositivo). Os doentes devem ser cuidadosamente monitorizados devido a potenciais acontecimentos relacionados com cateteres.

Conteúdo de sódio

Este medicamento contém 0,15 mmol de sódio por ml. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Não foram realizados estudos de interação. Não é expectável que Strimvelis interaja com a família de enzimas do citocromo hepático P-450 ou transportadores de medicamentos.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Mulheres com potencial para engravidar

Como Strimvelis será administrado após o condicionamento com bussulfano, as doentes com potencial para engravidar devem utilizar um método contraceptivo de barreira fiável durante a administração de Strimvelis e durante pelo menos 6 meses após o tratamento.

Gravidez

Não estão disponíveis dados clínicos sobre a exposição durante a gravidez. Não foram realizados estudos de toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento.

Strimvelis não deve ser utilizado durante a gravidez.

Amamentação

Desconhece-se se Strimvelis é excretado no leite humano. Não foi estudado o efeito sobre bebés que estejam a ser amamentados por mães a quem seja administrado Strimvelis.

Strimvelis não deve ser administrado a mulheres que estejam a amamentar.

Fertilidade

Não existem dados sobre os efeitos de Strimvelis na fertilidade humana. Não foram avaliados os efeitos na fertilidade masculina e feminina em estudos efetuados em animais.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos prolongados de Strimvelis sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8 Efeitos indesejáveis

Resumo do perfil de segurança

A segurança de Strimvelis foi avaliada em 18 indivíduos, com uma duração mediana de acompanhamento de 7 anos.

Tendo em conta a reduzida população de doentes e o tamanho das coortes, as reações adversas na tabela não fornecem uma perspetiva completa da natureza e frequência desses acontecimentos. Reações adversas graves incluem autoimunidade (p. ex. anemia hemolítica autoimune, anemia aplástica autoimune, hepatite autoimune, trombocitopenia autoimune e síndrome de Guillain-Barré). A reação adversa mais frequentemente notificada foi pirexia.

Lista tabelada de reações adversas

As reações adversas estão listadas abaixo por classe de sistema de órgãos MedDRA e por frequência. As categorias de frequência utilizadas são:

Muito frequentes $\geq 1/10$

Frequentes $\geq 1/100, < 1/10$

Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas apresentam-se por ordem decrescente de gravidade.

Classe de sistemas de órgãos	Muito frequentes	Frequentes
Doenças do sangue e do sistema linfático	Anemia ^a Neutropenia ^a	Anemia hemolítica autoimune, anemia aplástica autoimune, trombocitopenia autoimune
Doenças endócrinas	Hipotireoidismo	Tiroidite autoimune
Doenças do sistema nervoso		Síndrome de Guillain-Barré
Vasculopatias	Hipertensão ^a	
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino	Asma, rinite alérgica	
Afeções hepatobiliares		Hepatite autoimune
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos	Dermatite atópica, eczema	
Perturbações gerais e alterações no local de administração	Pirexia	
Exames complementares de diagnóstico	Enzima hepática aumentada ^a , anticorpo antinuclear (ANA) positivo	Anticorpo citoplasmático antineutrófilo positivo, anticorpo contra músculo liso positivo

^aReações adversas consideradas potencialmente relacionadas com o condicionamento com bussulfano

Descrição das reações adversas selecionadas

Reconstituição imunológica

Todas as reações adversas identificadas na tabela (à exceção daquelas potencialmente relacionadas com bussulfano) são consideradas como estando relacionadas com a reconstituição imunológica, devido à sua natureza e momento de aparecimento. Estas reações adversas autoimunes foram notificadas por indivíduos após a terapia genética. A maioria foi notificada entre o terceiro mês e o terceiro ano do período de acompanhamento e desapareceram, com exceção do hipotireoidismo e dos testes ANA positivos. Adicionalmente, as reações adversas relacionadas com alergias na tabela foram notificados maioritariamente entre o terceiro mês e o terceiro ano do período de acompanhamento.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional de notificação mencionado no [Apêndice V](#).

4.9 Sobredosagem

Não estão disponíveis dados de estudos clínicos relativos à sobredosagem com Strimvelis.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: Imunoestimulantes, outros imunoestimulantes, Código ATC: **ainda não atribuído**

Mecanismo de ação

Após perfusão, as células CD34⁺ formam um enxerto na medula óssea, onde voltam a popular o sistema hematopoiético com uma quantidade de células que expressa os níveis farmacologicamente ativos da enzima ADA.

Após um enxerto bem-sucedido no doente, espera-se que os efeitos do produto sejam para toda a vida.

Efeitos farmacodinâmicos

As percentagens medianas de células geneticamente modificadas no sangue periférico no primeiro ano e 3 anos após o tratamento foram de 28% (intervalo 6%-92%) e 30% (intervalo 8%-101%) de células CD19⁺ e 73% (intervalo 20%-100%) e 67% (intervalo 39%-82%) de células CD3⁺, respetivamente.

A presença do transgene leva a um aumento da expressão de ADA. Um ano após o tratamento, a atividade mediana da ADA (células mononucleares de adenosina desaminase) nos linfócitos de sangue periférico foi de 181,2 (intervalo 42,1-1678,2) nmol/h/mg de proteína, quando comparada com a mediana na linha de base (intervalo) de 80,6 (30,5-92,3) nmol/h/mg de proteína. A atividade da ADA manteve-se aumentada ao longo dos 3 anos de acompanhamento.

Eficácia e segurança clínicas

Foram tratados com Strimvelis um total de 18 doentes com ADA-SCID, como parte de um ensaio piloto de extensão aberta (AD1115611; N=12), dois ensaios piloto prévios de extensão aberta (AD1117054/AD1117056; N=3), e um programa de uso compassivo (AD1117064; N=3). Os estudos avaliaram o uso de Strimvelis num intervalo de 0,9 milhões – 18,2 milhões de células CD34⁺/kg. Todos os doentes receberam o condicionamento com bussulfano antes da terapia genética, com a maioria a receber uma dose total de 4 mg/kg, por via intravenosa, durante 2 dias consecutivos antes da perfusão de CD34⁺. Quatro indivíduos tinham recebido anteriormente um transplante de células estaminais sem sucesso de um dador haploidêntico e 15 dos 18 indivíduos tinham recebido anteriormente terapêutica de substituição enzimática com adenosina desaminase bovina modificada por conjugação com polietilenoglicol (PEG-ADA). Os doentes que receberam anteriormente PEG-ADA descontinuaram este tratamento 10 a 22 dias antes do tratamento com Strimvelis. A mediana de idades ao longo do programa foi de 1,7 anos (intervalo 0,5 a 6,1) e 61% era do sexo masculino. Oitenta e três por cento eram caucasianos (56% de ascendência Caucasiana/Europeia e 28% de ascendência Árabe/Norte-Africana), 11% Afro-Americanos/Africanos e 6% Asiáticos.

Doentes tratados no estudo piloto

A eficácia de Strimvelis foi avaliada num estudo de extensão aberta, prospetivo, com a duração de 3 anos, em crianças às quais faltava um dador irmão de células estaminais compatível com o HLA e que não estavam a reagir devidamente à PEG-ADA, eram intolerantes ou não tinham acesso à mesma.

Os resultados aos 3 anos dos doentes tratados no estudo piloto são apresentados na Tabela 1. O tratamento com Strimvelis resultou numa taxa de sobrevivência de 100% aos 3 anos pós-tratamento, uma diminuição na taxa de infeções graves, um aumento nos linfócitos T (CD3⁺) e todos os indivíduos tinham níveis de nucleótido deoxiadenosina nos eritrócitos venosos (RBC dAXP) abaixo dos níveis patológicos (>100 nmol/ml).

Tabela 1. Resultados aos 3 anos para a população ITT no estudo piloto*

Objetivo de eficácia	Linha de base/Pré-	Ano 3/3 Anos Pós-tratamento^b
-----------------------------	---------------------------	--

	tratamento^a	
Sobrevivência		
n	Não aplicável	12
%		100%
Infeções graves		
n	12	12
Taxa de infeções graves por pessoa-ano de observação (intervalo de confiança de 95%)	1,10 (0,74-1,58)	0,429 ^c (0,24-0,72)
Linfócito T (x10 ⁶ /l)		
n	11	11
mediana (intervalo)	88,0 (19-2718)	828,0 (309-2458)
% de indivíduos com RBC dAXP venoso <100 nmol/ml após Strimvelis ^d		
n	Não aplicável ^e	11
%		100%

* Incluindo dados de um doente recolhidos após a intervenção com PEG-ADA (≥ 3 meses de tratamento) ou transplante de célula estaminal hematopoiética.

^a Com base em todo o período de pré-tratamento para infeções graves (recolhidos retrospectivamente), e nos dados recolhidos na visita inicial para linfócitos T. O doente 10 não tinha valor inicial para os linfócitos T.

^b Com base nos 3 anos de período pós-tratamento para sobrevivência e infeções graves, e nos dados recolhidos na visita aos 3 anos para linfócitos T e dAXP. O doente 8 desistiu do estudo antes da visita dos 3 anos e como tal não existem dados para linfócitos T e dAXP.

^c As infeções graves são as que necessitam de hospitalização ou que a prolongam. O período de hospitalização de 3 meses imediatamente após a terapia genética foi excluído dos cálculos.

^d dAXP=dAMP+dADP+dATP. Os resultados de dAXP baseiam-se numa análise da resposta da percentagem de doentes após a terapia genética que alcançaram a definição de desintoxicação metabólica adequada, assim sendo, os valores iniciais não se aplicam.

^e Na linha de base, 9 dos 11 (82%) doentes tinham dAXP <100 nmol/ml. Todos estes doentes tinham tomado anteriormente PEG-ADA.

Função das células T: Nos doentes tratados no estudo piloto, a proliferação de células T foi demonstrada em resposta à estimulação com anticorpos anti-CD3 (mediana de 62629 cpm, intervalo 4531 a 252173) e fitohemaglutinina (mediana de 140642 cpm, intervalo 11119 a 505607), 1 ano após a terapia genética, e estas respostas foram mantidas ao longo do Ano 3. Constatou-se que os TRECs (círculos de excisão do recetor de células T) nos linfócitos de sangue periférico estavam aumentados acima da linha de base (mediana de 141, intervalo 56 a 1542 cópias/100ng ADN) no Ano 1 e mantiveram-se até ao Ano 3 pós-tratamento e que todos os indivíduos tinham evidências de correntes V-beta policlonais num ou mais momentos temporais após a terapia genética, disponibilizando ainda mais evidências que suportam o desenvolvimento funcional das células T.

Função das células B: Todos os 12 indivíduos tratados no estudo piloto receberam tratamento com IVIG na altura do rastreio, e 7 indivíduos (58%) tinham descontinuado o uso de IVIG nos 0-3 anos de acompanhamento após a terapia genética.

Acompanhamento a longo prazo

Foi observada uma taxa de sobrevivência de 100% nos 12 indivíduos tratados no estudo piloto e também nos 18 indivíduos da análise integrada, com uma duração mediana de acompanhamento de, aproximadamente, 7 anos. A sobrevivência livre de intervenção nesta população piloto (definida como sobrevivência sem necessidade de reintrodução de PEG-ADA a longo prazo (≥ 3 meses), ou transplante de células estaminais) foi de 92% (11/12 indivíduos) (82% (14/17 indivíduos) para a população integrada). Um indivíduo tratado num estudo piloto não tinha dados de reintrodução de PEG-ADA e, como tal, foi excluído da sobrevivência

livre de intervenção na população integrada. PEG-ADA a longo prazo (excedendo os 3 meses de duração contínua) foi utilizada por três indivíduos; dois desses indivíduos receberam subsequentemente um transplante de células estaminais de um irmão compatível e um indivíduo permaneceu em tratamento crónico com PEG-ADA. Outro indivíduo necessitou de administração transitória de PEG-ADA devido a um acontecimento autoimune (ver secção 4.4).

Nos doentes tratados no estudo piloto, a taxa de infeções graves diminuiu ao longo do período de acompanhamento (Tabela 2).

Tabela 2 Taxa de infeções graves por pessoa-ano de exposição (população piloto)*

Período de tempo (anos)	Pré-tratamento	Pós tratamento								Total
		0,33-1	>1-2	>2-3	>3-4	>4-5	>5-6	>6-7	>7-8	
N.º de indivíduos	12	12	11	11	11	11	9	7	3	12
N.º de infeções graves	29	6	3	0	2	0	1	0	0	12
Taxa de infeções graves por pessoa ano	1,10	0,63	0,27	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	0,00	0,17

* Excluindo os dados de um doente recolhidos na altura da intervenção com PEG-ADA (≥ 3 meses de tratamento) ou transplante de células estaminais hematopoéticas. n/a – não aplicável.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Strimvelis é uma terapêutica celular autóloga. A natureza de Strimvelis faz com que os estudos convencionais de farmacocinética, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação não se apliquem.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Não foram realizados estudos reprodutivos e de desenvolvimento.

Foi realizado um estudo de biodistribuição com a duração de 4 meses em murganhos. Foram administradas células CD34⁺, provenientes de sangue humano saudável do cordão umbilical, transduzidas com o vetor utilizado para a produção de Strimvelis, por via intravenosa em murganhos condicionados com bussulfano. A maioria dos murganhos demonstrou reconstituição do sistema hematopoético no final do estudo. Foram também detetados níveis baixos de células humanas e de sequências vectoriais em órgãos não-hematopoéticos, consistentes com a presença de sangue contendo células humanas transduzidas. Não houve efeitos adversos nos parâmetros de sobrevivência, hematológicos ou de histopatologia de órgãos principais, à exceção de perda de peso corporal e atrofia nos testículos e ovários, consistente com a administração de bussulfano.

Não foram realizados estudos de carcinogenicidade, uma vez que não estava disponível nenhum modelo animal adequado para avaliar o potencial tumorigénico de Strimvelis, devido à incapacidade de atingir um enxerto a longo prazo de células transduzidas em murganhos.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Cloreto de sódio

6.2 Incompatibilidades

Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos.

6.3 Prazo de validade

6 horas.

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar a 15-30°C.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Saco de perfusão de acetato de etil vinil (EVA) de 50 ml, com uma interconexão *luer spike* fechada com uma cápsula de fecho *luer lock*, acondicionado num recipiente exterior reutilizável.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Strimvelis é transportado diretamente para o estabelecimento de saúde onde a perfusão será administrada. O(s) saco(s) de perfusão é/são colocado(s) dentro de um recipiente exterior fechado. Os sacos devem ser mantidos dentro do recipiente exterior até estarem prontos a utilizar.

Strimvelis destina-se apenas para utilização autóloga. A identidade do doente deve coincidir com a informação única essencial do doente no recipiente primário e/ou exterior antes da perfusão.

Agitar cuidadosamente o saco de perfusão para voltar a dispersar quaisquer agregados celulares, administrar utilizando um conjunto de administração de transfusão com filtro para remover quaisquer agregados celulares restantes.

Este medicamento contém células geneticamente modificadas. Devem ser seguidas as diretrizes locais de biossegurança aplicáveis (ver secção 4.2).

Strimvelis não está testado para agentes infecciosos transmissíveis. Por conseguinte, os profissionais de saúde que manuseiem Strimvelis devem tomar as devidas precauções para prevenir a potencial transmissão de doenças infecciosas.

Superfícies e materiais de trabalho que possam potencialmente ter estado em contacto com Strimvelis devem ser descontaminados com desinfetante apropriado.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências de biossegurança locais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV
Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam,
a Holanda

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

EU/1/16/1097/001

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 26 maio 2016

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos <http://www.ema.europa.eu/>.

ANEXO II

- A. FABRICANTE DA SUBSTÂNCIA ATIVA DE ORIGEM BIOLÓGICA E FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE**
- B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO**
- C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**
- D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ DO MEDICAMENTO**

A. FABRICANTE DA SUBSTÂNCIA ATIVA DE ORIGEM BIOLÓGICA E FABRICANTE RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE

Nome e endereço do fabricante da substância ativa de origem biológica

MolMed SpA
58 Via Olgettina
20132
Milan
Itália

Nome e endereço do fabricante responsável pela libertação do lote

MolMed SpA
58 Via Olgettina
20132
Milan
Itália

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO

Medicamento de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados (ver anexo I: Resumo das Características do Medicamento, secção 4.2).

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

• **Relatórios periódicos de segurança**

Os requisitos para a apresentação de relatórios periódicos de segurança para este medicamento estão estabelecidos na lista Europeia de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do n.º 7 do artigo 107.º-C da Diretiva 2001/83/CE e quaisquer atualizações subsequentes publicadas no portal europeu de medicamentos.

O Titular da Autorização de Introdução no Mercado deverá apresentar o primeiro relatório periódico de segurança para este medicamento no prazo de 6 meses após a concessão da autorização.

D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ DO MEDICAMENTO

• **Plano de Gestão do Risco (PGR)**

O Titular da AIM deve efetuar as atividades e as intervenções de farmacovigilância requeridas e detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. da Autorização de Introdução no Mercado, e quaisquer atualizações subsequentes do PGR que sejam acordadas.

Deve ser apresentado um PGR atualizado:

- A pedido da Agência Europeia de Medicamentos;
- Sempre que o sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-risco ou como resultado de ter sido atingido um objetivo importante (farmacovigilância ou minimização do risco).

• **Medidas adicionais de minimização do risco**

Antes do lançamento de Strimvelis em cada Estado-Membro, o Titular da Autorização de Introdução no Mercado (TAIM) deve acordar o conteúdo e formato dos materiais educacionais para os pais/cuidadores e

para os profissionais de saúde, detalhes de prescrição restrita e formulário de consentimento do produto/acesso controlado, incluindo meios de comunicação, modalidades de distribuição e quaisquer outros aspetos do programa, com as Autoridades Competentes Nacionais.

Strimvelis será administrado num centro de transplantes especializado, e por médicos com experiência anterior no tratamento e gestão de doentes com ADA-SCID e na utilização de produtos de terapia genética *ex vivo* com CD34⁺ autólogas. É necessário um formulário de consentimento do produto preenchido antes de iniciar o tratamento.

Os materiais educacionais devem incluir as seguintes questões de segurança/elementos-chave: autoimunidade, resposta sem sucesso à terapêutica genética e, malignidade devido à oncogénese insercional (por ex: leucemia, mielodisplasia).

- **Obrigação de concretizar as medidas de pós-autorização**

O Titular da Autorização de Introdução no Mercado deverá completar, dentro dos prazos indicados, a seguinte medida:

Descrição	Data limite
PASS não intervencional: Para investigar a segurança e a eficácia a longo prazo da terapia genética com Strimvelis, o TAIM deve conduzir e submeter os resultados de um estudo a longo prazo de acompanhamento não intervencional, prospetivo utilizando dados de um registo de doentes com imunodeficiência combinada grave em adenosina desaminase (ADA-SCID) tratados com Strimvelis. O TAIM irá fazer um acompanhamento do risco de imunogenicidade, mutagénese insercional e oncogénese assim como toxicidade hepática. O TAIM irá rever a ocorrência de angioedema, reações anafiláticas, acontecimentos alérgicos sistémicos e reações adversas cutâneas graves durante o período FU, especialmente nos doentes que não tiveram uma resposta bem-sucedida e que receberam ERT ou SCT. O TAIM irá também avaliar a sobrevivência livre de intervenção.	O TAIM deverá planear para incluir relatórios regulares do progresso do registo no RPS e disponibilizar relatórios de estudos interinos a cada 2 anos até ao final do registo. Os relatórios de registo interinos devem ser submetidos a cada 2 anos. O relatório do estudo clínico final deve ser submetido após o 50.º doente ter tido a visita de acompanhamento de 15 anos; Q4 2037.

ANEXO III
ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO

A. ROTULAGEM

INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO E NO ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

RECIPIENTE EXTERIOR

1. NOME DO MEDICAMENTO

Strimvelis 1-10 milhões de células/ml dispersão para perfusão.

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S)

Fração celular autóloga enriquecida com CD34⁺ que contém células CD34⁺ transduzidas com vetor retroviral que codifica a sequência cADN da ADA humana com uma concentração de 1-10 milhões de células CD34⁺/ml.

3. LISTA DOS EXCIPIENTES

Contém também cloreto de sódio

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO

Dispersão para perfusão.

N.º de sacos de perfusão:

Número total de células: x 10⁶

Células CD34⁺/kg: x 10⁶

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Consultar o folheto informativo antes de utilizar.

Via intravenosa.

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO

Apenas para utilização autóloga.

8. PRAZO DE VALIDADE

Exp.: {DD mês AAAA} {hh:mm}

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Conservar a 15-30°C.

10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE APLICÁVEL

Este medicamento contém células geneticamente modificadas.
Os medicamentos não utilizados devem ser eliminados de acordo com as diretrizes locais de biossegurança.

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV
Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam,
a Holanda

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

EU/1/16/1097/001

13. NÚMERO DO LOTE, CÓDIGOS DA DÁDIVA E DO PRODUTO

Lot:
ID do Doente:

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO**15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO****16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE**

Foi aceite a justificação para não incluir a informação em Braille

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D

Não aplicável.

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA

Não aplicável.

INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

SACO DE PERFUSÃO

1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO

Strimvelis 1-10 milhões de células/ml dispersão para perfusão.
Via intravenosa.

2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO

Consultar o folheto informativo antes de utilizar.

3. PRAZO DE VALIDADE

Exp.: {DD mês AAAA}{hh:mm}

4. NÚMERO DO LOTE, CÓDIGOS DA DÁDIVA E DO PRODUTO

Lot:
ID do Doente:
N.º do Saco:

5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE

Número total de células: x 10⁶
Células CD34⁺ /kg: x 10⁶

6. OUTROS

Apenas para utilização autóloga.

B. FOLHETO INFORMATIVO

Folheto informativo: Informação para o doente ou para o prestador de cuidados

Strimvelis 1-10 milhões de células/ml dispersão para perfusão

Fração celular autóloga enriquecida com CD34⁺ que contém células CD34⁺ transduzidas com vetor retroviral que codifica a sequência cADN da ADA humana

▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Poderá ajudar, comunicando quaisquer efeitos secundários que tenha. Para saber como comunicar efeitos secundários, veja o final da secção 4.

Leia com atenção todo este folheto antes de lhe ser administrado (ou à sua criança) este medicamento, pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou enfermeiro.
- Se (ou a sua criança) tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- O seu médico irá dar-lhe um Cartão de Alerta do Doente. Leia-o cuidadosamente e siga as instruções nele presentes.
- Mostre sempre o Cartão de Alerta do Doente ao seu médico ou enfermeiro quando os vir ou se for ao hospital.

O que contém este folheto:

1. O que é Strimvelis e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado (ou à sua criança) Strimvelis
3. Como é administrado Strimvelis
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Strimvelis
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Strimvelis e para que é utilizado

Strimvelis é um tipo de medicamento chamado **terapia genética**.

Strimvelis é utilizado no tratamento de uma doença grave chamada **ADA-SCID** (*Imunodeficiência Combinada Grave de Adenosina Desaminase*). Com esta doença, o sistema imunitário não funciona corretamente na defesa do corpo contra infeções. As pessoas com ADA-SCID não produzem uma quantidade suficiente de uma enzima chamada *adenosina desaminase (ADA)*, uma vez que o gene que a produz é defeituoso.

Strimvelis é utilizado no tratamento da ADA-SCID quando nenhum membro da família é compatível para doar células estaminais da sua medula óssea para um transplante.

Strimvelis é preparado especialmente para cada doente, usando as células da medula óssea do próprio doente. Funciona colocando um novo gene nas células estaminais da medula óssea, para que estas possam produzir ADA.

Strimvelis é administrado gota-a-gota (*perfusão*) numa veia (*via intravenosa*). Para mais informações sobre o que acontece antes e durante o tratamento, ver secção 3, *Como é administrado Strimvelis*.

2. O que precisa de saber antes de lhe ser administrado (ou à sua criança) Strimvelis

Strimvelis não é adequado para algumas pessoas

Strimvelis não lhe deve ser administrado (ou à sua criança):

- se tem **alergia** a qualquer um dos componentes deste medicamento (*indicados na secção 6*)
- se tem ou alguma vez teve um tipo de **cancro** chamado *leucemia* ou *mielodisplasia*
- se o teste ao **VIH ou a algumas outras infeções** deu positivo (o seu médico irá aconselhá-lo relativamente a isto)
- se já foi tratado com **terapia genética**

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou enfermeiro antes de lhe ser administrado (ou à sua criança) este medicamento.

Strimvelis é preparado especialmente a partir das células do próprio doente. Nunca deve ser administrado a outra pessoa.

Inserir um novo gene no ADN pode causar leucemia. Em ensaios clínicos de terapia genética para outras doenças (que não a ADA-SCID), alguns doentes desenvolveram leucemia ou outros cancros do sistema sanguíneo. Tal não foi observado em nenhum doente tratado com Strimvelis; porém, durante o acompanhamento a longo prazo, o seu médico foi aconselhado a monitorizá-lo (ou à sua criança) para quaisquer sinais de leucemia.

Após ter sido tratado (ou a sua criança) com Strimvelis, você ou a sua criança não poderá doar sangue, órgãos ou tecidos em nenhum momento no futuro. Tal ocorre porque Strimvelis é um produto de terapia genética.

Quando o tratamento com Strimvelis não puder ser concluído

Em alguns casos, pode não ser possível avançar com o tratamento planeado com Strimvelis. Existem várias razões para que isto possa acontecer, por exemplo:

- se tiver ocorrido um problema na altura em que as células foram retiradas para a preparação do medicamento
- se não houver células suficientes do tipo correto para a preparação do medicamento
- se o medicamento tiver ficado contaminado aquando da sua preparação
- se tiver havido um atraso na chegada do medicamento ao hospital onde o tratamento ia decorrer.

Nesses casos, o médico irá dar-lhe (ou à sua criança) células estaminais de substituição, utilizando a amostra de reserva que foi recolhida e guardada antes do início do tratamento (*ver também secção 3 Como é administrado Strimvelis*).

Pode necessitar de outro tratamento

Strimvelis é submetido a uma variedade de testes antes de ser utilizado. Por ser administrado pouco tempo depois da sua preparação, os resultados finais de alguns desses testes não estarão prontos antes de o medicamento ser administrado. Se os testes mostrarem algo que o possa afetar (ou à sua criança), o médico irá tratá-lo em conformidade.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico antes de lhe ser administrado este medicamento. Strimvelis não lhe deve ser administrado se estiver grávida. Se existir a possibilidade de engravidar, deverá utilizar um contraceptivo de barreira (como o preservativo) durante o tratamento e durante, pelo menos, 6 meses após o final do mesmo.

Strimvelis não lhe deve ser administrado se estiver a amamentar. Desconhece-se se os componentes de Strimvelis podem passar para o leite materno.

Strimvelis contém sódio

Este medicamento contém aproximadamente 3,5 mg de sódio por mililitro. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão controlada de sódio.

3. Como é administrado Strimvelis

Strimvelis é administrado gota-a-gota (*perfusão*) numa veia (*via intravenosa*). Apenas pode ser administrado num hospital especializado, e por um médico com experiência no tratamento de doentes com ADA-SCID e na utilização deste tipo de medicamento.

Strimvelis só pode ser preparado se o médico conseguir recolher uma quantidade suficiente do tipo correto de células da medula óssea do próprio doente.

Antes de Strimvelis ser preparado, o médico irá realizar testes para se certificar de que você (ou a sua criança) não têm certas infeções (ver secção 2).

São recolhidas duas amostras

O médico irá recolher duas amostras de células estaminais da medula óssea antes do tratamento planeado:

- a **amostra de reserva**, pelo menos 3 semanas antes. Esta será armazenada, para ser dada ao doente como células estaminais de substituição se Strimvelis não puder ser administrado ou se não funcionar (ver '*Quando o tratamento com Strimvelis não puder ser concluído*', na secção 2)
- a **amostra de tratamento**, 4 a 5 dias antes. Esta será usada na preparação de Strimvelis, através da colocação de um novo gene nas células.

Antes e durante o tratamento com Strimvelis

Quando	O que é feito	Porquê
Pelo menos 3 semanas antes do tratamento	Recolhida amostra de reserva das células estaminais	para serem guardadas como reserva (<i>ver acima</i>)
Cerca de 4 a 5 dias antes do tratamento	Recolhida amostra de tratamento das células estaminais	para preparar Strimvelis (<i>ver acima</i>)
3 dias e 2 dias antes do tratamento	Será administrado um medicamento chamado bussulfano quatro vezes por dia durante dois dias (total de 8 doses)	para preparar a medula óssea para Strimvelis
Cerca de 15 a 30 minutos antes do tratamento	Poderá ser administrado um medicamento anti-histamínico	para fazer com que seja menos provável reagir à perfusão
Strimvelis é administrado...	gota-a-gota numa veia. Isto demorará cerca de 20 minutos	

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas. Os efeitos marcados com * podem estar relacionados com o bussulfano.

Efeitos secundários muito frequentes

Podem afetar **mais de 1 em 10 pessoas**:

- nariz com corrimento ou congestionado (*rinite alérgica*)

- pieira, dificuldade em respirar (*asma*)
- pele inflamada com comichão (*dermatite atópica, eczema*)
- aumento da temperatura (*pirexia*)
- glândula tiroideia pouco ativa (*hipotiroidismo*)
- pressão arterial elevada (*hipertensão*)*
- diminuição do número de glóbulos vermelhos ou brancos (*anemia, neutropenia*)*
- aumento das enzimas hepáticas*
- resultados positivos nas análises ao sangue para *anticorpo antinuclear*

Se tiver alguma questão acerca dos sintomas ou efeitos secundários, ou se algum dos sintomas o preocupar

→ **Fale com o seu médico ou enfermeiro.**

Efeitos secundários frequentes

Podem afetar **até 1 em 10 pessoas**. São todos causados pelo facto do sistema imunitário se tornar hiperativo e começar a atacar os tecidos do próprio organismo.

- manchas vermelhas ou roxas na pele, hemorragia debaixo da pele (*púrpura trombocitopénica imune*)
- glândula tiroideia inflamada (*tiroidite autoimune*)
- fraqueza e dor nos pés e nas mãos (*síndrome de Guillain-Barré*)
- fígado inflamado (*hepatite autoimune*)
- número reduzido de células sanguíneas (*anemia hemolítica autoimune, anemia aplástica autoimune*)
- resultados positivos nas análises ao sangue para *anticorpos citoplasmáticos antineutrófilos e anticorpos contra músculo liso*

Se tiver alguma questão acerca dos sintomas ou efeitos secundários, ou se algum dos sintomas o preocupar

→ **Fale com o seu médico ou enfermeiro.**

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no [Apêndice V](#). Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Strimvelis

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade e hora (EXP) impressos no rótulo do recipiente e no rótulo do saco de perfusão.

Conservar a 15-30°C.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização. Uma vez que este medicamento será administrado por um médico qualificado, é ele o responsável por deitar fora o produto. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Strimvelis A substância ativa é a fração celular autóloga (do próprio doente) enriquecida com CD34⁺ que contém células CD34⁺ transduzidas com vetor retroviral que codifica a sequência cADN da ADA humana. A concentração é de 1-10 milhões de células CD34⁺/ml.

- O outro componente é o cloreto de sódio (*ver secção 2, Strimvelis contém sódio*).

Qual o aspeto de Strimvelis e conteúdo da embalagem

Strimvelis é uma dispersão de células para perfusão turva a límpida, incolor a cor-de-rosa, que é fornecida em um ou mais sacos de perfusão. Os sacos de perfusão são fornecidos num recipiente fechado.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV
Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam,
a Holanda

Fabricante

MolMed SpA
58 Via Olgettina
20132
Milan
Itália

Este folheto foi revisto pela última vez em

Outras fontes de informação

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>. Também existem *links* para outros sítios da internet sobre doenças raras e tratamentos.

Este folheto está disponível em todas as línguas da UE/EEE no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos.

A informação que se segue destina-se apenas aos profissionais de saúde:

Strimvelis é transportado diretamente para o estabelecimento de saúde onde a perfusão será administrada. O saco de perfusão é colocado dentro de um recipiente exterior fechado. Os sacos devem ser mantidos dentro do recipiente exterior até estarem prontos a utilizar.

Strimvelis destina-se apenas para utilização autóloga. A identidade do doente deve coincidir com a informação única essencial do doente no(s) saco(s) de perfusão e/ou recipiente exterior antes da perfusão.

Agitar cuidadosamente o saco de perfusão para voltar a dispersar quaisquer agregados celulares, administre utilizando um conjunto de administração de transfusão com filtro para remover quaisquer agregados celulares restantes.

Após a administração, deve ser utilizada uma seringa com 50 ml de soro fisiológico para limpar o saco.

Este medicamento contém células geneticamente modificadas. Devem ser seguidas as diretrizes locais de biossegurança aplicáveis.

Strimvelis não está testado para agentes infecciosos transmissíveis. Por conseguinte, os profissionais de saúde que manuseiem Strimvelis devem tomar as devidas precauções para prevenir a potencial transmissão de doenças infecciosas.

Superfícies e materiais de trabalho que possam potencialmente ter estado em contacto com Strimvelis devem ser descontaminados com desinfetante apropriado.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências de biossegurança locais.