

ANNEX I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 2.5 mg pilloli miksijin b'rita

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 2.5 mg tadalafil

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola miksija b'rita fiha 29.74 mg lactose.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b'rita (pillola).

Pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa (5.1 ± 0.3 mm), imnaqqxa b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL over 1' fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta' disfunzjoni erettili fl-irġiel adulti.

Sabiex tadalafil ikun effettiv, huwa meħtieġ stimolu sesswali.

Tadalafil Mylan m'huwiex indikat għall-użu min-nisa.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Irġiel adulti

Is-soltu, id-doża rakkmandata hija ta' 10 mg meħuda qabel attivita' sesswali prevista u ma' l-ikel jew fuq stonku vojta. F'dawk il-pazjenti li ma jkollhomx effett adegwat b'10mg ta' tadalafil, tista' tiġi ppruvata doża ta' 20 mg. Tista' tittiehed għall-inqas 30 minuta qabel l-attivita' sesswali.

Il-frekwenza ta' l-oġħla doża hija ta' darba kuljum.

Tadalafil 10 u 20 mg huwa intenzjonat għall-użu qabel attività sesswali prevista u mhux irrakkomandat għall-użu kontinwu ta' kuljum.

F'pazjenti li jaħsbu li se jkollhom użu frekwenti ta' tadalafil (jiġifieri, għallinqas darbtejn fil-ġimgħa) jista' jiġi kkunsidrat dożaġġ ta' darba kuljum bl-inqas dozi ta' tadalafil, skond l-għażla tal-pazjent u l-gudizzju tat-tabib.

F'dawn il-pazjenti, id-doża rakkomandata hija ta' 5 mg meħuda darba kuljum u bejn wieħed u ieħor għandha dejjem tittiehed fl-istess hin tal-ġurnata. Id-doża tista' titnaqqas għal 2.5 mg darba kuljum skond it-tollerabilità individwali.

Kemm hu xieraq l-użu kontinwu ta' skeda ta' dożaġġ ta' kuljum għandu jiġi vvalutat kull tant żmien.

Popolazzjonijiet speċjali

Irgiel anzjani

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti anzjani.

Irgiel b'indeboliment fil-funzjoni renali

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti b'indeboliment renali ħafif jew moderat. Għall-pazjenti b'indeboliment renali sever 10 mg hija d-doża massima rakkomandata. Dożaġġ ta' darba kuljum ta' tadalafile m'huwiex rakkomandat f'pazjenti b'indeboliment renali sever. (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Irgiel b'indeboliment fil-funzjoni tal-fwied

Id-doża rakkomandata ta' tadalafile hija ta' 10 mg meħuda qabel attivita' sesswali prevista u mingħajr rigward għall-ikel. Tagħrif kliniku dwar is-sigurtà ta' tadalafile f'pazjenti b'indeboliment epatiku sever (Child Pugh Klassi C) huwa limitat; għalhekk jekk jiġi miktub mit-tabib, dan għandu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju għal kull pazjent. M'hemm ebda tagħrif disponibbli dwar it-teħid ta' doži ta' tadalafile oġġla minn 10 mg f'pazjenti b'indeboliment epatiku. Dożaġġ ta' darba kuljum ma ġiex evalwat f'pazjenti b'indeboliment epatiku; għalhekk jekk jiġi miktub mit-tabib, dan għandu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju għal kull pazjent. (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Irgiel bid-dijabete

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti dijabetiċi.

Popolazzjoni pedjatrika

M'hemmx indikazzjoni rilevanti ta' tadalafile fil-popolazzjoni pedjatrika b'referenza għall-kura ta' disfunzjoni erettili

Metodu ta' kif għandu jingħata

Tadalafile Mylan hu disponibbli bħala pilloli miksija b'rita ta' 2.5, 5, 10 u 20mg għall-użu orali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Fi studji kliniċi, tadalafile intwera li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Dan huwa maħsub li jirriżulta mill-effetti kkombinati ta' nitrati u tadalafile fir-rota ta' nitric oxide/cGMP. Għalhekk, l-għoti ta' tadalafile lil pazjenti li jkun qad jużaw kwalunkwe forma ta' nitrate organiku huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.5).

Tadalafile ma jistax jiġi uzat f'irgħiel li jbatu minn mard kardijaku li għalihom l-attivita' sesswali mhix rakkomandata. It-tobba għandhom iqisu r-riskju potenzjali kardijaku ta' attivita' sesswali f'pazjenti li għandhom mard kardjovaskulari pre-eżistenti."

Il-gruppi ta' pazjenti b'mard kardjovaskulari għadhom ma ġewx inkluzi fil-provi kliniċi u l-użu ta' tadalafile huwa għalhekk kontra-indikat:

- Pazjenti li kellhom infart kardijaku fl-aħħar 90 jum,
- Pazjenti li jbatu minn angina li mhix stabbli jew angina li sseħħ waqt il-kopulazzjoni sesswali,
- Pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb meqjusa mill-Assoċjazzjoni tal-Qalb ta' New York bħala Klassi 2 jew akbar, fl-aħħar 6 xhur,
- Pazjenti b'taħbit irregolari tal-qalb mhux kontrollat, pressjoni baxxa (<90/50 mm Hg), jew pressjoni għolja mhux kontrollata,

- Pazjenti li kellhom puplesija fl-ahhar 6 xhur.

Tadalafil huwa kontra-indikat f'pazjenti li tilfu d-dawl f'ghajn wahda minhabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), indipendetement mill-fatt jekk dan l-episodju kienx marbut jew le ma' użu precedenti ta' inibitur ta' PDE5 (ara sezzjoni 4.4).

It-tehid flimkien ta' inibituri ta' PDE5, inkluż tadalafil, ma' stimulatori ta' guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikant għax hemm il-possibiltà li dan iwassal għal ipotensjoni sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Qabel tinbeda l-kura b'Tadalafil Mylan

Wieħed għandu jgħares lejn il-passat mediku u għandu jsir eżami fiżiku biex issir id-dijanjsi ta' disfunzjoni erettili u biex jiġu identifikati l-fatturi li potenzjalment qed jikkawżawha, qabel ma jiġi kkunsidrat it-trattament farmakoloġiku.

Qabel ma jinbeda kwalunkwe trattament għal disfunzjoni erettili, it-tobba għandhom jikkunsidraw listat kardjovaskulari tal-pazjenti tagħhom, peress illi hemm grad ta' riskju kardijaku assoċjat ma' lattivita' sesswali. Tadalafil għandu karatteristiċi vasodilatorji, li jirriżultaw fi tnaqqis hafif u temporajnu fil-pressjoni tad-demem (ara sezzjoni 5.1) u b'hekk jikkawża l-effett ipotensiv tan-nitrati (ara sezzjoni 4.3).

L-evalwazzjoni tad-disfunzjoni erettili għandha tinkludi d-determinazzjoni tal-kawżi potenzjali sottostanti u l-identifikazzjoni ta' kura xierqa wara eżaminazzjoni medika xierqa. Mhux magħruf jekk tadalafil huwiex effettiv f'pazjenti li għaddew minn kirurgija fil-pelvis jew prostatetomija radikali fejn in-nervituri ma' ġewx salvati.

Kardjovaskulari

Każijiet kardjovaskulari serji, fosthom infart mijokardijaku, mewt kardijaku għal għarrieda, angina pectoris instabbli, aritmija ventrikulari, puplesija, attakki iskemici transitorji, uġiġh fis-sider, palpitazzjonijiet u takikardija, ġew irrappurtati jew wara t-tqegħid fis-suq u/jew fi provi klinici. Ħafna mill-pazjenti li kellhom dawn il-każijiet kellhom fatturi ta' riskju kardjovaskulari minn qabel. Madankollu, mhuwiex possibbli li jiġi determinat b'mod definitiv jekk dawn l-effetti humiex relatati direttament ma' dawn il-fatturi ta' riskju, ma' tadalafil, ma' attivita' sesswali, jew ma' tahlita ta' dawn il-fatturi jew fatturi oħra.

F'pazjenti li fl-istess ħin qegħdin jieħdu prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja fid-demem, tadalafil jista' jikkawża tnaqqis fil-pressjoni tad-demem. Meta tinbeda l-kura bit-tehid ta' tadalafil darba kuljum, għandhom jingħataw l-kunsiderazzjonijiet klinici xierqa għal possibiltà ta' tibdil fid-doża tatterapija kontra l-pressjoni għolja fid-demem.

F'pazjenti li qed jieħdu alpha1 blockers, l-amministrazzjoni konkomitanti ta' tadalafil jista' jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika f'xi pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Mhuwiex rakkomandat li tadalafil jingħata flimkien ma' doxazosin.

Vizjoni

Difetti fil-vista u każijiet ta' NAION ġew irrappurtati b'konnessjoni mat-tehid ta' Tadalafil Mylan u inibituri oħra ta' PDE5. Analizi ta' tagħrif osservazzjonali tissuggerixxi zieda fir-riskju ta' NAION akuta f'irġiel b'disfunzjoni erettili wara espożizzjoni għal tadalafil jew inibituri oħra ta' PDE5. Peress li dan jista' jkun rilevanti għall-pazjenti kollha esposti għal tadalafil, il-pazjent għandu jingħata parir li f'każ ta' difett fil-vista għal għarrieda, għandu jieqaf jieħu Tadalafil Mylan u jikkonsulta tabib minnufih (ara sezzjoni 4.3).

Tnaqqis jew telf ta' smigh f'daqqa

Kazijiet ta' telf ta' smigh f'daqqa gew irrapportati wara l-użu ta' tadalafil. Għalkemm f'xi kazijiet kienu prezenti fatturi ta' riskju oħra (bħall-età, id-dijabete, l-ipertensjoni u passat mediku ta' telf ta' smigh precedenti) il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieqfu jieħdu tadalafil u jfittxu kura medika minnufih f'każ ta' tnaqqis jew telf ta' smigh f'daqqa.

Indeboliment renali u epatiku

Minhabba ż-żieda fl-espozizzjoni ta' tadalafil(AUC), esperjenza klinika limitata u l-fatt li t-tneħħija m'hijiex affetwata mid-dijalizi, doża ta' darba kuljum ta' tadalafil m'hijiex rakkomandata f'pazjenti b'indeboliment renali sever.

Hemm informazzjoni klinika limitata dwar is-sigurta' ta' teħid ta' doża waħda ta' tadalafil f'pazjenti b'insuffiċjenza severa tal-fwied (Child-Pugh Klassi C); It-teħid ta' doża darba kuljum ma ġietx evalwata f'pazjenti b'insuffiċjenza epatika. Jekk Tadalafil Mylan jinkiteb mit-tabib, għandha ssir stima birreqqa tal-benefiċċji/riskji għall-individwu mit-tabib li jippreskrivih.

Prijapiżmu u deformazzjoni anatomika tal-pene

Pazjenti li jkollhom erezzjonijiet li jdumu għal 4 sigħat jew aktar għandhom ikunu avżati li għandhom ifittxu assistenza medika minnufih. Jekk il-prijapiżmu ma jiġix ittrattat minnufih, jistgħu jirriżultaw ħsara fit-tessut penili u mpotenza permanenti.

Tadalafil għandu jintużab'kawtela f'pazjenti b'diformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angolazzjoni, fibrozi kavernożali jew il-marda ta' Peyronie), jew f'pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jistgħu jippre-disponuhom għal prijapiżmu (bħal sickle cell enemija, majeloma multipla jew lewkimja).

L-użu ma' inibituri CYP3A4

Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal tadalafil lill-pazjenti li qed jużaw inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, ketoconazole, itraconazole, u erythromycin) għaliex kien osservat esponiment akbar għal tadalafil (AUC) meta l-prodotti mediċinali jingħataw flimkien (ara sezzjoni 4.5).

Tadalafil u trattamenti oħra għal disfunzjoni erettile

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' l-użu flimkien ta' tadalafil u inibituri oħrajn ta' PDE5 jew trattamenti oħra għall-kura tad-disfunzjoni erettile ma ġewx studjati. Il-pazjenti iridu jiġu mgħarrfa li m'għandhomx jieħdu Tadalafil Mylan flimkien ma' dawn it-tipi ta' mediċini jew trattamenti.

Kontenut tal-lactose

Tadalafil Mylan fih l-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-galactose, ta' defiċjenza ta' lactase totali jew ta' malassorbiment ta' glucose-galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

Kontenut tas-sodium

Tadalafil Mylan fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Saru studji ta' interazzjoni dwar tadalafil ta' 10 mg u/jew 20 mg, kif indikat hawn taħt. Rigward dawk l-istudji ta' interazzjoni fejn giet użata biss id-doża ta' 10 mg tadalafil, ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox interazzjonijiet klinikament rilevanti li jistgħu iseħħu f' dozi oġġla.

Effetti ta' sustanzi oħrajn fuq tadalafil

Cytochrome P450 inhibitors

Tadalafil huwa prinċipalment metabolizzat minn CYP3A4. Inibitur selettiv ta' CYP3A4, ketoconazole (200 mg kuljum), żied l-esponiment għal tadalafil (10-mg) (AUC) b' darbtejn u C_{max} bi 15%, relattivament għall-AUC u għal valuri ta' C_{max} għal tadalafil biss. Ketoconazole (400 mg kuljum) żied l-esponiment għal tadalafil (20-mg) (AUC) b'erba darbiet u C_{max} bi 22%. Ritonavir, inibitur ta' lenżima protease (200 mg darbtejn kuljum), li huwa inibitur ta' CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, u CYP2D6, żied l-esponiment għal tadalafil (20-mg) (AUC) b' darbtejn bl-ebda tibdil f' C_{max} . Għalkemm ma ġewx studjati interazzjonijiet speċifiċi, inibituri oħra tal-enżima protease, bħal saquinavir, u inibituri oħrajn ta' CYP3A4, bħal erythromycin, clarithromycin, itraconazole u meraq talgrejpfrut għandhom jingħataw flimkien b'kawtela minħabba li huma mistennija li jżidu l-koncentrazzjonijiet ta' tadalafil fil-plażma (ara sezzjoni 4.4).

Konsegwentement l-inċidenza tal-effetti avversi elenkati fis-sezzjoni 4.8 tista' tiżdied.

Transporters

Ir-rwol tat-trasportaturi (bħal p-glikoproteina) fid-dispożizzjoni ta' tadalafil mhux magħruf. Għalhekk hemm il-potenzjal ta' interazzjonijiet tal-mediċina minħabba inibizzjoni tat-trasportaturi

Indutturi Cytochrome P450

Rifampicin, induttur ta' CYP3A4, naqqas l-AUC ta' tadalafil bi 88%, relattivament għall-valuri tal-AUC għal tadalafil waħdu (10 mg). Wieħed jista' jistenna li dan it-tnaqqis fl-espożizzjoni jnaqqas leffikaċja ta' tadalafil: kemm ikun kbir dan it-tnaqqis fl-effikaċja m'huwx magħruf. Indutturi oħrajn ta' CYP3A4 bħall-phenobarbital, phenytoin u carbamazepine, jistgħu wkoll inaqqsu ilkoncentrazzjonijiet ta' tadalafil fil-plażma.

Effetti ta' tadalafil fuq prodotti mediċinali oħrajn

Nitrati

Fl-istudji kliniċi, tadalafil (5, 10 u 20 mg) deher li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Għalhekk l-għoti ta' tadalafil lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta' nitrat organiku huwa kontra-indikat 6 (ara sezzjoni 4.3). Ibbażat fuq ir-riżultati ta' studju kliniku li fiha 150 individwu irċievew doża ta' 20 mg tadalafil kuljum għal 7 ijiem u 0.4 mg nitroglicerina taħt l-ilsien f'hinijiet diversi, din l-interazzjoni damet aktar minn 24 siegħa u ma deherx aktar meta għaddew 48 siegħa minn l-aħħar doża ta' tadalafil. Għalhekk, f'pazjent li għalih gie preskritt xi doża ta' tadalafil (2.5 mg-20 mg), fejn l-għoti tan-nitrat jitqies medikalment neċessarju f' sitwazzjoni prekarja għall-ħajja, għall-inqas 48 siegħa għandhom jithallew jgħaddu minn l-aħħar doża ta' tadalafil qabel ma jingħataw in-nitrati. F'dawn iċċirkostanzi, in-nitrati għandhom biss jingħataw taħt sorveljanza medika stretta, b'sorveljanza xierqa emodinamika.

Mediċini tal-pressjoni (inkluz calcium channel blockers)

It-teħid flimkien ta' doxazin (4 u 8 mg kuljum) u tadalafil (doża ta' 5 mg kuljum u doża waħda ta' 20 mg) iżid b'mod sinifikanti l-effett ta' tnaqqis fil-pressjoni tad-demem ta' dan l-imblokkatur tarreċetturi alpha. Dan l-effett idum għallinqas 12-il siegħa u jista' jkun sintomatiku u jinkludi s-sinkope. Għalhekk din il-kombinazzjoni m'hijiex irrakkomandata (ara sezzjoni 4.4). F'studji ta' interazzjoni magħmula fuq numru limitat ta' volontiera b'saħħithom, dawn l-effetti ma ġewx irrapporati b'alfuzosin u tamsulozin. Madankollu għandha tittiehed l-kawtela meta tadalafil jintuża f'pazjenti li qegħdin jiġu kkurati b'xi imblokkatur tar-reċetturi alpha u speċjalment fl-anzjani. It-trattamenti għandhom jinbdeu b'doża għal minimu u bil-mod il-mod jiġu aġġustati.

Fi studji ta' farmakologija klinika, gie ezaminat il-potenzjal biex tadalafil iżid l-effetti ipotensivi ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pressjoni. Klassijiet ewlenin ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pressjoni għolja kienu studjati, inklużi l-calcium channel blockers (amlodipine), inibituri ta' lenżimi li jbiddu l-angiotensin (ACE) (enalapril), dawk li jimblukaw ir-riċetturi beta-adrenerġiċi (metoprolol), id-djuretici ta' t-tip thiazide (bendrofluazide), u dawk li jimblukaw ir-riċetturi ta' langiotensin II (tipi u doži varji, waħedhom jew flimkien ma' thiazides, dawk li jimblukaw il-passaġġi tal-kalċjum, blokkaturi-beta, u/jew blokkaturi-alpha). Tadalafil (10 mg hliet fi studji b'imblokkaturi tar-riċetturi angiotensin II u amlodipine fejn intużat doża ta' 20 mg) ma kellu l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti ma' l-ebda waħda minn dawn il-klassijiet. Fi studju ieħor ta' farmakologija klinika, kien studjat tadalafil (20 mg) flimkien ma' sa 4kl assijiet ta' mediċini li jintużaw kontra l-pressjoni għolja. F'pazjenti li jieħdu mediċini multipli kontra l-pressjoni għolja, it-tibdiliet ambulatorji fil-pressjoni tad-demmm deħru li kienu relatati mal-grad ta' kontroll tal-pressjoni tad-demmm. F'dan irrigward, l-individwi ta' l-istudju li l-pressjoni tad-demmm tagħhom kienet ikkontrollata tajjeb, it-tnaqqis kien minimu u simili għal dak ta' individwi b'saħħithom. Fl-individwi ta' l-istudju li l-pressjoni taddemm tagħhom ma kenitx ikkontrollat, it-tnaqqis kien akbar minkejja li dan it-tnaqqis ma kienx assoċjat mas-sintomi ta' pressjoni baxxa fil-maġġoranza tal-individwi. F'pazjenti li jirċievu prodotti mediċinali għall-pressjoni għolja flimkien ma' tadalafil 20 mg, dan jista' jinduċi tnaqqis fil-pressjoni tad-demmm, li (bl-eċċezzjoni ta' imblokkaturi tar-riċetturi alpha – ara hawn fuq-) huwa ġeneralment haħif u x' aktarx ma jkunx klinikament rilevanti. L-analiżi ta' informazzjoni tal-prova klinika tal-fażi 3 ma wriet l-ebda differenza fl-avvenimenti avversi f'pazjenti li jieħdu tadalafil waħdu jew flimkien ma' prodotti mediċinali għall-pressjoni għolja. Madankollu, għandu jingħata parir kliniku xieraq lil pazjenti rigward il-possibilita' ta' tnaqqis fil-pressjoni tad-demmm meta jkun qed jieħdu prodotti mediċinali għal kontra l-pressjoni għolja.

Riociguat

Studji qabel l-użu kliniku wrew zieda fl-effett li titbaxxa l-pressjoni sistemika tad-demmm meta inibituri ta' PDE5 intużaw flimkien ma' riociguat. Fi studji klinici, gie muri li riociguat jzid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta' PDE5. Fil-popolazzjoni taħt studju ma kien hemm ebda evidenza li dan it-teħid flimkien kellu xi effett kliniku favorevoli. It-teħid fl-istess ħin ta' riociguat ma' inibituri ta' PDE5, inkluż tadalafil, huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

Inibituri ta' 5-alpha reductase

Ma ġiet identifikata ebda reazzjoni avversa ġdida f'studju kliniku fejn tadalafil 5 mg mogħti flimkien ma' finasteride 5 mg gie mqabbel ma' placebo flimkien ma' finasteride 5 mg għas-solliev mis-sintomi ta' BPH. Madankollu peress li ma sarx studju formali ta' interazzjoni bejn mediċina u oħra li jevalwa l-effetti ta' tadalafil u l-inibituri ta' 5-alpha reductase, wieħed għandu joqgħod attent meta tadalafil jingħata flimkien ma' 5-ARIs.

Substrati CYP1A2 (e.g. theophylline)

Meta tadalafil 10 mg ingħata ma' theophylline (inibitur mhux selettiv tal-phosphodiesterase) fi studju ta' farmakologija klinika, ma kienx hemm interazzjoni farmakokinetika. L-uniku effett farmakodinamiku kien zieda żgħira (3.5bp m) fir-rata tat-taħbit tal-qalb. Minkejja li dan l-effett huwa effett minimu u ma kienx ta' sinifikat kliniku f'dan l-istudju, għandu jitqies meta dawn il-prodotti mediċinali jingħataw flimkien.

Ethinylestradiol u terbutaline

Intwera li tadalafil iżid il-bijodisponibilita' orali ta' ethinylestradiol; zieda simili tista' tkun mistennija bit-teħid orali ta' terbutaline, għalkemm il-konsegwenza klinika ta' din mhix ċerta.

Alkoħol

Koncentrazzjonijiet ta' l-alkoħol (medja massima tal-koncentrazzjoni fid-demmm 0.08%) ma kinux affettwati mit-teħid ta' tadalafil magħhom (10 mg jew 20 mg). Minbarra dan, l-ebda tibdil filkoncentrazzjonijiet ta' tadalafil ma deħru 3 sigħat wara t-teħid ma' l-alkoħol. L-alkoħol ingħata

b'mod li r-rata ta' l-assorbiment ta' l-alkohol tkun massima (sajjem tul il-lejl bl-ebda ikel sa sagħtejn wara li ttiehed l-alkohol).

Tadalafil (20 mg) ma ziedx il-medja tat-tnaqqis ta' pressjoni tad-demmi prodotta mill-alkohol (0.7 g/kg jew madwar 180 ml ta' 40% alkohol [vodka] f'irġiel ta' 80 kg) iżda f'xi individwi, kienu osservati sturdament dovut għat-tibdil fil-pożizzjoni tal-persuna u pressjoni baxxa ortostatika. Meta tadalafil ngħata ma' dozi aktar baxxi ta' l-alkohol (0.6 g/kg), ma deherx li kien hemm pressjoni baxxa u l-isturdament seħħ bi frekwenza simili għal meta ttiehed l-alkohol waħdu. Leffett ta' l-alkohol fuq il-funzjoni konjittiva ma żdiedx bit-tadalafil (10 mg).

Prodotti medicinali metabolizzati b'Cytochrome P450

Tadalafil mhux mistenni li b'mod klinikament sinifikanti jinibixxi jew jinduċi it-tneħħija ta' prodotti medicinali metabolizzati minn iżoformi ta' CYP450. Xi studji kkonfermaw li tadalafil ma jinibixxi jew ma jstimulax iżoformi ta' CYP450, iklużi CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 u CYP2C19.

Substrati CYP2C9 (e.ż. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg 20 mg) ma kellu l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq l-espożizzjoni (AUC) għal S-warfarin jew R-warfarin (substrat ta' CYP2C9), u tadalafil lanqas ma affettwa tibdil fil-hin talprotrombin indott mill-warfarin.

Aspirin

Tadalafil (10 u 20 mg) ma ziedx iż-żieda fil-hin ta' fsada ikkawżata minn acetyl salicylic acid.

Prodotti medicinali antidijabetiċi

Ma sarux studji ta' interazzjonijiet speċifiċi ma' medicini antidijabetiċi.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tadalafil Mylan m'huwiex indikat għall-użu minn nisa.

Tqala

It-tagħrif huwa limitat għall-użu ta' tadalafil fin-nisa tqal. Studji f'animali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta' l-embriju/fetu, fuq il-ħlas jew fuq l-iżvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Bħala prekawzjoni hu preferribli li ma jintuzax Tadalafil Mylan waqt it-tqala.

Treddigh

Tagħrif disponibbli farmakodinamiku/tossikologiku magħmul fil-bhejjem wera li tadalafil huwa preżenti fil-ħalib. Ma jistax jiġi eskluż xi riskju għat-tarbija li qiegħda tiġi mreddgħa. Tadalafil Mylan m'għandux jintuża waqt it-treddigh.

Fertilità

Kien hemm xi effetti li deheru fil-klieb li jstgħu jindikaw xi ħsara fil-fertilità. Żewġ studji kliniċi sussegwenti jissuggerixxu li dan l-effett mhuwiex probabbli fil-bnedmin, għalkemm ġie nnutat tnaqqis fil-koncentrazzjoni ta' sperma f'xi rġiel (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Tadalafil għandu effett żgħir fuq il-hila biex issuq u thaddem magni. Minkejja li l-frekwenza ta' sturdament fir-rapporti fl-ambitu ta' placebo u tadalafil fi provi kliniċi kienet simili, il-pazjenti għandhom ikunu konxji dwar kif jirreagixxu għal tadalafil, qabel ma jsuqu jew jużaw l-magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta' sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni li ġew irrapportati f'pazjenti li qed jieħdu tadalaflil għall-kura taddisfunzjoni erettili jew għall-iperplażja beninna tal-prostata kienu uġiġh ta' ras, dispepsja, uġiġh fiddahar u majalġja, fejn l-inciġenza tagħhom tiżdied hekk kif tiżdied id-doża ta' tadalaflil..

Irreazzjonijiet avversi li ġew irrapportati kienu temporanji u hafna drabi ħfief jew moderati. Il-parti lkbira tal-uġiġh ta' ras irrapportati b'tadalaflil b'dożaġġ ta' darba kuljum jinhassu fl-ewwel 10 sa 30 ġurnata minn meta tibda l-kura.

Sommarju f'forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella hawn taħt tniżżel ir-reazzjonijiet avversi osservati minn rapurtagġ spontanju u minn studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo (b'total ta' 8022 pazjent fuq tadalaflil u 4422 pazjent fuq plaċebo) għall-kura tad-disfunzjoni erettili kemm meta tadalaflil jittiehed meta jkun hemm il-bżonn u kemm f'dożaġġ ta' darba kuljum u għall-iperplażja beninna tal-prostata f'dożaġġ ta' darba kuljum.

Frekwenza: komuni hafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1000$), Rari hafna ($< 1/10,000$) u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli)

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fis-sistema immuni</i>			
		Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva	Angjoedema ²
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>			
	Uġiġh ta' ras	Sturdament	Puplesija ¹ (li tinkludi avvenimenti emorraġiċi), Sinkope, Attakki iskemiċi temporanji ¹ , Emigranja ² , Aċċessjonijiet ² , Amnesija temporanja
<i>Disturbi fl-ġhajnejn</i>			
		Vista m'cajpra, Sensazzjonijiet deskritti bħala w'giġh fl-ġhajnejn	Difett fil-kamp viżiv, Nefha ta' tebqet il-ġhajn, Iperemija tal-konguntiva, Newropatija ottika iskemika anterjuri mhux arteritika (NAION) ² , Okklużjoni vaskulari tar-retina ²
<i>Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika</i>			
		Żanzin fil-widnejn	Telf għal għarrieda tas-smiġh

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fil-qalb¹</i>			
		Takikardija, Palpitazzjonijiet	Infart mijokardijaku, Anġina pectoris instabbi ² , Arritmija ventrikulari ²
<i>Disturbi vaskulari</i>			
	Fwawar	Pressjoni baxxa ³ , Pressjoni għolja	
<i>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali</i>			
	Kongestjoni nażali	Qtuġh ta' nifs, Epistassi	
<i>Disturbi gastrointestinali</i>			
	Dispepsija	Uġiġh addominali, Rimettar, Dardir, Rifluss gastroesofagali	
<i>Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda</i>			
		Raxx	Urtikarja, Sindrome ta' Stevens- Johnson ² , Dermatite bil-qxur ² , Iperidrozi (għaraq)
<i>Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi</i>			
	Uġiġh fid-dahar, Mijaġġja, Uġiġh fl-estremittajiet		
<i>Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja</i>			
		Ematurija	
<i>Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider</i>			
		erezżjonijiet li jdumu żmien twil	Prijapiżmu, Emorraġija tal-pene, Ematospermija
<i>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>			
		Uġiġh fis-sider ¹ , Edema periferali, Għeja	Edema tal-wieċ ² , Mewt kardijaka għal għarrieda ^{1,2}

(1) Il-parti l-kbira tal-pazjenti kellhom fatturi ta' riskju kardjovaskulari li kienu jeżistu minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

(2) Reazzjonijiet avversi rrapportati waqt is-sorveljanza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq li ma kinux osservati f' studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo.

(3) Irrapportat bi frekwenza akbar meta tadalafil ġie mogħti lill-pazjenti li kienu diġa qed jieħdu prodotti mediċinali kontra l-pessjoni.

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi partikulari

Ġiet irrapportata inċidenza ftit iżjed oghla ta' anormalitajiet fl-ECG, l-iżjed bradikardija sinusojde, f'pazjenti kkurati b'tadalafil darba kuljum meta mqabbel ma' placebo. Il-parti l-kbira ta' dawn l-anormalitajiet fl-ECG ma kienux assoċjati ma' reazzjonijiet avversi.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Id-dejta hija limitata għal pazjenti 'l fuq minn 65 sena li qed jirċievi tadalafil f'studji kliniċi jew għallkura tad-disfunzjoni eretili jew għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata. Fi provi kliniċi b'tadalafil meħud fil-pront għall-kura ta' disfunzjoni eretili, id-dijarea ġiet irrapportata b'mod aktar frekwenti f'pazjenti li kellhom aktar minn 65 sena. F'studji kliniċi b'tadalafil 5 mg meħud darba kuljum għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata, l-isturdament u ddijarea ġew irrapportati b'mod aktar frekwenti f'pazjenti 'l fuq minn 75 sena.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'[Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Doži singli sa 500 mg ngħataw lill-individwi b'saħħithom, u doži multipli sa 100 mg kuljum ingħataw lill-pazjenti. L-avvenimenti avversi kienu simili għal dawk li dehru b'f' doži aktar baxxi. F'każijiet ta' doži eċċessivi, il-miżuri supportivi indikati għandhom jittieħdu skond il-htieġa. L-emodjalisi tikkontribwixxi fit-tneħħija ta' tadalafil b'mod negligibbli.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini uroloġiċi, Mediċini użati għad-disfunzjoni erettili, Kodiċi ATC: G04BE08.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Tadalafil huwa inibitur riversibbli, selettiv ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP) speifikament phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Meta l-istimolu sesswali jikkawża hrug lokali ta' nitric oxide, linibizzjoni ta' PDE5 permezz ta' tadalafil tipproduċi livelli oghla ta' cGMP fil-corpus cavernosum. Dan jirriżulta f'rilassament tal-muskoli involontarji u mogħdija ta' demm fit-tessut tal-pene, u b'hekk jipproduċi erezzjoni. Tadalafil m'għandu l-ebda effett jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali.

Effetti farmakodinamiċi

Studji *in vitro* wrew li tadalafil huwa inibitur selettiv ta' PDE5. PDE5 hija enżima li tinsab fil-muskoli involontarji tal-corpus cavernosum, fil-muskoli involontarji vaskolari u vixxerali, fil-muskoli skeletalli, plejtlits, fil-kliewi, fil-pulmuni u fiċ-ċervellett. L-effett ta' tadalafil huwa aktar qawwi fuq PDE5 milli fuq phosphodiesterases oħrajn. Tadalafil huwa >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE1, PDE2 u PDE4, li huma enżimi li jinsabu fil-qalb, fil-moħħ, fil-vini u l-arterji, fil-fwied u f'organi oħra. Tadalafil huwa >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE3, li hija enżima li tinsab fil-qalb u fil-vini u l-arterji.

Din is-selettività għal PDE5 fuq il-PDE3 hija importanti għaliex PDE3 hija enzima li hija involuta fil-kontrattilità kardijaka. Minbarra dan, tadalafil huwa madwar 700 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE6, li hija enzima li tinsab fir-retina u li hija responsabbli għall-fototransduzzjoni. Tadalafil huwa wkoll >1 0,000 darba aktar iktar potenti għal PDE5 milli għal PDE7 sa PDE10.

Effikaċja klinika u sigurtà

Saru tliet studji kliniċi fuq 1054 pazjent f'ambjent tad-dar biex ikun definit iż-żmien ta' rispons għal tadalafil meta jkun hemm it-talba. Tadalafil wera titjib statistikament sinifikanti fil-funzjoni erettili u fl-abilità li jkun hemm kopulazzjoni sesswali b'suċċess sa 36 siegħa wara li tittiehed id-doża, kif ukoll fl-abilità tal-pazjenti li jkollhom u jzommu erezzjoni għal kopulazzjoni b'suċċess meta mqabbel ma' placebo wara 16 minuta mit-teħid tad-doża.

Tadalafil li ngħata lill-individwi b'saħħithom, meta mqabbel ma' placebo, ma pproduċa l-ebda differenza sinifikanti fil-pressjoni sistolika u diastolika meħuda meta l-individwu kien mimdud fuq dahru (medja massima ta' tnaqqis ta' 1.6/0.8 mm Hg, rispettivament), fil-pressjoni sistolika u diastolika meħuda meta l-individwu kien bilwieqfa (medja massima ta' tnaqqis ta' 0.2/4.6 mm Hg, rispettivament), u l-ebda tibdil sinifikanti fir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Fi studju li sar biex ikunu ttestjati l-effetti ta' tadalafil fuq il-viżjoni, fejn intuża t-test Farnsworth-Munsell ta' 100-lewn, ma deherx li kien hemm problemi biex jintgħarfu l-kuluri (blu/aħdar). Din issejba hija konsistenti ma' l-affinità baxxa ta' tadalafil għal PDE6 meta mqabbel ma' PDE5. Fl-istudji kliniċi kollha, ir-rapporti tat-tibdil fil-viżjoni tal-kulur kienu rari (<0.1%).

Saru tliet studji fl-irġiel biex ikun stmat l-effett potenzjali fuq l-ispermatogenezi ta' tadalafil 10 mg (studju wiehed ta' 6 xhur) u 20 mg (studju wiehed ta' 6 xhur u studju wiehed ta' 9 xhur) mogħtija kuljum. F'tnejn minn dawn l-istudji ġew osservati tnaqqis fl-għadd u fil-koncentrazzjoni ta' sperma relatati ma' kura b'tadalafil ta' relevanza klinika improbabbli. Dawn l-effetti ma ġewx assoċjati ma' tibdil fil-parametri l-oħra bħal motilità, morfologija u FSH.

Tadalafil f'doži ta' 2.5, 5, u 10 mg meħuda darba kuljum kien għall-ewwel evalwat f'3 studji kliniċi li fihom ħadu sehem 853 pazjent, ta' etajiet (marġni ta' 21-82 sena) u razez differenti, b'disfunzjoni erettili li kellhom gradi ta' severità (ħafif, moderat, gravi) u etjologiji varji. Fiz-żewġ studji primarji ta' effikaċja fuq popolazzjonijiet ġenerali, il-proporzjon ta' tentattivi ta' kopulazzjoni b'suċċess għal kull pazjent kienu medja ta' 57 u 67% għal dawk fuq tadalafil 5 mg, 50% għal dawk fuq tadalafil 2.5 mg meta mqabbla ma' 31 u 37% li ħadu placebo. Fl-istudju f'pazjenti li kellhom disfunzjoni erettili sekondarja għad-dijabete, il-proporzjon ta' tentattivi ta' suċċess għal kull pazjent kienu medja ta' 41 u 46% għal dawk fuq tadalafil 5 mg u 2.5 mg rispettivament, meta mqabbel ma' 28% li ħadu placebo. Il-parti l-kbira tal-pazjenti f'dawn it-tliet studji kienu rrispondew qabel għall-kura bl-inibituri PDE5 fejn id-doża kienet tittiehed biss meta jkun hemm it-talba. F'studju li sar wara, 217-il pazjent li qatt ma kienu ħadu inibituri ta' PDE5 ġew magħzula b'mod arbitrarju biex jieħdu tadalafil 5 mg jew placebo. Il-proporzjon ta' tentattivi ta' kopulazzjoni sesswali b'suċċess għal kull pazjent kien medja ta' 68% għall-pazjenti fuq tadalafil meta mqabbel ma' 52% għall-pazjenti fuq placebo.

Fi studju li dam 12-il ġimgħa u li gie magħmul f'186 pazjent (142 tadalafil, 44pl aċebo) b'disfunzjoni erettili kawża ta' trauma tan-nerv li jgħaddi minn ġos-sinsla, tadalafil b'mod sinifikanti tejjeb ilfunzjoni erettili li wassal għal medja f'kull pazjent ta' proporzjon ta' tentattivi ta' suċċess f'dawk ikkurati b'tadalafil 10 mg jew 20 mg (doża flessibbli, meta jkun hemm il-bżonn) ta' 48% meta mqabbel ma' 17% bi placebo.

Popolazzjoni pedjatrika

Sar studju wiehed f'pazjenti pedjatriċi b'Distrofija Muskolari ta' Duchenne (DMD – *Duchenne Muscular Dystrophy*) fejn ma ntweriet ebda evidenza ta' effikaċja. L-istudju ta' tadalafil, bi 3 fergħat, parallel, magħmul b'mod arbitrarju, *double-blind* u kkontrollat bi placebo sar f'331 tifel b'etajiet minn

7-14-il sena b'DMD li fl-istess hin kienu qed jirċievu t-terapija bil-kortikosteroidi. L-istudju kien jinkludi perijodu *double-blind* ta' 48 ġimgħa fejn il-pazjenti, b'mod arbitrarju, ngħataw kuljum tadalafil 0.3 mg/kg, tadalafil 0.6 mg/kg, jew placebo. Tadalafil ma weriex effikaċja biex inaqqas it-tnaqqis fil-mixi kif imkejjel permezz tal-punt finali primarju tad-distanza li wieħed jimxi f'6 minuti (6MWD – *6 minute walk distance*): il-bidla medja fl-inqas numru ta' kwadrati (LS – *least squares*) f'6MWD fit-48 ġimgħa kien -51.0 metri (m) fil-grupp tal-placebo, meta mqabbel ma' -64.7 m fil-grupp ta' tadalafil 0.3 mg/kg ($p = 0.307$) u -59.1 m fil-grupp ta' tadalafil 0.6 mg/kg ($p = 0.538$). Barra minn hekk, ma kien hemm ebda evidenza ta' effikaċja minn ebda waħda mill-analiżi sekondarji li saru f'dan l-istudju. Ir-riżultati totali ta' sigurtà kienu fil-parti l-kbira konsistenti mal-profil ta' sigurtà magħruf ta' tadalafil u bl-avvenimenti avversi (AEs, adverse events) mistennija f'popolazzjoni pedjatrika b'DMD li qiegħda tirċievi l-kortikosteroidi.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu pprezentati r-riżultati tal-istudji f'kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta' disfunzjoni erettile. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Tadalafil jiġi assorbit malajr jittiehed mill-ħalq u l-medja massima osservata ta' konċentrazzjoni fil-plażma (C_{max}) tintlaħaq f'hin medju ta' saġhtejn wara li tittiehed id-doża. Il-biodisponibilità assoluta ta' tadalafil wara doża orali ma gietx determinata. Ir-rata u l-grad ta' l-assorbiment ta' tadalafil mhumiex influwenzati bl-ikel, għalhekk tadalafil jista' jittiehed ma' l-ikel jew fuq stonku vojti. Il-hin tad-doża (filgħodu versu filgħaxija) ma kellu l-ebda effetti klinikament rilevanti fuq ir-rata u l-grad ta' l-assorbiment.

Distribuzzjoni

Il-volum medju tad-distribuzzjoni huwa madwar 63l, li jindika li tadalafil jiġi distribwit fit-tessuti. F'konċentrazzjonijiet terapewtiċi, 94% ta' tadalafil fil-plażma jkun marbut mal-proteini. L-irbit mal-proteini mhuwiex effettwat mill-funzjoni tal-kliewi. Inqas minn 0.0005% tad-doża mogħtija dehret fis-semen ta' individwi b'saħħithom.

Bijotrasformazzjoni

Tadalafil huwa prinċipalment metabolizzat permezz ta' l-iżoforma ċitokromju P450 (CYP) 3A4. Il-metabolu prinċipali ċirkolanti huwa methylcatechol glucuronide. Dan il-metabolu huwa mill-inqas 13,000-il darba inqas qawwi minn tadalafil għal PDE5. Konsegwentement, mhuwiex mistenni li jkun klinikament attiv fil-konċentrazzjonijiet osservati tal-metabolu.

Eliminazzjoni

It-tneħħija medja orali ta' tadalafil hija 2.5l/siegħa u l-half-life medja hija ta' 17.5 sigħat f'individwi b'saħħithom. Tadalafil jitneħħa prinċipalment bħala metaboli mhux attivi, l-aktar fl-ippurgar (madwar 61% taddoża) u b'ammont inqas fl-awrina (madwar 36% tad-doża).

Linearità/nuqqas ta' linearità

Il-farmakokinetiċi ta' tadalafil f'individwi b'saħħithom huma lineari fir-rigward tal-hin u tad-doża. Fi skala ta' doża minn 2.5 sa 20 mg, l-esponiment (AUC) jiżdied b'mod proporzjonali għad-doża. Livelli kostanti fil-plażma jinlaħqu fi żmien 5 ijiem mit-teħid ta' doża ta' darba kuljum.

Il-farmakokinetiċi determinati f'popolazzjoni magħżula b'pazjenti b'disfunzjoni erettili huma simili għall-farmakokinetiċi f'individwi mingħajr disfunzjoni erettili.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Anzjani b'saħħithom (65 sena jew akbar) kellhom tneħħija aktar baxxa ta' tadalafile meħud oralment, li rriżulta f'25% aktar esponiment (AUC) meta mqabbel ma' individwi b'saħħithom ta' eta' minn 19 sa 45 sena. Dan l-effett ta' l-eta mhuwiex klinikament sinifikanti u ma jeħtieġx tibdil fid-doża.

Insuffiċjenza renali

Fl-istudji tal-farmakoloġija klinika fejn intużat doża waħda ta' tadalafile (5 sa 20 mg), l-esponiment għal tadalafile (AUC) kien madwar id-doppju f'individwi b'indeboliment hafif fil-kliwi (tneħħija talkrejinina 51 sa 80 ml/min) jew moderat (tneħħija tal-krejinina 31 sa 50 ml/min) u f'individwi fuq id-dijalizi bi stat terminali tal-funzjoni tal-kliwi. Fil-pazjenti fuq l-emodjalizi, C_{max} kien 41% oġhla minn dak osservat f'individwi b'saħħithom. L-emodjalizi tikkontribwixxi ftit li xejn għat-tneħħija tattadalafile.

Insuffiċjenza epatika

L-esponiment għal tadalafile (AUC) f'individwi b'insuffiċjenza hafifa u moderata tal-fwied (Child-Pugh Klassi A u B) huwa komparabbli ma' l-espożizzjoni f'individwi b'saħħithom meta tinghata doża ta' 10 mg. L-informazzjoni klinika dwar is-sigurtà ta' tadalafile f'pazjenti b'insuffiċjenza epatika gravi (Child-Pugh Klassi C) hija limitata. M'hemm l-ebda tagħrif disponibbli dwar l-għoti ta' doża ta' tadalafile darba kuljum lill-pazjenti b'indeboliment epatiku. Jekk tabib jippreskrivi tadalafile b'doża ta' darba kuljum għandha ssir evalwazzjoni b'attenzjoni fuq bażi individwali tal-benefiċċji/riskji mit-tabib li jkun għamel ir-riċetta.

Pazjenti bid-dijabete

L-esponiment għal tadalafile (AUC) f'individwi bid-dijabete kien madwar 19% inqas mill-valur ta' AUC f'individwi b'saħħithom. Din id-differenza fl-espożizzjoni ma teħtieġx tibdil fid-doża.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn doži ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kancer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin

Ma kien hemm ebda evidenza ta' teratoġenicità' jew ta' effett tossiku fuq l-embriju jew il-fetu f'firien jew ġrieden li rċevew sa 1000 mg/kg/jum tadalafile. Fi studju tal-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid tal-firien, id-doża li fiha ma ġie osservat l-ebda effett kienet ta' 30 mg/kg/jum. F'fara tqila, l-AUC għal medicina ħielsa kkalkulata f'din id-doża kienet madwar 18-il darba akbar minn l-AUC fil-bniedem f'doża ta' 20 mg.

Ma kien hemm l-ebda ħsara fil-fertilità tal-firien maskili u femminili. Fi klieb li ngħataw tadalafile kuljum għal 6 sa 12-il xahar f'doži ta' 25 mg/kg/jum (li jriżulta f'esponiment mill-inqas 3 darbiet akbar [skala 3.7 – 18.6] milli jidher fil-bnedmin li ngħataw doża waħda ta' 20 mg) u aktar, kien hemm rigressjoni tal-epitelju tubulari seminiferu li rriżulta fi tnaqqis tal-ispermatogenezi f'xi klieb. Ara wkoll sezzjoni 5.1

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Lactose, anhydrous
Poloxamer 188
Cellulose, microcrystalline (pH101)
Povidone (K-25)
Croscarmellose sodium
Magnesium stearate
Sodium laurilsulfate
Silica, colloidal anhydrous

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate
Hypromellose (E464)
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide aħmar (E172)
Triacetin

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet Snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folji tal-Alu PVC/PE/PVdC.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 28 u 56 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal ta' prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/961/008

EU/1/14/961/009

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Novembru 2014

Data tal-aħħar tiġdid: 31 Lulju 2019

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 5 mg pilloli miksijin b'rita

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 5 mg tadalafil.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola miksija b'rita fiha 59.48 mg ta' lactose.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b'rita (pillola).

Pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa (6.3 ± 0.3 mm), imnaqqa b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL over 2' fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta' disfunzjoni erettili fl-irġiel adulti.

Sabiex tadalafil ikun effettiv għall-kura tad-disfunzjoni erettili, huwa meħtieġ stimolu sesswali.

Il-kura tas-sinjali u s-sintomi tal-iperplażja beninna tal-prostata fl-irġiel adulti.

Tadalafil Mylan m'huwiex indikat għall-użu min-nisa.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

Disfunzjoni erettili fl-irġiel adulti

Is-soltu, id-doża rakkmandata hija ta' 10 mg meħuda qabel attivita' sesswali prevista u ma' l-ikel jew fuq stonku vojta. F'dawk il-pazjenti li ma jkollhomx effett adegwat b'10mg ta' tadalafil, tista' tiġi ppruvata doża ta' 20 mg. Tista' tittiehed għall-inqas 30 minuta qabel l-attivita' sesswali.

Il-frekwenza tal-ogħla doża hija ta' darba kuljum.

Tadalafil 10 u 20 mg huwa intenzjonat għall-użu qabel attività sesswali prevista u mhux irrakkomandat għall-użu kontinwu ta' kuljum.

F'pazjenti li jaħsbu li se jkollhom użu frekwenti ta' tadalafil (jiġifieri, għallinqas darbtejn fil-gimgha) jista' jiġi kkunsidrat dożaġġ ta' darba kuljum bl-inqas doži ta' tadalafil, skond l-għażla tal-pazjent u l-gudizzju tat-tabib.

F'dawn il-pazjenti, id-doża rakkomandata hija ta' 5 mg meħuda darba kuljum u bejn wieħed u ieħor għandha dejjem tittieħed fl-istess ħin tal-ġurnata. Id-doża tista' titnaqqas għal 2.5 mg darba kuljum skond it-tollerabilità individwali.

Kemm hu xieraq l-użu kontinwu ta' skeda ta' dożaġġ ta' kuljum għandu jiġi vvalutat kull tant żmien.

Iperplażja beninna tal-prostata fl-irġiel adulti

Id-doża rakkomandata hi ta' 5 mg, li tittieħed madwar l-istess ħin kuljum mal-ikel jew fuq stonku vojti. Għall-irġiel adulti li qed jiġu kkurati kemm għall-iperplażja beninna tal-prostata u kemm għaddisfunzjoni erettili, Id-doża rakkomandata hi wkoll ta' 5 mg li tittieħed madwar l-istess ħin kuljum. Pazjenti li ma jkunux kapaċi jittolleraw id-doża ta' tadalafile 5 mg għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata għandhom jikkunsidraw terapija alternattiva peress li l-effikaċja ta' tadalafile 2.5 mg ma ġietx murija fl-iperplażja beninna tal-prostata.

Popolazzjonijiet speċjali

Irġiel anzjani

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti anzjani.

Irġiel b'indeboliment fil-funzjoni tal-kliwi

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti b'indeboliment renali ħafif jew moderat. Għall-pazjenti b'indeboliment renali sever 10 mg hija d-doża massima rakkomandata għall-kura ta' meta jkun hemm il-bżonn.

Dożaġġ ta' darba kuljum ta' 2.5 jew 5 mg tadalafile għall-kura kemm tad-disfunzjoni erettili u kemm tal-iperplażja beninna tal-prostata m'huwiex rakkomandat f'pazjenti b'indeboliment renali sever (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Irġiel b'indeboliment tal-fwied

Għall-kura tad-disfunzjoni erettili bl-użu ta' tadalafile meta jkun hemm il-bżonn, id-doża rakkomandata ta' tadalafile hija ta' 10 mg meħuda qabel attivita' sesswali prevista u mingħajr rigward għall-ikel. Tagħrif kliniku dwar is-sigurtà ta' tadalafile f'pazjenti b'indeboliment epatiku sever (Child Pugh Klassi C) huwa limitat; għalhekk jekk jiġi miktub mit-tabib, dan għandu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/ riskju għal kull pazjent. M'hemm ebda tagħrif disponibbli dwar it-teħid ta' doži ta' tadalafile oġġla minn 10 mg f'pazjenti b'indeboliment epatiku.

Dożaġġ ta' darba kuljum ta' tadalafile għall-kura kemm tad-disfunzjoni erettili u kemm tal-iperplażja beninna tal-prostata ma ġiex evalwat f'pazjenti b'indeboliment epatiku; għalhekk jekk jiġi miktub mit-tabib, dan għandu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju għal kull pazjent. (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Irġiel bid-dijabete

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti dijabetiċi.

Popolazzjoni pedjatrika

M'hemmx indikazzjoni rilevanti ta' tadalafile fil-popolazzjoni pedjatrika b'referenza għall-kura ta' disfunzjoni erettili.

Metodu ta' kif għandu jinġhata

Tadalafile hu disponibbli bħala pilloli miksija b'rita ta' 2.5, 5, 10 u 20mg għall-użu orali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Fi studji kliniċi, tadalafil intwera li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Dan huwa maħsub li jirriżulta mill-effetti kkombinati ta' nitrati u tadalafil fir-rotta ta' nitric oxide/cGMP. Għalhekk l-għoti ta' tadalafil lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta' nitrat organiku huwa kontra-indikat. (ara sezzjoni 4.5).

Tadalafil ma jistax jiġi użat f'irġiel li jbatu minn mard kardijaku li għalihom l-attività sesswali mhix rakkmandata. It-tobba għandhom iqisu r-riskju potenzjali kardijaku ta' attività sesswali f'pazjenti li għandhom mard kardjovaskulari pre-eżistenti.

Il-gruppi ta' pazjenti b'mard kardjovaskulari għadhom ma ġewx inklużi fil-provi kliniċi u l-użu ta' tadalafil huwa għalhekk kontra-indikat:

- Pazjenti li kellhom infart kardijaku fl-aħħar 90 jum,
- Pazjenti li jbatu minn angina li mhix stabbli jew angina li sseħħ waqt il-kopulazzjoni sesswali,
- Pazjenti li jbatu minn insufficjenza tal-qalb meqjusa mill-Assoċjazzjoni tal-Qalb ta' New York bhala Klassi 2 jew akbar, fl-aħħar 6 xhur,
- Pazjenti b'taħbit irregolari tal-qalb mhux kontrollat, pressjoni baxxa (<90/50 mm Hg), jew pressjoni għolja mhux kontrollata,
- Pazjenti li kellhom puplesija fl-aħħar 6 xhur.

Tadalafil huwa kontra-indikat f'pazjenti li tilfu d-dawl f'għajn waħda minhabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), indipendentement mill-fatt jekk dan l-episodju kienx marbut jew le ma' użu precedenti ta' inibitur ta' PDE5 (ara sezzjoni 4.4).

It-tehid flimkien ta' inibituri ta' PDE5, inkluż tadalafil, ma' stimulatori ta' guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontra-indikat għax hemm il-possibbiltà li dan iwassal għal ipotensjoni sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Qabel tinbeda l-kura b'Tadalafil Mylan

Wieħed għandu jgħares lejn il-passat mediku u għandu jsir eżami fiżiku biex issir id-dijanjozi ta' disfunzjoni erettili jew ta' iperplazja beninna tal-prostata u biex jiġu identifikati l-fatturi li potenzjalment qed jikkawżawha, qabel ma jiġi kkunsidrat it-trattament farmakoloġiku.

Qabel ma jinbeda kwalunkwe trattament għal disfunzjoni erettili, it-tobba għandhom jikkunsidraw listat kardjovaskulari tal-pazjenti tagħhom, peress illi hemm grad ta' riskju kardijaku assoċjat ma' l-attività sesswali. Tadalafil għandu karatteristiċi vasodilatorji, li jirriżultaw fi tnaqqis ħafif u temporajnu fil-pessjoni tad-demem (ara sezzjoni 5.1) u b'hekk jikkawża l-effett ipotensiv tan-nitrati (ara sezzjoni 4.3).

Qabel ma tinbeda l-kura b'tadalafil għall-iperplazja beninna tal-prostata, il-pazjenti għandhom jiġu eżaminati biex tiġi aċċertata li m'hemm ebda presenja ta' karcinoma tal-prostata u evalwati bir-reqqa għall-kundizzjonijiet kardjovaskulari (ara sezzjoni 4.3).

L-evalwazzjoni tad-disfunzjoni erettili għandha tinkludi d-determinazzjoni tal-kawżi potenzjali sottostanti u l-identifikazzjoni ta' kura xierqa wara eżaminazzjoni medika xierqa. Mhux magħruf jekk tadalafil huwiex effettiv f'pazjenti li għaddew minn kirurgija fil-pelvis jew prostatetomija radikali fejn in-nervituri ma' ġewx salvati.

Kardjovaskulari

Kazijiet kardjovaskulari serji, fosthom infart mijokardijaku, mewt kardijaku għal għarrieda, angina pectoris instabli, aritmija ventrikulari, puplesija, attackki iskemici transitorji, u ġiġi fis-sider,

palpitazzjonijiet u takikardija, ġew irrapportati jew wara t-tqegħid fis-suq u/jew fi provi kliniċi. Hafna mill-pazjenti li kellhom dawn il-każijiet kellhom fatturi ta' riskju kardjovaskulari minn qabel. Madankollu, mhux possibbli li jiġi determinat b'mod definitiv jekk dawn l-effetti mhux relatati direttament ma' dawn il-fatturi ta' riskju, ma' tadalaflil, ma' attività sesswali, jew ma' tahlita ta' dawn il-fatturi jew fatturi oħra.

F'pazjenti li fl-istess hin qegħdin jiehdu prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja fid-demm, tadalaflil jista' jikkawża tnaqqis fil-pressjoni tad-demm. Meta tinbeda l-kura bit-teħid ta' tadalaflil darba kuljum, għandhom jingħataw l-kunsiderazzjonijiet kliniċi xierqa għal possibiltà ta' tibdil fid-doża tatterapija kontra l-pressjoni għolja fid-demm.

F'pazjenti li qed jiehdu alpha 1 blokkers, l-amministrazzjoni konkomitanti ta' tadalaflil jista' jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika f'xi pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Mhux rakkomandat li tadalaflil jingħata flimkien ma' doxazosin.

Vizjoni

Difetti fil-vista u każijiet ta' NAION ġew irrapportati b'konnessjoni mat-teħid ta' tadalaflil u inibituri oħra ta' PDE5. Analizi ta' taġġir osservazzjonali tissuggerixxi zieda fir-riskju ta' NAION akuta f'irġiel b'disfunzjoni erettili wara espożizzjoni għal tadalaflil jew inibituri oħra ta' PDE5. Peress li dan jista' jkun rilevanti għall-pazjenti kollha esposti għal tadalaflil, il-pazjent għandu jingħata parir li f'każ ta' difett fil-vista għal għarrieda, għandu jieqaf jiehdu Tadalaflil Mylan u jikkonsulta tabib minnufih (ara sezzjoni 4.3).

Tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa

Każijiet ta' telf ta' smiġh f'daqqa ġew irrapportati wara l-użu ta' tadalaflil. Għalkemm f'xi każijiet kienu preżenti fatturi ta' riskju oħra (bħall-età, id-dijabete, l-ipertensjoni u passat mediku ta' telf ta' smiġh preċedenti) il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieqfu jiehdu tadalaflil u jfittxu kura medika minnufih f'każ ta' tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa.

Indeboliment renali u epatiku

Minhabba z-zieda fl-espożizzjoni ta' tadalaflil (AUC), esperjenza klinika limitata u l-fatt li t-tneħħija m'hijiex affetwata mid-dijalizi, doża ta' darba kuljum ta' tadalaflil m'hijiex rakkomandata f'pazjenti b'indeboliment renali sever.

Hemm informazzjoni klinika limitata dwar is-sigurtà ta' teħid ta' doża waħda ta' tadalaflil f'pazjenti b'insuffiċjenza severa tal-fwied (Child-Pugh Klassi C). It-teħid ta' doża darba kuljum kemm għallkura tad-disfunzjoni erettili u kemm għall-iperplażja beninna tal-prostata ma ġietx evalwata f'pazjenti b'insuffiċjenza epatika. Jekk Tadalaflil Mylan jinkiteb mit-tabib, għandha ssir stima bir-reqqa talbenefiċċji/ riskji għall-individwu mit-tabib li jippreskrivih.

Prijapiżmu u deformazzjoni anatomika tal-pene

Pazjenti li jkollhom erezzjonijiet li jdumu għal 4 sigħat jew aktar għandhom ikunu avżati li għandhom ifittxu assistenza medika minnufih. Jekk il-prijapiżmu ma jiġix ittrattat minnufih, jistgħu jirriżultaw hsara fit-tessut penili u mpotenza permanenti.

Tadalaflil għandujintuża b'kawtela f'pazjenti b'diformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angolazzjoni, fibrozi kavernożali jew il-marda ta' Peyronie), jew f'pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jistgħu jippre-disponu għal priyapiżmu (bħal sickle cell enemija, majeloma multipla jew lewkimja).

L-użu ma inibituri CYP3A4

Wiehed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal tadalafile lill-pazjenti li qed jużaw inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, ketoconazole, itraconazole, u erythromycin) għaliex kien osservat esponiment akbar għal tadalafile (AUC) meta l-prodotti mediċinali jingħataw flimkien (Ara sezzjoni 4.5).

Tadalafile u trattamenti oħra għal disfunzjoni erettili

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' l-użu flimkien ta' tadalafile u inibituri oħrajn ta' PDE5 jew trattamenti oħra għall-kura tad-disfunzjoni erettili ma għewx studjati. Il-pazjenti iridu jiġu mgħarrfa li m'għandhomx jieħdu Tadalafile Mylan flimkien ma' dawn it-tipi ta' mediċini jew trattamenti.

Kontenut tal-lactose

Tadalafile Mylan fih l-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-galactose, ta' defiċjenza ta' lactase totali jew ta' malassorbiment ta' glucose-galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

Kontenut tas-sodium

Tadalafile Mylan fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Saru studji ta' interazzjoni dwar tadalafile ta' 10 mg u/jew 20 mg, kif indikat hawn taħt. Rigward dawk l-istudji ta' interazzjoni fejn għet użata biss id-doża ta' 10 mg tadalafile, ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox interazzjonijiet klinikament rilevanti li jistgħu isehħu f' dozi oghla.

Effetti ta' sustanzi oħrajn fuq tadalafile

Cytochrome P450 inhibitors

Tadalafile huwa prinċipalment metabolizzat minn CYP3A4. Inibitur selettiv ta' CYP3A4, ketoconazole (200 mg kuljum), zied l-esponiment għal tadalafile (10-mg) (AUC) b'darbtejn u C_{max} bi 15%, relattivament għall-AUC u għal valuri ta' C_{max} għal tadalafile biss. Ketoconazole (400 mg kuljum) zied l-esponiment għal tadalafile (20-mg) (AUC) b'erba darbiet u C_{max} bi 22%. Ritonavir, inibitur ta' lenżima protease (200 mg darbtejn kuljum), li huwa inibitur ta' CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, u CYP2D6, zied l-esponiment għal tadalafile (20-mg) (AUC) b'darbtejn bl-ebda tibdil f' C_{max} . Għalkemm ma għewx studjati interazzjonijiet speċifiċi, inibituri oħra tal-enżima protease, bħal saquinavir, u inibituri oħrajn ta' CYP3A4, bħal erythromycin, clarithromycin, itraconazole u meraq talgrejpfrut għandhom jingħataw flimkien b'kawtela minħabba li huma mistennija li jżidu l-koncentrazzjonijiet ta' tadalafile fil-plażma (ara sezzjoni 4.4). Konsegwentement l-inċidenza tal-effetti avversi elenkati fit-sezzjoni 4.8 tista' tiżdied.

Transporters

Ir-rwol tat-trasportaturi (bħal p-glikoproteina) fid-dispożizzjoni ta' tadalafile mhux magħruf. Għalhekk hemm il-potenzjal ta' interazzjonijiet tal-mediċina minħabba inibizzjoni tat-trasportaturi

Indutturi Cytochrome P450

Rifampicin, induttur ta' CYP3A4, naqqas l-AUC ta' tadalafile bi 88%, relattivament għall-valuri tal-AUC għal tadalafile waħdu (10 mg). Wiehed jista' jistenna li dan it-tnaqqis fl-espożizzjoni jnaqqas leffikaċja ta' tadalafile: kemm ikun kbir dan it-tnaqqis fl-effikaċja m'huwiex magħruf. Indutturi oħrajn ta' CYP3A4 bħall-phenobarbital, phenytoin u carbamazepine, jistgħu wkoll inaqqsu il-koncentrazzjonijiet ta' tadalafile fil-plażma.

Effetti ta' tadalafile fuq prodotti mediċinali oħrajn

Nitrati

Fl-istudji kliniċi, tadalafile (5, 10 u 20 mg) deher li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Għalhekk l-ghoti ta' tadalafile lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta' nitrat organiku huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3). Ibbażat fuq ir-riżultati ta' studju kliniku li fih 150 individwu irċievew doża ta' 20 mg tadalafile kuljum għal 7 ijiem u 0.4 mg nitroglicerina taħt l-ilsien f'ħinijiet diversi, din l-interazzjoni damet aktar minn 24 siegħa u ma dehrax aktar meta għaddew 48 siegħa minn l-aħħar doża ta' tadalafile. Għalhekk, f'pazjent li għalih ġie preskritt xi doża ta' tadalafile (2.5 mg-20 mg), fejn l-ghoti tan-nitrat jitqies medikalment neċessarju f'sitwazzjoni prekarja għall-ħajja, għall-inqas 48 siegħa għandhom jithallew jgħaddu minn l-aħħar doża ta' tadalafile qabel ma jingħataw in-nitrati. F'dawn iċċirkostanzi, in-nitrati għandhom biss jingħataw taħt sorveljanza medika stretta, b'sorveljanza xierqa emodinamika.

Mediċini tal-pressjoni (inkluz calcium channel blockers)

It-teħid flimkien ta' doxazin (4 u 8 mg kuljum) u tadalafile (doża ta' 5 mg kuljum u doża waħda ta' 20 mg) iżid b'mod sinifikanti l-effett ta' tnaqqis fil-pressjoni tad-demem ta' dan l-imblokkatur tar-reċetturi alpha. Dan l-effett idum għallinqas 12-il siegħa u jista' jkun sintomatiku u jinkludi s-sinkope. Għalhekk din il-kombinazzjoni m'hijiex irrakkomandata (ara sezzjoni 4.4). F'studji ta' interazzjoni magħmula fuq numru limitat ta' volontiera b'saħħithom, dawn l-effetti ma ġewx irrapporati b'alfuzosin u tamsulozin. Madankollu għandha tittiehed l-kawtela meta tadalafile jintuza f'pazjenti li qegħdin jiġu kkurati b'xi imblokkatur tar-reċetturi alpha u speċjalment fl-anzjani. It-trattamenti għandhom jinbdew b'dożaġġ minimu u bil-mod il-mod jiġu aġġustati.

Fi studji ta' farmakoloġija klinika, ġie eżaminat il-potenzjal biex tadalafile iżid l-effetti ipotensivi ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pressjoni għolja. Klassijiet ewlenin ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pressjoni għolja kienu studjati, inkluzi l-calcium channel blockers (amlodipine), inibituri ta' l-enzimi li jbiddu l-angiotensin (ACE) (enalapril), dawk li jimblukkaw ir-riċetturi betaadrenerġiċi (metoprolol), id-djuretiċi ta' t-tip thiazide (bendrofluazide), u dawk li jimblukkaw irriċetturi ta' l-angiotensin II (tipi u doži varji, waħedhom jew flimkien ma' thiazides, dawk li jimblukkaw il-passaġġi tal-kalcjum, blokkaturi-beta, u/jew blokkaturi-alpha). Tadalafile (10 mg ħlief fi studji b'imblokkatur tar-reċetturi angiotensin II u amlodipine fejn intużat doża ta' 20 mg) ma kellu lebdha interazzjoni klinikalment sinifikanti ma' l-ebda waħda minn dawn il-klassijiet. Fi studju ieħor ta' farmakoloġija klinika, kien studjat tadalafile (20 mg) flimkien ma' sa 4kl assijiet ta' mediċini li jintużaw kontra l-pressjoni għolja. F'pazjenti li jiehdu mediċini multipli kontra l-pressjoni għolja, ittibdilit ambulatorji fil-pressjoni tad-demem deher li kienu relatati mal-grad ta' kontroll tal-pressjoni tad-demem. F'dan ir-rigward, l-individwi ta' l-istudju li l-pressjoni tad-demem tagħhom kienet ikkontrollata tajjeb, it-tnaqqis kien minimu u simili għal dak ta' individwi b'saħħithom. Fl-individwi ta' l-istudju li l-pressjoni tad-demem tagħhom ma kienx ikkontrollat, it-tnaqqis kien akbar minkejja li dan it-tnaqqis ma kienx assoċjat mas-sintomi ta' pressjoni baxxa fil-maġġoranza tal-individwi. F'pazjenti li jirċievu prodotti mediċinali għall-pressjoni għolja flimkien ma' tadalafile 20 mg, dan jista' jinduċi tnaqqis fil-pressjoni tad-demem, li (bl-eċċezzjoni ta' imblokkatur tar-riċetturi alpha – ara hawn fuq-) huwa ġeneralment ħafif u x'aktarx ma jkunx klinikament rilevanti. L-analiżi ta' informazzjoni tal-prova klinika tal-fażi 3 ma wriet l-ebda differenza fl-avvenimenti avversi f'pazjenti li jiehdu tadalafile waħdu jew flimkien ma' prodotti mediċinali għall-pressjoni għolja. Madankollu, għandu jingħataw parir kliniku xieraq lil pazjenti rigward il-possibilita' ta' tnaqqis fil-pressjoni tad-demem meta jkunu qed jiehdu prodotti mediċinali għal kontra l-pressjoni għolja.

Riociguat

Studji qabel l-użu kliniku wrew zieda fl-effett li titbaxxa l-pressjoni sistemika tad-demem meta inibituri ta' PDE5 intużaw flimkien ma' riociguat. Fi studji kliniċi, ġie muri li riociguat jżid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta' PDE5. Fil-popolazzjoni taħt studju ma kien hemm ebda evidenza li dan it-teħid flimkien kellu xi effett kliniku favorevoli. It-teħid fl-istess ħin ta' riociguat ma' inibituri ta' PDE5, inkluz tadalafile, huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Inibituri ta' 5-alpha reductase

Ma giet identifikata ebda reazzjoni avversa ġdida f' studju kliniku fejn tadalafil 5 mg mogħti flimkien ma' finasteride 5 mg ġie mqabbel ma' placebo flimkien ma' finasteride 5 mg għas-solliev mis-sintomi ta' BPH. Madankollu peress li ma sarx studju formali ta' interazzjoni bejn mediċina u oħra li jevalwa l-effetti ta' tadalafil u l-inibituri ta' 5-alpha reductase (5-ARIs), wiehed għandu joqgħod attent meta tadalafil jingħata flimkien ma' 5-ARIs.

Substrati CYP1A2 (e.g. theophylline)

Meta tadalafil 10 mg ingħata ma' theophylline (inibitur mhux selettiv tal-phosphodiesterase) fi studju ta' farmakoloġija klinika, ma kienx hemm interazzjoni farmakokinetika. L-uniku effett farmakodinamiku kien żieda żgħira (3.5bp m) fir-rata tat-tahbit tal-qalb. Minkejja li dan l-effett huwa effett minimu u ma kienx ta' sinifikat kliniku f'dan l-istudju, għandu jitqies meta dawn il-prodotti mediċinali jingħataw flimkien.

Ethinylestradiol u terbutaline

Intwera li tadalafil iżid il-bijodisponibilità orali ta' ethinylestradiol; żieda simili tista' tkun mistennija bit-teħid orali ta' terbutaline, għalkemm il-konsegwenza klinika ta' din mhix ċerta.

Alkoħol

Koncentrazzjonijiet ta' l-alkoħol (medja massima tal-koncentrazzjoni fid-demm 0.08%) ma kinux affettwati mit-teħid ta' tadalafil magħhom (10 mg jew 20 mg). Minbarra dan, l-ebda tibdil filkoncentrazzjonijiet ta' tadalafil ma deherx 3 sigħat wara t-teħid ma' l-alkoħol. L-alkoħol ingħata b'mod li r-rata ta' l-assorbiment ta' l-alkoħol tkun massima (sajjem tul il-lejl bl-ebda ikel sa sagħtejn wara li tteħed l-alkoħol).

Tadalafil (20 mg) ma żiedx il-medja tat-tnaqqs ta' pressjoni tad-demm prodotta mill-alkoħol (0.7 g/kg jew madwar 180 ml ta' 40% alkoħol [vodka] f'irġiel ta' 80 kg) iżda f'xi individwi, kienu osservati sturdament dovut għat-tibdil fil-pożizzjoni tal-persuna u pressjoni baxxa ortostatika. Meta tadalafil ingħata ma' doži aktar baxxi ta' l-alkoħol (0.6 g/kg), ma deherx li kien hemm pressjoni baxxa u l-isturdament seħħ bi frekwenza simili għal meta tteħed l-alkoħol waħdu. L-effett ta' l-alkoħol fuq il-funzjoni konjittiva ma żdiedx bit-tadalafil (10 mg).

Prodotti mediċinali metabolizzati b' Cytochrome P450

Tadalafil mhux mistenni li b'mod klinikament sinifikanti jinibixxi jew jinduċi it-tneħħija ta' prodotti mediċinali metabolizzati minn iżoformi ta' CYP450. Xi studji kkonfermaw li tadalafil ma jinibixxi jew ma jstimulax iżoformi ta' CYP450, ikluži CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 u CYP2C19.

Substrati CYP2C9 (e.ż. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg 20 mg) ma kellu l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq l-espożizzjoni (AUC) għal S-warfarin jew R-warfarin (substrat ta' CYP2C9), u tadalafil lanqas ma affettwa tibdil fil-hin talprotrombin indott mill-warfarin.

Aspirin

Tadalafil (10 u 20 mg) ma żiedx iż-żieda fil-hin ta' fsada ikkawżata minn acetyl salicylic acid.

Prodotti mediċinali antidijabetiċi

Ma sarux studji ta' interazzjonijiet speċifiċi ma' mediċini antidijabetiċi.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tadalafil Mylan m'huwiex indikat għall-użu minn nisa.

Tqala

It-tagħrif huwa limitat għall-użu ta' tadalafil fin-nisa tqal. Studji f'animali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta' l-embriju/fetu, fuq il-ħlas jew fuq l-iżvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Bħala prekawzjoni hu preferribli li ma jintuzax Tadalafil Mylan waqt it-tqala.

Treddigh

Tagħrif disponibbli farmakodinamiku/tossikoloġiku magħmul fil-bhejjem wera li tadalafil huwa preżenti fil-ħalib. Ma jistax jiġi eskluż xi riskju għat-tarbija li qiegħda tiġi mreddgħa. Tadalafil Mylan m'għandux jintuża waqt it-treddigh.

Fertilità

Kien hemm xi effetti li deheru fil-klieb li jistgħu jindikaw xi ħsara fil-fertilità. Żewġ studji kliniċi sussegwenti jissuggerixxu li dan l-effett mhuwiex probabbli fil-bnedmin, għalkemm ġie nnutat tnaqqis fil-koncentrazzjoni ta' sperma f'xi rġiel (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Tadalafil għandu effett żgħir fuq il-hila biex issuq u thaddem magni. Minkejja li l-frekwenza ta' sturdament fir-rapporti fl-ambitu ta' placebo u tadalafil fi provi kliniċi kienet simili, il-pazjenti għandhom ikunu konxji dwar kif jirreaġixxu għal tadalafil qabel ma jsuqu jew jużaw l-magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta' sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni li ġew irrapportati f'pazjenti li qed jieħdu tadalafil għall-kura taddisfunzjoni erettili jew għall-iperplażja beninna tal-prostata kienu uġiġħ ta' ras, dispepsja, uġiġħ fiddahar u majalġja, fejn l-inċidenza tagħhom tiżdied hekk kif tiżdied id-doża ta' tadalafil. Irreazzjonijiet avversi li ġew irrapportati kienu temporanji u hafna drabi ħfief jew moderati. Il-parti lkbira tal-uġiġħ ta' ras irrapportati b'tadalafil b'dożaġġ ta' darba kuljum jinħassu fl-ewwel 10 sa 30 gurnata minn meta tibda l-kura.

Sommarju f'forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella hawn taħt tniżżel ir-reazzjonijiet avversi osservati minn rapurtaġġ spontanju u minn studji kliniċi kkontrollati bil-placebo (b'total ta' 8022 pazjent fuq tadalafil u 4422 pazjent fuq placebo) għall-kura tad-disfunzjoni erettili kemm meta tadalafil jittiehed meta jkun hemm il-bżonn u kemm f'dożaġġ ta' darba kuljum u għall-iperplażja beninna tal-prostata f'dożaġġ ta' darba kuljum.

Frekwenza: komuni ħafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), Rari ħafna ($< 1/10,000$) u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli)

Komuni ħafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fis-sistema immuni</i>			
		Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva	Angjoedema ²

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>			
	Uġiġh ta' ras	Sturdament	Puplesija ¹ (li tinkludi avvenimenti emorraġiċi), Sinkope, Attakki iskemiċi temporanji ¹ , Emigranja ² , Aċċessjonijiet ² , Amnesija temporanja
<i>Disturbi fl-ġhajnejn</i>			
		Vista m'cajpra, Sensazzjonijiet deskritti bħala wġiġh fl-ġhajnejn	Difett fil-kamp viżiv, Nefha ta' tebqet il-ġhajn, Iperemija tal-konguntiva, Newropatija ottika iskemika anterjuri mhux arteritika (NAION) ² , Okklużjoni vaskulari tar-retina ²
<i>Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika</i>			
		Żanzin fil-widnejn	Telf għal għarrieda tas-smiġh
<i>Disturbi fil-qalb¹</i>			
		Takikardija, Palpitazzjonijiet	Infart mijokardijaku, Anġina pectoris instabbli ² , Arritmija ventrikulari ²
<i>Disturbi vaskulari</i>			
	Fwawar	Pressjoni baxxa ³ , Pressjoni għolja	
<i>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali</i>			
	Kongestjoni nażali	Qtuġh ta' nifs, Epistassi	
<i>Disturbi gastrointestinali</i>			
	Dispepsija	Uġiġh addominali, Rimettar, Dardir, Rifluss gastroesofagali	

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda</i>			
		Raxx	Urtikarja, Sindrome ta' Stevens-Johnson ² , Dermatite bil-qxur ² , Iperidroži (għaraq)
<i>Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi</i>			
	Uġiġh fid-dahar, Mijalġja, Uġiġh fl-estremittajiet		
<i>Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarka</i>			
		Ematurija	
<i>Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider</i>			
		erezzjonijiet li jdumu żmien twil	Prijapiżmu, Emorragija tal-pene, Ematospermija
<i>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>			
		Uġiġh fis-sider ¹ , Edema periferali, Għeja	Edema tal-wiċċ ² , Mewt kardijaka għal għarrieda ^{1,2}

(1) Il-parti l-kbira tal-pazjenti kellhom fatturi ta' riskju kardjovaskulari li kienu jeżistu minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

(2) Reazzjonijiet avversi rrapportati waqt is-sorveljanza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq li ma kinux osservati f'studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo.

(3) Irrapportat bi frekwenza akbar meta tadalafil ġie mogħti lill-pazjenti li kienu diġa qed jieħdu prodotti mediċinali kontra l-pessjoni.

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi partikulari

Ġiet irrappurtata incidenza ftit iżjed oġħla ta' anormalitajiet fl-ECG, l-iżjed bradikardija sinusojde, f'pazjenti kkurati b'tadalafil darba kuljum meta mqabbel ma' plaċebo. Il-parti l-kbira ta' dawn l-anormalitajiet fl-ECG ma kienux assoċjati ma' reazzjonijiet avversi.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Id-dejta hija limitata għal pazjenti 'l fuq minn 65 sena li qed jirċievi tadalafil f'studji kliniċi jew għallkura tad-disfunzjoni erettili jew għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata. Fi provi kliniċi b'tadalafil meħud fil-pront għall-kura ta' disfunzjoni erettili, id-dijarea ġiet irrappurtata b'mod aktar frekwenti f'pazjenti li kellhom aktar minn 65 sena. F'studji kliniċi b'tadalafil 5 mg meħud darba kuljum għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata, l-isturdament u ddijarea ġew irrappurtati b'mod aktar frekwenti f'pazjenti 'l fuq minn 75 sena.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżzla f'[Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Doži singli sa 500 mg ngħataw lill-individwi b'saħħithom, u doži multipli sa 100 mg kuljum ingħataw lill-pazjenti. L-avvenimenti avversi kienu simili għal dawk li dehru b'f' doži aktar baxxi. F'każijiet ta' doži eċċessivi, il-miżuri supportivi indikati għandhom jittieħdu skond il-ħtieġa. L-emodjalisi tikkontribwixxi fit-tneħħija ta' tadafafil b'mod negliġibbli.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini uroloġiċi, Mediċini użati għad-disfunzjoni erettile, Kodiċi ATC: G04BE08.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Tadafafil huwa inibitur riversibbli, selettiv ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP) speċifikament phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Meta l-istimolu sesswali jikkawża ħruġ lokali ta' nitric oxide, linibizzjoni ta' PDE5 permezz ta' tadafafil tipproduċi livelli oġġla ta' cGMP fil-corpus cavernosum. Dan jirriżulta f'rilassament tal-muskoli involontarji u mogħdija ta' demm fit-tessut tal-pene, u b'hekk jipproduċi erezzjoni. Fil-kura tad-disfunzjoni erettile, Tadafafil m'għandu l-ebda effett jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali.

L-effett tal-inibizzjoni ta' PDE5 fuq il-konċentrazzjoni ta' cGMP fil-corpus cavernosum jidher ukoll fil-muskolu involontarju tal-prostata, tal-bużżieqa tal-awrina u fil-forniment vaskulari tagħhom. Irrilassament vaskulari li jirriżulta minn din l-inibizzjoni żżid il-perfużjoni tad-demm li tista' tkun ilmekkaniżmu li biha s-sintomi tal-iperplażja beninna tal-prostata jitnaqqsu. Ma' dawn l-effetti vaskulari jista' jżjed ukoll l-inibizzjoni tal-attività tan-nervituri afferenti tal-bużżieqa tal-awrina u rrilassament tal-muskolu involontarju tal-prostata u tal-bużżieqa tal-awrina.

Effetti farmakodinamiċi

Studji *in vitro* wrew li tadafafil huwa inibitur selettiv ta' PDE5. PDE5 hija enzima li tinsab fil-muskoli involontarji tal-corpus cavernosum, fil-muskoli involontarji vaskolari u vixxerali, fil-muskoli skeletali, plejtlits, fil-kliewi, fil-pulmuni u fiċ-ċervellett. L-effett ta' tadafafil huwa aktar qawwi fuq PDE5 milli fuq phosphodiesterases oħrajn. Tadafafil huwa >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE1, PDE2 u PDE4, li huma enzimi li jinsabu fil-qalb, fil-moħħ, fil-vini u l-arterji, fil-fwied u f'organi oħra. Tadafafil huwa >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE3, li hija enzima li tinsab fil-qalb u fil-vini u l-arterji.

Din is-selettività għal PDE5 fuq il-PDE3 hija importanti għaliex PDE3 hija enzima li hija involuta fil-kontrattilità kardijaka. Minbarra dan, tadafafil huwa madwar 700 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE6, li hija enzima li tinsab fir-retina u li hija responsabbli għall-fototransduzzjoni. Tadafafil huwa wkoll >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE7 permezz ta' PDE10.

Effikaċja klinika u sigurtà

Tadafafil li ngħata lill-individwi b'saħħithom, meta mqabbel ma' placebo, ma pproduċa l-ebda differenza sinifikanti fil-pressjoni sistolika u diastolika meħuda meta l-individwu kien mimdud fuq dahru (medja massima ta' tnaqqis ta' 1.6/0.8 mm Hg, rispettivament), fil-pressjoni sistolika u diastolika meħuda meta l-individwu kien bilwieqfa (medja massima ta' tnaqqis ta' 0.2/4.6 mm Hg, rispettivament), u l-ebda tibdil sinifikanti fir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Fi studju li sar biex ikunu ttestjati l-effetti ta' tadalafil fuq il-viżjoni, fejn intuża t-test Farnsworth-Munsell ta' 100-lewn, ma deherx li kien hemm problemi biex jintgħarfu l-kuluri (blu/aħdar). Din issejba hija konsistenti ma' l-affinita' baxxa ta' tadalafil għal PDE6 meta mqabbel ma' PDE5. Fl-istudji kliniċi kollha, ir-rapporti tat-tibdil fil-viżjoni tal-kulur kienu rari (<0 .1%).

Saru tliet studji fl-irġiel biex ikun stmat l-effett potenzjali fuq l-ispermatogenezi ta' tadalafil 10 mg (studju wieħed ta' 6 xhur) u 20 mg (studju wieħed ta' 6 xhur u studju wieħed ta' 9 xhur) mogħtija kuljum. F'tnejn minn dawn l-istudji ġew osservati tnaqqis fl-għadd u fil-koncentrazzjoni ta' sperma relatati ma' kura b'tadalafil ta' relevanza klinika improbabbli. Dawn l-effetti ma ġewx assoċjati ma' tibdil fil-parametri l-oħra bħal motilità, morfologija u FSH.

Disfunzjoni erettile

Għal tadalafil li jittiehed meta jkun hemm il-bżonn, saru tliet studji kliniċi fuq 1054 pazjent f'ambjent tad-dar biex ikun definit iż-żmien ta' rispons. Tadalafil wera titjib statistikament sinifikanti filfunzjoni erettile u fl-abilita' li jkun hemm kopulazzjoni sesswali b'suċċess sa 36 siegħa wara li tittiehed id-doża, kif ukoll fl-abilita' tal-pazjenti li jkollhom u jzommu erezzjoni għal kopulazzjoni b'suċċess meta mqabbel ma' placebo wara 16 minuta mit-tehid tad-doża.

Fi studju li dam 12-il ġimgħa u li ġie magħmul f'186 pazjent (142 tadalafil, 44pl aċebo) b'disfunzjoni erettile kawża ta' trauma tan-nerv li jgħaddi minn ġos-sinsla, tadalafil b'mod sinifikanti tejjeb ilfunzjoni erettile li wassal għal medja f'kull pazjent ta' proporzjon ta' tentattivi ta' suċċess f'dawk ikkurati b'tadalafil 10 mg jew 20 mg (doża flessibbli, meta jkun hemm il-bżonn) ta' 48% meta mqabbel ma' 17% bi placebo.

Għall-evalwazzjoni ta' dożagġ ta' darba kuljum b'tadalafil f'dozi ta' 2.5, 5, u 10 mg għall-ewwel kienu saru 3 studji kliniċi li fihom ħadu sehem 853 pazjent, ta' etajiet (margni ta' 21-82 sena) u razez differenti, b'disfunzjoni erettile li kellhom gradi ta' severità (ħafif, moderat, gravi) u etjologiji varji. Fiz-żewġ studji primarji ta' effikaċja fuq popolazzjonijiet ġenerali, il-proporzjon ta' tentattivi ta' kopulazzjoni b'suċċess għal kull pazjent kienu medja ta' 57 u 67% għal dawk fuq tadalafil 5 mg, 50% għal dawk fuq tadalafil 2.5 mg meta mqabbla ma' 31 u 37% li ħadu placebo. Fl-istudju f'pazjenti li kellhom disfunzjoni erettile sekondarja għad-dijabete, il-proporzjon ta' tentattivi ta' suċċess għal kull pazjent kienu medja ta' 41 u 46% għal dawk fuq tadalafil 5 mg u 2.5 mg rispettivament, meta mqabbel ma' 28% li ħadu placebo. Il-parti l-kbira tal-pazjenti f'dawn it-tliet studji kienu rrispondew qabel għall-kura bl-inibituri PDE5 fejn id-doża kienet tittiehed biss meta jkun hemm it-talba. F'studju li sar wara, 217-il pazjent li qatt ma kienu ħadu inibituri ta' PDE5 ġew magħżula b'mod arbitrarju biex jieħdu tadalafil 5 mg jew placebo. Il-proporzjon ta' tentattivi ta' kopulazzjoni sesswali b'suċċess għal kull pazjent kien medja ta' 68% għall-pazjenti fuq tadalafil meta mqabbel ma' 52% għall-pazjenti fuq placebo.

Iperplażja beninna tal-prostata

Tadalafil ġie studjat f'4 studji kliniċi li damu 12-il ġimgħa u li fihom ħadu sehem 'il fuq minn 1500 pazjent b'sinjali u sintomi ta' iperplażja beninna tal-prostata. It-titjib fil-total tal-puntegġ internazzjonali għas-sintomi tal-prostata b'tadalafil 5 mg fl-erba' studji kienu -4.8, -5.6 u -6.3 meta mqabbel ma' -2.2, -3.6, -3.8 u -4.2 bi placebo. It-titjib fit-total tal-puntegġ internazzjonali għas-sintomi tal-prostata deher kmieni mill-1 ġimgħa. F'wieħed mill-istudji, li kien jinkludi wkoll lil tamsulosin 0.4 mg bħala komparatur attiv, it-titjib fit-total tal-puntegġ internazzjonali għas-sintomi tal-prostata b'tadalafil 5 mg, tamsulosin u placebo kienu ta' -6.3, -5.7 u -4.2 rispettivament.

Wieħed minn dawn l-istudji evalwa t-titjib fid-disfunzjoni erettile u s-sinjali u s-sintomi tal-iperplażja beninna tal-prostata f'pazjenti li kellhom iż-żewġ kundizzjonijiet. It-titjib fil-kamp tal-funzjoni erettile tal-indiċi internazzjonali tal-funzjoni erettile u t-total tal-puntegġ internazzjonali għas-sintomi tal-24 prostata f'dan l-istudju kienu ta' 6.5 u -6.1 b'tadalafil 5 mg meta mqabbel ma' 1.8 u -3.8 bi placebo, rispettivament. Il-proporzjon ta' tentattivi ta' kopulazzjoni sesswali b'suċċess għal kull pazjent kien medja ta' 71.9% għall-pazjenti b'tadalafil 5 mg meta mqabbel ma' 48.3% għall-pazjenti fuq placebo. Il-manteniment tal-effett kien evalwat f'estensjoni open label ta' wieħed mill-istudji li wera li t-titjib

fit-total tal-punteġġ internazzjonali għas-sintomi tal-prostata li deher fit-12-il ġimgha kien mantnut sa sena addizzjonali ta' kura b'tadalafil 5 mg.

Popolazzjoni pedjatrika

Sar studju wieħed f'pazjenti pedjatriki b'Distrofija Muskolari ta' Duchenne (DMD – *Duchenne Muscular Dystrophy*) fejn ma ntweriet ebda evidenza ta' effikaċja. L-istudju ta'adalafil, bi 3 ferġat, parallel, magħmul b'mod arbitrarju, *double-blind* u kkontrollat bi placebo sar f'331 tifel b'etajiet minn 7-14-il sena b'DMD li fl-istess hin kienu qed jirċievu t-terapija bil-kortikosteroidi. L-istudju kien jinkludi perijodu *double-blind* ta' 48 ġimgha fejn il-pazjenti, b'mod arbitrarju, ngħataw kuljum *tadalafil* 0.3 mg/kg, *tadalafil* 0.6 mg/kg, jew placebo. *Tadalafil* ma weriex effikaċja biex inaqqas it-tnaqqis fil-mixi kif imkejjeġ permezz tal-punt finali primarju tad-distanza li wieħed jimxi f'6 minuti (6MWD – *6 minute walk distance*): il-bidla medja fl-inqas numru ta' kwadrati (LS – *least squares*) f'6MWD fit-48 ġimgha kien -51.0 metri (m) fil-grupp tal-placebo, meta mqabbel ma' -64.7 m fil-grupp ta' *tadalafil* 0.3 mg/kg ($p = 0.307$) u -59.1 m fil-grupp ta' *tadalafil* 0.6 mg/kg ($p = 0.538$). Barra minn hekk, ma kien hemm ebda evidenza ta' effikaċja minn ebda waħda mill-analiżi sekondarji li saru f'dan l-istudju. Ir-riżultati totali ta' sigurtà kienu fil-parti l-kbira konsistenti mal-profil ta' sigurtà magħruf ta' *tadalafil* u bl-avvenimenti avversi (AEs, adverse events) mistennija f'popolazzjoni pedjatrika b'DMD li qieghda tirċievi l-kortikosteroidi.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu pprezentati r-riżultati tal-istudji f'kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta' disfunzjoni erettile. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Tadalafil jiġi assorbit malajr jittiehed mill-ħalq u l-medja massima osservata ta' konċentrazzjoni fil-plażma (C_{max}) tintlaħaq f'ħin medju ta' sagħtejn wara li tittiehed id-doża. Il-biodisponibilità assoluta ta' *tadalafil* wara doża orali ma gietx determinata. Ir-rata u l-grad ta' l-assorbiment ta' *tadalafil* mhumiex influwenzati bl-ikel, għalhekk *Tadalafil* jista' jittiehed ma' l-ikel jew fuq stonku vojta. Il-ħin tad-doża (filgħodu versu filgħaxija) ma kellu l-ebda effetti klinikament rilevanti fuq ir-rata u l-grad ta' l-assorbiment.

Distribuzzjoni

Il-volum medju tad-distribuzzjoni huwa madwar 63l, li jindika li *tadalafil* jiġi distribwit fit-tessuti. F'konċentrazzjonijiet terapewtiċi, 94% ta' *tadalafil* fil-plażma jkun marbut mal-proteini. L-irbit mal-proteini mhuwiex effettwat mill-funzjoni tal-kliewi.

Inqas minn 0.0005% tad-doża mogħtija dehret fis-semen ta' individwi b'saħħithom.

Bijotrasformazzjoni

Tadalafil huwa prinċipalment metabolizzat permezz ta' l-iżoforma ċitokromju P450 (CYP) 3A4. Il-metabolu prinċipali ċirkolanti huwa methylcatechol glucuronide. Dan il-metabolu huwa mill-inqas 13,000-il darba inqas qawwi minn *tadalafil* għal PDE5. Konsegwentement, mhuwiex mistenni li jkun klinikament attiv fil-konċentrazzjonijiet osservati tal-metabolu.

Eliminazzjoni

It-tneħħija medja orali ta' *tadalafil* hija 2.51 /siegħa u l-half-life medja hija ta' 17.5 sigħat f'individwi b'saħħithom.

Tadalafil jitneħħa prinċipalment bħala metaboli mhux attivi, l-aktar fl-ippurgar (madwar 61% taddoża) u b'ammont inqas fl-awrina (madwar 36% tad-doża).

Linearità/nuqqas ta' linearità

Il-farmakokinetiċi ta' tadalafile f'individwi b'saħħithom huma lineari fir-rigward tal-ħin u tad-doża. Fi skala ta' doża minn 2.5 sa 20 mg, l-esponiment (AUC) jiżdied b'mod proporzjonali għad-doża. Livelli kostanti fil-plażma jinlaħqu fi żmien 5 ijiem mit-teħid ta' doża ta' darba kuljum.

Il-farmakokinetiċi determinati f'popolazzjoni magħżula b'pazjenti b'disfunzjoni erettili huma simili għall-farmakokinetiċi f'individwi mingħajr disfunzjoni erettili.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Anzjani b'saħħithom (65 sena jew akbar) kellhom tneħħija aktar baxxa ta' tadalafile meħud oralment, li rriżulta f'25% aktar esponiment (AUC) meta mqabbel ma' individwi b'saħħithom ta' eta' minn 19 sa 45 sena. Dan l-effett ta' l-eta mhuwiex klinikament sinifikanti u ma jeħtieġx tibdil fid-doża.

Insuffiċjenza renali

Fl-istudji tal-farmakoloġija klinika fejn intużat doża waħda ta' tadalafile (5 sa 20 mg), l-esponiment għal tadalafile (AUC) kien madwar id-doppju f'individwi b'indeboliment hafif fil-kliewi (tneħħija talkrejinina 51 sa 80 ml/min) jew moderat (tneħħija tal-krejinina 31 sa 50 ml/min) u f'individwi fuq id-dijalizi bi stat terminali tal-funzjoni tal-kliewi. Fil-pazjenti fuq l-emođjalizi, C_{max} kien 41% oġħla minn dak osservat f'individwi b'saħħithom. L-emođjalizi tikkontribwixxi ftit li xejn għat-tneħħija tattadalafile.

Insuffiċjenza epatika

L-esponiment għal tadalafile (AUC) f'individwi b'insuffiċjenza hafifa u moderata tal-fwied (Child-Pugh Klassi A u B) huwa komparabbli ma' l-espożizzjoni f'individwi b'saħħithom meta tingħata doża ta' 10 mg. L-informazzjoni klinika dwar is-sigurtà ta' tadalafile f'pazjenti b'insuffiċjenza epatika gravi (Child-Pugh Klassi C) hija limitata. M'hemm l-ebda taġħrif disponibbli dwar l-għoti ta' doża ta' tadalafile darba kuljum lill-pazjenti b'indeboliment epatiku. Jekk tabib jippreskrivi tadalafile b'doża ta' darba kuljum għandha ssir evalwazzjoni b'attenzjoni fuq bażi individwali tal-benefiċċji/riskji mit-tabib li jkun għamel ir-riċetta.

Pazjenti bid-dijabete

L-esponiment għal tadalafile (AUC) f'individwi bid-dijabete kien madwar 19% inqas mill-valur ta' AUC f'individwi b'saħħithom. Din id-differenza fl-espożizzjoni ma teħtieġx tibdil fid-doża.

5.3 Taġħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Taġħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn doži ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin Ma kien hemm ebda evidenza ta' teratoġenicità jew ta' effett tossiku fuq l-embriju jew il-fetu f'firien jew ġrieden li rċevew sa 1000 mg/kg/jum tadalafile. Fi studju ta' l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid tal-firien, id-doża li fiha ma ġie osservat l-ebda effett kienet ta' 30 mg/kg/jum. F'fara tqila, l-AUC għal medicina ħielsa kkalkulata f'din id-doża kienet madwar 18-il darba akbar minn l-AUC fil-bniedem f'doża ta' 20 mg.

Ma kien hemm l-ebda ħsara fil-fertilità tal-firien maskili u femminili. Fi klieb li ngħataw tadalafile kuljum għal 6 sa 12-il xahar f'doži ta' 25 mg/kg/jum (li jirriżulta f'esponiment mill-inqas 3 darbiet akbar [skala 3.7 – 18.6] milli jidher fil-bnedmin li ngħataw doża waħda ta' 20 mg) u aktar, kien hemm rigressjoni tal-epitelju tubulari seminiferu li rriżulta fi tnaqqis tal-ispermatogenezi f'xi klieb. Ara wkoll sezzjoni 5.1

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Lactose, anhydrous
Poloxamer 188
Cellulose, microcrystalline (pH101)
Povidone (K-25)
Croscarmellose sodium
Magnesium stearate
Sodium laurilsulfate
Silica, colloidal anhydrous

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate
Hypromellose (E464)
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide isfar (E172)
Triacetin

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet Snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folji tal-Alu PVC/PE/PVdC.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 14, 28, 30, 56, 84 u 98 pillola.
Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal ta' prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/961/012
EU/1/14/961/013
EU/1/14/961/014
EU/1/14/961/015
EU/1/14/961/016
EU/1/14/961/017

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Novembru 2014
Data tal-aħhar tiġdid: 31 Lulju 2019

10. DATA TA' REVIZJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita
Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita

Kull pillola fiha 10 mg tadalafil.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola miksija b'rita fiha 118.96 mg ta' lactose.

Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita

Kull pillola fiha 20 mg tadalafil.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola miksija b'rita fiha 237.92 mg ta' lactose.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b'rita. (pillola).

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita

Pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa (8.1 ± 0.3 mm), imnaqqxa b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL3' fuq in-naħa l-oħra.

Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita

Pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa (10.7 ± 0.3 mm), imnaqqxa b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL4' fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta' disfunzjoni erettili fl-irġiel adulti.

Sabiex tadalafil ikun effettiv, huwa meħtieġ stimolu sesswali.

Tadalafil Mylan m'huwiex indikat għall-użu min-nisa.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Požoloġija

Irgiel adulti

Is-soltu, id-doża rakkmandata hija ta' 10 mg meħuda qabel attivita' sesswali prevista u ma' l-ikel jew fuq stonku vojta. F'dawk il-pazjenti li ma jkollhomx effett adegwat b'10mg ta' tadalafil, tista' tiġi ppruvata doża ta' 20 mg. Tista' tittiehed għall-inqas 30 minuta qabel l-attivita' sesswali.

Il-frekwenza ta' l-ogħla doża hija ta' darba kuljum.

Tadalafil 10 u 20 mg huwa intenzjonat għall-użu qabel attività sesswali prevista u mhux irrakkomandat għall-użu kontinwu ta' kuljum.

F'pazjenti li jaħsbu li se jkollhom użu frekwenti ta' tadalafil (jiġifieri, għallinqas darbtejn fil-ġimgħa) jista' jiġi kkunsidrat dożaġġ ta' darba kuljum bl-inqas dozi ta' tadalafil, skond l-għażla tal-pazjent u l-għudizzju tat-tabib.

F'dawn il-pazjenti, id-doża rakkomandata hija ta' 5 mg meħuda darba kuljum u bejn wieħed u ieħor għandha dejjem tittiehed fl-istess hin tal-ġurnata. Id-doża tista' titnaqqas għal 2.5 mg darba kuljum skond it-tollerabilità individwali.

Kemm hu xieraq l-użu kontinwu ta' skeda ta' dożaġġ ta' kuljum għandu jiġi vvalutat kull tant żmien.

Popolazzjonijiet speċjali

Irgiel anzjani

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti anzjani.

Irgiel b'indeboliment tal-kliwi

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti b'indeboliment renali ħafif jew moderat. Għall-pazjenti b'indeboliment renali sever 10 mg hija d-doża massima rakkomandata. Dożaġġ ta' darba kuljum ta' tadalafil m'huwiex rakkomandat f'pazjenti b'indeboliment renali sever (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Irgiel b'indeboliment tal-fwied

Id-doża rakkmandata ta' tadalafil hija ta' 10 mg meħuda qabel attivita' sesswali prevista u mingħajr rigward għall-ikel. Tagħrif kliniku dwar is-sigurtà ta' tadalafil f'pazjenti b'indeboliment epatiku sever (Child Pugh Klassi C) huwa limitat; għalhekk jekk jiġi miktub mit-tabib, dan għandu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju għal kull pazjent. M'hemm ebda tagħrif disponibbli dwar it-tehid ta' dozi ta' tadalafil oghla minn 10 mg f'pazjenti b'indeboliment epatiku. Dożaġġ ta' darba kuljum ma ġiex evalwat f'pazjenti b'indeboliment epatiku; għalhekk jekk jiġi miktub mit-tabib, dan għandu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju għal kull pazjent. (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Irgiel bid-dijabete

Mhux meħtieġ tibdil tad-doża f'pazjenti dijabetiċi.

Popolazzjoni pedjatrika

M'hemmx indikazzjoni rilevanti ta' tadalafil fil-popolazzjoni pedjatrika b'referenza għall-kura ta' disfunzjoni erettile

Metodu ta' kif għandu jingħata

Tadalafil Mylan 10mg u 20mg pilloli miksija b'rita ma jistgħux jinqasmu u għandhom jinbelgħu sħaħ.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Fi studji kliniċi, tadalafil intwera li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Dan huwa maħsub li jirriżulta mill-effetti kkombinati ta' nitrati u tadalafil fir-rotta ta' nitric oxide/cGMP. Għalhekk l-għoti ta' tadalafil lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta' nitrat organiku huwa kontra-indikat. (ara sezzjoni 4.5).

Tadalafil ma jistax jiġi użat f'irġiel li jbatu minn mard kardijaku li għalihom l-attività sesswali mhix rakkmandata. It-tobba għandhom iqisu r-riskju potenzjali kardijaku ta' attività sesswali f'pazjenti li għandhom mard kardjovaskulari pre-eżistenti.

Il-gruppi ta' pazjenti b'mard kardjovaskulari għadhom ma ġewx inklużi fil-provi kliniċi u l-użu ta' tadalafil huwa għalhekk kontra-indikat:

- Pazjenti li kellhom infart kardijaku fl-aħħar 90 jum,
- Pazjenti li jbatu minn angina li mhix stabbli jew angina li sseħħ waqt il-kopulazzjoni sesswali,
- Pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb meqjusa mill-Assoċjazzjoni tal-Qalb ta' New York bħala Klassi 2 jew akbar, fl-aħħar 6 xhur,
- Pazjenti b'taħbit irregolari tal-qalb mhux kontrollat, pressjoni baxxa (<90/50 mm Hg), jew pressjoni għolja mhux kontrollata,
- Pazjenti li kellhom puplesija fl-aħħar 6 xhur.

Tadalafil huwa kontra-indikat f'pazjenti li tilfu d-dawl f'għajn waħda minħabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), indipendentement mill-fatt jekk dan l-episodju kienx marbut jew le ma' użu preċedenti ta' inibitur ta' PDE5 (ara sezzjoni 4.4).

It-teħid flimkien ta' inibituri ta' PDE5, inkluż tadalafil, ma' stimulatori ta' guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikant għax hemm il-possibbiltà li dan iwassal għal ipotensjoni sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Qabel tinbada l-kura b'Tadalafil Mylan

Wieħed għandu jgħares lejn il-passat mediku u għandu jsir eżami fiżiku biex issir id-dijanjozi ta' disfunzjoni erettili u biex jiġu identifikati l-fatturi li potenzjalment qed jikkawżawha, qabel ma jiġi kkunsidrat it-trattament farmakoloġiku.

Qabel ma jinbada kwalunkwe trattament għal disfunzjoni erettili, it-tobba għandhom jikkunsidraw listat kardjovaskulari tal-pazjenti tagħhom, peress illi hemm grad ta' riskju kardijaku assoċjat ma' lattività sesswali. Tadalafil għandu karatteristiċi vasodilatorji, li jirriżultaw fi tnaqqis ħafif u temporajnu fil-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 5.1) u b'hekk jikkawża l-effett ipotensiv tan-nitrati (ara sezzjoni 4.3).

L-evalwazzjoni tad-disfunzjoni erettili għandha tinkludi d-determinazzjoni tal-kawżi potenzjali sottostanti u l-identifikazzjoni ta' kura xierqa wara eżaminazzjoni medika xierqa. Mhux magħruf jekk tadalafil huwiex effettiv f'pazjenti li għaddew minn kirurgija fil-pelvis jew prostatettomija radikali fejn in-nervituri ma' ġewx salvati.

Kardjovaskulari

Każijiet kardjovaskulari serji, fosthom infart mijokardijaku, mewt kardijaku għal għarrieda, angina pectoris instabli, aritmija ventrikulari, puplesija, attackki iskemici transitorji, ugiġh fis-sider,

palpitazzjonijiet u takikardija, ġew irrapportati jew wara t-tqegħid fis-suq u/jew fi provi kliniċi. Hafna mill-pazjenti li kellhom dawn il-każijiet kellhom fatturi ta' riskju kardjovaskulari minn qabel. Madankollu, mhuwiex possibbli li jiġi determinat b'mod definitiv jekk dawn l-effetti humiex relatati direttament ma' dawn il-fatturi ta' riskju, ma' tadalafil, ma' attività sesswali, jew ma' tahlita ta' dawn il-fatturi jew fatturi oħra.

F'pazjenti li qed jieħdu alpha 1b1 ockers, l-amministrazzjoni konkomitanti ta' tadalafil jista' jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika f'xi pazjenti (ara sezzjoni 4.5). Mhuwiex rakkomandat li tadalafil jingħata flimkien ma' doxazosin.

Vizjoni

Difetti fil-vista u każijiet ta' NAION ġew irrapportati b'konnessjoni mat-teħid ta' tadalafil u inibituri oħra ta' PDE5. Analizi ta' taġħrif osservazzjonali tissuggerixxi zieda fir-riskju ta' NAION akuta f'irġiel b'disfunzjoni erettili wara espożizzjoni għal tadalafil jew inibituri oħra ta' PDE5. Peress li dan jista' jkun rilevanti għall-pazjenti kollha esposti għal tadalafil, il-pazjent għandu jingħata parir li f'każ ta' difett fil-vista għal għarrieda, għandu jieqaf jieħu Tadalafil Mylan u jikkonsulta tabib minnufih (ara sezzjoni 4.3).

Tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa

Każijiet ta' telf ta' smiġh f'daqqa ġew irrapportati wara l-użu ta' tadalafil. Għalkemm f'xi każijiet kienu preżenti fatturi ta' riskju oħra (bħall-età, id-dijabete, l-ipertensjoni u passat mediku ta' telf ta' smiġh preċedenti) il-pazjenti għandhom jingħataw parir jieqfu jieħdu tadalafil u jfittxu kura medika minnufih f'każ ta' tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa.

Indeboliment renali

Minhabba ż-zieda fl-espożizzjoni ta' tadalafil(AUC), esperjenza klinika limitata u l-fatt li t-tneħħija m'hijiex affetwata mid-dijalizi, doża ta' darba kuljum ta' tadalafil m'hijiex rakkomandata f'pazjenti b'indeboliment renali sever.

Indeboliment Epatiku

Hemm informazzjoni klinika limitata dwar is-sigurtà ta' teħid ta' doża waħda ta' tadalafil f'pazjenti b'insuffiċjenza severa tal-fwied (Child-Pugh Klassi C); It-teħid ta' doża darba kuljum ma' gietx evalwata f'pazjenti b'insuffiċjenza epatika. Jekk Tadalafil Mylan jinkiteb mit-tabib, għandha ssir stima birreqqa tal-benefiċċji/riskji għall-individwu mit-tabib li jippreskrivih.

Prijapiżmu u deformazzjoni anatomika tal-pene

Pazjenti li jkollhom erezzjonijiet li jdumu għal 4 sigħat jew aktar għandhom ikunu avżati li għandhom ifittxu assistenza medika minnufih. Jekk il-prijapiżmu ma' jiġix ittrattat minnufih, jistgħu jirriżultaw ħsara fit-tessut penili u mpotenza permanenti.

Tadalafil għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'diformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angolazzjoni, fibrozi kavernożali jew il-marda ta' Peyronie), jew f'pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jistgħu jippre-disponuhom għal prijapiżmu (bħal sickle cell enemija, majeloma multipla jew lewkimja).

L-użu ma' inibituri CYP3A4

Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal tadalafil lill-pazjenti li qed jużaw inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, ketoconazole, itraconazole, u erythromycin) għaliex kien osservat esponiment akbar għal tadalafil (AUC) meta l-prodotti mediċinali jingħataw flimkien (Ara sezzjoni 4.5).

Tadalafil u trattamenti ohra għal disfunzjoni erettili

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' l-użu flimkien ta' tadalafil u inibituri oħrajn ta' PDE5 jew trattamenti ohra għall-kura tad-disfunzjoni erettili ma ġewx studjati. Il-pazjenti iridu jiġu mgħarrfa li m'għandhomx jiehdu Tadalafil Mylan flimkien ma' dawn it-tipi ta' mediċini jew trattamenti.

Kontenut tal-lactose

Tadalafil Mylan fih l-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-galactose, ta' defiċjenza ta' lactase totali jew ta' malassorbiment ta' glucose-galactose m'għandhomx jiehdu dan il-prodott mediċinali.

Kontenut tas-sodium

Tadalafil Mylan fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

Saru studji ta' interazzjoni dwar tadalafil ta' 10 mg u/jew 20 mg, kif indikat hawn taht. Rigward dawk l-istudji ta' interazzjoni fejn ġiet użata biss id-doża ta' 10 mg tadalafil, ma jistgħux jiġu esklużi għal kollox interazzjonijiet klinikament rilevanti li jistgħu iseħħu f' dozi oġġla.

Effetti ta' sustanzi oħrajn fuq tadalafil

Cytochrome P450 inhibitors

Tadalafil huwa prinċipalment metabolizzat minn CYP3A4. Inibitur selettiv ta' CYP3A4, ketoconazole (200 mg kuljum), žied l-esponiment għal tadalafil (10-mg) (AUC) b'darbtejn u C_{max} bi 15%, relattivament għall-AUC u għal valuri ta' C_{max} għal tadalafil biss. Ketoconazole (400 mg kuljum) žied l-esponiment għal tadalafil (20-mg) (AUC) b'erba darbiet u C_{max} bi 22%. Ritonavir, inibitur ta' lenżima protease (200 mg darbtejn kuljum), li huwa inibitur ta' CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, u CYP2D6, žied l-esponiment għal tadalafil (20-mg) (AUC) b'darbtejn bl-ebda tibdil f' C_{max} . Għalkemm ma ġewx studjati interazzjonijiet speċifiċi, inibituri oħra tal-enzima protease, bħal saquinavir, u inibituri oħrajn ta' CYP3A4, bħal erythromycin, clarithromycin, itraconazole u meraq tal-grejpfrut għandhom jingħataw flimkien b'kawtela minhabba li huma mistennija li jżidu l-koncentrazzjonijiet ta' tadalafil fil-plażma (ara sezzjoni 4.4). Konsegwentement l-inċidenza tal-effetti avversi elenkati fit-sezzjoni 4.8 tista' tiżdied.

Transporters

Ir-rwol tat-trasportaturi (bħal p-glikoproteina) fid-dispożizzjoni ta' tadalafil mhux magħruf. Għalhekk hemm il-potenzjal ta' interazzjonijiet tal-mediċina minhabba inibizzjoni tat-trasportaturi

Indutturi Cytochrome P450

Rifampicin, induttur ta' CYP3A4, naqqas l-AUC ta' tadalafil bi 88%, relattivament għall-valuri tal-AUC għal tadalafil waħdu (10 mg). Wieheċ jista' jistenna li dan it-tnaqqis fl-espożizzjoni jnaqqas leffikaċja ta' tadalafil: kemm ikun kbir dan it-tnaqqis fl-effikaċja m'huwx magħruf. Indutturi oħrajn ta' CYP3A4 bħall-phenobarbital, phenytoin u carbamazepine, jistgħu wkoll inaqqsu ilkoncentrazzjonijiet ta' tadalafil fil-plażma.

Effetti ta' tadalafil fuq prodotti mediċinali oħrajn

Nitrati

Fl-istudji kliniċi, tadalafil (5, 10 u 20 mg) deher li jkabbar l-effetti ipotensivi tan-nitrati. Għalhekk l-għoti ta' tadalafil Mylan lil pazjenti li qed jużaw kwalunkwe forma ta' nitrat organiku huwa

kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3). Ibbażat fuq ir-riżultati ta' studju kliniku li fih 150 individwu irċievev doża ta' 20 mg tadalafil kuljum għal 7 ijiem u 0.4 mg nitroglicerina taħt l-ilsien f'ħinijiet diversi, din linterazzjoni damet aktar minn 24 siegħa u ma dehrinx aktar meta għaddew 48 siegħa minn l-aħħar doża ta' tadalafil. Għalhekk, f'pazjent li għalih gie preskritt xi doża ta' tadalafil (2.5mg-20mg), fejn l-għoti tan-nitrat jitqies medikalment neċessarju f'sitwazzjoni prekarja għall-ħajja, għall-inqas 48 siegħa għandhom jithallew jgħaddu minn l-aħħar doża ta' tadalafil qabel ma jingħataw in-nitrati. F'dawn iċ ċirkostanzi, in-nitrati għandhom biss jingħataw taħt sorveljanza medika stretta, b'sorveljanza xierqa emodinamika.

Medicini tal-pessjoni (inkluz calcium channel blockers)

It-tehid flimkien ta' doxazin (4 u 8 mg kuljum) u tadalafil (doża ta' 5 mg kuljum u doża waħda ta' 20 mg) iżid b'mod sinifikanti l-effett ta' tnaqqis fil-pessjoni tad-demmm ta' dan l-imblokkatur tarreċetturi alpha. Dan l-effett idum għallinqas 12-il siegħa u jista' jkun sintomatiku u jinkludi s-sinkope.

Għalhekk din il-kombinazzjoni m'hijiex irrakkomandata (ara sezzjoni 4.4).

F'studji ta' interazzjoni magħmula fuq numru limitat ta' volontiera b'saħħithom, dawn l-effetti ma ġewx irrapportati b'alfuzosin u tamsulozin. Madankollu għandha tittiehed l-kawtela meta tadalafil jintuża f'pazjenti li qegħdin jiġu kkurati b'xi imblokkatur tar-reċetturi alpha u speċjalment fl-anzjani. It-trattamenti għandhom jinbdew b'dożaġġ minimu u bil-mod il-mod jiġu aġġustati.

Fi studji ta' farmakoloġija klinika, il-potenzjal biex tadalafil iżid l-effetti ipotensivi ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pessjoni għolja kien eżaminat. Klassijiet ewlenin ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pessjoni għolja kienu studjati, inkluzi dawk li jimblukkwaw il-passaġġi tal-kalċjum (amlodipine), inibituri ta' l-enzimi li jbiddu l-angiotensin (ACE) (enalapril), dawk li jimblukkwaw ir-riċetturi beta-adrenerġiċi (metoprolol), id-djuretici ta' t-tip thiazide (bendrofluazide), u dawk li jimblukkwaw ir-riċetturi ta' l-angiotensin II (tipi u doži varji, waħedhom jew flimkien ma' thiazides, dawk li jimblukkwaw il-passaġġi tal-kalċjum, blokkaturi-beta, u/jew blokkaturi-alpha). Tadalafil (10mg ħlief fi studji b'imblokkaturi tar-reċetturi angiotensin II u amlodipine fejn intużat doża ta' 20mg) ma kellu l-ebda interazzjoni klinikalment sinifikanti ma' l-ebda waħda minn dawn ilklassijiet. Fi studju ieħor ta' farmakoloġija klinika, kien studjat tadalafil (20mg) flimkien ma' sa 4kl assijiet ta' prodotti mediċinali li jintużaw kontra l-pessjoni għolja. F'pazjenti li jieħdu prodotti mediċinali multipli kontra l-pessjoni għolja, it-tibdiliet ambulatorji fil-pessjoni tad-demmm deħru li kienu relatati mal-grad ta' kontroll tal-pessjoni tad-demmm. F'dan ir-rigward, l-individwi ta' l-istudju li l-pessjoni tad-demmm tagħhom kienet ikkontrollata tajjeb, it-tnaqqis kien minimu u simili għal dak ta' individwi b'saħħithom. Fl-individwi ta' l-istudju li l-pessjoni tad-demmm tagħhom ma kenitx ikkontrollat, it-tnaqqis kien akbar minkejja li dan it-tnaqqis ma kienx assoċjat mas-sintomi ta' pessjoni baxxa fil-maġġoranza tal-individwi. F'pazjenti li jirċievu prodotti mediċinali għall-pessjoni għolja flimkien ma' tadalafil 20 mg, dan jista' jinduċi tnaqqis fil-pessjoni tad-demmm, li (bl-eċċezzjoni ta' imblokkaturi tar-riċetturi alpha – ara hawn fuq-) huwa ġeneralment ħafif u x' aktarx ma jkunx klinikament rilevanti. L-analiżi ta' informazzjoni tal-prova klinika tal-fażi 3 ma wriet l-ebda differenza fl-avvenimenti avversi f'pazjenti li jieħdu tadalafil waħdu jew flimkien ma' prodotti mediċinali għall-pessjoni għolja. Madankollu, għandu jingħata parir kliniku xieraq lil pazjenti rigward il-possibilita' ta' tnaqqis fil-pessjoni tad-demmm meta jkun qed jieħdu prodotti mediċinali għal kontra l-pessjoni għolja.

Riociguat

Studji qabel l-użu kliniku wrew zieda fl-effett li titbaxxa l-pessjoni sistemika tad-demmm meta inibituri ta' PDE5 intużaw flimkien ma' riociguat. Fi studji kliniċi, gie muri li riociguat jzid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta' PDE5. Fil-popolazzjoni taħt studju ma kien hemm ebda evidenza li dan it-tehid flimkien kellu xi effett kliniku favorevoli. It-tehid fl-istess ħin ta' riociguat ma' inibituri ta' PDE5, inkluz tadalafil, huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Inibituri ta' 5-alpha reductase

Ma giet identifikata ebda reazzjoni avversa ġdida f'studju kliniku fejn tadalafil 5 mg mogħti flimkien ma' finasteride 5 mg gie mqabbel ma' placebo flimkien ma' finasteride 5 mg għas-solliev mis-sintomi

ta' BPH. Madankollu peress li ma sarx studju formali ta' interazzjoni bejn medicina u ohra li jevalwa l-effetti ta' tadalafil u l-inibituri ta' 5-alpha reductase (5-ARIs), wiehed għandu joqgħod attent meta tadalafil jingħata flimkien ma' 5-ARIs.

Substrati CYP1A2 (e.g. theophylline)

Meta tadalafil 10 mg ingħata ma' theophylline (inibitur mhux selettiv tal-phosphodiesterase) fi studju ta' farmakologija klinika, ma kienx hemm interazzjoni farmakokinetika. L-uniku effett farmakodinamiku kien żieda żgħira (3.5bp m) fir-rata tat-taħbit tal-qalb. Minkejja li dan l-effett huwa effett minimu u ma kienx ta' sinifikat kliniku f' dan l-istudju, għandu jitqies meta dawn il-prodotti medicinali jingħataw flimkien.

Ethinylestradiol u terbutaline

Intwera li tadalafil iżid il-bijodisponibilita' orali ta' ethinylestradiol; żieda simili tista' tkun mistennija bit-tehid orali ta' terbutaline, għalkemm il-konsegwenza klinika ta' din mhix ċerta.

Alkoħol

Koncentrazzjonijiet ta' l-alkoħol (medja massima tal-koncentrazzjoni fid-demm 0.08%) ma kinux affettwati mit-tehid ta' tadalafil magħhom (10 mg jew 20 mg). Minbarra dan, l-ebda tibdil filkoncentrazzjonijiet ta' tadalafil ma deherx 3 sigħat wara t-tehid ma' l-alkoħol. L-alkoħol ingħata b'mod li r-rata ta' l-assorbiment ta' l-alkoħol tkun massima (sajjem tul il-lejl bl-ebda ikel sa sagħtejn wara li tiehed l-alkoħol).

Tadalafil (20 mg) ma żiedx il-medja tat-tnaqqis ta' pressjoni tad-demmi prodotta mill-alkoħol (0.7 g/kg jew madwar 180 ml ta' 40% alkoħol [vodka] f'irgħiel ta' 80 kg) iżda f'xi individwi, kienu osservati sturdament dovut għat-tibdil fil-pożizzjoni tal-persuna u pressjoni baxxa ortostatika. Meta tadalafil ingħata ma' dozi aktar baxxi ta' l-alkoħol (0.6 g/kg), ma deherx li kien hemm pressjoni baxxa u l-isturdament seħħ bi frekwenza simili għal meta tiehed l-alkoħol waħdu. L-effett ta' l-alkoħol fuq il-funzjoni konjittiva ma żdiedx bit-tadalafil (10 mg).

Prodotti medicinali metabolizzati b'Cytochrome P450

Tadalafil mhux mistenni li b'mod klinikament sinifikanti jinibixxi jew jinduċi it-tneħħija ta' prodotti medicinali metabolizzati minn iżoformi ta' CYP450. Xi studji kkonfermaw li tadalafil ma jinibixxi jew ma jstimulax iżoformi ta' CYP450, ikluzi CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 u CYP2C19.

Substrati CYP2C9 (e.ż. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg 20 mg) ma kellu l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq l-espożizzjoni (AUC) għal S-warfarin jew R-warfarin (substrat ta' CYP2C9), u tadalafil lanqas ma affettwa tibdil fil-ħin talprotrombin indott mill-warfarin.

Aspirin

Tadalafil (10 u 20 mg) ma żiedx iż-żieda fil-ħin ta' fsada ikkawżata minn acetyl salicylic acid.

Prodotti medicinali antidijabetiċi

Ma sarux studji ta' interazzjonijiet speċifiċi ma' medicini antidijabetiċi.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tadalafil Mylan m'huwiex indikat għall-użu minn nisa.

Tqala

It-tagħrif huwa limitat għall-użu ta' tadalafil fin-nisa tqal. Studji f'animali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta' l-embriju/fetu, fuq il-ħlas jew fuq l-iżvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Bħala prekawzjoni hu preferribli li ma jintuzax Tadalafil Mylan waqt it-tqala.

Treddigh

Tagħrif disponibbli farmakodinamiku/tossikoloġiku magħmul fil-bhejjem wera li tadalafil huwa prezenti fil-ħalib. Ma jistax jiġi eskluż xi riskju għat-tarbija li qieghda tiġi mreddgħa. Tadalafil Mylan m'għandux jintuża waqt it-treddigh.

Fertilità

Kien hemm xi effetti li deħru fil-klieb li jistgħu jindikaw xi ħsara fil-fertilità. Żewġ studji kliniċi sussegwenti jissuġġerixxu li dan l-effett mhuwiex probabbli fil-bnedmin, għalkemm ġie nnutat tnaqqis fil-koncentrazzjoni ta' sperma f'xi rġiel (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Tadalafil għandu effett żgħir fuq il-hila biex issuq u thaddem magni. Minkejja li l-frekwenza ta' sturdament fir-rapporti fl-ambitu ta' placebo u tadalafil fi provi kliniċi kienet simili, il-pazjenti għandhom ikunu konxji dwar kif jirreagixxu għal tadalafil qabel ma jsuqu jew jużaw l-magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta' sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni li ġew irrapportati f'pazjenti li qed jieħdu tadalafil għall-kura taddisfunzjoni erettili jew għall-iperplażja beninna tal-prostata kienu uġiġħ ta' ras, dispepsja, uġiġħ fiddahar u majalgja, fejn l-incidanza tagħhom tiżdied hekk kif tiżdied id-doża ta' tadalafil.

Irreazzjonijiet avversi li ġew irrapportati kienu temporanji u hafna drabi ħfief jew moderati. Il-parti lkbira tal-uġiġħ ta' ras irrapportati b'tadalafil b'dożaġġ ta' darba kuljum jinħassu fl-ewwel 10 sa 30 ġurnata minn meta tibda l-kura.

Sommarju f'forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella hawn taħt tniżżel ir-reazzjonijiet avversi osservati minn rapurtaġġ spontanju u minn studji kliniċi kkontrollati bil-placebo (b'total ta' 8022 pazjent fuq tadalafil u 4422 pazjent fuq placebo) għall-kura tad-disfunzjoni erettili kemm meta Tadalafil Mylan jittiehed meta jkun hemm il-bżonn u kemm f'dożaġġ ta' darba kuljum u għall-iperplażja beninna tal-prostata f'dożaġġ ta' darba kuljum.

Frekwenza: komuni hafna ($\geq 1/10$), komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($\geq 1/1000$ sa $< 1/100$), rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), Rari hafna ($< 1/10,000$) u mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli)

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fis-sistema immuni</i>			
		Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva	Angjoedema ²

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fis-sistema nervuża</i>			
	Uġiġh ta' ras	Sturdament	Puplesija ¹ (li tinkludi avvenimenti emorraġiċi), Sinkope, Attakki iskemiċi temporanji ¹ , Emigranja ² , Aċċessjonijiet ² , Amnesija temporanja
<i>Disturbi fl-ġhajnejn</i>			
		Vista m'cajpra, Sensazzjonijiet deskritti bħala wġiġh fl-ġhajnejn	Difett fil-kamp viżiv, Nefha ta' tebqet il-ġhajn, Iperemija tal-konguntiva, Newropatija ottika iskemika anterjuri mhux arteritika (NAION) ² , Okklużjoni vaskulari tar-retina ²
<i>Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika</i>			
		Żanzin fil-widnejn	Telf għal għarrieda tas-smiġh
<i>Disturbi fil-qalb¹</i>			
		Takikardija, Palpitazzjonijiet	Infart mijokardijaku, Anġina pectoris instabbli ² , Arritmija ventrikulari ²
<i>Disturbi vaskulari</i>			
	Fwawar	Pressjoni baxxa ³ , Pressjoni għolja	
<i>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali</i>			
	Kongestjoni nażali	Qtuġh ta' nifs, Epistassi	
<i>Disturbi gastrointestinali</i>			
	Dispepsija	Uġiġh addominali, Rimettar, Dardir, Rifluss gastroesofagali	

Komuni hafna	Komuni	Mhux komuni	Rari
<i>Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda</i>			
		Raxx	Urtikarja, Sindrome ta' Stevens-Johnson ² , Dermatite bil-qxur ² , Iperidroži (għaraq)
<i>Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi</i>			
	Uġiġh fid-dahar, Mijalġja, Uġiġh fl-estremittajiet		
<i>Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarija</i>			
		Ematurija	
<i>Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider</i>			
		erezzjonijiet li jdumu żmien twil	Prijapiżmu, Emorragija tal-pene, Ematospermija
<i>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</i>			
		Uġiġh fis-sider ¹ , Edema periferali, Għeja	Edema tal-wiċċ ² , Mewt kardijaka għal għarrieda ^{1,2}

(1) Il-parti l-kbira tal-pazjenti kellhom fatturi ta' riskju kardjovaskulari li kienu jeżistu minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

(2) Reazzjonijiet avversi rrapportati waqt is-sorveljanza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq li ma kinux osservati f'studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo.

(3) Irrapportat bi frekwenza akbar meta tadalaflil ġie mogħti lill-pazjenti li kienu diġa qed jieħdu prodotti mediċinali kontra l-pessjoni.

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi partikulari

Ġiet irrappurtata inċidenza ftit iżjed oġħla ta' anormalitajiet fl-ECG, l-iżjed bradikardija sinusojde, f'pazjenti kkurati b'tadalafil darba kuljum meta mqabbel ma' plaċebo. Il-parti l-kbira ta' dawn l-anormalitajiet fl-ECG ma kienux assoċjati ma' reazzjonijiet avversi.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Id-dejta hija limitata għal pazjenti 'l fuq minn 65 sena li qed jirċievi tadalaflil f'studji kliniċi jew għallkura tad-disfunzjoni erettili jew għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata. Fi provi kliniċi b'tadalafil meħud fil-pront għall-kura ta' disfunzjoni erettili, id-dijarea ġiet irrappurtata b'mod aktar frekwenti f'pazjenti li kellhom aktar minn 65 sena. F'studji kliniċi b'tadalafil 5 mg meħud darba kuljum għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata, l-isturdament u ddijarea ġew irrappurtati b'mod aktar frekwenti f'pazjenti 'l fuq minn 75 sena.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżzla f'[Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Doži singli sa 500 mg ngħataw lill-individwi b'saħħithom, u doži multipli sa 100 mg kuljum ingħataw lill-pazjenti. L-avvenimenti avversi kienu simili għal dawk li dehru b'f' doži aktar baxxi. F'każijiet ta' doži eċċessivi, il-miżuri supportivi indikati għandhom jittieħdu skond il-ħtieġa. L-emodjalisi tikkontribwixxi fit-tneħħija ta' tadalafil b'mod negliġibbli.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini uroloġiċi, Mediċini użati għad-disfunzjoni erettili, Kodiċi ATC: G04BE08.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Tadalafil huwa inibitur riversibbli, selettiv ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP) speifikament phosphodiesterase tip 5 (PDE5). Meta l-istimolu sesswali jikkawża ħruġ lokali ta' nitric oxide, linibizzjoni ta' PDE5 permezz ta' tadalafil tipproduċi livelli oġhla ta' cGMP fil-corpus cavernosum. Dan jirriżulta f'rilassament tal-muskoli involontarji u mogħdija ta' demm fit-tessut tal-pene, u b'hekk jipproduċi erezzjoni. Tadalafil m'għandu l-ebda effett jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali.

Effetti farmakodinamiċi

Studji *in vitro* wrew li tadalafil huwa inibitur selettiv ta' PDE5. PDE5 hija enżima li tinsab fil-muskoli involontarji tal-corpus cavernosum, fil-muskoli involontarji vaskolari u vixxerali, fil-muskoli skeletalali, plejtlits, fil-kliewi, fil-pulmuni u fiċ-ċervellett. L-effett ta' tadalafil huwa aktar qawwi fuq PDE5 milli fuq phosphodiesterases oħrajn. Tadalafil huwa >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE1, PDE2 u PDE4, li huma enżimi li jinsabu fil-qalb, fil-moħħ, fil-vini u l-arterji, fil-fwied u f'organi oħra. Tadalafil huwa >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE3, li hija enżima li tinsab fil-qalb u fil-vini u l-arterji.

Din is-selettivita' għal PDE5 fuq il-PDE3 hija importanti għaliex PDE3 hija enżima li hija involuta fil-kontrattilità kardijaka. Minbarra dan, tadalafil huwa madwar 700 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE6, li hija enżima li tinsab fir-retina u li hija responsabbli għall-fototransduzzjoni. Tadalafil huwa wkoll >1 0,000 darba aktar potenti għal PDE5 milli għal PDE7 permezz ta' PDE10.

Effikaċja klinika u sigurtà

Saru tliet studji kliniċi fuq 1054 pazjent f'ambjent tad-dar biex ikun definit iż-żmien ta' rispons għal tadalafil meta jkun hemm it-talba. Tadalafil wera titjib statistikament sinifikanti fil-funzjoni erettili u fl-abilita' li jkun hemm kopulazzjoni sesswali b'suċċess sa 36 siegħa wara li tittieħed id-doża, kif ukoll fl-abilita' tal-pazjenti li jkollhom u jzommu erezzjoni għal kopulazzjoni b'suċċess meta mqabbel ma' placebo wara 16 minuta mit-teħid tad-doża.

Tadalafil li ngħata lill-individwi b'saħħithom, meta mqabbel ma' placebo, ma pproduċa l-ebda differenza sinifikanti fil-pressjoni sistolika u dijastolika meħuda meta l-individwu kien mimdud fuq dahru (medja massima ta' tnaqqis ta' 1.6/0.8 mm Hg, rispettivament), fil-pressjoni sistolika u dijastolika meħuda meta l-individwu kien bilwieqfa (medja massima ta' tnaqqis ta' 0.2/4.6 mm Hg, rispettivament), u l-ebda tibdil sinifikanti fir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Fi studju li sar biex ikunu ttestjati l-effetti ta' tadalafil fuq il-viżjoni, fejn intuża t-test Farnsworth-Munsell ta' 100-lewn, ma deherx li kien hemm problemi biex jintgħarfu l-kuluri

(blu/aħdar). Din issejba hija konsistenti ma' l-affinita' baxxa ta' tadalafil għal PDE6 meta mqabbel ma' PDE5. Fl-istudji kliniċi kollha, ir-rapporti tat-tibdil fil-viżjoni tal-kulur kienu rari (<0.1%).

Saru tliet studji fl-irġiel biex ikun stmat l-effett potenzjali fuq l-ispermatogenesi ta' tadalafil 10 mg (studju wieħed ta' 6 xhur) u 20 mg (studju wieħed ta' 6 xhur u studju wieħed ta' 9 xhur) mogħtija kuljum..F'tnejn minn dawn l-istudji ġew osservati tnaqqis fl-għadd u fil-koncentrazzjoni ta' sperma relatati ma' kura b'tadalafil ta' rilevanza klinika improbabbli. Dawn l-effetti ma ġewx assoċjati ma' tibdil fil-parametri l-oħra bħal motilità, morfologija u FSH.

Tadalafil f'dozi ta' 2 sa 100 mg kien evalwat f'16-il studju kliniku li involva aktar minn 3250 pazjent, inklużi pazjenti b'disfunzjoni erettili ta' gradi varji (hafif, moderat, gravi), etjologiji varji, etajiet varji (skala 21-86 sena), u etniċitajiet varji. Il-parti l-kbira tal-pazjenti kellhom disfunzjoni erettili li damet għall-inqas sena. Fl-istudji dwar effikaċja primarja ta' popolazzjonijiet ġenerali, 81% tal-pazjenti sabu illi tadalafil tejjeb l-erezzjonijiet tagħhom meta mqabbel ma' 35% li ħadu l-plaċebo. Barra minn hekk, pazjenti b'disfunzjoni erettili fil-kategoriji kollha ta' severita' kellhom erezzjonijiet imtejbien meta ħadu tadalafil (86%, 83%, u 72% għal disfunzjoni hafifa, moderata, u gravi, rispettivament, meta mqabbel ma' 45%, 42%, u 19% li ħadu l-plaċebo). Fl-istudji dwar effikaċja primarja, 75% tal-attentati għall-kopolazzjoni kienu b'suċċess f'pazjenti li ħadu tadalafil meta mqabbel ma' 32% li ħadu l-plaċebo.

Fi studju li dam 12-il ġimgha u li ġie magħmul f'186 pazjent (142 tadalafil, 44pl aċebo) b'disfunzjoni erettili kawża ta' trawma tan-nerv li jgħaddi minn ġos-sinsla, tadalafil b'mod sinifikanti tejjeb ilfunzjoni erettili li wassal għal medja f'kull pazjent ta' proporzjon ta' tentattivi ta' suċċess f'dawk ikkurati b'tadalafil 10 mg jew 20 mg (doża flessibbli, meta jkun hemm il-bżonn) ta' 48% meta mqabbel ma' 17% bi plaċebo.

Popolazzjoni pedjatrika

Sar studju wieħed f'pazjenti pedjatriċi b'Distrofija Muskolari ta' Duchenne (DMD – *Duchenne Muscular Dystrophy*) fejn ma ntweriet ebda evidenza ta' effikaċja. L-istudju ta' tadalafil, bi 3 ferġat, parallel, magħmul b'mod arbitrarju, *double-blind* u kkontrollat bi plaċebo sar f'331 tifel b'etajiet minn 7-14-il sena b'DMD li fl-istess hin kienu qed jirċievu t-terapija bil-kortikosteroidi. L-istudju kien jinkludi perijodu *double-blind* ta' 48 ġimgha fejn il-pazjenti, b'mod arbitrarju, ngħataw kuljum tadalafil 0.3 mg/kg, tadalafil 0.6 mg/kg, jew plaċebo. Tadalafil ma weriex effikaċja biex inaqqas it-tnaqqis fil-mixi kif imkejjeż permezz tal-punt finali primarju tad-distanza li wieħed jimxi f'6 minuti (6MWD – *6 minute walk distance*): il-bidla medja fl-inqas numru ta' kwadrati (LS – *least squares*) f'6MWD fit-48 ġimgha kien -51.0 metri (m) fil-grupp tal-plaċebo, meta mqabbel ma' -64.7 m fil-grupp ta' tadalafil 0.3 mg/kg ($p = 0.307$) u -59.1 m fil-grupp ta' tadalafil 0.6 mg/kg ($p = 0.538$). Barra minn hekk, ma kien hemm ebda evidenza ta' effikaċja minn ebda waħda mill-analiżi sekondarji li saru f'dan l-istudju. Ir-riżultati totali ta' sigurtà kienu fil-parti l-kbira konsistenti mal-profil ta' sigurtà magħruf ta' tadalafil u bl-avvenimenti avversi (AEs, adverse events) mistennija f'popolazzjoni pedjatrika b'DMD li qieghda tirċievi l-kortikosteroidi.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji f'kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta' disfunzjoni erettili. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Tadalafil jiġi assorbit malajr jittiehed mill-ħalq u l-medja massima osservata ta' konċentrazzjoni fil-plażma (C_{max}) tintlaħaq f'ħin medju ta' sagħtejn wara li tittiehed id-doża. Il-biodisponibilità assoluta ta' tadalafil wara doża orali ma ġietx determinata.

Ir-rata u l-grad ta' l-assorbiment ta' tadalafil mhumiex influwenzati bl-ikel, għalhekk tadalafil jista' jittiehed ma' l-ikel jew fuq stonku vojta. Il-hin tad-doża (filgħodu versu filgħaxija) ma kellu l-ebda effetti klinikament rilevanti fuq ir-rata u l-grad ta' l-assorbiment.

Distribuzzjoni

Il-volum medju tad-distribuzzjoni huwa madwar 63l, li jindika li tadalafil jiġi distribwit fit-tessuti. F'koncentrazzjonijiet terapewtiċi, 94% ta' tadalafil fil-plażma jkun marbut mal-proteini. L-irbit mal-proteini mhuwiex effettwat mill-funzjoni tal-kliewi. Inqas minn 0.0005% tad-doża mogħtija dehret fis-semen ta' individwi b'saħħithom.

Bijotrasformazzjoni

Tadalafil huwa prinċipalment metabolizzat permezz ta' l-iżoforma ċitokromju P450 (CYP) 3A4. Il-metabolu prinċipali ċirkolanti huwa methylcatechol glucuronide. Dan il-metabolu huwa mill-inqas 13,000-il darba inqas qawwi minn tadalafil għal PDE5. Konsegwentement, mhuwiex mistenni li jkun klinikament attiv fil-koncentrazzjonijiet osservati tal-metabolu.

Eliminazzjoni

It-tneħħija medja orali ta' tadalafil hija 2.5l /siegħa u l-half-life medja hija ta' 17.5 siegħa f'individwi b'saħħithom. Tadalafil jitneħħa prinċipalment bħala metaboli mhux attivi, l-aktar fl-ippurgar (madwar 61% taddoża) u b'ammont inqas fl-awrina (madwar 36% tad-doża).

Linearità/nuqqas ta' linearità

Il-farmakokinetiċi ta' tadalafil f'individwi b'saħħithom huma lineari fir-rigward tal-hin u tad-doża. Fi skala ta' doża minn 2.5 sa 20 mg, l-esponiment (AUC) jiżjed b'mod proporzjonali għad-doża. Livelli kostanti fil-plażma jinlaħqu fi żmien 5 ijiem mit-teħid ta' doża ta' darba kuljum. Il-farmakokinetiċi determinati f'popolazzjoni magħżula b'pazjenti b'disfunzjoni erettili huma simili għall-farmakokinetiċi f'individwi mingħajr disfunzjoni erettili.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Anzjani b'saħħithom (65 sena jew akbar) kellhom tneħħija aktar baxxa ta' tadalafil meħud oralment, li rriżulta f'25% aktar esponiment (AUC) meta mqabbel ma' individwi b'saħħithom ta' età minn 19 sa 45 sena. Dan l-effett ta' l-età mhuwiex klinikament sinifikanti u ma jeħtieġx tibdil fid-doża.

Insuffiċjenza renali

Fl-istudji tal-farmakoloġija klinika fejn intużat doża waħda ta' tadalafil (5 sa 20 mg), l-esponiment għal tadalafil (AUC) kien madwar id-doppju f'individwi b'indeboliment ħafif fil-kliewi (tneħħija tal-kreatinina 51 sa 80 ml/min) jew moderat (tneħħija tal-kreatinina 31 sa 50 ml/min) u f'individwi fuq id-dijaliżi bi stat terminali tal-funzjoni tal-kliewi. Fil-pazjenti fuq l-emojaljiżi, C_{max} kien 41% oghla minn dak osservat f'individwi b'saħħithom. L-emojaljiżi tikkontribwixxi ftit li xejn għat-tneħħija tattadalafil.

Insuffiċjenza epatika

L-esponiment għal tadalafil (AUC) f'individwi b'insuffiċjenza ħafifa u moderata tal-fwied (Child-Pugh Klassi A u B) huwa komparabbli ma' l-espożizzjoni f'individwi b'saħħithom meta tingħata doża ta' 10 mg. L-informazzjoni klinika dwar is-sigurta' ta' tadalafil f'pazjenti b'insuffiċjenza gravi tal-fwied (Child-Pugh Klassi C); hija limitata. Jekk jiġi preskritt tadalafil, għandha ssir evalwazzjoni b'attenzjoni tal-benefiċċji/riskji għall-individwu mit-tabib li jippreskrivih. M'hemm

L-ebda informazzjoni disponibbli dwar it-tehid ta' dozi oghla minn 10 mg ta' tadalafile minn pazjenti b'indeboliment tal-fwied.

Pazjenti bid-dijabete

L-esponiment għal tadalafile (AUC) f'individwi bid-dijabete kien madwar 19% inqas mill-valur ta' AUC f'individwi b'saħħithom. Din id-differenza fl-espożizzjoni ma teħtiegħ tibdil fid-doża.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dozi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin

Ma kien hemm ebda evidenza ta' teratoġeniċità jew ta' effett tossiku fuq l-embriju jew il-fetu f'firien jew grieden li rċevew sa 1000 mg/kg/jum tadalafile. Fi studju ta' l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid tal-firien, id-doża li fiha ma ġie osservat l-ebda effett kienet ta' 30 mg/kg/jum. F'fara tqila, l-AUC għal medicina hielsa kkalkulata f'din id-doża kienet madwar 18-il darba akbar minn l-AUC fil-bniedem f'doża ta' 20 mg.

Ma kien hemm l-ebda ħsara fil-fertilità tal-firien maskili u femminili. Fi klieb li ngħataw tadalafile kuljum għal 6 sa 12-il xahar f'dozi ta' 25 mg/kg/jum (li jirriżulta f'esponiment mill-inqas 3 darbiet akbar [skala 3.7 – 18.6] milli jidher fil-bnedmin li ngħataw doża waħda ta' 20 mg) u aktar, kien hemm rigressjoni tal-epitelju tubulari seminiferu li rriżulta fi tnaqqis tal-ispermatogènesi f'xi klieb. Ara wkoll sezzjoni 5.1

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Lactose, anhydrous
Poloxamer 188
Cellulose, microcrystalline (pH101)
Povidone (K-25)
Croscarmellose sodium
Magnesium stearate
Sodium laurilsulfate
Silica, colloidal anhydrous

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate,
Hypromellose (E464)
Titanium dioxide (E171)
Iron oxide yellow (E172)
Triacetin

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet Snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folji tal-Alu PVC/PE/PVdC.

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita

Daqsijiet tal-pakkett ta' 4, 12 u 24 pillola.

Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita

Daqsijiet tal-pakkett ta' 2, 4, 8, 12 u 24 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal ta' prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-igijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita

EU/1/14/961/001
EU/1/14/961/010
EU/1/14/961/011

Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita

EU/1/14/961/002
EU/1/14/961/003
EU/1/14/961/004
EU/1/14/961/005
EU/1/14/961/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Novembru 2014
Data tal-aħħar tiġdid: 31 Lulju 2019

10. DATA TA' REVIZJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

ANNEX II

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GTAL-AWTORIZ FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories
Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate
Grange Road, Dublin 13
L-Irlanda

Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom 2900
L-Ungerija

Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan UK Healthcare Limited
Building 20, Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Fuq il-fuljett ta' tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott ikkonċernat.

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U LUŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIZITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GTAL-AWTORIZ FIS-SUQ

• Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)

Ir-rekwiziti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

• Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq (MAH)għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Medicini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minhabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minhabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

Jekk il-preżentazzjoni ta' PSUR u l-aġġornament ta' RMP jikkoinċidu, dawn jistgħu jiġu ppreżentati fl-istess hin.

ANNEX III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 2.5 mg pilloli miksijin b'rita
tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg tadalafil

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksijin b'rita
56 pillola miksijin b'rit

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.
Darba kuljum

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/961/008
EU/1/14/961/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tadalafil Mylan 2.5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 2.5 mg pilloli
tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 5 mg pilloli miksijin b'rita
tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 5 mg tadalafil

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksijin b'rita
28 pillola miksijin b'rita
30 pillola miksijin b'rita
56 pillola miksijin b'rita
84 pillola miksijin b'rita
98 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali
Darba kuljum

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/961/012
EU/1/14/961/013
EU/1/14/961/014
EU/1/14/961/015
EU/1/14/961/016
EU/1/14/961/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tadalafil Mylan 5mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 5mg pilloli
tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita
tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 10 mg tadalafil

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4 pilloli miksijin b'rita
12-il pillola miksijin b'rita
24 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/961/001
EU/1/14/961/010
EU/1/14/961/011

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tadalafil Mylan 10mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI
FOLJA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 10mg pilloli
tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita
tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 20 mg tadalafil

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.
Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b'rita
4 pilloli miksijin b'rita
8 pilloli miksijin b'rita
12-il pillola miksijin b'rita
24 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX IT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/14/961/002
EU/1/14/961/003
EU/1/14/961/004
EU/1/14/961/005
EU/1/14/961/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tadalafil Mylan 20mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tadalafil Mylan 20mg pilloli
tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Tadalafil Mylan 2.5 mg pilloli miksijin b'rita tadalafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina għiet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Tadalafil Mylan
3. Kif għandek tieħu Tadalafil Mylan
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Tadalafil Mylan
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuża

Tadalafil Mylan huwa trattament għall-irġiel adulti b'disfunzjoni erettili. Dan jiġri meta raġel ma jkunx jista' jkollu, jew iżomm, pene iebes u erett kif inhu xieraq għall-attività sesswali. Tadalafil intwera li jtejjeb b'mod sinifikanti l-kapaċità li jinkiseb pene erett u iebes li hu xieraq għall-attività sesswali.

Tadalafil Mylan għandu s-sustanza attiva tadalafil li jagħmel parti minn grupp ta' mediċini msejha inibituri talphosphodiesterase tip 5. Wara l-istimolu sesswali, Tadalafil Mylan jaħdem billi jgħin lill-arterji fil-pene tiegħek jirrilassaw, u b'hekk jippermettu d-dhul tad-demmi fil-pene tiegħek. Ir-riżultat ta' dan huwa funzjoni erettili mtejjba. Tadalafil Mylan ma jgħinekx jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

Huwa importanti li tkun taf li tadalafil ma jaħdimx jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali. Hemm bżonn li int u s-sieħba tiegħek tibdew il-logħob ta' qabel l-kopulazzjoni sesswali, kif kontu tagħmlu kieku ma kontx qiegħed tieħu l-mediċina għad-disfunzjoni erettili.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Tadalafil Mylan

Tihux Tadalafil Mylan

- jekk inti allergiku għal tadalafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imnizzla fis-sezzjoni 6).
- jekk inti qed tieħu xi forma ta' nitrate organiku jew donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite. Dan huwa grupp ta' mediċini ("nitрати") li jintużaw fit-trattament ta' angina pectoris ("uġiġħ fis-sider"). Tadalafil intwera li jżid l-effetti ta' dawn il-mediċini. Jekk qed tieħu xi forma ta' nitrate jew m' intix ċert, għid lit-tabib tiegħek.
- jekk inti għandek mard serju tal-qalb jew kellek attakk tal-qalb reċenti f'dawn l-aħħar 90 ġurnata.
- jekk inti kellek attakk ta' puplesija f'dawn l-aħħar 6 xhur.
- jekk inti għandek pressjoni tad-demmi baxxa jew pressjoni tad-demmi għolja mhux ikkontrollata.

- jekk inti qatt kellek telf tal-vista minhabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), kundizzjoni li tiġi deskritta bħal "puplesija tal-ġhajj".
- qed/a tiegħu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demmm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demmm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demmm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Tadalafil Mylan, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiegħu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tiegħu Tadalafil Mylan

Kun af li l-attività sesswali għandha riskju possibbli għal pazjenti li jbatu minn mard tal-qalb għaliex tagħmel sforz żejjed fuq il-qalb. Jekk għandek problema tal-qalb għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Qabel ma tiegħu l-pilloli, għid lit-tabib tiegħek jekk għandek:

- anemija tat-tip '*sickle cell*' (abnormalita' taċ-ċelloli ħomor tad-demmm)
- majeloma multipla (kanċer tal-mudullun)
- lewkimja (kanċer taċ-ċelloli tad-demmm)
- kwalunkwe deformazzjoni tal-pene tiegħek
- problema serji tal-fwied
- problema serja tal-kliewi

M'huwiex magħruf jekk tadalafil huwa effettiv f'pazjenti li kellhom

- kirurġija pelvika
- tneħhija totali jew ta' parti tal-glandola tal-prostata fejn jiġu mqatta' n-nervituri tal-prostata (prostatektomija radikali li taffettwa n-nervituri).

Jekk f'daqqa waħda tesperjenza tnaqqis jew telf tal-vista, waqqaf Tadalafil Mylan u kkuntattja t-tabib tiegħek minnufih.

Ġie nnotat tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa f'xi pazjenti li qed jieħdu tadalafil. Għalkemm mhuwiex magħruf jekk l-avveniment hux relatat direttament ma' tadalafil, jekk ikollok tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa, ieqaf iegu Tadalafil Mylan u kkuntattja minnufih lit-tabib tiegħek.

Tadalafil Mylan m'huwiex intenzjonat biex jiġi użat min-nisa.

Tfal u adolexxenti

Tadalafil Mylan mhux intenzjonat biex jintuża mit-tfal u minn adolexxenti taħt it-tmintax-il sena

Medicini oħra u Tadalafil Mylan

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiegħu, hadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi medicini oħra.

Tihux Tadalafil Mylan jekk diġà qed tiegħu n-nitrati.

Xi medicini jistgħu jiġu affettwati minn Tadalafil Mylan jew jistgħu jaffettwaw kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb. Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk diġà qed tiegħu:

- alpha blocker (użat għal kura ta' pressjoni għolja tad-demmm jew għas-sintomi urinarji assoċjati ma' iperplażja beninna tal-prostata).
- medicini oħra għal kura ta' pressjoni għolja fid-demmm.
- Riociguat.
- inibitur ta' 5-alpha reductase (użat fil-kura ta' iperplażja beninna tal-prostata).
- medicini bħall-pilloli ketoconazole (biex tikkura infezzjonijiet tal-moffa) u inibituri ta' protease għall-kura tal-AIDS jew tal-HIV.
- phenobarbital, phenytoin u carbamazepine (medicini kontra l-aċċessjonijiet)

- rifampicin, erythromycin , clarithromycin jew itraconazole
- trattamenti oħra għad-disfunzjoni erettili.

Tadalafil Mylan ma' ikel u xorb

Il-meraġ tal-grapefruit jista' jaffettwa kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb u għandju jittiehed b'kawtela. Tkellem mat-tabib tiegħek għal aktar informazzjoni.

Ix-xorb tal-alkoħol jista' temporanjament ibaxxilek il-pressjoni tad-demem. Jekk hađt jew taħseb li ser tiehu Tadalafil Mylan, evita li tixrob alkoħol eċċessiv (livell ta' alkoħol fid-demem ta' 0.08% jew aktar), minhabba li dan jista' jżid ir-riskju ta' sturdament meta tkun bilwieqfa.

Fertilità

Meta ġew trattati l-klieb kien hemm tnaqqis fl-isperma u dan ġie osservat ukoll f'xi irġiel. Dan mhux probabbli li jwassal għal nuqqas ta' fertilità.

Sewqan u thaddim ta' magni

Xi rġiel li hađu tadalafil fl-istudji kliniċi rrapurtaw li kellhom xi sturdament. Oqgħod attent kif tirrejaġixxi għall-pilloli qabel ma ssuq jew thaddem xi magni.

Tadalafil Mylan fih il-lactose

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib qabel ma tiehu din il-mediċina.

Tadalafil Mylan fih is-sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tiehu Tadalafil Mylan

Dejjem għandek tiehu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata hija ta' pillola waħda ta' 5 mg darba kuljum li tittiehed bejn wieħed u ieħor dejjem fl-istess hin. It-tabib tiegħek jista' jaġġusta d-doża għal 2.5 mg skont ir-rispons tiegħek għal Tadalafil Mylan. Din tingħata bħala pillola ta' 2.5 mg. Tihux Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum.

Il-pilloli Tadalafil Mylan huma għall-użu orali u għall-irġiel biss. Ibla' l-pillola shiħa ma' xi ftit ilma. Il-pilloli jistgħu jittiehdu mal-ikel jew fuq stonku vojta.

Doża ta' Tadalafil Mylan darba kuljum tista' tkun utili għall-irġiel li jaħsbu li jkollom attività sesswali darbtejn jew iżjed fil-ġimgħa.

Meta jittiehed darba kuljum Tadalafil Mylan iħallik tikseb erezzjoni, meta stimulat sesswalment, f'kull hin fl-24 siegħa tal-ġurnata.

Jekk tiehu Tadalafil Mylan aktar milli suppost

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jista' jkollok xi effetti sekondarji kif deskritt f'sezzjoni 4.

Jekk tinsa tiehu Tadalafil Mylan

Ħu d-doża tiegħek hekk kif tiftakar iżda m'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tiehu. M'għandekx tiehu Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti normalment ikunu ta' natura ħafifa jew moderata

Jekk ikollok xi effetti sekondarji minn dawn li ġejjin ieqaf milli tuża l-mediċina u fittex lattenzjoni medika immedjatement:

- reazzjonijiet allergiċi li jinkludu raxx (frekwenza mhux komuni)
- uġiġħ fis-sider – tużax nitrati iżda fittex għajjnuna medika immedjatement (frekwenza mhux komuni)
- prijapizmu, erezzjoni fit-tul u possibilment bl-uġiġħ wara li tieġu tadalafile (frekwenza rari). Jekk għandek din it-tip ta' erezzjoni, li ddum kontinwament għal aktar minn 4 sigħat għandek tikkuntattja littaġib immedjatement.
- telf tal-vista f'daqqa waħda (frekwenza rari).

Effetti sekondarji oħra kienu rrapportati.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni)

- uġiġħ ta' ras, uġiġħ tad-dahar. uġiġħ fil-muskoli, uġiġħ fid-dirgħajn u fir-riglejn, ħmura fil-wieċ, imnieher miżdud, u indigestjoni.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna)

- sturdament, uġiġħ fl-istonku, thossok imdardar, tirremetti, rifluss, vista mċajpra, uġiġħ fl-għajnejn, diffikulta biex tieġu n-nifs, il-presenza ta' demm fl-awrina, erezzjoni fit-tul, sensazzjoni li l-qalb qed thabbat ħafna, rata tal-qalb mghaġġla, pressjoni għolja tad-demm, pressjoni baxxa tad-demm, infriġ, žanżin fil-widnejn, nefha tal-idejn, tas-saqajn jew tal-għekiesi, u thossok għajjen.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna)

- ħass ħażin, konvulżjonijiet u telf temporanju tal-memorja, nefha fil-kpiepel ta' l-għajnejn, għajnejn ħomor, nuqqas jew telf tas-smiġħ f'daqqa u urtikarja (nfafet ħomor u bil-ħaqq fuq wieċ il-ġilda), ħruġ ta' demm mill-pene, preżenza ta' demm fl-isperma u žieda fl-għaraq.

B'mod rari ġew ukoll irrapportati attakk tal-qalb u puplesija f'irġiel li ħadu tadalafile. Ħafna minn dawn l-irġiel kellhom problemi tal-qalb magħrufa minn qabel ma ħadu din il-mediċina.

B'mod rari, ġew irrapportati każi ta' tnaqqis jew telf ta' vista, parzjali, temporanji jew permanenti f'għajn waħda jew fit-tnejn li huma.

F'irġiel li ħadu tadalafile ġew irrapportati **xi effetti sekondarji oħra rari**, li ma dehrux f'studji kliniċi.

Dawn jinkludu:

- l-emikranja, nefha fil-wieċ, reazzjonijiet allergiċi serji li jikkaġunaw nefha fil-wieċ jew filgrizmejn, raxxijiet severi fil-ġilda, xi disturbu li jkollhom effett fuq il-fluss tad-demm fl-għajnejn, taħbit irregolari tal-qalb, anġina u mewta kardijaka għal għarrieda..

L-effett sekondarju ta' sturdament ġie irrapportat b'mod aktar frekwenti fl-irġiel 'il fuq minn 75 sena li kienu qed jieħdu tadalafile. Id-dijarea ġiet irrapportata b'mod aktar frekwenti f'irġiel li kellhom aktar minn 65 sena u li kienu qed jieħdu tadalafile.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista' tghin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Tadalafil Mylan

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għal-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadexx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Tadalafil Mylan

- Is-sustanza **attiva** hi tadalafil. Kull pillola fiha 2.5 mg tadalafil.
- **Is-sustanzi mhux attivi l-oħra** huma:
Qalba tal-pillola: lactose anhydrous (ara sezzjoni 2 'Tadalafil Mylan fih il-lactose'), poloxamer 188, cellulose microcrystalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium laurilsulfate, silica colloidal anhydrous.
Kisja b'rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), iron oxide isfar (E172), triacetin.

Kif jidher Tadalafil Mylan u l-kontenut tal-pakkett

Tadalafil Mylan 2.5 mg hi pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa, immarkata b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL over 1' fuq in-naħa l-oħra.

Tadalafil Mylan 2.5 mg hu disponibbli f'pakketti tal-folji li jkun fihom 28 u 56 pillola. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

Manifattur

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
L-Irlanda

Mylan L-Ungerija Kft.
Mylan utca 1
Komárom, 2900
L-Ungerija

Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan UK Healthcare Limited
Building 20, Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva (Lithuania)

BGP Products UAB
Tel: + 370 5 205 1288

България (Bulgaria)

Майлан ЕООД
Тел: + 359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl
Tel: + 32 (0)2 658 61 00
(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.
Tel: + 420 222 004 400

Magyarország (Hungary)

Mylan EPD Kft.
Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS
Tel: + 45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd
Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH
Tel: + 49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV
Tel: + 31 (0)20 426 3300

Eesti (Estonia)

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal
Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS
Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα (Greece)

Generics Pharma Hellas EPE
Τηλ: + 30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH
Tel: + 43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.
Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S
Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.
Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska (Croatia)

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 23 50 599

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: + 353 (0) 87 1694982

Ísland

Icepharma hf

Tel: + 354 540 8000

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Κύπρος (Cyprus)

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 222 077 23

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: + 371 676 05580

România

BGP Products SRL

Tel: + 40 372 579 000

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: + 421 2 32 199 100

Suomi/Finland

Mylan Finland OY

Puh/Tel: + 358 20 720 9555

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

United Kingdom

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853000

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi ohra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu/>

Fuljett ta' taghrif : Informazzjoni għall-pazjent

Tadalafil Mylan 5 mg pilloli miksijin b'rita tadalafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali tal-mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Tadalafil Mylan
3. Kif għandek tiehu Tadalafil Mylan
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Tadalafil Mylan
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuża

Tadalafil Mylan għandu s-sustanza attiva tadalafil li jagħmel parti minn grupp ta' medicini msejha inibituri talphosphodiesterase tip 5.

Tadalafil Mylan 5 mg jintuża għall-kura fl-irġiel adult b':

- **disfunzjoni erettile.** Dan jgħri meta raġel ma jkunx jista' jkollu, jew iżomm, pene iebes u erett kif inhu xieraq għall-attività sesswali. Tadalafil intwera li jtejjeb b'mod sinifikanti l-kapaċità li jinkiseb pene erett u iebes li hu xieraq għall-attività sesswali. Wara l-istimolu sesswali, Tadalafil Mylan jaħdem billi jgħin lill-arterji fil-pene tiegħek jirrilassaw, u b'hekk jippermettu d-dhul tad-demem fil-pene tiegħek. Ir-riżultat ta' dan huwa funzjoni erettile mtejjba. Tadalafil Mylan ma jgħinekx jekk m'għandekx disfunzjoni erettile. Huwa importanti li tkun taf li Tadalafil Mylan ma jaħdimx jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali. Hemm bżonn li int u s-sieħba tiegħek tibdew il-logħob ta' qabel l-kopulazzjoni sesswali, kif kontu tagħmlu kieku ma kontx qiegħed tiehu l-medicina għad-disfunzjoni erettile
- sintomi urinarju assoċjati ma' kundizzjoni komuni li tissejjah **iperplażja beninna tal-prostata.** Din hija meta l-galandola tal-prostata tikber bl-età. Is-sintomi jinkludu d-diffikultà biex tibda tgħaddi l-awrina, is-sensazzjoni li ma tkunx għaddejt l-awrina kollha u bżonn aktar frekwenti li tgħaddi l-awrina anki bil-lejl. Tadalafil Mylan itejjeb il-fluss tad-demem lejn il-prostata u l-bużżieqa talawrina kif ukoll jirrilassa l-muskolu ta' dawn l-organi u b'hekk jistgħu jonqsu s-sintomi taliperplażja beninna tal-prostata. Intwera li Tadalafil Mylan jista' jtejjeb dawn is-sintomi urinarji kmieni mill-1-2 ġimgħa mill-bidu tal-kura.

Tadalafil Mylan huwa trattament għall-irġiel adulti b'disfunzjoni erettile.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Tadalafil Mylan

Tihux Tadalafil Mylan

- jekk inti allergiku għal tadalafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

- jekk inti qed tiehu xi forma ta' nitrate organiku jew donaturi ta' nitric oxide bhal amyl nitrite. Dan huwa grupp ta' medicini ("nitрати") li jintużaw fit-trattament ta' angina pectoris ("uġiġh fis-sider"). Tadalafil intwera li jżid l-effetti ta' dawn il-medicini. Jekk qed tiehu xi forma ta' nitrate jew m' intix ċert, għid lit-tabib tiegħek.
- jekk inti għandek mard serju tal-qalb jew kellek attack tal-qalb reċenti f' dawn l-aħħar 90 gurnata.
- jekk inti kellek attack ta' puplesija f' dawn l-aħħar 6 xhur.
- jekk inti għandek pressjoni tad-demem baxxa jew pressjoni tad-demem għolja mhux ikkontrollata.
- jekk inti qatt kellek telf tal-vista minhabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), kundizzjoni li tiġi deskritta bhal "puplesija tal-ġhajn".
- qed/a tiehu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demem fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demem fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demem). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bhal Tadalafil Mylan, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiehu riociguat jew m' intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u Prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tiehu Tadalafil Mylan.

Kun af li l-attività sesswali għandha riskju possibbli għal pazjenti li jbatu minn mard tal-qalb għaliex tagħmel sforz żejjed fuq il-qalb. Jekk għandek problema tal-qalb għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Peress li l-iperplazja beninna tal-prostata u l-kanċer tal-prostata għandhom l-istess sintomi, it-tabib tiegħek se jeżaminak għall-kanċer tal-prostata qabel ma tibda l-kura b' tadalafil għall-iperplazja beninna tal-prostata. Tadalafil mhijiex kura għall-kanċer tal-prostata.

Qabel ma tiehu l-pilloli, għid lit-tabib tiegħek jekk għandek:

- anemija tat-tip '*sickle cell*' (abnormalita' taċ-ċelloli homor tad-demem)
- majeloma multipla (kanċer tal-mudullun)
- lewkimja (kanċer taċ-ċelloli tad-demem)
- kwalunkwe deformazzjoni tal-pene tiegħek
- problema serji tal-fwied
- problema serja tal-kliewi

M'huwiex magħruf jekk tadalafil huwa effettiv f' pazjenti li kellhom

- kirurġija pelvika
- tneħhija totali jew ta' parti tal-glandola tal-prostata fejn jiġu mqatta' n-nervituri tal-prostata (prostatektomija radikali li taffettwa n-nervituri).

Jekk f' daqqa waħda tesperjenza tnaqqis jew telf tal-vista, waqqaf Tadalafil Mylan u kkuntattja t-tabib tiegħek minnufih.

Ġie nnotat tnaqqis jew telf ta' smiġh f' daqqa f' xi pazjenti li qed jieħdu tadalafil. Għalkemm mhuwiex magħruf jekk l-avveniment hux relatat direttament ma' tadalafil, jekk ikollok tnaqqis jew telf ta' smiġh f' daqqa, ieqaf ieħu Tadalafil Mylan u kkuntattja minnufih lit-tabib tiegħek.

Tadalafil Mylan m'huwiex intenzjonat biex jiġi użat min-nisa.

Tfal u adolexxenti

Tadalafil Mylan mhux intenzjonat biex jintuża mit-tfal u minn adolexxenti taħt it-tmintax-il sena

Medicini oħra u Tadalafil Mylan

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu, hadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini oħra.

Tihux Tadalafil Mylan jekk diġa qed tiehu n-nitrati.

Xi mediċini jistgħu jiġu affettwati minn Tadalafil Mylan jew jistgħu jaffettwaw kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb. Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk diġa qed tiehu:

- alpha blocker (użat għal kura ta' pressjoni għolja tad-demem jew għas-sintomi urinarji assoċjati ma' iperplażja beninna tal-prostata).
- mediċini oħra għal kura ta' pressjoni għolja fid-demem.
- riociguat.
- inibitur ta' 5-alpha reductase (użat fil-kura ta' iperplażja beninna tal-prostata).
- mediċini bħall-pilloli ketoconazole (biex tikkura infezzjonijiet tal-moffa) u inibituri ta' protease għall-kura tal-AIDS u tal-HIV.
- phenobarbital, phenytoin u carbamazepine (mediċini kontra l-aċċessjonijiet)
- rifampicin, erythromycin, clarithromycin jew itraconazole
- trattamenti oħra għad-disfunzjoni erettili.

Tadalafil Mylan ma' ikel u xorb

Il-meraq tal-grapefruit jista' jaffettwa kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb u għandju jittiehed b'kawtela. Tkellem mat-tabib tiegħek għal aktar informazzjoni.

Ix-xorb tal-alkoħol jista' temporanjament ibaxxilek il-pressjoni tad-demem. Jekk hadt jew taħseb li ser tiehu Tadalafil Mylan, evita li tixrob alkoħol eċċessiv (livell ta' alkoħol fid-demem ta' 0.08% jew aktar), minhabba li dan jista' jżid ir-riskju ta' sturdament meta tkun bilwieqfa.

Fertilità

Meta ġew trattati l-klieb kien hemm tnaqqis fl-isperma u dan ġie osservat ukoll f'xi irġiel. Dan mhux probabbli li jwassal għal nuqqas ta' fertilità.

Sewqan u thaddim ta' magni

Xi rġiel li ħadu tadalafil fl-istudji kliniċi rrapurtaw li kellhom xi sturdament. Oqgħod attent kif tirrejaġixxi għall-pilloli qabel ma ssuq jew thaddem xi magni.

Tadalafil Mylan fih il-lactose

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib qabel ma tiehu din il-mediċina.

Tadalafil Mylan fih is-sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tiehu Tadalafil Mylan

Dejjem għandek tiehu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Għall-kura tad-disfunzjoni erettili

Id-doża rakkomandata hija ta' pillola waħda ta' 5 mg darba kuljum li tittiehed bejn wieħed u iehor dejjem fl-istess ħin. It-tabib tiegħek jista' jaġġusta d-doża għal 2.5 mg skont ir-rispons tiegħek għal Tadalafil Mylan. Din se tingħata bħala pillola ta' 2.5 mg.

Tihux Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum.

Meta jittiehed darba kuljum Tadalafil Mylan iħallik tikseb erezzjoni, meta stimulat sesswalment, f'kull ħin fl-24 siegħa tal-ġurnata. Dożaġġ darba kuljum ta' Tadalafil Mylan jista' jkun utli għal irġiel li jantiċipaw li jkollhom attività sesswali darbtejn jew aktar drabi fil-ġimgħa.

Għall-kura tal-iperplażja beninna tal-prostata

Id-doża hija ta' pillola waħda ta' 5 mg darba kuljum li tittiehed bejn wiehed u iehor dejjem fl-istess hin. Jekk għandek iperplażja beninna tal-prostata u disfunzjoni erettili, id-doża tibqa' l-istess ta' 5 mg li tittiehed darba kuljum.

Tihux Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum.

Il-pilloli Tadalafil Mylan huma għall-użu orali u għall-irgħiel biss. Ibla' l-pillola shiha ma' xi ftit ilma. Il-pilloli jistgħu jittiehdu mal-ikel jew fuq stonku vojta.

Jekk tiehu Tadalafil Mylan aktar milli suppost

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jista' jkollok xi effetti sekondarji kif deskritt f'sezzjoni 4.

Jekk tinsa tiehu Tadalafil Mylan

Ħu d-doża tiegħek hekk kif tiftakar iżda m'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tiehu. M'għandekx tiehu Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti normalment ikunu ta' natura ħafifa jew moderata

Jekk ikollok xi effetti sekondarji minn dawn li ġejjin ieqaf milli tuża l-medicina u fittex l-attentzjoni medika immedjatement:

- reazzjonijiet allergiċi li jinkludu raxx (frekwenza mhux komuni)
- uġiġħ fis-sider – tużax nitrati iżda fittex għajjnuna medika immedjatement (frekwenza mhux komuni)
- prijapizmu, erezzjoni fit-tul u possibilment bl-uġiġħ wara li tiehu tadalafil (frekwenza rari). Jekk għandek din it-tip ta' erezzjoni, li ddum kontinwament għal aktar minn 4 sigħat għandek tikkuntattja lit-tabib immedjatement.
- telf tal-vista f'daqqa waħda (frekwenza rari).

Effetti sekondarji oħra kienu rrapportati.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni)

- uġiġħ ta' ras, uġiġħ tad-dahar. uġiġħ fil-muskoli, uġiġħ fid-dirgħajn u fir-rigħlejn, ħmura fil-wieċ, imnieher miżdud, u indigestjoni.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna)

- sturdament, uġiġħ fl-istonku, tħossok imdardar, tirremetti, rifluss, vista m'cajpra, uġiġħ fl-għajnejn, diffikulta biex tiehu n-nifs, il-presenza ta' demm fl-awrina, erezzjoni fit-tul, sensazzjoni li l-qalb qed tħabbat ħafna, rata tal-qalb mgħaġġla, pressjoni għolja tad-demm, pressjoni baxxa tad-demm, infrig, żanzin fil-widnejn, nefha tal-idejn, tas-saqajn jew tal-għekiesi, u tħossok għajjen.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna)

- ħass ħażin, konvulzjonijiet u telf temporanju tal-memorja, nefha fil-kpiepel ta' l-għajnejn, għajnejn ħomor, nuqqas jew telf tas-smiġħ f'daqqa u urtikarja (nfafet ħomor u bil-ħaqq fuq wieċ il-ġilda), ħruġ ta' demm mill-pene, preżenza ta' demm fl-isperma u zieda fl-għaraq.

B'mod rari ġew ukoll irrapportati attakk tal-qalb u puplesija f'irgħiel li ħadu tadalafil. Ħafna minn dawn l-irgħiel kellhom problemi tal-qalb magħrufa minn qabel ma ħadu din il-medicina.

B'mod rari, ġew irrappurtati każi ta' tnaqqis jew telf ta' vista, parzjali, temporanji jew permanenti f'għajn waħda jew fit-tnejn li huma.

F'irġiel li ħadu tadalafile ġew irrappurtati **xi effetti sekondarji ohra rari**, li ma dehrux f' studji kliniċi. Dawn jinkludu:

- l-emikranja, nefha fil-wiċċ, reazzjonijiet allergiċi serji li jikkawunaw nefha fil-wiċċ jew filgrizmejn, raxxijiet severi fil-ġilda, xi disturbji li jkollhom effett fuq il-fluss tad-demem flgħajnejn, taħbit irregolari tal-qalb, anġina u mewta kardijaka għal għarrieda..

L-effett sekondarju ta' sturdament ġie irrappurtat b'mod aktar frekwenti fl-irġiel 'il fuq minn 75 sena li kienu qed jieħdu tadalafile. Id-dijarea ġiet irrappurtata b'mod aktar frekwenti f'irġiel li kellhom aktar minn 65 sena u li kienu qed jieħdu tadalafile.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Tadalafile Mylan

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għal-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadex tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Tadalafile Mylan

- Is-sustanza **attiva** hi tadalafile. Kull pillola fiha 5 mg tadalafile.
- **Is-sustanzi mhux attivi l-ohra** huma:
Qalba tal-pillola: lactose anhydrous (ara sezzjoni 2 'Tadalafile Mylan fih il-lactose'), poloxamer 188, cellulose microcrystalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium laurilsulfate, silica colloidal anhydrous.
Kisja b'rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), iron oxide isfar (E172), triacetin.

Kif jidher Tadalafile Mylan u l-kontenut tal-pakkett

Tadalafile Mylan 5mg hi pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa, immarkata b'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL over 2' fuq in-naħa l-ohra.

Tadalafile Mylan 5 mg hu disponibbli f'pakketti tal-folji li jkun fihom 14, 28, 30, 56, 84 u 98 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

Manifattur

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
L-Irlanda

Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom, 2900
L-Ungerija

Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan UK Healthcare Limited
Building 20, Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva (Lithuania)

BGP Products UAB
Tel: + 370 5 205 1288

България (Bulgaria)

Майлан ЕООД
Тел: + 359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl
Tel: + 32 (0)2 658 61 00
(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.
Tel: + 420 222 004 400

Magyarország (Hungary)

Mylan EPD Kft.
Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS
Tel: + 45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd
Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH
Tel: + 49 800 0700 800

Eesti (Estonia)

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal
Tel: + 372 6363 052

Ελλάδα (Greece)

Generics Pharma Hellas EPE
Τηλ: + 30 210 993 6410

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.
Tel: + 34 900 102 712

France

Mylan S.A.S
Tel: + 33 4 37 25 75 00

Hrvatska (Croatia)

Mylan Hrvatska d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Ireland

Mylan Ireland Limited
Tel: + 353 (0) 87 1694982

Ísland

Icepharma hf
Tel: + 354 540 8000

Italia

Mylan Italia S.r.l.
Tel: + 39 02 612 46921

Κύπρος (Cyprus)

Varnavas Hadjipanayis Ltd
Τηλ: +357 222 077 23

Latvija

Mylan Healthcare SIA
Tel: + 371 676 05580

Nederland

Mylan BV
Tel: + 31 (0)20 426 3300

Norge

Mylan Healthcare Norge AS
Tel: + 47 66 75 33 00

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH
Tel: + 43 1 416 2418

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 546 64 00

Portugal

Mylan, Lda.
Tel: + 351 21 412 72 56

România

BGP Products SRL
Tel: + 40 372 579 000

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.
Tel: + 386 1 23 63 180

Slovenská republika

Mylan s.r.o.
Tel: + 421 2 32 199 100

Suomi/Finland

Mylan Finland OY
Puh/Tel: + 358 20 720 9555

Sverige

Mylan AB
Tel: + 46 855 522 750

United Kingdom

Generics [UK] Ltd.
Tel: + 44 1707 853000

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi oħra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu/>

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Tadalafil Mylan 10 mg pilloli miksijin b'rita tadalafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Tadalafil Mylan
3. Kif għandek tieħu Tadalafil Mylan
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Tadalafil Mylan
6. Il-kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuza

Tadalafil Mylan huwa trattament għall-irġiel adulti b' disfunzjoni erettili. Dan jigrigi meta raġel ma jkunx jista' jkollu, jew iżomm, pene iebes u erett kif inhu xieraq għall-attività sesswali. Tadalafil intwera li jtejjeb b'mod sinifikanti l-kapaċità li jinkiseb pene erett u iebes li hu xieraq għall-attività sesswali.

Tadalafil Mylan għandu s-sustanza attiva tadalafil li jagħmel parti minn grupp ta' mediċini msejha inibituri talphosphodiesterase tip 5. Wara l-istimolu sesswali, Tadalafil Mylan jaħdem billi jgħin lill-arterji fil-pene tiegħek jirrilassaw, u b'hekk jippermettu d-dhul tad-demmi fil-pene tiegħek. Ir-riżultat ta' dan huwa funzjoni erettili mtejjba. Tadalafil Mylan ma jgħinekx jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

Huwa importanti li tkun taf li Tadalafil Mylan ma jaħdimx jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali. Hemm bżonn li int u s-sieħba tiegħek tibdew il-logħob ta' qabel l-kopulazzjoni sesswali, kif kontu tagħmlu kieku ma kontx qiegħed tieħu l-mediċina għad-disfunzjoni erettili.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Tadalafil Mylan

Tihux Tadalafil Mylan

- jekk inti allergiku għal tadalafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imnizzla fis-sezzjoni 6).
- jekk inti qed tieħu xi forma ta' nitrate organiku jew donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite. Dan huwa grupp ta' mediċini ("nitрати") li jintużaw fit-trattament ta' angina pectoris ("uġiġħ fis-sider"). Tadalafil intwera li jżid l-effetti ta' dawn il-mediċini. Jekk qed tieħu xi forma ta' nitrate jew m' intix ċert, għid lit-tabib tiegħek.
- jekk inti għandek mard serju tal-qalb jew kellek attakk tal-qalb reċenti f'dawn l-aħħar 90 ġurnata.
- jekk inti kellek attakk ta' puplesija f'dawn l-aħħar 6 xhur.
- jekk inti għandek pressjoni tad-demmi baxxa jew pressjoni tad-demmi għolja mhux ikkontrollata.

- jekk inti qatt kellek telf tal-vista minhabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), kundizzjoni li tiġi deskritta bħal "puplesija tal-ġhajn"
- qed/a tiegħu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demmm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demmm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demmm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Tadalafil Mylan, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tiegħu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tiegħu Tadalafil Mylan

Kun af li l-attività sesswali għandha riskju possibbli għal pazjenti li jbatu minn mard tal-qalb għaliex tagħmel sforz żejjed fuq il-qalb. Jekk għandek problema tal-qalb għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Qabel ma tiegħu l-pilloli, għid lit-tabib tiegħek jekk għandek:

- anemija tat-tip '*sickle cell*' (abnormalita' taċ-ċelloli ħomor tad-demmm)
- majeloma multipla (kanċer tal-mudullun)
- lewkimja (kanċer taċ-ċelloli tad-demmm)
- kwalunkwe deformazzjoni tal-pene tiegħek
- problema serji tal-fwied
- problema serja tal-kliewi

M'huwiex magħruf jekk tadalafil huwa effettiv f'pazjenti li kellhom

- kirurgija pelvika
- tneħhija totali jew ta' parti tal-glandola tal-prostata fejn jiġu mqatta' n-nervituri tal-prostata (prostatektomija radikali li taffettwa n-nervituri).

Jekk f'daqqa waħda tesperjenza tnaqqis jew telf tal-vista, waqqaf Tadalafil Mylan u kkuntattja t-tabib tiegħek minnufih.

Ġie nnotat tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa f'xi pazjenti li qed jieħdu tadalafil. Għalkemm mhuwiex magħruf jekk l-avveniment hux relatat direttament ma' tadalafil, jekk ikollok tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa, ieqaf ieħu Tadalafil Mylan u kkuntattja minnufih lit-tabib tiegħek.

Tadalafil Mylan m'huwiex intenzjonat biex jiġi użat min-nisa.

Tfal u adolexxenti

Tadalafil Mylan mhux intenzjonat biex jintuża mit-tfal u minn adolexxenti taħt it-tmintax-il sena

Medicini oħra u Tadalafil Mylan

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiegħu, hadt dan l-aħħar jew tista' tiegħu xi medicini oħra.

Tiħux Tadalafil Mylan jekk diġà qed tiegħu n-nitrati.

Xi medicini jistgħu jiġu affettwati minn Tadalafil Mylan jew jistgħu jaffettwaw kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb. Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk diġà qed tiegħu:

- alpha blocker (użat għal kura ta' pressjoni għolja tad-demmm jew għas-sintomi urinarji assoċjati ma' iperplazja beninna tal-prostata).
- medicini oħra għal kura ta' pressjoni għolja fid-demmm.
- Riociguat.
- inibitur ta' 5-alpha reductase (użat fil-kura ta' iperplazja beninna tal-prostata).
- medicini bħall-pilloli ketoconazole (biex tikkura infezzjonijiet tal-moffa) u inibituri ta' protease għall-kura tal-AIDS jew tal-HIV.
- phenobarbital, phenytoin u carbamazepine (medicini kontra l-aċċessjonijiet)

- rifampicin, erythromycin , clarithromycin jew itraconazole
- trattamenti oħra għad-disfunzjoni erettili.

Tadalafil Mylan ma' ikel u xorb

Il-meraġ tal-grapefruit jista' jaffettwa kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb u għandju jittiehed b'kawtela. Tkellem mat-tabib tiegħek għal aktar informazzjoni.

Ix-xorb tal-alkoħol jista' temporanjament ibaxxilek ilpressjoni tad-dem. Jekk hađt jew taħseb li ser tiehu Tadalafil Mylan, evita li tixrob alkoħol eċċessiv (livell ta' alkoħol fid-dem ta' 0.08% jew aktar), minhabba li dan jista' jżid ir-riskju ta' sturdament meta tkun bilwieqfa.

Fertilità

Meta ġew trattati l-klieb kien hemm tnaqqis fl-isperma u dan ġie osservat ukoll f'xi irġiel. Dan mhux probabbli li jwassal għal nuqqas ta' fertilità.

Sewqan u thaddim ta' magni

Xi rġiel li hađu tadalafil fl-istudji kliniċi rrapurtaw li kellhom xi sturdament. Oqgħod attent kif tirrejaġixxi għall-pilloli qabel ma ssuq jew thaddem xi magni.

Tadalafil Mylan fih il-lactose

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib qabel ma tiehu din il-mediċina.

Tadalafil Mylan fih is-sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tiehu Tadalafil Mylan

Dejjem għandek tiehu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata tal-bidu hija pillola ta' 10 mg qabel l-attività sesswali. Jekk l-effett ta' din iddoża huwa ħafif wisq, it-tabib tiegħek jista' jżidlek id-doża sa 20 mg. Tadalafil Mylan huwa għallużu orali.

Tista' tiehu tadalafil mill-inqas 30 minuta qabel l-attività sesswali.

Tadalafil jista' jibqa' effettiv sa 36 siegħa wara li tiehu l-pillola.

Tihux Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum. Tadalafil Mylan 10 mg u 20 mg huwa intenzjonat għall-użu qabel attività sesswali prevista u mhux irrakkomandat għall-użu kontinwu ta' kuljum.

Il-pilloli Tadalafil Mylan huma għall-użu orali u għall-irġiel biss. Ibla' l-pillola sħiħa ma' xi ftit ilma. Il-pilloli jistgħu jittiehdu mal-ikel jew fuq stonku vojta.

Jekk tiehu Tadalafil Mylan aktar milli suppost

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jista' jkollok xi effetti sekondarji kif deskritt f'sezzjoni 4.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina , staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekundarji possibbli

Bhal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekundarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti normalment ikunu ta' natura ħafifa jew moderata.

Jekk ikollok xi effetti sekundarji minn dawn li ġejjin ieqaf milli tuża l-mediċina u fittex lattenzjoni medika immedjatement:

- reazzjonijiet allergiċi li jinkludu raxx (frekwenza mhux komuni)
- uġiġħ fis-sider – tużax nitrati iżda fittex għajjnuna medika immedjatement (frekwenza mhux komuni)
- prijapiżmu, erezzjoni fit-tul u possibilment bl-uġiġħ wara li tieġu tadalafl (frekwenza rari). Jekk għandek din it-tip ta' erezzjoni, li ddum kontinwament għal aktar minn 4 sigħat għandek tikkuntattja liltabib immedjatement.
- telf tal-vista f'daqqa waħda (frekwenza rari).

Effetti sekundarji oħra kienu rrapportati.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni)

- uġiġħ ta' ras, uġiġħ tad-dahar. uġiġħ fil-muskoli, uġiġħ fid-dirġajn u fir-riglejn, ħmura fil-wiċċ, imnieher miżdud, u indigestjoni.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna)

- sturdament, uġiġħ fl-istonku, thossok imdardar, tirremetti, rifluss, vista mēajpra, uġiġħ fl-għajnejn, diffikulta biex tieġu n-nifs, il-presenza ta' demm fl-awrina, erezzjoni fit-tul, sensazzjoni li l-qalb qed thabbat ħafna, rata tal-qalb mgħaġġla, pressjoni għolja tad-demm, pressjoni baxxa tad-demm, infrig, žanżin fil-widnejn, nefha tal-idejn, tas-saqajn jew tal-għekiesi, u thossok għajjen.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna)

- ħass ħażin, konvulżjonijiet u telf temporanju tal-memorja, nefha fil-kpiepel ta' l-għajnejn, għajnejn ħomor, nuqqas jew telf tas-smiġħ f'daqqa u urtikarja (nfafet ħomor u bil-ħaqq fuq wiċċ il-gilda), ħrug ta' demm mill-pene, preżenza ta' demm fl-isperma u žieda fl-għaraq.

B'mod rari ġew ukoll irrapportati attakk tal-qalb u puplesija f'irġiel li ħadu tadalafl. Ħafna minn dawn l-irġiel kellhom problemi tal-qalb magħrufa minn qabel ma ħadu din il-mediċina.

B'mod rari, ġew irrappurtati kaži ta' tnaqqis jew telf ta' vista, parzjali, temporanji jew permanenti f'għajn waħda jew fit-tnejn li huma.

F'irġiel li ħadu tadalafl ġew irrapportati **xi effetti sekundarji oħra rari**, li ma dehrux f'studji kliniċi.

Dawn jinkludu:

- l-emikranja, nefha fil-wiċċ, reazzjonijiet allergiċi serji li jikkagunaw nefha fil-wiċċ jew filgrizmejn, raxxijiet severi fil-gilda, xi disturbji li jkollhom effett fuq il-fluss tad-demm fl-għajnejn, taħbit irregolari tal-qalb, angina u mewta kardijaka għal għarrieda..

L-effett sekundarju ta' sturdament ġie irrapportat b'mod aktar frekwenti fl-irġiel 'il fuq minn 75 sena li kienu qed jieħdu tadalafl. Id-dijarea ġiet irrappurtata b'mod aktar frekwenti f'irġiel li kellhom aktar minn 65 sena u li kienu qed jieħdu tadalafl.

Rappurtar tal-effetti sekundarji

Jekk ikollok xi effett sekundarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekundarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekundarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Tadalafil Mylan

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadexx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Tadalafil Mylan

- Is-sustanza **attiva** hi tadalafil. Kull pillola fiha 10 mg tadalafil.
- **Is-sustanzi mhux attivi l-ohra** huma:
Qalba tal-pillola: lactose anhydrous (ara sezzjoni 2 'Tadalafil Mylan fih il-lactose'), poloxamer 188, cellulose microcrystalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium laurilsulfate, silica colloidal anhydrous.
Kisja b'rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), triacetin.

Kif jidher Tadalafil Mylan u l-kontenut tal-pakkett

Tadalafil Mylan 10 mg hi pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa, immarkata b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL3' fuq in-naħa l-ohra.

Tadalafil Mylan 10 mg hu disponibbli f'pakketti tal-folji li jkun fihom 4, 12 u 24 pillola. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

Manifattur

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoye Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
L-Irlanda

Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom, 2900
L-Ungerija

Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan UK Healthcare Limited
Building 20, Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva (Lithuania)

BGP Products UAB
Tel: + 370 5 205 1288

България (Bulgaria)

Майлан ЕООД
Тел: + 359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl
Tel: + 32 (0)2 658 61 00
(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.
Tel: + 420 222 004 400

Magyarország (Hungary)

Mylan EPD Kft.
Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS
Tel: + 45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd
Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH
Tel: + 49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV
Tel: + 31 (0)20 426 3300

Eesti (Estonia)

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal
Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS
Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα (Greece)

Generics Pharma Hellas EPE
Τηλ: + 30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH
Tel: + 43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.
Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S
Tel: + 33 4 37 25 75 00

Hrvatska (Croatia)

Mylan Hrvatska d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Ireland

Mylan Ireland Limited
Tel: + 353 (0) 87 1694982

Ísland

Icepharma hf
Tel: + 354 540 8000

Italia

Mylan Italia S.r.l.
Tel: + 39 02 612 46921

Κύπρος (Cyprus)

Varnavas Hadjipanayis Ltd
Τηλ: +357 222 077 23

Latvija

Mylan Healthcare SIA
Tel: + 371 676 05580

Portugal

Mylan, Lda.
Tel: + 351 21 412 72 56

România

BGP Products SRL
Tel: + 40 372 579 000

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.
Tel: + 386 1 23 63 180

Slovenská republika

Mylan s.r.o.
Tel: + 421 2 32 199 100

Suomi/Finland

Mylan Finland OY
Puh/Tel: + 358 20 720 9555

Sverige

Mylan AB
Tel: + 46 855 522 750

United Kingdom

Generics [UK] Ltd.
Tel: + 44 1707 853000

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**Sorsi oħra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu/>

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent

Tadalafil Mylan 20 mg pilloli miksijin b'rita tadalafil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew spiżjar tiegħek.
- Din il-medicina giet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuza
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Tadalafil Mylan
3. Kif għandek tiehu Tadalafil Mylan
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Tadalafil Mylan
6. Il-kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Tadalafil Mylan u għalxiex jintuza

Tadalafil Mylan huwa trattament għall-irġiel adulti b' disfunzjoni erettili. Dan jigrigi meta raġel ma jkunx jista' jkollu, jew iżomm, pene iebes u erett kif inhu xieraq għall-attività sesswali. Tadalafil intwera li jtejjeb b'mod sinifikanti l-kapaċità li jinkiseb pene erett u iebes li hu xieraq għall-attività sesswali.

Tadalafil Mylan għandu s-sustanza attiva tadalafil li jagħmel parti minn grupp ta' mediċini msejha inibituri talphosphodiesterase tip 5. Wara l-istimolu sesswali, Tadalafil Mylan jaħdem billi jgħin lill-arterji fil-pene tiegħek jirrilassaw, u b'hekk jippermettu d-dhul tad-demmi fil-pene tiegħek. Ir-riżultat ta' dan huwa funzjoni erettili mtejjba. Tadalafil Mylan ma jgħinekx jekk m'għandekx disfunzjoni erettili.

Huwa importanti li tkun taf li tadalafil ma jaħdimx jekk ma jkunx hemm stimolu sesswali. Hemm bżonn li int u s-sieħba tiegħek tibdew il-logħob ta' qabel l-kopulazzjoni sesswali, kif kontu tagħmlu kieku ma kontx qiegħed tiehu l-medicina għad-disfunzjoni erettili.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Tadalafil Mylan

Tihux Tadalafil Mylan

- jekk inti allergiku għal tadalafil jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzla fis-sezzjoni 6).
- jekk inti qed tiehu xi forma ta' nitrate organiku jew donaturi ta' nitric oxide bħal amyl nitrite. Dan huwa grupp ta' mediċini ("nitрати") li jintużaw fit-trattament ta' angina pectoris ("uġiġħ fis-sider"). Tadalafil intwera li jżid l-effetti ta' dawn il-mediċini. Jekk qed tiehu xi forma ta' nitrate jew m' intix ċert, għid lit-tabib tiegħek.
- jekk inti għandek mard serju tal-qalb jew kellek attakk tal-qalb reċenti f'dawn l-aħħar 90 ġurnata.
- jekk inti kellek attakk ta' puplesija f'dawn l-aħħar 6 xhur.
- jekk inti għandek pressjoni tad-demmi baxxa jew pressjoni tad-demmi għolja mhux ikkontrollata.

- jekk inti qatt kellek telf tal-vista minhabba newropatija ottika iskemika anterjuri li m'hijiex arteritika (NAION), kundizzjoni li tiġi deskritta bħal "puplesija tal-ġhajn"
- qed/a tieġu riociguat. Din il-medicina tintuża għat-trattament tal-ipertensjoni arterjali pulmonarja (i.e., pressjoni għolja tad-demmm fil-pulmuni) u ipertensjoni pulmonarja tromboembolika kronika (i.e., pressjoni għolja tad-demmm fil-pulmuni kkawżata minn ċapep fid-demmm). Ġie muri li inibituri ta' PDE5, bħal Tadalafil Mylan, iżidu l-effetti ipotensivi ta' din il-medicina. Jekk qed/a tieġu riociguat jew m'intix ċert/a għid lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieġu Tadalafil Mylan

Kun af li l-attività sesswali għandha riskju possibbli għal pazjenti li jbatu minn mard tal-qalb għaliex tagħmel sforz żejjed fuq il-qalb. Jekk għandek problema tal-qalb għandek tgħid lit-tabib tiegħek.

Qabel ma tieġu l-pilloli, għid lit-tabib tiegħek jekk għandek:

- anemija tat-tip '*sickle cell*' (abnormalita' taċ-ċelloli ħomor tad-demmm)
- majeloma multipla (kanċer tal-mudullun)
- lewkimja (kanċer taċ-ċelloli tad-demmm)
- kwalunkwe deformazzjoni tal-pene tiegħek
- problema serji tal-fwied
- problema serja tal-kliewi

M'huwiex magħruf jekk tadalafil huwa effettiv f'pazjenti li kellhom

- kirurgija pelvika
- tneħhija totali jew ta' parti tal-glandola tal-prostata fejn jiġu mqatta' n-nervituri tal-prostata (prostatektomija radikali li taffettwa n-nervituri).

Jekk f'daqqa waħda tesperjenza tnaqqis jew telf tal-vista, waqqaf Tadalafil Mylan u kkuntattja t-tabib tiegħek minnufih.

Ġie nnotat tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa f'xi pazjenti li qed jieħdu tadalafil. Għalkemm mhuwiex magħruf jekk l-avveniment hux relatat direttament ma' tadalafil, jekk ikollok tnaqqis jew telf ta' smiġh f'daqqa, ieqaf ieħu Tadalafil Mylan u kkuntattja minnufih lit-tabib tiegħek.

Tadalafil Mylan m'huwiex intenzjonat biex jiġi użat min-nisa.

Tfal u adolexxenti

Tadalafil Mylan mhux intenzjonat biex jintuża mit-tfal u minn adolexxenti taħt it-tmintax-il sena

Medicini oħra u Tadalafil Mylan

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieġu, hadt dan l-aħħar jew tista' tieġu xi medicini oħra.

Tihux Tadalafil Mylan jekk diġà qed tieġu n-nitrati.

Xi medicini jistgħu jiġu affettwati minn Tadalafil Mylan jew jistgħu jaffettwaw kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb. Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk diġà qed tieġu:

- alpha blocker (użat għal kura ta' pressjoni għolja tad-demmm jew għas-sintomi urinarji assoċjati ma' iperplażja beninna tal-prostata).
- medicini oħra għal kura ta' pressjoni għolja fid-demmm.
- riociguat.
- inibitur ta' 5-alpha reductase (użat fil-kura ta' iperplażja beninna tal-prostata).
- medicini bħall-pilloli ketoconazole (biex tikkura infezzjonijiet tal-moffa) u inibituri ta' protease għall-kura tal-AIDS jew tal-HIV.
- phenobarbital, phenytoin u carbamazepine (medicini kontra l-aċċessjonijiet)

- rifampicin, erythromycin , clarithromycin jew itraconazole
- trattamenti oħra għad-disfunzjoni erettili.

Tadalafil Mylan ma' ikel u xorb

Il-meraġ tal-grapefruit jista' jaffettwa kemm Tadalafil Mylan jaħdem tajjeb u għandju jittiehed b'kawtela. Tkellem mat-tabib tiegħek għal aktar informazzjoni.

Ix-xorb ta' l-alkoħol jista' temporanjament ibaxxilek il-pessjoni tad-demem. Jekk ħadt jew ser tieħu Tadalafil Mylan, evita li tixrob alkoħol eċċessiv (livell ta' alkoħol fid-demem ta' 0.08% jew aktar), minhabba li dan jista' jżid ir-riskju ta' sturdament meta tkun bil-wieqfa.

Fertilità

Meta ġew trattati l-klieb kien hemm tnaqqis fl-isperma u dan ġie osservat ukoll f'xi irġiel. Dan mhux probabbli li jwassal għal nuqqas ta' fertilità.

Sewqan u thaddim ta' magni

Xi rġiel li ħadu tadalafil fl-istudji kliniċi rrapurtaw li kellhom xi sturdament. Oqgħod attent kif tirrejaġixxi għall-pilloli qabel ma ssuq jew thaddem xi magni.

Tadalafil Mylan fih il-lactose

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib qabel ma tieħu din il-mediċina.

Tadalafil Mylan fih is-sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull pillola, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Tadalafil Mylan

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata tal-bidu hija ta' pillola waħda ta' 10 mg qabel l-attività sesswali. Madankollu, inti ġejt mogħti d-doża ta' pillola waħda ta' 20 mg minhabba li t-tabib iddeċieda li d-doża rakkomandata ta' 10mg hija ħafifa wisq.

Tista' tieħu tadalafil mill-inqas 30 minuta qabel l-attività sesswali.

Tadalafil jista' jibqa' effettiv sa 36 siegħa wara li tieħu l-pillola.

Tihux Tadalafil Mylan aktar minn darba kuljum. Tadalafil Mylan 10 mg u 20 mg huwa intenzjonat għall-użu qabel attività sesswali prevista u mhux irrakkomandat għall-użu kontinwu ta' kuljum.

Il-pilloli ta' Tadalafil huma għall-użu orali fl-irġiel biss. Ibla' l-pillola shiħa bi ftit ilma. Tista' tieħu Tadalafil Mylan mal-ikel jew fuq stonku vojta.

Jekk tieħu Tadalafil Mylan aktar milli suppost

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jista' jkollok xi effetti sekondarji kif deskritt f'sezzjoni 4.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekundarji possibbli

Bhal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekundarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Dawn l-effetti normalment ikunu ta' natura ħafifa jew moderata.

Jekk ikollok xi effetti sekundarji minn dawn li ġejjin ieqaf milli tuża l-mediċina u fittex lattenzjoni medika immedjatement:

- reazzjonijiet allergiċi li jinkludu raxx (frekwenza mhux komuni)
- uġiġħ fis-sider – tużax nitrati iżda fittex għajjnuna medika immedjatement (frekwenza mhux komuni)
- prijapiżmu, erezzjoni fit-tul u possibilment bl-uġiġħ wara li tieħu tadalafile (frekwenza rari). Jekk għandek din it-tip ta' erezzjoni, li ddum kontinwament għal aktar minn 4 sigħat għandek tikkuntattja liltabib immedjatement.
- telf tal-vista f'daqqa waħda (frekwenza rari).

Effetti sekundarji oħra kienu rrapportati.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni)

- uġiġħ ta' ras, uġiġħ tad-dahar. uġiġħ fil-muskoli, uġiġħ fid-dirgħajn u fir-riglejn, ħmura fil-wiċċ, imnieher miżdud, u indiġestjoni.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna)

- sturdament, uġiġħ fl-istonku, thossok imdardar, tirremetti, rifluss, vista mēajpra, uġiġħ fl-għajnejn, diffikulta biex tieħu n-nifs, il-presenza ta' demm fl-awrina, erezzjoni fit-tul, sensazzjoni li l-qalb qed tħabbat ħafna, rata tal-qalb mgħaġġla, pressjoni għolja tad-demm, pressjoni baxxa tad-demm, infrig, žanżin fil-widnejn, nefha tal-idejn, tas-saqajn jew tal-għekiesi, u thossok għajjen.

Rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna)

- ħass ħażin, konvulżjonijiet u telf temporanju tal-memorja, nefha fil-kpiepel ta' l-għajnejn, għajnejn ħomor, nuqqas jew telf tas-smiġħ f'daqqa u urtikarja (nfafet ħomor u bil-ħaqq fuq wiċċ il-gilda), ħrug ta' demm mill-pene, preżenza ta' demm fl-isperma u žieda fl-għaraq.

B'mod rari ġew ukoll irrapportati attakk tal-qalb u puplesija f'irgħiel li ħadu tadalafile. Ħafna minn dawn l-irgħiel kellhom problemi tal-qalb magħrufa minn qabel ma ħadu din il-mediċina.

B'mod rari, ġew irrappurtati każi ta' tnaqqis jew telf ta' vista, parzjali, temporanji jew permanenti f'għajn waħda jew fit-tnejn li huma.

F'irgħiel li ħadu tadalafile ġew irrapportati **xi effetti sekundarji oħra rari**, li ma dehrux f'studji kliniċi.

Dawn jinkludu:

- l-emikranja, nefha fil-wiċċ, reazzjonijiet allergiċi serji li jikkagunaw nefha fil-wiċċ jew filgrizmejn, raxxijiet severi fil-gilda, xi disturbji li jkollhom effett fuq il-fluss tad-demm fl-għajnejn, taħbit irregolari tal-qalb, angina u mewta kardijaka għal għarrieda..

L-effett sekundarju ta' sturdament ġie irrapportat b'mod aktar frekwenti fl-irgħiel 'il fuq minn 75 sena li kienu qed jieħdu tadalafile. Id-dijarea ġiet irrappurtata b'mod aktar frekwenti f'irgħiel li kellhom aktar minn 65 sena u li kienu qed jieħdu tadalafile.

Rappurtar tal-effetti sekundarji

Jekk ikollok xi effett sekundarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekundarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekundarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Tadalafil Mylan

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara 'JIS'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Din il-medicina m'għandhiex bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadexx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Tadalafil Mylan

- Is-sustanza **attiva** hi tadalafil. Kull pillola fiha 20 mg tadalafil.
- **Is-sustanzi mhux attivi l-oħra** huma:
Qalba tal-pillola: lactose anhydrous (ara sezzjoni 2 'Tadalafil Mylan fih il-lactose'), poloxamer 188, cellulose microcrystalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium laurilsulfate, silica colloidal anhydrous.
Kisja b'rita: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), triacetin.

Kif jidher Tadalafil Mylan u l-kontenut tal-pakkett

Tadalafil Mylan 20 mg hi pillola miksija b'rita, ta' lewn isfar ċar, tonda u bikonvessa, immarkata b' 'M' fuq naħa waħda tal-pillola u 'TL4' fuq in-naħa l-oħra.

Tadalafil Mylan 20 mg hu disponibbli f'pakketti tal-folji li jkun fihom 2, 4, 8, 12 u 24 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs,
69800 Saint-Priest,
Franza

Manifattur

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoye Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
L-Irlanda

Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom, 2900
L-Ungerija

Generics [UK] Limited
Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan UK Healthcare Limited
Building 20, Station Close
Potters Bar, EN6 1TL
Ir-Renju Unit

Mylan Germany GmbH
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe
Hessen, 61352,
Germany

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina , jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl
Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva (Lithuania)

BGP Products UAB
Tel: + 370 5 205 1288

България (Bulgaria)

Майлан ЕООД
Тел: + 359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl
Tel: + 32 (0)2 658 61 00
(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.
Tel: + 420 222 004 400

Magyarország (Hungary)

Mylan EPD Kft.
Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS
Tel: + 45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd
Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH
Tel: + 49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV
Tel: + 31 (0)20 426 3300

Eesti (Estonia)

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal
Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS
Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα (Greece)

Generics Pharma Hellas EPE
Τηλ: + 30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH
Tel: + 43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.
Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S
Tel: + 33 4 37 25 75 00

Hrvatska (Croatia)

Mylan Hrvatska d.o.o.
Tel: + 385 1 23 50 599

Ireland

Mylan Ireland Limited
Tel: + 353 (0) 87 1694982

Ísland

Icepharma hf
Tel: + 354 540 8000

Italia

Mylan Italia S.r.l.
Tel: + 39 02 612 46921

Κύπρος (Cyprus)

Varnavas Hadjipanayis Ltd
Τηλ: +357 222 077 23

Latvija

Mylan Healthcare SIA
Tel: + 371 676 05580

Portugal

Mylan, Lda.
Tel: + 351 21 412 72 56

România

BGP Products SRL
Tel: + 40 372 579 000

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.
Tel: + 386 1 23 63 180

Slovenská republika

Mylan s.r.o.
Tel: + 421 2 32 199 100

Suomi/Finland

Mylan Finland OY
Puh/Tel: + 358 20 720 9555

Sverige

Mylan AB
Tel: + 46 855 522 750

United Kingdom

Generics [UK] Ltd.
Tel: + 44 1707 853000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'**Sorsi ohra ta' informazzjoni**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu/>