

**ANNES I**

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT**

## 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Temomedac 5 mg kapsuli ibsin  
Temomedac 20 mg kapsuli ibsin  
Temomedac 100 mg kapsuli ibsin  
Temomedac 140 mg kapsuli ibsin  
Temomedac 180 mg kapsuli ibsin  
Temomedac 250 mg kapsuli ibsin

## 2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Temomedac 5 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 5 mg ta' temozolomide.

Temomedac 20 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 20 mg ta' temozolomide.

Temomedac 100 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 100 mg ta' temozolomide.

Temomedac 140 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 140 mg ta' temozolomide.

Temomedac 180 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 180 mg ta' temozolomide.

Temomedac 250 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 250 mg ta' temozolomide.

### *Eċċipjent b'effett magħruf*

Temomedac 5 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 87 mg anhydrous lactose.

Temomedac 20 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 72 mg anhydrous lactose u sunset yellow FCF (E 110).

Temomedac 100 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 84 mg anhydrous lactose.

Temomedac 140 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 117 mg anhydrous lactose.

Temomedac 180 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 150 mg anhydrous lactose.

Temomedac 250 mg kapsuli ibsin  
Kull kapsula iebsa fiha 209 mg anhydrous lactose.

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

### 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa (kapsula).

#### Temomedac 5 mg kapsuli ibsin

Il-kapsuli ibsin (tul ta' madwar, 16 mm) għandhom korp abjad opak u għatu b'żewġ strixxi b'linka hadra fuq l-għatu u b'"T 5 mg" b'linka hadra fuq il-korp.

#### Temomedac 20 mg kapsuli ibsin

Il-kapsuli ibsin (tul ta' madwar, 18 mm) għandhom korp abjad opak u għatu b'żewġ strixxi b'linka orangjo fuq l-għatu u b'"T 20 mg" b'linka orangjo fuq il-korp.

#### Temomedac 100 mg kapsuli ibsin

Il-kapsuli ibsin (tul ta' madwar, 20 mm) għandhom korp abjad opak u għatu b'żewġ strixxi b'linka roża fuq l-għatu u b'"T 100 mg" b'linka roża fuq il-korp.

#### Temomedac 140 mg kapsuli ibsin

Il-kapsuli ibsin (tul ta' madwar, 22 mm) għandhom korp abjad opak u għatu b'żewġ strixxi b'linka blu fuq l-għatu u b'"T 140 mg" b'linka blu fuq il-korp.

#### Temomedac 180 mg kapsuli ibsin

Il-kapsuli ibsin (tul ta' madwar, 22 mm) għandhom korp abjad opak u għatu b'żewġ strixxi b'linka ħamra fuq l-għatu u b'"T 180 mg" b'linka ħamra fuq il-korp.

#### Temomedac 250 mg kapsuli ibsin

Il-kapsuli ibsin (tul ta' madwar, 22 mm) għandhom korp abjad opak u għatu b'żewġ strixxi b'linka sewda fuq l-għatu u b'"T 250 mg" b'linka ħamra fuq il-korp.

### 4. TAGHRIF KLINIKU

#### 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Temomedac huwa indikat għall-kura ta':

- pazjenti adulti bi glijoblastoma multiforme li tkun għadha kemm giet iddijanostikata flimkien ma' radjuterapija (RT) u wara bħala monoterapija
- tfal b'età minn tliet snin 'il fuq, adolexxenti, u pazjenti adulti bi glijoma malinna, bħal glijoblastoma multiforme jew astrocitoma anaplastika, li jergħu jirkadu jew ikollhom avvanz talmarda wara li tkun ingħatat terapija standard.

#### 4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Temomedac għandu jiġi preskritt biss minn tobba b'esperjenza fil-kura onkoloġika ta' tumuri tal-moħħ.

Kura anti-emetika tista' tingħata (ara sezzjoni 4.4).

#### Pożoloġija

##### *Pazjenti adulti li jkunu għadhom kif ġew iddijanostikati bi glijoblastoma multiforme*

Temomedac jingħata flimkien ma' radjuterapija fokali (fażi konkomitanti) segwit b'mhux aktar minn 6 ċikli ta' b'monoterapija ta' temozolomide (TMZ) (fażi ta' monoterapija).

##### *Faži meta jingħataw flimkien*

TMZ jingħata b'mod orali b'doża ta' 75 mg/m<sup>2</sup> kuljum għal 42 jum flimkien ma' radjuterapija fokali

(60 Gy mogħtija fi 30 frazzjoni). Mhux irrakkomandat li jitnaqqsu d-dozi, iżda ttardjar jew waqfien tal-ghoti ta' TMZ għandu jiġi deċiż kull ġimgha skont kriterji ta' tossiċità ematoloġika u dik mhux ematoloġika. L-ghoti ta' TMZ jista' jitkompla fil-perijodu ta' 42 jum meta jkunu qed jingħataw flimkien (sa 49 jum) jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

- għadd assolut tan-newtrofili (ANC)  $\geq 1.5 \times 10^9/l$
- għadd tat-tromboċiti  $\geq 100 \times 10^9/l$
- tossiċità mhux ematoloġika ta' kriterju komuni tat-tossiċità (CTC) ta'  $\leq$  Grad 1 (hlief għal alopeċja, tqalligh u rimettar).

Waqf il-kura, l-għadd komplet tad-demem għandu jinkiseb kull ġimgha. L-ghoti ta' TMZ għandu jitwaqqaf għal xi żmien jew għal kollox waqt il-faži meta jkunu qed jingħataw flimkien skont il-kriterji ta' tossiċità ematoloġika u mhux ematoloġika kif jidher f'Tabella 1.

<i>Tabella 1. It-twaqqif momentanju jew definit tad-doži ta' TMZ meta jkunu qed jingħataw flimkien ir-radjuterapija u TMZ</i>		
Tossiċità	Twaqqif momentanju ta' TMZ <sup>a</sup>	Twaqqif definit ta' TMZ
Għadd assolut tan-newtrofili	$\geq 0.5$ u $< 1.5 \times 10^9/l$	$< 0.5 \times 10^9/l$
Għadd tat-tromboċiti	$\geq 10$ u $< 100 \times 10^9/l$	$< 10 \times 10^9/l$
Tossiċità mhux ematoloġika ta' CTC (hlief għal alopeċja, tqalligh, rimettar)	CTC Grad 2	CTC Grad 3 u 4

a: Il-kura b'TMZ mogħti b'mod konkomitanti tista' titkompla meta jintlaħqu dawn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin: għadd assolut tan-newtrofili  $\geq 1.5 \times 10^9/l$ ; għadd tat-tromboċiti  $\geq 100 \times 10^9/l$ ; tossiċità mhux ematoloġika ta' CTC ta'  $\leq$  Grad 1 (hlief għal alopeċja, tqalligh, rimettar).

#### *Faži ta' Monoterapija*

Erba' ġimghat wara li ntemmet il-faži konkomitanti ta' TMZ + RT, TMZ ikompli jingħata sa' 6 ċikli ta' kura b'monoterapija. Id-doża f'Ċiklu 1 (monoterapija) hija 150 mg/m<sup>2</sup> darba kuljum għal 5 ijiem segwiti minn 23 jum mingħajr kura. Fil-bidu ta' Ċiklu 2, id-doża tizzied għal 200 mg/m<sup>2</sup> jekk it-tossiċità mhux ematoloġika CTC għal Ċiklu 1 huwa Grad  $\leq 2$  (hlief għal alopeċja, tqalligh u rimettar), jekk l-għadd assolut tan-newtrofili (ANC) jkun  $\geq 1.5 \times 10^9/l$ , u l-għadd tat-tromboċiti jkun  $\geq 100 \times 10^9/l$ . Jekk id-doża ma tkunx giet miżjuda ma' Ċiklu 2, m'għandux ikun hemm zieda fid-doża fiċ-ċikli ta' wara. Ladarba d-doża tkun giet miżjuda, tinzamm għal 200 mg/m<sup>2</sup> kuljum fl-ewwel 5 ijiem ta' kull ċiklu li jkun imiss hlief jekk issehħ tossiċità. It-tnaqqis u t-twaqqif tad-doži waqt il-faži ta' monoterapija għandhom isiru skond f'Tabelli 2 u 3.

Waqf il-kura, l-għadd komplet tad-demem għandu jinkiseb f'Jum 22 (21 jum wara l-ewwel doża ta' TMZ). Id-doża għandha titnaqqas jew l-ghoti jitwaqqaf skont Tabella 3.

<i>Tabella 2. Il-livelli tad-doża ta' TMZ għall-kura bħala monoterapija</i>		
Livell tad-doża	Doża ta' TMZ (mg/m <sup>2</sup> /jum)	Kummenti
-1	100	Tnaqqis għal tossiċità li kienet seħħet qabel
0	150	Doża waqt Ċiklu 1
1	200	Doži waqt Ċikli 2 - 6 jekk ma jkunx hemm tossiċità

<i>Tabella 3. Tnaqqis jew twaqqif tad-doża ta' TMZ waqt kura b'monoterapija</i>		
Tossiċità	Naqqas TMZ b'livell ta' doża 1 <sup>a</sup>	Waqf TMZ
Għadd assolut tan-newtrofili	$< 1.0 \times 10^9/l$	Ara n-nota b ta' taħt
Għadd tat-tromboċiti	$< 50 \times 10^9/l$	Ara n-nota b ta' taħt
Tossiċità mhux ematoloġika ta' CTC (hlief għal alopeċja, tqalligh, rimettar)	CTC Grad 3	CTC Grad 4 <sup>b</sup>

a: Livelli tad-doża ta' TMZ huma elenkati f'Tabella 2.

- b: TMZ ghandu jitwaqqaf jekk:
- Livell tad-doża -1 (100 mg/m<sup>2</sup>) jibqa jirrizulta f'tossiçità inaçcettabbli
  - L-istess tossiçità mhux ematoloġika ta' Grad 3 (hliet għal alopeçja, tqalligh, rimettar) terġa tigrì wara tnaqqis fid-doża

### Pazjenti adulti u pedjatriçi minn 3 snin 'il fuq bi glijoma malinna rikorrenti jew progressiva

Çiklu ta' kura jikkonsisti minn 28 jum. F'pazjenti li qabel ma kinux ikkurati bil-kimoterapija, TMZ jittiehed mill-halq f'doża ta' 200 mg/m<sup>2</sup> darba kuljum għall-ewwel 5 ijiem, segwiti minn 23 jum ta' waqfien mill-kura (total ta' 28 jum). F'pazjenti li qabel kienu kkurati bil-kimoterapija, id-doża tal-bidu hija 150 mg/m<sup>2</sup> darba kuljum, li tkun miżjuda fit-tieni çiklu għal 200 mg/m<sup>2</sup> kuljum, għal 5 ijiem jekk ma jkunx hemm tossiçità ematoloġika (ara sezzjoni 4.4).

### Popolazzjonijiet speçjali

#### *Popolazzjoni pedjatrika*

F'pazjenti ta' 3 snin jew akbar, TMZ jintuża biss f'każ ta' glijoma malinna rikorrenti jew progressiva. L-esperjenza f'dawn it-tfal hija limitata ħafna (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1). Is-sigurtà u l-effikaçja ta' TMZ fit-tfal ta' taħt it-3 snin ma ġewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli.

#### *Pazjenti b'indeboliment epatiku jew renali*

Il-farmakokinetika ta' TMZ kienet kumparabbli f'pazjenti b'funzjoni epatika normali u f'dawk b'indeboliment epatiku ħafif jew moderat. M'hemmx informazzjoni disponibbli dwar l-għoti ta' TMZ f'pazjenti b'indeboliment epatiku serju (Child's Class C) jew b'indeboliment renali. Ibbażat fuq il-karatteristiçi farmakokinetiçi ta' TMZ, tnaqqis fid-doża x'aktarx li ma jkunx meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment epatiku serju jew kwalunkwe grad ta' indeboliment renali. Madankollu, attenzjoni hi meħtieġa meta TMZ jingħata f'dawn il-pazjenti.

#### *Pazjenti anzjani*

Ibbażat fuq analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni f'pazjenti ta' età bejn 19 - 78 sena, it-tneħħija ta' TMZ mhijiex affettwata mill-età. Madankollu, jidher li pazjenti anzjani (> 70 sena) għandhom riskju akbar li jkollhom newtropsenija u trombocitopenija (ara sezzjoni 4.4).

### Metodu ta' kif għandu jingħata

Temomedac kapsuli ibsin għandhom jittiehdu meta wiehed ikun sajjem.

Il-kapsuli għandhom jinbelġu shaħ ma' tazza ilma u m'għandhomx jifthuhom jew jomghoduhom.

Jekk ir-rimettar isehħ wara l-għoti tad-doża, it-tieni doża m'għandhiex tingħata dakinhar.

### **4.3 Kontra-indikazzjonijiet**

Sensittività eçcessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wiehed mill-eçcipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Sensittività eçcessiva għal dacarbazine (DTIC).

Majelosoppressjoni severa (ara sezzjoni 4.4).

#### 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

##### Infezzjonijiet opportunistiċi u attivazzjoni mill-ġdid ta' infezzjonijiet

Ġew osservati infezzjonijiet opportunistiċi (bħal pnemmonja kkawżata minn *Pneumocystis jirovecii*) u attivazzjoni mill-ġdid ta' infezzjonijiet (bħal HBV, CMV) waqt il-kura b'TMZ (ara sezzjoni 4.8).

##### Pnemmonja bi *Pneumocystis jirovecii*

Pazjenti li nġhataw TMZ flimkien ma' RT fi prova gwida għall-iskeda mtawla ta' 42 jum intwerew li kellhom riskju partikolari li taqbadhom pulmonite b' *Pneumocystis jirovecii* (PCP). Għalhekk, hija meħtieġa profilassi kontra PCP għall-pazjenti kollha li jkunu qegħdin jirċievu TMZ flimkien ma' RT għall-kors ta' 42 jum (b'massimu ta' 49 jum), irrispettivament mill-ġhadd tal-limfociti. Jekk issehh limfopenija, huma għandhom jibqgħu għaddejnin bil-profilassi sakemm jirkupraw mil-limfopenija għal  $\text{Grad} \leq 1$ .

Jista' jkun hemm aktar każijiet ta' PCP meta TMZ jingħata għal kors itwal. Madankollu, il-pazjenti kollha li qed jirċievu TMZ, l-aktar dawk li qed jirċievu steroidi, għandhom jinżammu taħt osservazzjoni mill-qrib għall-PCP, ikun xi jkun il-kors. Każijiet ta' insuffiċjenza respiratorja fatali kienu rrapportati f'pazjenti li jużaw TMZ, speċjalment flimkien ma' dexamethasone jew steroidi oħrajn.

##### HBV

Kienet irrappurtata epatite minhabba l-attivazzjoni mill-ġdid tal-virus tal-epatite B (HBV - *hepatitis B virus*), li f'xi każijiet wasslet għall-mewt. Għandhom jiġu kkonsultati esperti fuq mard tal-fwied qabel tinbeda l-kura f'pazjenti b'seroloġija pożittiva għall-epatite B (inkluż dawk b'mard attiv). Waqt il-kura l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati u mmanigġjati kif xieraq.

##### Meningoċefalite herpetika

F'każijiet ta' wara t-tqegħid fis-suq, kienet osservata meningoċefalite herpetika (inklużi każijiet fatali) f'pazjenti li kienu qed jingħataw TMZ f'kombinazzjoni ma' radjuterapja, inklużi każijiet ta' għoti konkomitanti ta' steroidi.

##### Tossiċità fil-fwied

Ħsara fil-fwied, li tinkludi insuffiċjenza fatali tal-fwied, kienet irrappurtata f'pazjenti kkurati b'TMZ (ara sezzjoni 4.8). Testijiet tal-funzjoni tal-fwied fil-linja bażi għandhom isiru qabel il-bidu tal-kura. Jekk dawn ma jkunux normali, it-tobba għandhom jistmaw il-benefiċċju u r-riskju qabel ma jibdew temozolomide, inkluża l-possibbiltà ta' insuffiċjenza fatali tal-fwied. Għall-pazjenti fuq ċiklu ta' kura ta' 42 jum it-testijiet tal-funzjoni tal-fwied għandhom jiġu ripetuti f'nofs dan iċ-ċiklu. Għall-pazjenti kollha, it-testijiet tal-funzjoni tal-fwied għandhom jiġu ċċekkjati wara kull ċiklu ta' kura. Għall-pazjenti b'anormalitajiet sinifikanti fil-funzjoni tal-fwied, it-tobba għandhom jistmaw il-benefiċċju u r-riskju li jkomplu l-kura. Tossiċità fil-fwied tista' ssehh diversi ġimġhat jew aktar wara l-aħħar kura b'temozolomide.

##### Tumuri malinni

Każijiet ta' sindrome majelodisplastika u tumuri sekondarji, inkluża lewkimja majelojda kienu irrappurtati b'mod rari hafna (ara sezzjoni 4.8).

##### Terapja kontra t-tqalligh

Dardir u rimettar isehhu b'mod komuni hafna b'TMZ. Terapja kontra t-tqalligh tista' tingħata qabel jew wara li jingħata TMZ.

### Pazjenti adulti bi glioblastoma multiforme li tkun għadha kif giet iddijanostikata

Kura biex tilqa' għat-tqalligh hija rakkomandata qabel l-ewwel doża tal-fazi konkomitanti u hija rakkomandata hafna waqt il-fazi b' monoterapija.

### Pazjenti bi glijoma malinna rikorrenti jew progressiva

Pazjenti li fiċ-ċikli ta' kura li ngħataw qabel irrimettew hafna (Grad 3 jew 4) jista' jkollhom bżonn kura kontra t-tqalligh.

### Parametri tal-laboratorju

Pazjenti kkurati b' TMZ jista' jkollhom majelosoppressjoni, inkluż panċitopenija għal tul ta' żmien, li tista' twassal għal anemija aplastika, li f' xi każijiet kellha riżultat fatali. F' xi każijiet, esponiment fl-istess hin għal prodotti mediċinali assoċjati ma' anemija aplastika, inkluż carbamazepine, phenytoin, u sulfamethoxazole/trimethoprim, jikkumplikaw l-valutazzjoni. Qabel id-dożaġġ, dawn il-parametri tal-laboratorji li għejjin iridu jintlaħqu: ANC  $\geq 1.5 \times 10^9/l$  u għadd tal-plejtlets  $\geq 100 \times 10^9/l$ . Għadd komplet tad-demem għandu jinkiseb fit-22 jum (21 jum wara l-ewwel doża) jew sa 48 siegħa minn dak il-jum, u kull ġimgħa sakemm l-ANC ikun  $> 1.5 \times 10^9/l$  u l-għadd tal-plejtlets ikun  $> 100 \times 10^9/l$ . Jekk l-ANC jaqa' għal  $< 1.0 \times 10^9/l$  jew l-għadd tal-plejtlets ikun  $< 50 \times 10^9/l$  waqt xi ċiklu, iċ-ċiklu li jmiss għandu jitnaqqas b' livell wiehed ta' doża (ara sezzjoni 4.2). Il-livelli tad-doża jinkludu 100 mg/m<sup>2</sup>, 150 mg/m<sup>2</sup>, u 200 mg/m<sup>2</sup>. L-inqas doża rikkmandata hija ta' 100 mg/m<sup>2</sup>.

### Popolazzjoni pedjatrika

M'hemmx esperjenza klinika bl-użu ta' TMZ fi tfal li għandhom inqas minn 3 snin. Esperjenza fi tfal akbar u adolexxenti hija limitata hafna (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1).

### Pazjenti anzjani (> 70 sena)

Pazjenti anzjani jidhru li huma friskju akbar li jkollhom newtrogenija u tromboċitopenja, meta mqabbla ma' pazjenti iżgħar. Għalhekk, attenzjoni speċjali trid tingħata meta TMZ jingħata lill-pazjenti anzjani.

### Pazjenti nisa

Nisa li jista' jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva biex jevitaw it-tqala waqt li jkun qad jirċievu TMZ, u għal mill-anqas 6 xhur wara t-tlestija tat-trattament.

### Pazjenti rġiel

Irgiel li qed ikunu ttrattati b' TMZ huma kunsiljati biex ma jkollhomx tfal sa mill-anqas 3 xhur wara li jkun irċievu l-aħħar doża u biex jieħdu parir dwar il-krijokonservazzjoni ta' l-isperma qabel it-trattament (ara sezzjoni 4.6).

### Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-galactose, nuqqas ta' Lapp lactase jew assorbiment hażin ta' glucose-galactose m'għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f' kull kapsula iebsa, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

### Tagħrif addizzjonali għall-Temomedac 20 mg kapsuli ibsin

Is-sustanza mhux attiva sunset yellow FCF (E110) inkluża fil-qoxra tal-kapsuli tista' tikkawża reazzjonijiet allergiċi.

#### 4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Fi studju separat ta' fażi I, l-ghoti ta' TMZ ma' ranitidine ma bidilx il-grad ta' assorbiment ta' temozolomide jew l-esponiment għall-metabolit attiv tiegħu monomethyl triazenoimidazole carboxamide (MTIC).

L-ghoti ta' TMZ mal-ikel irriżulta fi tnaqqis ta' 33 % fis- $C_{max}$  u fi tnaqqis ta' 9 % fl-erja taħt il-kurva (AUC).

Billi ma jistax ikun eskluż li t-tibdil f' $C_{max}$  huwa klinikament sinifikanti, Temomedac għandu jittiehed mingħajr ikel.

Ibbażat fuq analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni fi provi ta' fażi II, l-ghoti flimkien ta' dexamethasone, prochlorperazine, phenytoin, carbamazepine, ondansetron, antagonisti tar-riċettur ta'  $1-H_2$ , jew phenobarbital ma biddlax it-tneħħija ta' TMZ. L-ghoti flimkien ma' valproic acid kien assoċjat ma' tnaqqis żgħir iżda statistikament rilevanti fit-tneħħija ta' TMZ.

Ma saru l-ebda studji biex jiddeterminaw l-effett ta' TMZ fuq il-metabolizmu jew l-eliminazzjoni ta' prodotti mediċinali oħra. Madankollu, billi TMZ ma jgħaddix minn metabolizmu tal-fwied u ma tantx jehel mal-proteini tad-demem, x'aktarx li ma jaffettwax il-farmakokinetiċi ta' prodotti mediċinali oħra (ara sezzjoni 5.2).

L-użu ta' TMZ flimkien ma' sustanzi majelosoppressivi oħra jista' jżid il-possibilità ta' majelosoppressjoni.

##### Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta' interazzjoni twettqu biss f'adulti.

#### 4.6 Fertilità, tqala u treddigh

##### Tqala

M'hemmx dejta dwar nisa tqal. Fi studji ta' qabel l-użu kliniku fuq firien u fniek li kienu qed jirċievu 150 mg/m<sup>2</sup> TMZ, kienu muriċja -teratoġeniċità u/jew effett tossiku fuq il-fetu (ara sezzjoni 5.3). Temomedac m'għandux jingħata lil nisa waqt it-tqala. Jekk l-użu waqt it-tqala jkun ikkunsidrat, il-pazjenta għandha tkun infurmata dwar ir-riskju potenzjali għall-fetu.

##### Treddigh

Mhux magħruf jekk TMZ jgħix eliminat fil-halib tas-sider tal-bniedem; għalhekk, it-treddigh għandu jitwaqqaf waqt il-kura b'TMZ.

##### Nisa li jistgħu jgħorġu tqal

Nisa li jistgħu jgħorġu tqal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva biex jevitaw it-tqala waqt li jkunu qed jieħdu TMZ, u għal mill-anqas 6 xhur wara t-tlestija tat-trattament.

##### Fertilità tar-raġel

TMZ jista' jkollu effetti ġenotossiċi. Għalhekk, irġiel li qed ikunu ttrattati għandhom jużaw miżuri effettivi ta' kontraċezzjoni u jkunu kkunsiljati biex ma jkollhomx tfal sa mill-anqas 3 xhur wara l-aħħar doża, u biex jieħdu parir dwar il-krijokonservazzjoni ta' l-isperma qabel il-kura minhabba l-possibbiltà ta' infertilità irreversibbli minhabba t-terapija b'TMZ.

#### 4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni



TMZ għandu effett żgħir fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba gheja kbira u nghas (ara sezzjoni 4.8).

#### 4.8 Effetti mhux mixtieqa

##### Sommarju tal-profil tas-sigurtà

##### Esperjenza mill-provi kliniċi

F'pazjenti ttrattati b'TMZ fi provi kliniċi, l-aktar reazzjonijiet avversi komuni kienu nawsja, rimettar, stitikezza, anoreksja, ugiġh ta' ras, gheja, konvulzjonijiet, u raxx. Il-parti l-kbira tar-reazzjonijiet avversi ematoloġiċi ġew rrapportati b' mod komuni; il-frekwenza ta' sejbiet tal-laboratorju ta' Grad 3-4 hija pprezentata wara Tabella 4.

Ghall-pazjenti bi glijoma rikurrenti jew progressiva, nawsja, (43 %) u rimettar (36 %) ġeneralment kienu ta' Grad 1 jew 2 (0 – 5 episodji ta' rimettar f'24 siegħa) u jew għaddew mingħajr trattament jew ġew ikkontrollati malajr b'terapija antiemetika standard. L-inċidenza ta' nawsja u rimettar severi kienet ta' 4 %.

##### Lista ta' reazzjonijiet avversi miġbura f'tabella

Reazzjonijiet avversi osservati fi studji kliniċi u rrapportati minn użu ta' TMZ wara t-tqegħid fis-suq huma elenkati f'Tabella 4. Dawn ir-reazzjonijiet huma klassifikati skont is- Sistema tal-Klassifika tal-Organi u l-frekwenza. Il-gruppi tal-frekwenza huma mqassma skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni hafna ( $\geq 1/10$ ); Komuni ( $\geq 1/100$  sa  $< 1/10$ ); Mhux komuni ( $\geq 1/1,000$  sa  $< 1/100$ ); Rari ( $\geq 1/10,000$  sa  $< 1/1,000$ ); Rari hafna ( $< 1/10,000$ ); Mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-*data* disponibbli). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu lewwel.

<i>Tabella 4. Reazzjonijiet avversis f'pazjenti ttrattati b'temozolomide</i>	
<b>Infezzjonijiet u infestazzjonijiet</b>	
Komuni:	Infezzjonijiet, herpes zoster, faringite <sup>a</sup> , kandidjażi fil-ħalq
Mhux komuni:	Infezzjoni opportunistika (inkluża PCP), sepsis <sup>†</sup> , meningoencefalite erpetika <sup>†</sup> , infezzjoni b'CMV, attivazzjoni mill-ġdid ta' CMV, virus tal-epatite B <sup>†</sup> , herpes simplex, attivazzjoni mill-ġdid ta' infezzjoni, infezzjoni f'ferita, gastroenterite <sup>b</sup>
<b>Neplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati</b>	
Mhux komuni:	Sindrome mijelodisplastiku (MDS - <i>myelodysplastic syndrome</i> ), tumuri malinni sekondarji, inkluża lewkimja mijelojd
<b>Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika</b>	
Komuni:	Newtrogenija bid-deni, newtrogenija, tromboċitopenija, limfopenija, lewkopenija, anemija
Mhux komuni:	Panċitopenija li tiehu fit-tul, anemija aplastika <sup>†</sup> , panċitopenija, petekje
<b>Disturbi fis-sistema immuni</b>	
Komuni:	Reazzjoni allergika
Mhux komuni:	Anafilassi
<b>Disturbi fis-sistema endokrinarja</b>	
Komuni:	Cushingoid <sup>c</sup>
Mhux komuni:	Dijabete insipidus

Tabella 4. Reazzjonijiet avvesris f'pazjenti ttrattati b'temozolomide

<b>Disturbi fil-metabolizmu u n-nutrizzjoni</b>	
Komuni ħafna:	Anoreksja
Komuni:	Iperglicemija
Mhux komuni:	Ipokalmija, zieda fl-alkaline phosphatase
<b>Disturbi psikjatriċi</b>	
Komuni:	Aġitazzjoni, amnesija, depressjoni, ansjetà, konfużjoni, insomnija
Mhux komuni:	Disturb fl-imġiba, burdata tinbidel malajr, allucinazzjoni, apatija
<b>Disturbi fis-sistema nervuża</b>	
Komuni ħafna:	Konvulżjonijiet, emiparesi, afasja/difasja, uġiġh ta' ras
Komuni:	Atassja, bilanċ indebolit, konjizzjoni indebolita, koncentrazzjoni indebolita, koxjenza mnaqqsa, sturdament, ipoestesija, memorja indebolita, disturb newroloġiku, newropatija <sup>d</sup> , parestesija, hedla ta' nġhas. disturb fit-tahdit, tahsir tat-toghma, roġħda
Mhux komuni:	Status epilepticus, emipleġja, disturb ekstrapiramidali, parożmija, mixja mhux normali, iperesesija, disturb fis-sensi, koordinazzjoni mhux normali
<b>Disturbi fl-ġhajnejn</b>	
Komuni:	Emijanopja, vista mċajpra, disturb fil-vista <sup>e</sup> , difett fil-kamp viżiv, diplopja, uġiġh fl-ġħajn
Mhux komuni:	Tnaqqis fl-akutezza tal-vista, ġħajnejn xotti
<b>Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika</b>	
Komuni:	Truxija <sup>f</sup> , vertigini, tinnitus, uġiġh fil-widna <sup>g</sup>
Mhux komuni:	Indeboliment fis-smiġh, iperakużi, otite medja
<b>Disturbi fil-qalb</b>	
Mhux komuni:	Palpitazzjoni
<b>Disturbi vaskulari</b>	
Komuni:	Emorraġija, emboliżmu fil-pulmun, trombozi fil-vini tal-fond, pressjoni ġħolja
Mhux komuni:	Emorraġija ċerebrali, fwawar, fwawar ta' shana
<b>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali</b>	
Komuni:	Pulmonite, qtuġh ta' nifs, sinożite, bronkite, soġħla, infezzjoni fil-parti ta' fuq tal-apparat tan-nifs
Mhux komuni:	Insuffiċjenza respiratorja <sup>†</sup> , pulmonite tal-interstizju/pulmonite, fibrozi fil-pulmun, kongestjoni fl-imnieħer
<b>Disturbi gastrointestinali</b>	
Komuni ħafna:	Dijarea, stitikezza, nawsja, rimettar
Komuni:	Stomatite, uġiġh fl-addome <sup>h</sup> , dispepsja, disfagja
Mhux komuni:	Distenzjoni tal-addome, inkontinenza tal-ippurgar, disturb gastrointestinali, murliti, ħalq xott
<b>Disturbi fil-fwied u fil-marrara</b>	
Mhux komuni:	Insuffiċjenza tal-fwied <sup>†</sup> , ħsara fil-fwied, epatite, kolestasi, iperbilirubinimja
<b>Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda</b>	

<i>Tabella 4. Reazzjonijiet avvesris f'pazjenti ttrattati b'temozolomide</i>	
Komuni hafna:	Raxx, alopeċja
Komuni:	Eritema, ġilda xotta, ħakk
Mhux komuni:	Nekrolisi tossika tal-epidermide, sindrome ta' Stevens-Johnson, anġjoedima, eritema multiforme, eritroderma, il-ġilda taqa' qxur qxur, reazzjoni ta' sensittività eċċessiva għad-dawl, urtikarja, eksantema, dermatite, zieda fil-ħruġ tal-ġħaraq, pigmentazzjoni mhux normali
Mhux magħrufa:	Reazzjoni għall-medicina b'eosinofilja u sintomi sistemici (DRESS - <i>Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms</i> )
<b>Disturbi muskoluskeletriċi u tat-tessuti konnettivi</b>	
Komuni:	Mijopatija, dgħufija fil-muskoli, artralġja, uġiġħ fid-dahar, uġiġħ muskoluskeletriku, mijalġja
<b>Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarja</b>	
Komuni:	Żieda fil-frekwenza tal-awrina, inkontinenza tal-awrina
Mhux komuni:	Disurja
<b>Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider</b>	
Mhux komuni:	Emorraġija mill-vaġina, menorraġja, amenorrea, vaginite, uġiġħ fis-sider, impotenza
<b>Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata</b>	
Komuni hafna:	Gheja
Komuni:	Deni, sintomi bħal tal-influwenza, astenja, telqa tal-ġisem mingħajr sinjali ta' mard, uġiġħ, edima, edima periferali <sup>i</sup>
Mhux komuni:	Aggravar tal-kondizzjoni, roġħda esagerata flimkien ma' deni u tkexkix ta' bard, edima fil-wieċ, bidla fil-kulur fl-ilsien, ġħatx, disturb fis-snien
<b>Investigazzjonijiet</b>	
Komuni:	Żieda fil-livelli tal-enzimi tal-fwied <sup>l</sup> , tnaqqis fil-piż, zieda fil-piż
Mhux komuni:	Żieda ta' gamma-glutamyltransferase
<b>Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta' xi proċedura</b>	
Komuni:	Korriment ikkawżat minn radjazzjoni <sup>k</sup>

<sup>a</sup> Tinkludi farniġite, farinġite tal-immieħer u l-faringi, farinġite kkawżata minn Streptokokki

<sup>b</sup> Tinkludi gastroenterite, gastroenterite kkawżata minn virus

<sup>c</sup> Tinkludi cushingoid, sindrome ta' Cushing

<sup>d</sup> Tinkludi newropatija, newropatija periferali, polineuropatija, newropatija periferali tas-sensi, newropatija periferali motorja

<sup>e</sup> Tinkludi indeboliment fil-vista, disturb fl-ġħajnejn

<sup>f</sup> Tinkludi truxija, truxija bilaterali, truxija newrosensorja, truxija unilaterali

<sup>g</sup> Tinkludi uġiġħ fil-widna, skumdità fil-widna

<sup>h</sup> Tinkludi uġiġħ fl-addome, uġiġħ fil-parti t'isfel tal-addome, uġiġħ fin-naħa ta' fuq tal-addome, skumdità fl-addome

<sup>i</sup> Tinkludi edima periferali, nefħa periferali

<sup>j</sup> Tinkludi zieda fit-test tal-funzjoni tal-fwied, zieda fl-alanine aminotransferase, zieda fl-aspartate aminotransferase, zieda fl-enzimi tal-fwied

<sup>k</sup> Tinkludi korriment ikkawżat minn radjazzjoni, korriment fil-ġilda kkawżat minn radjazzjoni

<sup>†</sup> Inkluzi każijiet b'riżultat fatali

*Glioblastoma multiforme li tkun għadha kif ġiet iddijanostikata*

*Riżultati tal-laboratorju*

Majelosuppressjoni (newtrogenija u tromboċitopenija), li hija maghrufa bhala tossiċità li tillimita d-doża ghal hafna sustanzi ċitotossiċi, inkluż TMZ, sehhet. Meta l-anormalitajiet tal-laboratorju u l-avvenimenti avversi kienu kkombinati tul il-fażijiet ta' kura konkomitanti u dik bhala monoterapija, kienu osservati anormalitajiet ta' Grad 3 jew ta' Grad 4 fin-newtrofili, inkluż avvenimenti newtrogeniċi, fi 8 % tal-pazjenti. Anormalitajiet ta' Grad 3 jew ta' Grad 4 fit-tromboċiti, inkluż effetti tromboċitopeniċi, dehru f' 14 % tal-pazjenti li nghataw TMZ.

### Glijoma malinna rekurrenti jew progressiva

#### *Riżultati tal-laboratorju*

Tromboċitopenija u newtrogenija ta' Grad 3 jew 4 sehhew f' 19 % u 17 %, rispettivament, tal-pazjenti kkurati ghal glijoma malinna. Minhabba f'hekk kellhom jittiehdu l-isptar u/jew kellu jitwaqqaf TMZ f' 8 % u 4 %, rispettivament. Majelosuppressjoni setgħet tkun imbassra (normalment fl-ewwel ftit ċikli, bl-aktar punt baxx ma' Jum 21 u Jum 28), u l-irkupru kien mgħaġġel, normalment fi żmien 1 - 2 ġimgħat. Ma kienx hemm sinjali ta' majelosuppressjoni kumulattiva. It-tromboċitopenija żżid ir-riskju ta' emorragija, u meta jkun hemm newtrogenija jew lewkopenija jkun hemm riskju akbar ta' infezzjoni.

#### *Sess*

F'analizi bil-farmakokinetiċi ta' popolazzjoni fl-esperjenza bi prova klinika kien hemm 101 mara u 169 raġel li għalihom il-valuri l-aktar baxxi tan-newtrofili kienu disponibbli u 110 mara u 174 raġel li għalihom il-valuri l-aktar baxxi tal-plejtlets kienu disponibbli. Kien hemm rati oghla ta' newtrogenija ta' Grad 4 ( $ANC < 0.5 \times 10^9/l$ ), 12 % vs 5 %, u tromboċitopenija ( $< 20 \times 10^9/l$ ), 9 % vs 3 % fin-nisa u l-irġiel fl-ewwel ċiklu tat-terapija. F'set ta' dejta għal glijoma b'400 individwu, newtrogenija ta' Grad 4 sehhet fi 8 % tan-nisa vs 4 % ta' l-irġiel u tromboċitopenija ta' Grad 4 fi 8 % tan-nisa vs 3 % ta' l-irġiel fl-ewwel ċiklu tat-terapija. Fi studju b'288 individwu bi *glioblastoma multiforme* li għadha kif għet iddijanostikata, newtrogenija ta' Grad 4 sehhet fi 3 % tan-nisa vs 0 % tal-irġiel u tromboċitopenija ta' Grad 4 sehhet f' 1 % tan-nisa vs 0 % tal-irġiel fl-ewwel ċiklu tat-terapija.

### Popolazzjoni pedjatrika

TMZ mill-halq ġie studjat f'pazjenti pedjatriċi (età ta' 3-18-il sena) bi glijoma rikorrenti taz-zokk ċentrali tal-moħħ jew astroċitoma rikorrenti ta' grad għoli, f'kors fejn ingħata kuljum għal 5 ijiem kull 28 jum. Ghalkemm id-dejta hija limitata, it-tolleranza fit-tfal hija mistennija li tkun l-istess bhal dik fl-adulti. Is-sigurtà ta' TMZ fi tfal ta' taħt it-3 snin għadha ma għetx stabbilita.

### Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professionisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz **tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imnizzla f' [Appendiċi V](#)**.

## **4.9 Doża eċċessiva**

Doži ta' 500, 750, 1,000, u 1,250 mg/m<sup>2</sup> (doża totali kull ċiklu matul 5 ijiem) ġew evalwati klinikament f'pazjenti. Kien hemm limitazzjoni tad-doża minhabba tossiċità ematoloġika li kienet irrapportata ma' kwalunkwe doża iżda hu mistenni li tkun aktar serja b' doži aktar qawwija. Doża eċċessiva ta' 10,000 mg (doża totali f' ċiklu wiehed, matul 5 ijiem) ittiehdet minn pazjent u r-reazzjonijiet avversi rrapportati kienu panċitopenija, deni, kollass ta' diversi organi u mewt. Hemm rapporti ta' pazjenti li ħadu d-doża rrakkomandata għal aktar mill-5 ijiem tat-trattament (sa 64 jum) b'effetti avversi rrapportati li jinkludu suppressjoni tal-mudullun, b'infezzjoni jew mingħajr infezzjoni, f'xi każijiet li kienu serji u fit-tul u li wasslu għall-mewt. Fil-każ ta' doża eċċessiva, evalwazzjoni ematoloġika hija meħtieġa. Miżuri ta' appoġġ għandhom ikunu pprovduti kif meħtieġ.

## 5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

### 5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi – alkylating agents oħra, kodiċi ATC: L01A X 03

#### Mekkaniżmu ta' azzjoni

Temozolomide huwa triazene, li fil-pH fiżjoloġiku jinbidel malajr f' sustanza attiva monomethyl triazenoimidazole carboxamide (MTIC). Huwa maħsub li ċ-ċitotossicità ta' monomethyl triazenoimidazole carboxamide (MTIC) hija primarjament minħabba l-alkylation f'pożizzjoni O<sup>6</sup> ta' guanine, b'alkylation addizzjonali li sseħħ ukoll f'pożizzjoni N<sup>7</sup>. Ġrieħi ċitotossiċi li jiżviluppaw sussegwentement huma maħsuba li jinvolvu t-tiswija anormali tal-methyl adduct.

#### Effikaċja klinika u sigurtà

##### *Glioblastoma multiforme li tkun għadha kif giet iddijanostikata*

Total ta' 573 pazjent ġew randomised biex jirċievu jew TMZ + RT (n = 287) jew RT waħdu (n = 286). Il-pazjenti fil-fergħa ta' TMZ + RT irċeview flimkien TMZ (75 mg/m<sup>2</sup>) darba kuljum, bdew fl-ewwel jum ta' RT sa l-aħħar jum ta' RT għal 42 jum (sa mhux aktar minn 49 jum). Dan kien segwit b' monoterapija ta' TMZ (150 – 200 mg/m<sup>2</sup>) f' Jiem 1 – 5 ta' kull ċiklu ta' 28 jum sa 6 ċikli, bdew 4 ġimgħat wara li ntemmet r-RT. Pazjenti fil-fergħa tal-kontroll ingħataw RT biss. Terapija biex tilqa għall-pulmonite b' *Pneumocystis jirovecii* (PCP) kienet meħtieġa waqt it-terapija bl-RT u b' dik ikkombinata ma' TMZ.

TMZ kien mogħti bhala terapija tas-salvataġġ fil-fazi ta' follow-up f' 161 pazjent mill-282 (57 %) fil-fergħa b' RT waħdu, u f' 62 pazjent mill-277 (22 %) fil-fergħa ta' TMZ + RT.

Il-proporzjon tal-periklu (HR) għas-sopravivenza ġenerali kienet ta' 1.59 (95 % CI għal HR = 1.33 - 1.91) b' log rank p < 0.0001 favur il-fergħa ta' TMZ. Il-probabilità stmata li jkun hemm sopravivenza ta' sentejn jew aktar (26 % vs 10 %) hija oghla għall-fergħa ta' RT + TMZ. Iż-żieda ta' TMZ flimkien ma' RT, segwit b' TMZ waħdu fil-kura ta' pazjenti bi glioblastoma multiforme li tkun għadha kif giet iddijanostikata wasslet għal titjib fis-sopravivenza ġenerali (OS) b' mod statistikament sinifikanti meta mqabbel ma' RT waħedha (Figura 1).




Figura 1 Kurvi Kaplan-Meier għas-sopravivenza ġenerali (popolazzjoni intent-to-treat)

Ir-riżultati mill-prova ma kinux konsistenti fis-sottogrupp ta' pazjenti bi status baxx ta' prestazzjoni (WHO PS = 2, n = 70), fejn is-sopravivenza globali u ż-żmien sal-progressjoni tal-marda kienu simili fiż-żewġ gruppi. Madankollu, ma jidhirx li hemm xi riskji li ma jistgħux jiġu aċċettati f'dan is-sottogrupp ta' pazjenti.

#### Glijoma malinna rikorrenti jew progressiva

Dejta dwar l-effikaċja klinika f'pazjenti bi glioblastoma multiforme (Status ta' prestazzjoni ta' Karnofsky [KPS]  $\geq$  70), progressiva jew rikorrenti wara operazzjoni u RT, kienet ibbażata fuq żewġ provi kliniċi b'TMZ orali. Wahda kienet prova mhux komparattiva f'138 pazjent (29 % kienu rċevew ilkemoterapija qabel), u l-oħra kienet prova randomized kontrollata b'mod attiv ta' TMZ vs procarbazine f'total ta' 225 pazjent (67 % kienu rċevew trattament qabel bil-kemoterapija bbażata fuq nitrosourea). Fiż-żewġ provi, il-fini primarju kien is-sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) kif definita minn skans ta' MRI jew mis-sistema newroloġika li tmur għall-aġħar. Fl-istudju mhux komparattiv, il-PFS wara 6 xhur kien ta' 19 %, is-sopravivenza mingħajr progressjoni medjana kienet ta' 2.1 xhur, u l-medjan tas-sopravivenza totali kien ta' 5.4 xhur. Ir-rata ta' rispons oġġettiv (ORR) ibbażata fuq skans ta' MRI kienet ta' 8 %.

Fil-prova randomised ikkontrollata b'mod attiv, l-PFS ma' 6 xhur kien akbar b'mod sinifikanti għal TMZ milli għal procarbazine (21 % vs 8 %, rispettivament – chi-square p = 0.008) bil-PFS medjan ta' 2.89 u 1.88 xhur rispettivament (log rank p = 0.0063). Is-sopravivenza medjana kienet ta' 7.34 u 5.66 xhur għal TMZ u procarbazine, rispettivament (log rank p = 0.33). Mas-6 xhur, il-porzjon tal-pazjenti li baqgħu hajjin kien oġħla b'mod sinifikanti fil-fergħa ta' TMZ (60 %) meta mqabbel mal-fergħa ta' procarbazine (44 %) (chi-square p = 0.019). F'pazjenti li nġhataw il-kemoterapija qabel, il-benefiċċju kien indikat f'dawk b'KPS ta'  $\geq$  80.

Tagħrif dwar iż-żmien meta l-istat newroloġiku mar għall-aġħar iffavorixxa TMZ fuq procarbazine, kif għamel it-tagħrif dwar iż-żmien meta l-istatus ta' prestazzjoni mar għall-aġħar (tnaqqis għal KPS ta' < 70 jew tnaqqis b'mill-inqas 30 punt). Iż-żminijiet medjani għall-progressjoni f'dawn l-endpoints varja minn 0.7 sa 2.1 xhur aktar għal TMZ milli għal procarbazine (log rank p = <math>.</math>01 sa 0.03).

#### Astroċitoma anaplastika rikorrenti

Fi prova multiċentrika, prospettiva ta' fażi II li evalwat is-sigurtà u l-effikaċja ta' TMZ orali fit-trattament ta' pazjenti b'astroċitoma anaplastika wara l-ewwel rikaduta, wara 6 xhur il-PFS kienet ta'

46 %. Il-PFS medjana kienet ta' 5.4 xhur. Il-medjan tas-sopravivenza totali kien ta' 14.6 xhur. Ir-rata ta' rispons, ibbażata fuq il-valutazzjoni tal-verifikatur ċentrali, kienet ta' 35 % (13 CR u 43 PR) għall-popolazzjoni intent-to-treat (ITT) n = 162 . Fi 43 pazjent, mard stabbli kien irrapportat. Is-sopravivenza mingħajr eventi wara 6 xhur għall-popolazzjoni ITT kienet ta' 44 % b' medjan ta' sopravivenza mingħajr eventi ta' 4.6 xhur, li kienet tixbah lir-riżultati tas-sopravivenza mingħajr progressjoni. Għall-popolazzjoni eliġibbli għall-istologija, ir-riżultati tal-effikaċja kienu simili. Li jintlaħaq rispons oġġettiv radjoloġiku jew li l-istat mingħajr progressjoni jinżamm, kien assoċjat hafna ma' kemm inżammet jew tjiebet il-kwalità tal-ħajja.

### Popolazzjoni pedjatrika

TMZ orali kien studjat f' pazjenti pedjatriċi (età ta' 3 snin - 18-il sena) bi glijoma rikorrenti taz-zokk ċentrali tal-mohħ jew b' astroċitoma rikorrenti ta' grad għoli, f' kors mogħti kuljum għal 5 ijiem kull 28 jum. It-tolleranza għal TMZ hija simili għal dik tal-adulti.

## **5.2 Tagħrif farmakokinetiku**

TMZ huwa idrolizzat b' mod spontanju fil-pH fiżjoloġika għall-ispeċi attiva, 3-methyl-(triazen-1-yl)imidazole-4-carboxamide (MTIC). MTIC huwa idrolizzat b' mod spontanju għal 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AIC), intermedju magħruf fil-bijosintesi ta' purine u aċidi nuklejiċi, u għal methylhydrazine, li hu maħsub li jkun l-ispeċi *alkylating* attiva. Iċ-ċitotossicità ta' MTIC huwa maħsub li ġejja primarjament mill-alkylation ta' DNA l-aktar fil-pożizzjonijiet O<sup>6</sup> u N<sup>7</sup> ta' guanine. L-esponiment għal MTIC u AIC relattiv għall-AUC ta' TMZ huwa ~ 2.4 % u 23 %, rispettivament. In vivo it-t<sub>1/2</sub> ta' MTIC kien simili għal dak ta' TMZ, 1.8 hr.

### Assorbiment

Wara għoti orali lil pazjenti adulti, TMZ jiġi assorbit malajr, bl-oġhla konċentrazzjonijiet jintlaħqu anki 20 minuta wara li jkun ingħata (hin medju bejn 0.5 u 1.5 sigħat). Wara li jingħata mill-halq, TMZ tikkettat b'<sup>14</sup>C, il-medja tal-ammont ta' <sup>14</sup>C fl-ippurgar matul is-7 ijiem wara ddoża kienet 0.8 % li tindika assorbiment komplet.

### Distribuzzjoni

TMZ jehel b' mod hafif mal-proteini (10 % sa 20 %), u għalhekk mhux mistenni li jinteraġixxi ma' sustanzi li jehlu hafna mal-proteini.

Studji PET fil-bniedem u dejta ta' qabel l-użu kliniku jindikaw li TMZ jaqsam malajr mill-barriera ta' bejn id-demm u l-mohħ u jinstab fis-CSF. Il-fatt li jippenetra fis-CSF kien konfermat f' pazjent wiehed; l-esponiment għal CSF ibbażata fuq l-AUC ta' TMZ kien ta' madwar 30 % ta' dik fil-plażma, li huwa konsistenti mad-dejta mill-annimali.

### Eliminazzjoni

Il-half-life (t<sub>1/2</sub>) fil-plażma hija ta' madwar 1.8 sigħat. Il-mod ewlieni ta' l-eliminazzjoni ta' <sup>14</sup>C huwa dak renali. Wara għoti orali, madwar 5 % sa 10 % tad-doża tiġi rkuprata mhux mibdula fl-awrina fuq medda ta' 24 siegħa, u l-bqija tiġi eliminata bħala aċidu temozolomide, 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AIC) jew metaboliti polari li ma ġewx identifikati.

Il-konċentrazzjonijiet tal-plażma jiddiedu b' mod skond id-doża. It-tneħhija tal-plażma, il-volum tad-distribuzzjoni u l-half-life huma indipendenti mid-doża.

### Popolazzjonijiet speċjali

Analizi tal-farmakokinetika ta' TMZ ibbażata fuq il-popolazzjoni wrew li t-tneħhija mill-plażma ta' TMZ kienet indipendenti mill-età, funzjoni tal-kliewi jew l-użu tat-tabakk. Fi studju farmakokinetiku separat, il-profilu farmakokinetiċi tal-plażma f' pazjenti b' indeboliment hafif sa moderat tal-fwied

kienu jixbhu lil dawk osservati f' pazjenti b' funzjoni tal-fwied normali.

Pazjenti pedjatriċi kellhom AUC oghla minn dak ta' pazjenti adulti; madankollu, id-doża massima ttollerata (MTD) kienet ta' 1,000 mg/m<sup>2</sup> kull ċiklu kemm fit-tfal u kemm fl-adulti.

### 5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studi dwar l-effett tossiku minn ċiklu wiehed (dożaġġ ta' 5 ijiem, 23 jum mingħajr trattament), 3- u 6 ċikli kienu magħmula fuq firien u klieb. It-targits primarji tat-tossicità inkludew il-mudullun, is-sistema limforetikulari, it-testikoli u l-apparat gastro-intestinali u, f' dozi aktar qawwija, li kkaġunaw il-mewt lil 60 % sa 100 % tal-firien u l-klieb ittestjati, sehhet deġenerazzjoni tar-retina. Kien hemm evidenza li l-biċċa l-kbira tat-tossicità kienet riversibbli, hlief f' eventni avversi fis-sistema riproduttiva ta' l-irġiel u fid-deġenerazzjoni tar-retina. Madankollu, minħabba li d-dozi implikati fid-deġenerazzjoni tar-retina kienu fil-medda tad-doża li tikkaġuna l-mewt, u l-ebda effett komparabbli ma kien osservat fi studji kliniċi, din is-sejba ma kinetx ikkunsidrata li għandha rilevanza klinika.

TMZ huwa aġent alkylating embrijotossiku, teratoġeniku, u ġenotossiku. TMZ huwa aktar tossiku għall-firien u għall-klieb milli għall-bnedmin, u d-doża klinika tqarreb lejn id-doża minima li tikkaġuna l-mewt fil-firien u fil-klieb. It-tnaqqis fil-lewkociti u fil-plejtlets relatat mad-doża jidher li huwa indikatur sensitiv tat-tossicità. Varjetà ta' neoplażmi, li jinkudu karċinomi mammarij, keratokantoma tal-ġilda u basal cell adenoma kienu osservati fi studju ta' 6 ċikli fuq il-firien, filwaqt li l-ebda tumuri jew tibdil pri-neoplastiku ma kien evidenti fi studji fuq il-klieb. Il-firien jidher li huma partikularment sensitivi għall-effetti onkoġeniċi ta' TMZ, bl-ewwel tumuri li jsehhu fi żmien 3 xhur mill-bidu tad-dożaġġ. Il-perjodu ta' latency huwa qasir hafna, anke għal aġent alkylating.

Ir-riżultati ta' *chromosome aberration* tests ta' l-Ames/salmonella u l-Limfoċit tad-Demm Periferali Uman (HPBL) urew rispons pożittiv għall-mutaġenicità.

## 6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

### 6.1 Lista ta' eċċipjenti

#### Kontenut tal-kapsula

Anhydrous lactose  
Sodium starch glycolate Type A  
Colloidal anhydrous silica  
Tartaric acid  
Stearic acid

#### Qoxra tal-kapsula

Gelatin  
Titanium dioxide (E 171)

#### Linka tal-istampar

#### *Temomedac 5 mg kapsuli ibsin*

Shellac  
Propylene Glycol  
Titanium dioxide (E 171)  
Yellow iron oxide (E 172)  
Indigo carmine (E 132) aluminium lake



Temomedac 20 mg kapsuli ibsin

Shellac  
Propylene Glycol  
Titanium dioxide (E 171)  
Sunset yellow FCF Aluminium Lake (E 110)

Temomedac 100 mg kapsuli ibsin

Shellac  
Propylene Glycol  
Red iron oxide (E 172)  
Yellow iron oxide (E 172)  
Titanium dioxide (E 171)

Temomedac 140 mg kapsuli ibsin

Shellac  
Propylene Glycol  
Indigo carmine (E 132) aluminium lake

Temomedac 180 mg kapsuli ibsin

Shellac  
Propylene Glycol  
Red iron oxide (E 172)

Temomedac 250 mg kapsuli ibsin

Shellac  
Iron (II,III) oxide (E 172)  
Propylene Glycol

## **6.2 Inkompatibiltajiet**

Mhux applikabbli.

## **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali**

3 snin.

## **6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna**

Taħzinx f' temperatura 'l fuq minn 30 °C.  
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun magħluqa sewwa.

## **6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih**

Flixxun tal-ħġieġ ta' lewn kannella b'tapp abjad tal-polypropylene rezistenti għat-tfal, mghammar b'siġill ta' induzzjoni tal-polyethylene li fih 5 jew 20 kapsula.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

## **6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema u għal immaniġġar iehor**

Il-kapsuli m'għandhomx jinfethu. Jekk il-kapsula tiġrilha l-ħsara, il-kuntatt tat-trab li jkun fiha mal-ġilda jew mal-membrani mukużi għandu jiġi evitat. Jekk Temomedac jiġi f' kuntatt mal-ġilda jew mal-mukuża, għandu jiġi mahsul mill-ewwel u sew bis-sapun u bl-ilma.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir bex iżommu l-kapsuli fejn ma jidhrux u ma jintlaħqux mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilgħuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligġiet lokali.

**7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/001-012

**9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta' Jannar 2010  
Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta' Lulju 2014

**10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST**

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

## **ANNEX II**

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GTAL-AWTORIZ FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

**A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

**C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

- **Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

**D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

- **Pjan tal-ġestjon tar-riskju (RMP)**

Mhux applikabbli.

**ANNEX III**

**TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF**

## **A. TIKKETTAR**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Temomedac 5 mg kapsuli ibsin  
temozolomide

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull kapsula iebsa fiha 5 mg ta' temozolomide.

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih lactose. Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu orali.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilgħuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**Ċitotossiku.**

Tiftahx, tghaffiġx u tomghodx il-kapsuli, iblagħhom shaħ. Jekk il-kapsula tkun imkissra, evita kuntatt mal-ġilda, għajnejn jew imnieher.

**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Ahżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun maghluq sewwa.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligijiet lokali.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/001  
EU/1/09/605/002

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Temomedac 5 mg

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.>

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

PC  
SN



NN

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Temomedac 20 mg kapsuli ibsin  
temozolomide

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull kapsula iebsa fiha 20 mg ta' temozolomide.

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih lactose u sunset yellow FCF (E110). Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu orali.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilgħuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**Ċitotossiku.**

Tiftahx, tghaffiġx u tomghodx il-kapsuli, iblagħhom shaħ. Jekk il-kapsula tkun imkissra, evita kuntatt mal-ġilda, għajnejn jew imnieher.

**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Ahżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun maghluq sewwa.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligijiet lokali.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/003  
EU/1/09/605/004

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Temomedac 20 mg

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.>

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

PC  
SN

NN

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Temomedac 100 mg kapsuli ibsin  
temozolomide

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull kapsula iebsa fiha 100 mg ta' temozolomide.

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih lactose. Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu orali.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilghuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**Ċitotossiku.**

Tiftahx, tghaffiġx u tomghodx il-kapsuli, iblaghom shaħ. Jekk il-kapsula tkun imkissra, evita kuntatt mal-ġilda, għajnejn jew imnieher.

**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Ahżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun maghluq sewwa.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligijiet lokali.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/005  
EU/1/09/605/006

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Temomedac 100 mg

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.>

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

PC  
SN

NN

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Temomedac 140 mg kapsuli ibsin  
temozolomide

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull kapsula iebsa fiha 140 mg ta' temozolomide.

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih lactose. Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu orali.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilgħuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**Ċitotossiku.**

Tiftahx, tghaffiġx u tomghodx il-kapsuli, iblagħhom shaħ. Jekk il-kapsula tkun imkissra, evita kuntatt mal-ġilda, għajnejn jew imnieher.

**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.



Ahżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun maghluq sewwa.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligijiet lokali.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/007  
EU/1/09/605/008

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Temomedac 140 mg

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.>

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

PC  
SN

NN

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Temomedac 180 mg kapsuli ibsin  
temozolomide

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull kapsula iebsa fiha 180 mg ta' temozolomide.

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih lactose. Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu orali.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilgħuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**Ċitotossiku.**

Tiftahx, tghaffiġx u tomghodx il-kapsuli, iblagħhom shaħ. Jekk il-kapsula tkun imkissra, evita kuntatt mal-ġilda, għajnejn jew imnieher.

**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Ahżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun maghluq sewwa.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/009  
EU/1/09/605/010

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Temomedac 180 mg

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.>

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

PC  
SN

NN

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Temomedac 250 mg kapsuli ibsin  
temozolomide

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull kapsula iebsa fiha 250 mg ta' temozolomide.

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih lactose. Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu orali.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal, l-aħjar f'armarju maqful. Jekk jibilgħuh b'mod aċċidentali jista' joqtolhom.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**Ċitotossiku.**

Tiftahx, tghaffiġx u tomghodx il-kapsuli, iblagħhom shaħ. Jekk il-kapsula tkun imkissra, evita kuntatt mal-ġilda, għajnejn jew imnieher.

**8. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Ahżen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.  
Żomm il-flixxun maghluq sewwa.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ligijiet lokali.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/09/605/011  
EU/1/09/605/012

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA**

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Temomedac 250 mg

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.>

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

PC  
SN

NN



**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Temomedac 5 mg kapsuli ibsin  
temozolomide  
Użu orali.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**3. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**6. OHRAJN**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Temomedac 20 mg kapsuli ibsin  
temozolomide  
Użu orali

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

**3. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**6. OHRAJN**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Temomedac 100 mg kapsuli ibsin  
temozolomide  
Użu orali

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

**3. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**6. OHRAJN**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Temomedac 140 mg kapsuli ibsin  
temozolomide  
Użu orali.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**3. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**6. OHRAJN**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Temomedac 180 mg kapsuli ibsin  
temozolomide  
Użu orali.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

**3. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**6. OHRAJN**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Temomedac 250 mg kapsuli ibsin  
temozolomide  
Użu orali.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

**3. DATA TA' SKADENZA**

JIS

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 kapsuli ibsin  
20 kapsula iebsa

**6. OHRAJN**

## **B. FULJETT TA' TAGHRIF**

## Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

**Temomedac 5 mg kapsuli ibsin**  
**Temomedac 20 mg kapsuli ibsin**  
**Temomedac 100 mg kapsuli ibsin**  
**Temomedac 140 mg kapsuli ibsin**  
**Temomedac 180 mg kapsuli ibsin**  
**Temomedac 250 mg kapsuli ibsin**

temozolomide

### **Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tiehu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina giet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m'huwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

### **F'dan il-fuljett:**

1. X'inhu Temomedac u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Temomedac
3. Kif għandek tiehu Temomedac
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif tahzen Temomedac
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### **1. X'inhu Temomedac u għalxiex jintuża**

Temomedac fih mediċina msejha temozolamide. Din il-mediċina hija sustanza li taġixxi kontra t-tumuri.

Temomedac jintuża għall-kura ta' tipi speċifiċi ta' tumuri fil -moħħ:

- f'adulti bi glioblastoma multiforme li tkun għadha kif giet iddijanostikata. Temomedac l-ewwel jintuża ma' radjuterapija (fażi konkomitanti tal-kura) u mbagħad waħdu (fażi ta' kura b'monoterapija).
- fi tfal li għandhom minn 3 snin 'il fuq u f'pazjenti adulti bi glijoma malinna, bħall glijoblastoma multiforme u astrocītoma anaplastika. Temomedac jintuża f'dawn it-tumuri jekk jergġghu johorġu jew imorru għall-aġħar wara kura standard.

### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tiehu Temomedac**

#### **Tieħux Temomedac**

- jekk inti allergiku għal temozolomide jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6)..
- jekk kellek reazzjoni allergika għal dacarbazine (kura kontra l-kanċer, kultant imsejha DTIC). Sinjali ta' reazzjoni allergika jinkludu ħakk, qtugħ ta' nifs jew tharħir, nefha tal-wiċċ, xofftejn, ilsien jew griżem.
- jekk ċerti tipi ta' ċelluli tad-demmm jonqsu b'mod serju (majelosuppressjoni), bħal meta l-għadd taċ-ċelluli l-bojod tad-demmm u l-għadd tal-plejtlets jitbaxxa. Dawn iċ-ċelluli tad-demmm huma



importanti biex tiġġieled l-infezzjoni u biex jagħqad id-demm kif suppost. Qabel tibda l-kura, it-tabib tiegħek ser janalizza d-demm biex ikun żgur li għandek bizzejjed minn dawn iċ-ċelluli.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek qabel tieħu Temomedac

- peress li inti trid tinzamm taħt osservazzjoni stretta għall-iżvilupp ta' infezzjoni fis-sider imsejha pulmonite bi *Pneumocystis jirovecii* (PCP). Jekk int pazjent li għadek kif ġejt dijanjostikat (glijoblastoma multiforme) tista' tingħata Temomedac għal 42 jum flimkien ma' radjuterapija. F'dan il-każ, it-tabib tiegħek ser jordnalek ukoll medicina biex tgħinek tevita din it-tip ta' pneumonja (PCP).
- jekk qatt kellek jew jista' jkun li issa għandek infezzjoni b'epatite B. Dan minhabba li Temomedac jista' jikkawża li l-epatite B terġa' ssir attiva, u f'xi każijiet dan jista' jkun fatali. Il-pazjenti se jiġu ċċekkjati b'attenzjoni mit-tabib tagħhom għal sinjali ta' din l-infezzjoni qabel tinbeda l-kura.
- jekk għandek għadd baxx ta' ċelluli homor tad-demm (anemija), ċelluli bojod tad-demm u plejtlets jew problemi biex tgħaqqad id-demm qabel ma tibda l-kura, jew jekk int tiżviluppahom waqt il-kura. It-tabib tiegħek għandu mnejn jiddeċiedi li jnaqqas id-doża, iwaqqaf għal ftit jew għal kollixx il-kura jew ibiddel il-kura tiegħek. Jista' jkollok bżonn ukoll trattamenti oħrajn. F'ċerti każi, jista' jkun hemm bżonn li t-trattament b'Temomedac jitwaqqaf.
- ser isirulek testijiet tad-demm ta' sikwit waqt il-kura sabiex ikunu immonitorjati l-effetti sekondarji ta' Temomedac fuq iċ-ċelluli tad-demm tiegħek.
- peress li inti jista' jkollok riskju żgħir ta' bidliet oħra fiċ-ċelluli tad-demm, inkluża lewkemija.
- jekk ikollok dardir (thoss l-istonku mhux f'postu) u/jew rimettar, li huma assoċjati ta' spiss ma' l-effetti sekondarji ta' Temomedac (ara sezzjoni 4), it-tabib tiegħek jista' jordnalek medicina (anti-emetika) biex tgħinek tevita r-rimettar.
- jekk tirremetti ta' spiss qabel jew waqt il-kura, staqsi lit-tabib tiegħek dwar l-aħjar hin biex tieħu Temomedac sakemm ir-rimettar ikun ikkontrollat. Jekk tirremetti wara li tieħu d-doża, terġax tieħu doża oħra fl-istess gurnata.
- jekk jitlagħlek id-deni jew johorgulek is-sintomi ta' infezzjoni, għamel kuntatt mat-tabib tiegħek mill-ewwel.
- jekk għandek aktar minn 70 sena jista' jkollok tendenza akbar li jaqbdur infezzjonijiet jew titbenghel jew li jkollok emorraġija.
- jekk għandek problemi tal-fwied jew tal-kliwi, id-doża tiegħek ta' Temomedac jista' jkollha bżonn tkun irrangata.

### **Tfal u adolexxenti**

Tagħtix din il-medicina lil tfal li għandhom inqas minn 3 snin peress li ma gietx studjata. Hemm informazzjoni limitata f'pazjenti li għandhom 'l fuq minn 3 snin li ħadu Temomedac.

### **Mediċini oħra u Temomedac**

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qieghed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicina oħra.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina. Dan għaliex inti m'għandekx tiġi kkurata b'Temomedac waqt it-tqala sakemm ma jkunx indikat b'mod ċar mit-tabib tiegħek.

Iridu jittieħdu prekawzjonijiet kontraċettivi effettivi mill-pazjenti nisa li jkunu jistgħu johorgu tqal waqt li jkunu qegħdin jieħdu Temomedac, u għal mill-anqas 6 xhur wara t-tlestija tat-trattament.

Għandek tieqaf tredda' meta tkun qed tirċievi kura b'Temomedac.

### **Fertilità fl-irġiel**

Temomedac jista' jikkawża infertilità permanenti. Pazjenti rġiel għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva u m'għandux ikollhom tfal għal mill-anqas 3 xhur wara li jwaqqfu l-kura. Huwa rakkomandat li jinkiseb parir dwar il-konservazzjoni tal-isperma qabel il-kura.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Temomedac jista' jaghmlek thossok ghajjen jew bi nghas. F'dan il-każ, issuqx , tużax għodda jew magni u ssuqx rota sakemm tara kif taffettwak din il-mediċina (ara sezzjoni 4).

### **Temomedac fih lactose**

Temomedac fih lactose (tip ta' zokkor). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċertu tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu tieħu dan il-prodott mediċinali.

### **Temomedac fih sodium**

Dan il-mediċina fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull kapsula iebsa, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

### *Tagħrif addizzjonali għall-Temomedac 20 mg kapsuli ibsin*

Is-sustanza mhux attiva sunset yellow FCF (E110) inkluża fil-qoxra tal-kapsuli tista' tikkawża reazzjonijiet allergiċi.

## **3. Kif għandek tieħu Temomedac**

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispizjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

### Dożaġġ u tul tal-kura

It-tabib tiegħek għandu jikkalkula d-doża korretta ta' Temomedac. Din hija bbażata skond id-daqs tiegħek (tul u piż), jekk għandekx tumor rikurrenti u jekk kellekx trattament bil-kemoterapija fil-passat. Tista' tingħata mediċini oħra (anti emetiċi) biex teħodhom qabel u/jew wara li tieħu Temomedac biex tevita jew tikkontrolla d-dardir u r-rimettar.

### Pazjenti li jkunu għadhom kif ġew dijanjostikati bi glijblastoma multiforme:

Jekk int pazjent li għadek kif ġejt dijanjostikat, il-kura ser isseħħ f'żewġ fażijiet:

- kura ma' radjuterapija (il-faži konkomitanti) l-ewwel
- segwita b'Temomedac wahdu (il-faži ta' monoterapija).

Waqt il-faži konkomitanti, it-tabib tiegħek ser jibdielek Temomedac b'doża ta' 75 mg/m<sup>2</sup> (doża tas-soltu). Ser tieħu din id-doża kuljum għal 42 jum (sa 49 jum) flimkien ma' radjuterapija. Id-doża ta' Temomedac tista' tkun ittardjata jew imwaqqfa, skond l-għadd taċ-ċelluli tad-demmi tiegħek u kemm tiflaħ tieħu l-mediċina waqt il-faži konkomitanti.

Meta r-radjuterapija tkun kompleta, twaqqaf il-kura għal 4 ġimgħat. Dan jagħtik ftit żmien sabiex ġismek jerga' jirkupra.

Imbagħad ser tibda il-faži ta' monoterapija.

Waqt il-faži ta' monoterapija id-doża u l-mod kif tingħata Temomedac f'din l-faži ser tkun differenti. Ittabib tiegħek ser jikkalkula d-doża eżatta għalik. Jista' jkun hemm sa 6 perijodi ta' kura (ċikli). Kull wieħed idum 28 jum. Ser tieħu d-doża l-ġdida ta' Temomedac wahdedha darba kuljum għall-ewwel hamest ijiem ("granet tad-doża") ta' kull ċiklu. L-ewwel doża se tkun ta' 150 mg/m<sup>2</sup>. Imbagħad ikollok 23 jum mingħajr Temomedac. Dan b'kollox ikun ċiklu ta' kura ta' 28 jum. Wara jum 28, jibda ċ-ċiklu li jmiss. Ser terġa' tieħu Temomedac darba kuljum għal hamest ijiem segwit bi 23 jum mingħajr Temomedac.

Id-doża ta' Temomedac tista' tkun irrangata, ittardjata jew imwaqqfa għal kollox skond il-għadd taċ-ċelluli tad-demmi tiegħek u/jew kemm tkun tiflaħ għall-mediċina tiegħek f'kull ċiklu ta' kura.

Pazjenti b'tumuri li reġġu harġu jew aggravaw (glijoma malinna, bħal glijoplastoma multiforme jew astrocītoma anaplastika) li qed jieħdu Temomedac biss

Ċiklu ta' kura b'Temomedac jinkludi 28 jum.

Ser tieħu Temomedac waħdu darba kuljum għall-ewwel hamest ijiem. Din id-doża ta' kuljum tiddependi fuq jekk irċevejtx kimoterapija minn qabel jew le.

Jekk qatt ma kellek kura b'kimoterapija, l-ewwel doża ta' Temomedac se tkun ta' 200 mg/m<sup>2</sup> darba kuljum għall-ewwel hamest ijiem. Jekk xi darba qabel kellek kura b'kimoterapija, l-ewwel doża ta' Temomedac se tkun ta' 150 mg/m<sup>2</sup> darba kuljum għall-ewwel hamest ijiem.

Imbagħad ser jkollok 23 jum mingħajr Temomedac. Dan jammonta għal ċiklu ta' kura ta' 28 jum.

Wara jum 28, jibda ċ-ċiklu li jmiss. Ser terġa tirċievi Temomedac darba kuljum għal hamest ijiem, segwit minn 23 jum mingħajr Temomedac.

Qabel kull ċiklu ġdid ta' kura, id-demmm tiegħek jiġi eżaminat bex jaraw jekk id-doża ta' Temomedac għandhiex bżonn tinbidel. Skond ir-rizultati tat-testijiet tad-demmm, it-tabib jista' jirringa d-doża għaċċiklu li jmiss.

Kif għandek tieħu Temomedac

Hu d-doża ta' Temomedac li ordnawlek darba kuljum, l-aħjar kuljum fl-istess hin tal-ġurnata.

Hu l-kapsuli fuq stonku vojti; per eżempju, mill-anqas siegħa qabel ma tkun bihsiebek tieħu l-kolazzjon. Ibla' l-kapsula(i) shiha/shaħ ma' tazza ilma. Tiftaħx, tfarrakx u tomghodx il-kapsuli. Jekk kapsula tkun imxaqqa, evita kuntatt tat-trab mal-ġilda, l-għajnejn jew l-immieher. Jekk inti bi żball iddahhal xi ftiit f'għajnejk jew f'immieher, laħlah il-parti bl-ilma.

Skond id-doża li jordnawlek, jista' jkollok bżonn tieħu aktar minn kapsula waħda f'daqqa, u mażżmien b'qawwiet differenti (kontenut tas-sustanza attiva, f'mg). Il-kulur u l-immarkar tal-kapsula huwa differenti għal kull qawwa (ara t-tabella hawn taht).

Qawwa	Kulur/immarkar
Temomedac 5 mg	żewġ strixxi b'linka hadra fuq l-għatu u "T 5 mg" b'linka hadra fuq il-korp
Temomedac 20 mg	żewġ strixxi b'linka orangjo fuq l-għatu u "T 20 mg" b'linka orangjo fuq il-korp
Temomedac 100 mg	żewġ strixxi b'linka roża fuq l-għatu u "T 100 mg" b'linka roża fuq il-korp
Temomedac 140 mg	żewġ strixxi b'linka blu fuq l-għatu u "T 140 mg" b'linka blu fuq il-korp
Temomedac 180 mg	żewġ strixxi b'linka hamra fuq l-għatu u "T 180 mg" b'linka hamra fuq il-korp
Temomedac 250 mg	żewġ strixxi b'linka sewda fuq l-għatu u "T 250 mg" b'linka sewda fuq il-korp

Għandek taċċerta ruhek li tifhem eżattament u tiftakar dan li ġej:

- kemm għandek bżonn tieħu kapsuli fil-ġranet tad-doża. Staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar biex jiktubuhielek (inkluz il-kulur).
- liema ġranet huma l-jiem tad-doża.

Irrevedi d-doża mat-tabib tiegħek kull darba li tibda ċiklu ġdid, minħabba li tista' tkun differenti mill-aħħar ċiklu.

Dejjem għandek tieħu Temomedac skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruhek mat-tabib jew ma' l-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Jekk tizbalja l-mod kif tieħu din il-medicina, jista' jkun hemm konsegwenzi serji għal saħhtek.

### **Jekk tiehu Temomedac aktar milli suppost**

Jekk b' mod aċċidentali tiehu aktar kapsuli Temomedac milli kellek tiehu, ikkuntattja lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek minnufih.

### **Jekk tinsa tiehu Temomedac**

Ħu d-doża li nsejt kemm jista' jkun malajr fl-istess ġurnata. Jekk tghaddi ġurnata shiha, iċċekkja mattabib tiegħek. M'għandekx tiehu doża doppja biex tpatti għal doża li tkun insejt tiehu, sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx biex tagħmel hekk.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek **minnufih** jekk ikollok kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

- reazzjonijiet allergiċi serji (sensittività eċċessiva) (infafet, tharhir jew xi problemi biex tiehu n-nifs),
- emorraġija bla kontroll,
- aċċessjonijiet (konvulzjonijiet),
- deni,
- tkexkix ta' bard,
- uġiġh ta' ras li ma jkunx irid jgħaddi.

It-trattament b'Temomedac jista' jikkawża tnaqqis f'ċerti tipi ta' ċelluli tad-demmm. Dan jista' jikkawżalek żjieda fit-tbengil jew emorraġija, anemija (nuqqas ta' ċelluli ħomor tad-demmm), deni, u tnaqqis firreżistenza għall-infezzjonijiet. It-tnaqqis taċ-ċelluli tad-demmm normalment ma jdumx. F'xi każijiet jista' jiehu fit-tul u jista' jwassal għal forma serja ta' anemija (anemija aplastika). It-tabib tiegħek għandu jeżaminalek d-demmm tiegħek b' mod regolari għal xi tibdil, u ser jiddeċiedi jekk xi trattament speċifiku jkunx meħtieġ. F'xi każijiet, id-doża ta' Temomedac tiegħek titnaqqas jew il-kura titwaqqaf.

Effetti sekondarji oħra li ġew irrappurtati huma elenkati hawn taħt:

### **Effetti sekondarji komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10 ) huma:**

- telf t'aptit, diffikultà biex titkellem, uġiġh ta' ras
- rimettar, dardir, dijarea, stitikezza
- raxx, telf ta' xagħar
- gheja

### **Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10 ) huma:**

- infezzjonijiet, infezzjonijiet fil-halq
- numru mnaqqas ta' ċelluli tad-demmm (newtopenija, limfopenija, tromboċitopenija)
- reazzjoni allergika
- zieda fiz-zokkor fid-demmm
- indeboliment fil-memorja, depressjoni, ansjetà, konfużjoni, ma tkunx tista' torqod jew ma tkunx tista' tibqa' rieqed/rieqda
- indeboliment fil-koordinazzjoni u l-bilanċ
- diffikultà biex tikkonċentra, bidla fl-istat mentali jew fl-attenzjoni, tinsa'
- sturdament, sensazzjonijiet indeboliti, sensazzjonijiet ta' tingiż, roġħda, toġħma mhux normali
- telf parzjali tal-vista, vista mhux normali, vista doppja, uġiġh fl-għajn
- truxija, żarżir fil-widnejn, uġiġh fil-widna
- tagħqid ta' demm fil-pulmun jew fir-riglejn, pressjoni għolja
- pulmonite, qtugħ ta' nifs, bronkite, sogħla, infjammazzjoni fis-sinuis

- uġiġh fl-istonku jew fl-addome, stonku mqallem/hruq ta' stonku, diffikultà biex tibra'
- ġilda xotta, ħakk
- ħsara fil-muskoli, dgħufija fil-muskoli, uġiġh u wegħhat fil-muskoli
- ġogi juġġhu, uġiġh fid-dahar
- tagħmel l-awrina b' mod frekwenti, diffikultà biex iżżomm l-awrina
- deni, sintomi bħal tal-influenza, uġiġh, thossok ma tiflaħx, riħ jew influenza
- zamma ta' fluwidu, riġlejn minfuħa
- zieda fil-livelli tal-enzimi tal-fwied
- telf ta' piż, zieda fil-piż
- korriment ikkawżat minn radjazzjoni

#### **Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100 ) huma:**

- infezzjonijiet fil-moħħ (meningoencefalite erpetika) inklużi każijiet fatali
- infezzjonijiet ġodda jew attivati mill-ġdid ta' ċitomegalovirus
- infezzjonijiet f' ferita
- infezzjonijiet attivati mill-ġdid tal-virus tal-epatite B
- kanċers sekondarji inkluża lewkimja
- għadd imnaqqas ta' ċelluli tad-demem (panċitopenija, anemija, lewkopenija)
- dbabar ħomor taħt il-ġilda
- dijabete insipidus (sintomi jinkludu zieda fl-għamil tal-awrina u thossok bil-għatx), livell baxx ta' potassium fid-demem
- bidliet fil-burdata, alluċinazzjoni
- paralizi parzjali, bidla fis-sens tax-xamm
- għajnejn xotti
- indeboliment fis-smiġh, infezzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna
- palpazzjonijiet (meta inti tista' thoss qalbek thabbat), fwawar šhan
- stonku minfuħ, diffikultà biex tikkontrolla l-ippurgar, murliti, ħalq xott
- epatite u ħsara fil-fwied (inkluża insuffiċjenza fatali tal-fwied), kolestasi, zieda fil-bilirubin
- infafet fuq il-gisem jew fil-ħalq, taqxir tal-ġilda, zbroff fil-ġilda, ġilda tiħmar u tuġġha, raxx sever b' nefha fil-ġilda (inklużi l-keff tal-id u l-pala tas-sieq)
- zieda fis-sensittività għadd-dawl tax-xemx, urtikarja (ħorriqija), zieda fil-ħruġ tal-għaraq, bidla fil-kulur tal-ġilda
- diffikultà biex tagħmel l-awrina
- ħruġ ta' demem mill-vaġina, irritazzjoni fil-vaġina, menstruazzjoni li ma sseħħx jew tkun qawwija, uġiġh fis-sider, impotenza sesswali
- roġħda, nefha fil-wiċċ, bidla fil-kulur tal-ilsien, għatx, disturb fis-snien

#### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

#### **5. Kif taħzen Temomedac**

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal, l-aħjar f' armarju maqful. Jekk jibilgħuh b' mod aċċidentali jista' joqtolhom.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30 °C.

Aħzen fil-pakkett originali sabiex tilqa' mill-umdità.

Żomm il-flixxun magħluq sewwa.

Għid lill-ispizjar jekk tinnota xi tibdil fid-dehra tal-kapsuli.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih Temomedac

- Is-sustanza attiva hija temozolomide.  
*Temomedac 5 mg kapsuli ibsin:* Kull kapsula fiha 5 mg temozolomide.  
*Temomedac 20 mg kapsuli ibsin:* Kull kapsula fiha 20 mg temozolomide.  
*Temomedac 100 mg kapsuli ibsin:* Kull kapsula fiha 100 mg temozolomide.  
*Temomedac 140 mg kapsuli ibsin:* Kull kapsula fiha 140 mg temozolomide.  
*Temomedac 180 mg kapsuli ibsin:* Kull kapsula fiha 180 mg temozolomide.  
*Temomedac 250 mg kapsuli ibsin:* Kull kapsula fiha 250 mg temozolomide.
- Is-sustanzi l-oħrajn huma:  
kontenut tal-kapsula:  
anhydrous lactose, colloidal anhydrous silica, sodium starch glycolate type A, tartaric acid, stearic acid (ara sezzjoni 2 “Temomedac fih lactose”).  
qoxra tal-kapsula (li tinkudi l-linka tal-istampar):  
*Temomedac 5 mg kapsuli ibsin:* gelatin, titanium dioxide (E 171), shellac, propylene glycol, Indigo carmine (E 132) aluminium lake, yellow iron oxide (E 172).  
*Temomedac 20 mg kapsuli ibsin:* gelatin, titanium dioxide (E 171), shellac, propylene glycol, Sunset yellow FCF Aluminium Lake (E 110).  
*Temomedac 100 mg kapsuli ibsin:* gelatin, titanium dioxide (E 171), red iron oxide (E 172), shellac, propylene glycol, yellow iron oxide (E 172).  
*Temomedac 140 mg kapsuli ibsin:* gelatin, titanium dioxide (E 171), shellac, propylene glycol, Indigo carmine (E 132) aluminium lake.  
*Temomedac 180 mg kapsuli ibsin:* gelatin, titanium dioxide (E 171), shellac, propylene glycol, red iron oxide (E 172).  
*Temomedac 250 mg kapsuli ibsin:* gelatin, titanium dioxide (E 171), shellac, propylene glycol, black iron oxide (E 172).

### Kif jidher Temomedac u l-kontenut tal-pakkett

*Temomedac 5 mg kapsuli ibsin* għandhom korp abjad opak u għatu b'zewġ strixxi b'linka ħadra fuq l-għatu u b'“T 5 mg” b'linka ħadra fuq il-korp.

*Temomedac 20 mg kapsuli ibsin* għandhom korp abjad opak u għatu b'zewġ strixxi b'linka oranġjo fuq l-għatu u b'“T 20 mg” b'linka oranġjo fuq il-korp.

*Temomedac 100 mg kapsuli ibsin* għandhom korp abjad opak u għatu b'zewġ strixxi b'linka roża fuq l-għatu u b'“T 100 mg” b'linka roża fuq il-korp.

*Temomedac 140 mg kapsuli ibsin* għandhom korp abjad opak u għatu b'zewġ strixxi b'linka blu fuq l-għatu u b'“T 140 mg” b'linka blu fuq il-korp.

*Temomedac 180 mg kapsuli ibsin* għandhom korp abjad opak u għatu b'zewġ strixxi b'linka ħamra fuq l-għatu u b'“T 180 mg” b'linka ħamra fuq il-korp.

*Temomedac 250 mg kapsuli ibsin* għandhom korp abjad opak u għatu b'zewġ strixxi b'linka sewda fuq l-għatu u b'“T 250 mg” b'linka sewda fuq il-korp.

Il-kapsuli ibsin għall-użu orali jingħataw fi fliexken tal-ħġieg ta' lewn kannella li fihom 5 jew

20 kapsula.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

**Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur**

medac  
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH  
Theaterstr. 6  
22880 Wedel  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**

**Sorsi oħra ta' informazzjoni**

Informazzjoni ddettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu>.