


































































































Dabar vaistas yra paruoštas įkvėpimui.

Patvirtinimui dozės skaitiklyje matomas skaičius sumažėja **vienetu**.

- **Jeigu išgirdus spragtelėjimą („spragt“) dozės skaitiklyje matomas skaičius nesumažėja, inhaliatorius neišskirs vaisto.** Pasiėmę šį inhaliatorių, kreipkitės patarimo į savo vaistininką.
- **Inhaliatoriaus negalima kratyti jokiais aplinkybėmis.**

### 3) Įkvėpkite vaisto

- **Laikydami inhaliatorių toliau nuo burnos, giliai iškvėpkite (taip, kad nejustumėte diskomforto).**  
Negalima kvėpuoti į inhaliatorių.
- **Kandiklį įkiškite tarp lūpų ir jį tvirtai sučiaupkite lūpomis.**  
Neuždenkite pirštais ventiliavimo angų.



Norėdami įkvėpti vaisto, lūpomis sučiaupkite kandiklį. Neuždenkite pirštais ventiliavimo angų.


- Vieną kartą ilgai, tolygiai, giliai įkvėpkite. Kiek įmanoma ilgiau sulaikykite kvėpavimą (bent 3-4 sekundes).
- Ištraukite inhaliatorių iš burnos.
- Lėtai, švelniai iškvėpkite.

**Vaistinis preparatas ar jo skonis gali būti neįjuntami, net tinkamai naudojant inhaliatorių.**

Kad išvalytumėte kandiklį, naudokite **sausą audinį prieš** uždarydami dangtelį.

### 4) Uždarykite inhaliatorių ir praskalaukite burną

- **Norėdami uždaryti kandiklį, stumkite dangtelį aukštyn tol, kol jis juda.**



- **Po inhaliatoriaus panaudojimo praskalaukite burną vandeniu, jo nenurydami.**  
Taip sumažinsite burnos ar gerklės skausmingumo, kaip nepageidaujamo poveikio, atsiradimo tikimybę.

Neberregistruotas vaistinis preparatas