
































































































Tagad zāles ir sagatavotas inhalēšanai.

To apstiprina devu skaitītāja rādījums, kas samazinās par 1 devu.

- **Ja, atskanot klikšķim, devu skaitītājs nenoskaita vienu devu, inhalators neizdalīs zāles.** Aiznesiet to atpakaļ farmaceitam un lūdziet padomu.
- **Nekādā gadījumā nekratiet inhalatoru.**

### 3) Zāļu inhalēšana

- **Turot inhalatoru atstatu no mutes, veiciet maksimālu izelpu; jāizelpo tik dziļi lai tas neradītu grūtības.**  
Neveiciet izelpu inhalatorā.
- **Ievietojiet iemutni starp lūpām un ar lūpām to stingri aptveriet.**  
Nelieciet pirkstus uz gaisa vārstiem.



Inhalācijas brīdī Jūsu lūpām jāaptver iemutņa kontūra.

Neaizklājiet ar pirkstiem gaisa vārstus.


- Veiciet vienu ilgā, vienmērīgu, dziļu ieelpu. Tad aizturiet elpu pēc iespējas ilgāk (vismaz 3 - 4 sekundes).
- Attāliniet inhalatoru no mutes.
- Veiciet lēnu un mierīgu izelpu.

**Pat lietojot inhalatoru pareizi, Jūs varat nesagaršot un nesajust zāles.**

Ja vēlaties notīrīt iemutni, noslaukiet to **ar sausu drānu pirms** vāciņa aizvēršanas.

### 4) Inhalatora aizvēršana un mutes izskalošana

- **Lai aizvērtu iemutni, slidiniet vāciņu uz augšu līdz atdurei.**



- **Pēc inhalatora lietošanas izskalojiet muti ar ūdeni, to nenorijot.**  
Tā Jūs mazināsiet blakusparādību – mutes vai rīkles iekaisuma – iespējamību.

Zāles vairs nav reģistrētas