

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Vistide 75 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni Cidofovir

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina giet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-hsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humie imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk joghġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Vistide u għalxiex jintuża
2. Qabel ma' tuża Vistide
3. Kif għandek tuża Vistide
4. X'effetti oħra jista' jkollu
5. Kif taħzen Vistide
6. Aktar tagħrif

1. X'inhu Vistide u għalxiex jintuża

Vistide jintuża għal kura ta' infezzjoni fl-għajnejn imsejha retinite ikkawżata mis-CMV f'pazjenti li jsofru bl-AIDS (Sindrome ta' Immunodeficienza Akkwizita). Vistide ma jfejjeqx mir-retinite ikkawżata mis-CMV imma għandu mnejn itejjet il-kundizzjoni tiegħek billi jnaqqas ir-rata li biha tavvanza din il-marda.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Vistide ma ntwerewx fil-mard hlief f' retinite b'CMV f'pazjenti li jsofru bl-AIDS.

Vistide għandu jingħata minn professjonista fil-qasam mediku (tabib jew infermiera) fi spjar.

X'inhu r-retinite kkawżata mis-CMV?

Ir-retinite kkawżata mis-CMV hija infezzjoni fl-għajn ikkawżata minn virus msejjaħ cytomegalovirus (CMV). Is-CMV jattakkja r-retina tal-għajn u jista' jwassal għal tnaqqis fil-vista u saħansitra eventwalment anki jaġni ma jill-pazjent. Pazjenti bl-AIDS huma f'riskju għoli li jiżviluppaw retinite minhabba fis-CMV jew inkella xi forma oħra ta' mard minhabba fis-CMV bħal per eżempju kolite (marda infjammatorja tal-imsaren). It-trattament tar-retinite ikkawżata mis-CMV huwa neċessarju sabiex titnaqqas il-possibiltà li wiehed jitlef id-dawl.

Vistide huwa medicina għal kontra l-virus li jwaqqaf il-proċess li bih is-CMV isawwar kopja tiegħu innif u u dan billi jfixkel il-produzzjoni tad-DNA tal-virus.

2. Qabel ma tuża Vistide

Tużax Vistide

- **Jekk inti allergiku/a (*tbati minn sensitività eċċessiva*)** għal cidofovir jew sustanzi oħra ta' Vistide.
- **Jekk xi darba kellek mard tal-kliewi.**
- **Jekk ma tistax tieħu l-medicina probenecid** minhabba f'allergija serja għal probenecid jew għal xi medicini oħra li jkun fihom s-sulfa- (eż., sulfamethoxazole).

Jekk xi wahda minn dawn tapplika ghalik, kellek lit-tabib tieghek. **M'għandekx tinghata Vistide.**

Oqghod attent hafna b'Vistide

- **Il-ħsara fil-kliewi hija l-aktar effett sekondarju importanti li jsehh minħabba t-trattament b'Vistide.** Biex jitnaqqas ir-riskju ta' ħsara fil-kliewi, inti ser tinghata **fluwidi fil-vina (salina normali)** qabel kull doża ta' Vistide u **pilloli ta' probenecid** qabel u wara kull doża ta' Vistide (ara sezzjoni 3 hawn taht għal aktar informazzjoni). It-tabib tieghek għandu mnejn iġid ukoll biex tixrob hafna. It-tabib tieghek għandu wkoll jeżaminalek il-funzjoni tal-kliewi qabel kull doża ta' Vistide. It-trattament tieghek b'Vistide għandu mnejn jitwaqqaflek mit-tabib tieghek jekk ikun hemm xi bdil fil-funzjoni tal-kliewi.
- **Avża lit-tabib jekk għandek id-dijabete mellitus.** Vistide għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jbatu bid-dijabete minħabba li dawn il-pazjenti jkunu f'riskju akbar li jiżviluppaw tnaqqis fil-pessjoni ta' ġol-ġhajj (*ipotonja okulari*).
- **Matul it-trattament b'Vistide għandek tmur regolarment sabiex ikollok ezami okulari** għall-possibiltà ta' irritazzjoni fl-ġhajnejn, infjammazzjoni jew nefha. **Jekk ikollok uġiġ, ħmura jew ħakk fl-ġhajnejn jew tibdil fil-viżjoni, għid lit-tabib tieghek immedjatament.**
- Fl-annimali, Vistide irrizulta fi tnaqqis fil-piż tat-testikoli u tnaqqis fl-ġħadd ta' l-isperma (*ipospermja*). Għalkemm ma ġiex osservat fi studji b'Vistide fil-bniedem, xorta wahda hemm il-possibiltà li jiġri hekk fil-bniedem u dan jista' jwassal għall-infertilità. **L-irġiel għandhom jużaw metodi ta' kontraċezzjoni barriera waqt u sa 3 xhur wara t-trattament b'Vistide.**
- Vistide ma jintużax għat-trattament ta' infezzjoni HIV. Vistide mhux ser iwaqqfek milli tgħaddi infezzjoni tal-HIV lil nies oħrajn u għalhekk **għandek tkompli tiehu prekawzjonijiet biex tevita li tinfetta lil nies oħrajn.**

Użu fit-tfal

Vistide ma ġiex studjat fit-tfal. Għalhekk, **din il-medicina ma għandhiex tintuża fuq it-tfal.**

Meta tuża medicini oħra

- **Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek jekk qieghed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi medicini oħra,** anki dawk mingħajr riċetta, għax dawn jistgħu jinteraġixxu ma' Vistide jew probenecid.

Hu importanti hafna li tgħid lit-tabib tieghek jekk qed tircievi medicini oħra li jistgħu jagħmlu ħsara lill-kliewi tieghek.

Dawn jinkludu:

- medicini li fihom tenofovir, li jintużaw għal kura ta' infezzjoni bl-HIV-1 u/jew infezzjoni b'epatite B kronika
- aminoglycosides, pentamidine jew vancomycin (għal infezzjonijiet batterjali)
- amphotericin B (għal infezzjoni fungali)
- foscarnet (għal infezzjoni virali)
- adefovir (għal infezzjoni bl-HBV)

Dawn il-medicini għandhom jitwaqqfu **mill-anqas 7 ijiem** qabel ma tiehu Vistide.

- Probenecid jista' jinteraġixxi ma' medicini oħra li ta' spiss jintużaw fit-trattament tal-AIDS u mard ieħor li għandu x'jaqsam ma' l-AIDS, bħal zidovudine (AZT). Jekk tkun qed tiehu zidovudine, għandek tiddiskuti mat-tabib tieghek jekk ikunx ahjar li tieqaf tiehu zidovudine għal ftit jew inkella tnaqqas id-doża ta' zidovudine b'50% f'dawk il-ġranet li fihom jingħataw Vistide u probenecid.

- Il-potenzjal ta' interazzjonijiet bejn Vistide u inibituri protease kontra l-HIV ma ġiex studjat.

Meta tuża Vistide ma' l-ikel u max-xorb

Vistide għandu jingħata **wara li tkun kilt xi haġa**. It-tabib tiegħek jista' jagħtik parir biex tixrob hafna fluwidi qabel ma tircievi Vistide.

Tqala u treddigh

- **M'għandekx tingħata Vistide jekk inti tkun tqila.** Jekk tinqabad tqila waqt li tkun qed tircievi din il-medicina, għandek tinforma lit-tabib tiegħek minnufih. Intwera li Vistide jagħmel hsara f'annimali li jkunu għadhom mhux imwielda u allura m'għandux jintuża waqt it-tqala, sakemm il-vantaġġi li jista' jkun hemm ma jiġġustifikawx ir-riskji għall-fetu. **Jekk tista' tohroġ tqila, għandek tuża metodu effettiv ta' kontraċezzjoni** biex ma tinqabadx tqila waqt il-kura b'Vistide u għal xahar wara l-kura.
- **M'għandekx tingħata Vistide jekk tkun qed tredde.** Mhux magħruf jekk Vistide jgħaddix lit-tarbija fil-halib tas-sider, fil-bniedem. Peress li hafna medicini fil-fatt jgħaddu fil-halib tas-sider, fil-bniedem, nisa li jkunu jreddaw għandhom jew iwaqqfu Vistide, jew inkella jieqfu jreddghu jekk ser jibqgħu jieħdu Vistide.
- **B'mod ġenerali, nisa infettati bl-HIV ma għandhomx ireddghu** sabiex ma jittrasmettux l-HIV lit-trabi tagħhom li jkunu għadhom kemm twieldu permezz tal-halib tagħhom.

Sewqan u thaddim ta' magni

Vistide jista' jikkawża effetti ohra transitorji bħal gheja kbira u dgħufija. **Jekk ser issuq jew ser thaddem xi magni, tkellimha mat-tabib tiegħek** biex tara x'parir jagħtik dwar jekk għandekx twaqqaf dawn l-attivitatiet, liema parir ser ikun jiddependi mill-kundizzjoni tal-marda tiegħek, u minn kemm tiflah għal-medicina.

Tagħrif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Vistide

Din il-medicina fiha 2.5 mmol (jew 57 mg) sodju f'kull kunjett u dan għandu jitqies jekk inti qed tikkontrolla l-ammont ta' sodium li tiehu fid-dieta.

3. Kif għandek tuża Vistide

Vistide jingħata bhala infużjoni fil-vina (drupp go vina). M'għandux jingħata bhala metodi ohra li jinkludu injezzjoni ġol-għajn (injezzjoni diretta ġol-għajnejn) jew b'mod topiku (fuq il-ġilda). Vistide irid jingħata minn tabib jew infermiera b'esperjenza adattata fil-kura ta' nies bl-AIDS.

It-tabib jew infermiera ser jittrasferixxu d-doża adattata ta' Vistide mill-kunjett għal borża tal-infużjoni li jkun fiha 100 ml ta' soluzzjoni ta' salina (normali) 0.9%. Il-volum kollu tal-borża ser jingħata bhala infużjoni minn ġol-vina tiegħek b'rata kostanti fuq medda perjodu ta' siegħa bl-użu ta' pompa ta' l-infużjoni standard. Id-doża rakkomandata, frekwenza tal-użu, jew ir-rata tal-infużjoni m'għandhomx jinqabzu. Fl-aħħar ta' dan il-fuljett, hemm informazzjoni addizzjonali għal professjonisti fil-qasam mediku dwar kif jingħata Vistide.

Biex jitnaqqas ir-riskju ta' hsara fil-kliewi, il-pilloli probenecid u fluwidi ġol-vini (soluzzjoni salina) iridu jingħataw fil-jum ta' kull infużjoni b'Vistide. (Ara sub-sezzjonijiet "Kif għandek tiehu probenecid ma' Vistide" u "Kif jingħataw fluwidi IV qabel Vistide" hawn taht.)

Id-doża fil-kbar

Id-doża li ser ikollok bżonn tiġi kkalkulata fuq il-piż tal-ġisem tiegħek.

Trattament li tinda bih

Id-doża ta' Vistide li hija rrakkomandata f'pazjenti li għandhom funzjoni tal-kliewi li hija normali hija ta' 5 mg għal kull kg tal-piż tal-ġisem mogħtija **darba fil-ġimgha għal ġimagħtejn wara xulxin**.

Trattament ta' manteniment

Dan jinbeda' ġimghatejn wara li jitlesta t-trattament tal-bidu, u d-doża ta' Vistide li hija rrakkomandata biex tmanjni biha f'pazjenti b'funzjoni tal-kliewi normali hija ta' 5 mg għal kull kg tal-piż tal-ġisem mogħtija **darba kull ġimagħtejn**.

Regolar tad-doża

Jekk għandek xi problemi tal-kliewi, jista' jagħti l-każ li Vistide mhuwiex kura li tghodd għalik. Kampjuni ta' l-awrina u/jew tad-demem ser jittiehdlek qabel kull infużjoni ta' Vistide u jintużaw biex tiġi eżaminata l-funzjoni tal-kliewi. F'dawk il-pazjenti fejn ikun jidher li hemm tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, id-doża ta' Vistide tiegħek għandha mnejn titwaqqaf jew għal fit, inkella għal kollox, kull każ għalih.

Jekk aċċidentalment ġejt mogħti iktar Vistide minn dik li tkun ordnata lilek, **avża lit-tabib tiegħek minnufih**.

Kif għandek tiehu probenecid ma' Vistide

Il-pilloli probenecid jingħataw biex jitnaqqas ir-riskju ta' hsara fil-kliewi. Int għandek tiehu 3 dozi ta' pilloli probenecid, mill-ħalq, fl-istess jum meta jittiehed Vistide kif muri fit-tabella li ġejja.:

Hin	Doża
3 sigħat qabel il-bidu tal-infużjoni b'Vistide	2 g ta' probenecid
Sagħtejn wara tmiem tal-infużjoni b'Vistide	1 g ta' probenecid
8 sigħat wara tmiem tal-infużjoni b'Vistide	1 g ta' probenecid
Total	4 g ta' probenecid

Probenecid jittiehed biss fl-istess jum li jingħata Vistide.

Kif jingħataw fluwidi IV qabel Vistide

Is-salina normali tingħata biex jitnaqqas ir-riskju ta' hsara fil-kliewi. Inti għandek tingħata total ta' litru ta' soluzzjoni ta' salina (normali) 0.9 % fil-vina (bħala dripp ġo vina) qabel kull doża ta' Vistide. Is-soluzzjoni likwida tas-salina għandha tiġi nfuża fuq perijodu ta' siegħa immedjatament qabel l-infużjoni ta' Vistide. Jekk tkun tiflaħ għal ammont akbar ta' fluwidu, it-tabib għandu mnejn jagħtik litru ieħor ta' fluwidu. Jekk dan it-tieni litru ta' salina jingħata, għandu jingħata jew mal-bidu ta' l-infużjoni ta' Vistide, jew immedjatament wara u għandu jiġi nfuż fuq 1-3 sigħat. It-tabib għandu mnejn jgħidlek ukoll biex tixrob hafna.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, **staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek**.

4. Effetti sekondarji li jista' jkollu

Bħal kull mediċina oħra, Vistide jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd.

Dawn l-effetti sekondarji ġeneralment imorru meta jitwaqqaf it-trattament b'Vistide. **Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek immedjatament.**

L-effett sekondarju l-aktar komuni li ġie osservat b'Vistide kien dak ta' hsara fil-kliewi.

Effetti sekondarji komuni hafna

(Dawn jistgħu jaffettwaw iktar minn utent 1 minn kull 10)

- għadd baxx ta' ċelluli bojod fid-demem, uġiegh ta' ras, dardir, rimettar, proteina fl-awrina, zieda fil-livell tal-kreatinina fis-serum (li huwa kejl tal-funzjoni tal-kliewi), tfartis, raxx, dgħufija/għeja kbira u deni.

Effetti sekondarji li huma komuni

(Dawn jistgħu jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 100)

- infjammazzjoni fl-ghajn, tnaqqis fil-pressjoni ta' ġol-ghajn, diffikulta jew tbatija biex tiehu n-nifs, qtugh ta' nifs, dijarea u tkexkix ta' bard.

Kull uġiegh, hmura jew hakk fl-ghajn, jew kull tibdil fil-vista tiegħek għandhom jiġu rrapportati lit-tabib tiegħek minnufih biex jara jekk hemmx bżonn li jirrevedi t-trattament tiegħek.

Reazzjonijiet ohra li mhux mixtieqa li ġew rrapportati mill-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-suq jinkludu falliment tal-kliewi, hsara liċ-ċelluli tubuli tal-kliewi, infjammazzjoni tal-frixa u impediment tas-smigh.

Effetti sekondarji possibbli meta jittiehed probenecid

Effetti sekondarji komuni hafna possibbilment relatati ma' probenecid

(Dawn jistgħu jaffettwaw iktar minn utent 1 minn kull 10)

- dardir, rimettar, raxx u deni.

Effetti sekondarji komuni possibbilment relatati ma' probenecid

(Dawn jistgħu jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 100)

- uġiegh ta' ras, dgħufija/għeja kbira, tkexkix ta' bard u reazzjonijiet allergiċi.

Biex tnaqqas ir-riskju ta' dardir u/jew rimettar assoċjat ma' l-użu ta' probenecid, **għandek tiekol qabel kull doża**. It-tabib għandu mnejn jgħidek biex tiehu xi medicini ohrajn bħal anti-istamini, anti-emetiċi (medicini għal kontra r-rimettar) u/jew paracetamol biex inaqqaslek l-effetti sekondarji ta' probenecid.

Probenecid jista' wkoll jikkawza effetti sekondarji ohra li jinkludu tnaqqis fl-aptit, uġiegh fil-hanek, fwawar, tfartis, sturdament, tnaqqis fl-għadd taċ-ċelluli homor tad-demem u zieda fil-frekwenza ta' l-awrina. Reazzjonijiet allergiċi ġraw, b'infjammazzjoni tal-ġilda, hakk, tixwik u tingiż, u rament, reazzjonijiet allergiċi severi u reazzjonijiet serji fil-ġilda. Kien hemm ukoll rapporti ta' tnaqqis fl-għadd taċ-ċelluli bojod tad-demem, tossiċita' tal-fwied, tossiċita' tal-kliewi u distruzzjoni ta' ċelluli homor tad-demem. Tnaqqis fil-għadd taċ-ċelluli homor u tat-tromboċiti ġraw ukoll.

Għalhekk qabel ma jagħtik probenecid, it-tabib tiegħek għandu jikkonsulta l-informazzjoni kurrenti dwar l-użu tal-medicina għal iktar informazzjoni dwar is-sigurta' ta' probenecid. **Għandek taqra wkoll il-fuljett ta' tagħrif ta' probenecid.**

5. Kif taħzen Vistide

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax Vistide wara d-data ta' skadenza li tidher fuq it-tikketta.

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-frigġ jew friza.

Il-mediċini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispjazar dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għankekx b'zonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

6. Aktar tagħrif

X'fih Vistide

Is-sustanza attiva ta' Vistide 75 mg/ml hija cidofovir. Kull ml fih 75 mg cidofovir anhydrous. Kull kunjett fih 375 mg/5 ml cidofovir anhydrous.

Is-sustanzi l-oħra huma

- Sodium hydroxide
- Hydrochloric acid
- Ilma għall-injezzjonijiet

Id-dehra ta' Vistide u l-kontenuti tal-pakkett

Vistide jiġi bħala konċentrat sterili għal soluzzjoni għall-infużjoni ġo kunjetti tal-ħgieġ trasparenti li fihom 375 mg tas-sustanza attiva, anhydrous cidofovir, f'5 ml ifformulata f'ilma għall-injezzjonijiet f'konċentrazzjoni ta' 75 mg/ml. Il-formulazzjoni għandha l-pH tagħha aġġustat b'sodium hydroxide (u jekk ikun hemm b'zonn b'hydrochloric acid) u ma għandha ebda preservattivi.

Id-detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq

Gilead Sciences International Limited
Cambridge
CB21 6GT
Ir-Renju Unit

Manifattur

Gilead Sciences Limited
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill Co. Cork
L-Irlanda

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България

Gilead Sciences International Ltd
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Malta

Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.
Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

Gilead Sciences GmbH
Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100

España

Gilead Sciences, S.L.
Tel: + 34 91 378 98 30

France

Gilead Sciences
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Ireland

Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 1223 897555

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Italia

Gilead Sciences S.r.l.
Tel: + 39 02 439201

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Österreich

Gilead Sciences GesmbH
Tel: + 43 1 260 830

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.
Tel: + 48 22 262 8702

Portugal

Gilead Sciences, Lda.
Tel: + 351 21 7928790

România

Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd
Tel: + 44 (0) 1223 897555

Dan il-fuljett kien approvat l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Il-kunjetti ta' Vistide għandhom jiġu miflija qabel ma jintużaw. Jekk ikun jidher li hemm xi frak jew xi tibdil fil-kulur, il-kunjett m'għandux jintuża.

Huwa rakkomandat li jittieħdu prekawzjonijiet xierqa inkluż l-użu ta' apparat tas-sigurtà adattat kemm għall-preparazzjoni, kif ukoll għall-amministrazzjoni u anki għar-rimi ta' Vistide. Il-preparazzjoni tas-soluzzjoni dilwita ta' Vistide għandha ssir ġo *cabinet* tas-sigurtà bijoloġiku tat-tip laminar flow. Dawk li jippreparaw is-soluzzjoni għandhom jilbsu ngwanti tal-kirurgija, nuċċali tas-sigurtà, u lbies twil b'quddiem magħluq u bit-tarf tal-komma jagħlaq sew, bħal dak li jintuża mill-kirurgi waqt l-operazzjonijiet. Jekk Vistide jmiss mal-ġilda, aħsel il-membrani u laħlaħ sew bl-ilma.

Id-doża adattata ta' Vistide għandha tiġi ttrasferita mill-kunjett għal ġo borża tal-infużjoni li jkun fiha 100 ml ta' soluzzjoni ta' salina (normali) 0.9%. Il-volum kollu tal-borża għandu jingħata bħala infużjoni ġo vina tal-pazjent b'rata li hija kostanti fuq medda ta' siegħa bl-użu ta' pompa ta' l-infużjoni standard. Id-doża rakkomandata, il-frekwenza tal-użu, jew ir-rata tal-infużjoni m'għandhomx jinqabżu.

L-istabbiltà kimika ta' Vistide meta dan kien imħallat mas-salina kienet intweriet fi fliexken tal-ħgieġ, f'boroż ta' l-infużjonijiet magħmula minn polyvinyl chloride (PVC), jew ethylene/propylene co-polymer, u anki f'settijiet ta' l-infużjoni ġol-vina b'vent, magħmulin bil-bażi tal-PVC. Tipi oħrajn ta' tubi u boroż ta' l-infużjonijiet ma ġewx studjati.

Il-kompatibilità ta' Vistide mas-soluzzjoni tat-tip Ringer, u mas-soluzzjoni tat-tip Lactated Ringer jew ma' sustanzi fluwidi u batterjostatiċi għall-infużjonijiet, ma ġietx valutata.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatement.

Stabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija li hi l-iktar sa 24 siegħa f'temperatura ta' 2 - 8°C, meta ikun dilwit taħt kundizzjonijiet asemiċi kontrollati u validati. Ħżin għal iktar minn 24 siegħa jew iffriżar mhumiex rakkomandati. Soluzzjonijiet inkesshin għandhom jithallew jishnu sat-temperatura tal-kamra qabel jintużaw.

Vistide issibu f'kunjetti li jintużaw darba biss. Kunjetti nofshom użati għandhom jintremew.