

**LIITE I**  
**VALMISTEYHTEENVETO**

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

## 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Xevudy 500 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten

## 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektioampulli sisältää 500 mg sotrovimabia 8 ml:ssa (62,5 mg/ml).

Sotrovimabi on monoklonaalinen vasta-aine (IgG1, kappa), joka valmistetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

## 3. LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti)

Kirkas, väritön, kellertävä tai rusehtava liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia; pH noin 6 ja osmolaliteetti noin 290 mOsm/kg.

## 4. KLIINiset TIEDOT

### 4.1 Käyttöaiheet

Xevudy on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12 vuoden ikäisten nuorten (paino  $\geq 40$  kg) COVID-19-taudin (koronavirustauti 2019) hoitoon, kun potilas ei tarvitse lisähappea ja vaikean COVID-19-taudin riski on suurentunut (ks. kohta 5.1).

### 4.2 Annostus ja antotapa

Xevudy on annettava sellaisessa terveydenhuollon toimipaikassa, jossa potilasta voidaan seurata lääkkeen annon aikana ja vähintään tunnin ajan sen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Xevudy on suositeltavaa antaa 5 päivän kuluessa COVID-19-taudin oireiden alkamisesta (ks. kohta 5.1).

#### Annostus

*Aikuiset ja nuoret (ikä  $\geq 12$  vuotta ja paino  $\geq 40$  kg)*

Suosittelun annos on 500 mg:n kertainfuusio laimennettuna laskimoon (ks. kohdat 4.4 ja 6.6).

#### Eritysryhmät

##### *Iäkkäät*

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla (ks. kohta 5.2).

##### *Munuaisten vajaatoiminta*

Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 5.2).

### *Maksan vajaatoiminta*

Annosta ei tarvitse muuttaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 5.2).

### *Pediatriset potilaat*

Xevudy-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten tai alle 40 kg painavien lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu (ks. kohta 5.2). Tietoja ei ole saatavilla.

### Antotapa

Laskimoon.

Tämä lääkevalmiste on laimennettava ennen antoa.

Laimentamisen jälkeen liuoksen annossa on suositeltavaa käyttää 0,2 mikrometrin i.v. letkuston suodatinta (in-line). Liuos annetaan 30 minuutin aikana.

Xevudy-valmistetta ei saa antaa nopeana injektiona / bolusinjektiona laskimoon.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta.

## **4.3 Vasta-aiheet**

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

## **4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

### Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

### Yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien anafylaksi

Sotrovimabin annon yhteydessä on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita, myös anafylaksia (ks. kohta 4.8). Jos kliinisesti merkittävän yliherkkyysreaktion tai anafylaksin oireita tai löydöksiä esiintyy, valmisteen anto tulisi lopetettaa välittömästi ja asianmukainen lääkitys ja/tai tukihoito tulee aloittaa.

### Infuusioreaktiot

Infuusioreaktioita on havaittu, kun monoklonaalisia vasta-aineita on annettu laskimoon (ks. kohta 4.8). Reaktiot voivat olla vaikeita tai henkeä uhkaavia. Jos infuusioreaktio kehittyy, infuusio voidaan keskeyttää tai lopettaa tai sitä voidaan hidastaa.

## Antiviraalinen resistenssi

Havaitun omikron BA.2, BA.2.12.1, BA.4 ja BA.5:een kohdistuvan *in vitro* -neutralisoinnin vähenemisen kliinistä merkitystä ei tunneta (ks. kohta 5.1).

## **4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

### Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Sotrovimabi ei erityy munuaisteitse eikä metaboloidu CYP450-entsyymien välityksellä; siksi yhteisvaikutukset muiden munuaisteitse erittyvien lääkevalmisteiden tai CYP-entsyymien substraattien, indusorien tai estäjien kanssa ovat epätodennäköisiä.

### Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Farmakodynaamisissa *in vitro* -tutkimuksissa ei todettu antagonistista vaikutusta sotrovimabin ja remdesiviirin tai bamlanivimabin välillä.

## **4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys**

### Raskaus

Ei ole olemassa tietoja sotrovimabin käytöstä raskaana oleville naisille eikä lisääntymistoksisuutta ole arvioitu eläinkokeissa (ks. kohta 5.3). Ei ole tehty eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta 5.3). Ristireaktiivisen sitoutumisen määrittämisessä, jossa käytettiin ihmisen alkion ja sikiön proteiineilla rikastettuja proteiineja, ei kohteen ulkopuolista sitoutumista havaittu. Sotrovimabi on ihmisen immunoglobuliini G:tä (IgG), joten se saattaa siirtyä äidiltä istukan läpi kehittyvään sikiöön. Ei ole olemassa tietoja istukan läpäisevän sotrovimabin mahdollisista hyödyistä tai riskeistä kehittyvälle sikiölle.

Sotrovimabia saa käyttää raskauden aikana vain, jos odotettavissa oleva hyöty äidille oikeuttaa sikiölle mahdollisesti aiheutuvan riskin.

### Imetys

Ei tiedetä, erittykö sotrovimabi ihmisen rintamaitoon tai imeytyykö se imeväisellä systeemisesti. Sotrovimabin antoa imetyksen aikana voidaan harkita kliinisen tarpeen mukaan.

### Hedelmällisyys

Sotrovimabin vaikutuksista miesten tai naisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Vaikutuksia urosten ja naaraiden hedelmällisyyteen ei ole arvioitu eläinkokeissa.

## **4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn**

Xevudy-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

## **4.8 Haittavaikutukset**

### Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Sotrovimab 500 mg annoksen turvallisuus arvioitiin lumekontrolloidussa sokkoutetussa tutkimuksessa 1049 COVID-19 potilaalla, jotka eivät olleet sairaalahoidossa (COMET-ICE) (ks. kohta 5.1.). Yleisimmät haittavaikutukset olivat yliherkkyysoireet (2 %) ja infuusioreaktiot (1%). Vakavin haittavaikutus oli anafylaksi.

## Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on lueteltu taulukossa 1 elinjärjestelmäluokan ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen ( $\geq 1/10$ ), yleinen ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), melko harvinainen ( $\geq 1/1\ 000$ ,  $< 1/100$ ), harvinainen ( $\geq 1/10\ 000$ ,  $< 1/1\ 000$ ) ja hyvin harvinainen ( $< 1/10\ 000$ ).

**Taulukko 1: Haittavaikutustaulukko**

Elinjärjestelmäluokka	Haittavaikutus	Esiintymistiheys
Immuunijärjestelmä	Yliherkkyysoireet <sup>a</sup> Anafylaksi	Yleinen Harvinainen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina	Hengenahdistus	Melko harvinainen
Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot	Infuusioreaktiot	Yleinen

<sup>a</sup> Esimerkiksi ihottuma ja bronkospasmi. Myös kutina voidaan katsoa yliherkkyysoireeksi.

## Kuvaus valituista haittavaikutuksista

### Infuusioreaktiot

Infuusioreaktiot voivat olla vaikeita tai henkeä uhkaavia (ks. kohta 4.4). Infuusioreaktioiden oireita ja löydöksiä voivat olla kuume, hengitysvaikeudet, happisaturaation pieneneminen, vilunväristykset, pahoinvointi, rytmihäiriöt (esim. eteisvärinä), takykardia, bradykardia, rintakipu tai epämiellyttävä tunne rinnassa, heikotus, psyykkisen tilan muutokset, päänsärky, bronkospasmi, hypotensio, hypertensio, angioedeema, nielun ärsytys, ihottuma (mukaan lukien nokkosihottuma), kutina, lihaskipu, huimaus, uupumus ja diaforeesi (hikoilu).

### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista [liitteessä V](#) luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

## **4.9 Yliannostus**

Sotrovimabin yliannostukseen ei ole spesifistä hoitoa. Yliannostuksen yhteydessä potilaalle on annettava elintoimintoja tukevaa hoitoa ja vointia on seurattava asianmukaisesti tarpeen mukaan.

## **5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET**

### **5.1 Farmakodynamiikka**

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antiviraaliset monoklonaaliset vasta-aineet, ATC-koodi: J06BD05

### Vaikutusmekanismi

Sotrovimabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1-vasta-aine (IgG1-mAb), joka sitoutuu erittäin konservoituneeseen epitooppiin, joka on SARS-CoV-2-viruksen piikkiproteiinin reseptoriin sitoutuvassa domeenissa.

## Antiviraalinen aktiivisuus

Sotrovimabi neutraloi villin tyyppin SARS-CoV-2-virusta *in vitro* kun puolet maksimaalisesta tehokkaasta konsentraatiosta (EC<sub>50</sub> -arvo ) on 100,1 ng/ml.

**Taulukko 2: Sotrovimabin neutralointi data SARS-CoV-2-variantteja vastaan**

SARS-CoV-2-variantti		-kertainen herkkyuden aleneminen <sup>a</sup>	
Linja	WHO-nimitys	Pseudotyyppitetty virus	Autenttinen virus
B.1.1.7	alfa	ei muutosta	ei muutosta
B.1.351	beeta	ei muutosta	ei muutosta
P.1	gamma	ei muutosta	ei muutosta
B.1.617.2	delta	ei muutosta	ei muutosta
AY.1 ja AY.2	delta [+K417N]	ei muutosta	ei testattu
AY.4.2	delta [+]	ei muutosta	ei testattu
B.1.427/B.1.429	epsilon	ei muutosta	ei testattu
B.1.526	iota	ei muutosta	ei testattu
B.1.617.1	kappa	ei muutosta	ei muutosta
C.37	lambda	ei muutosta	ei testattu
B.1.621	myy	ei muutosta	ei testattu
B.1.1.529/BA.1	omikron	ei muutosta	ei muutosta
BA.1.1	omikron	ei muutosta	ei muutosta
BA.2	omikron	16	15,7 35,1 <sup>b</sup>
BA.2.12.1	omikron	16,6	ei testattu
BA.3	omikron	7,3	ei testattu
BA.4	omikron	21,3	ei testattu
BA.5	omikron	22,6	ei testattu

<sup>a</sup> Perustuu EC<sub>50</sub>-arvon muutokseen verrattuna villiin tyyppiin. Ei muutosta: ≤5-kertainen EC<sub>50</sub> -arvon muutos verrattuna villiin tyyppiin.

<sup>b</sup> Perustuu EC<sub>90</sub>-arvon muutokseen verrattuna villiin tyyppiin.

## Viruslääkeresistenssi

Viruksen pääsyä soluihin ei havaittu pienimmällä testatulla vasta-ainepitoisuudella (~ 10 x EC<sub>50</sub>), kun virusta viljeltiin 10:n solujen jaon ajan (34 vrk) aina samassa vasta-ainepitoisuudessa.

Kun resistenttejä variantteja pakotettiin syntymään suurenevan pitoisuuden valintamenetelmällä, E340A tunnistettiin sotrovimabi-mAb:lle resistentiksi mutantiksi (MARM). E340A-substituutio ilmestyi, kun soluviljelmistä valittiin resistenttejä viruksia, ja sen aktiivisuus oli yli 100 kertaa alhaisempi pseudotyyppitetystä VLP-määrittelyssä.

Pseudotyyppitetty VLP-määrittely soluviljelmässä osoitti, että epitooppisekvenssin polymorfismit K356T, P337H/K/L/R/T, E340A/K/G/I/Q/V, T345P ja L441N vähensivät herkkyttä sotrovimabilille. Tämä päätelmä perustuu siihen, että niiden EC<sub>50</sub>-arvojen havaittiin suurentuneen sulkeissa esitetyn kerrannaisluvun verran: P337K (>304), E340K (>297), T345P (225), E340V (>200), P337R (>192), P337L (>192), E340I (>190), E340A (>100), L441N (72), E340Q (>50), E340G (18,21), P337T (10,62), K356T (5,90) ja P337H (5,13). Erittäin yleisen D614G-substituution esiintyminen joko yksinään tai yhdistelmässä ei vaikuttanut sotrovimabin neutralointiaktiivisuuteen.

Kliinisessä COMET-ICE-tutkimuksessa 20:llä sotrovimabihaaran potilaalla todettiin lähtötilanteen jälkeisiä epitooppivariantteja (A344V [6,2 %]; R346G [5,2 %]; K356R [7,5 %]; E340A [99,0 %]; E340V [73,1 %]; P337L/E340K [49,4 % / 54,8 %]; 2 potilaalla todettiin S359G [12,2 % ja 8,3 %], 5 potilaalla E340K [8,0 % – 99,9 %] ja 7 potilaalla C361T [5,0 % – 15,7 %]. Lähtötilanteessa ja lähtötilanteen jälkeen kummassa tahansa tutkimushaarassa havaituista varianteista 14 (L335F, L335S, P337L, G339C, E340A, E340K, A344V, R346I, R346G, K356N, K356R, R357I, I358V ja S359G) on fenotyypiarvioitu pseudotyypitetyn VLP-menetelmän avulla. Sotrovimabin aktiivisuus säilyy seuraavia variantteja vastaan: L335F (0,8-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), L335S (0,9-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), G339C (1,2-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), A344V (1,1-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), R346I (1,7-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), R346G (0,9-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), K356N (1,1-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), K356R (0,8-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), R357I (1-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos), I358V (0,7-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos) ja S359G (0,8-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos). P337L, E340A ja E340K vähensivät herkkyyttä sotrovimabilille (yli 100-kertainen EC<sub>50</sub>-arvon muutos). Näiden muunnosten vaikutusta kliiniseen hoitovasteeseen ei kuitenkaan vielä tunneta.

### Kliininen teho

Tutkimus 214367 (COMET-ICE) oli faasin II/III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa sotrovimabia arvioitiin COVID-19-taudin hoitona ei-sairaalahoitossa olevilla rokottamattomilla aikuispotilailla, jotka eivät tutkimukseenottovaiheessa tarvinneet lisähappea missään muodossa. Tutkimukseen otettiin potilaita, joilla oli ollut oireita ≤ 5 vuorokauden ajan ja joilla SARS-CoV-2-infektio oli varmistettu laboratoriotutkimuksella. Tutkimus toteutettiin villin tyypin Wuhan-Hu-1 viruksen ollessa vallitseva, yleisimmät variantit olivat alfa ja epsilon. Tutkimukseen soveltuneilla potilailla oli vähintään yksi seuraavista: diabetes, lihavuus (BMI > 30), krooninen munuaistauti, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, keuhkohtaumatauti, keskivaikea tai vaikea astma, tai vähintään 55 vuoden ikä.

Potilaat satunnaistettiin saamaan yksi 500 mg:n sotrovimabi-infuusio (N = 528) tai lumelääkettä (N = 529) yhden tunnin aikana. Lähtöryhmien (Intent To Treat, ITT) mukaisessa populaatiossa (päivänä 29) 46 % oli miehiä ja iän mediaani oli 53 vuotta (vaihteluväli 17–96 vuotta); 20 % tutkittavista oli vähintään 65-vuotiaita ja 11 % yli 70-vuotiaita. Tutkittavista 59 % sai hoidon 3 vuorokauden kuluessa COVID-19-oireiden alkamisesta ja 41 % 4–5 vuorokauden kuluessa. Neljä yleisintä ennalta määriteltyä riskitekijää tai samanaikaista tilaa olivat lihavuus (63 %), vähintään 55 vuoden ikä (47 %), lääkitystä vaativa diabetes (22 %) ja keskivaikea tai vaikea astma (17 %).

Päivään 29 mennessä tapahtuvan sairaalahoiton tai kuoleman mukautettu suhteellisen riskin pienenemä oli lähtöryhmien mukaisessa populaatiossa 79 % (95 % lv: 50 %, 91 %). Ero johtui sairaalahoitojen määrästä; päivään 29 mennessä sotrovimabihaarassa ei esiintynyt kuolemantapauksia ja lumelääkehaarassa esiintyi kaksi. Yksikään sotrovimabihaaran potilaista (verrattuna 14:ään lumelääkehaaran potilaaseen) ei tarvinnut suurivirtauksista happea eikä mekaanista ventilaatiota päivään 29 mennessä.

**Taulukko 3 Ensijaisia ja toissijaisia päätetapahtumia koskevat tulokset lähtöryhmien (ITT) mukaisessa populaatiossa (COMET-ICE)**

	Sotrovimabi (500 mg infuusiona laskimoon) N = 528	Lume  N = 529
<b>Ensijainen päätetapahtuma</b>		
<b>COVID-19-taudin eteneminen: määritelmänä yli 24 tuntia jatkunut akuuttihoito sairaalassa minkä tahansa sairauden vuoksi tai kuolema mistä tahansa syystä (päivä 29)</b>		
Osuus (n, %) <sup>a</sup>	6 (1 %)	30 (6 %)
Korjattu suhteellisen riskin pienenemä (95 % lv)	79 % (50 %, 91 %)	
p-arvo	< 0,001	
<b>Toissijainen päätetapahtuma</b>		
<b>Eteneminen vaikeaksi ja/tai kriittiseksi COVID-19-hengitystieinfektioksi (päivä 29)<sup>b</sup></b>		
Osuus (n, %)	7 (1 %)	28 (5 %)
Korjattu suhteellisen riskin pienenemä (95 % lv)	74 % (41 %, 88 %)	
p-arvo	0,002	
<sup>a</sup> Sotrovimabihaarassa yksikään tutkittavista ei tarvinnut tehohoitoa; lumehaarassa tehohoitoa tarvitsi 9 tutkittavaa.		
<sup>b</sup> Eteneminen vaikeaksi ja/tai kriittiseksi COVID-19-hengitystieinfektioksi: määritelmänä lisähapen tarve (pienivirtauksinen happi happiviiksillä/maskilla, suurivirtauksinen happi, noninvasiivinen ventilaatio, mekaaninen ventilaatio tai kehonulkoinen happeuttaminen [ECMO]).		

### Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Xevudy-valmisteen käytöstä COVID-19-taudin hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

## **5.2 Farmakokinetiikka**

### Imeytyminen

Geometrinen  $C_{max}$ -keskiarvo tunnin kestäneen 500 mg laskimoinfuusion jälkeen oli 117,6 mikrog/ml (N = 290, CV % 46,5) ja pitoisuuden geometrinen keskiarvo päivänä 29 oli 24,5 mikrog/ml (N = 372, CV % 42,4).

### Jakautuminen

Tilamalleista riippumattoman analyysin perusteella vakaan tilan jakautumistilavuuden keskiarvo oli 8,1 l.

### Biotransformaatio

Sotrovimabin hajottamisesta vastaavat proteolyttiset entsyymit, joita löytyy laajalti elimistöstä.

### Eliminaatio

Tilamalleista riippumattoman analyysin perusteella systeemisen puhdistuman (CL) keskiarvo oli 125 ml/vrk ja terminaalisen puoliintumisajan mediaani noin 49 vrk.



## Erityisryhmät

### *Iäkkäät potilaat*

Populaatiofarmakokineettisissä analyyseissa sotrovimabin farmakokinetiikan ei havaittu muuttuvan iäkkäillä potilailla.

### *Munuaisten vajaatoiminta*

Sotrovimabimolekyyli on liian suuri erittyäkseen munuaisteitse, joten munuaisten vajaatoiminta ei todennäköisesti vaikuta millään tavoin eliminaatioon. Populaatiofarmakokineettisissä analyyseissa ei myöskään havaittu eroa sotrovimabin farmakokinetiikassa potilailla, joilla oli lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta.

### *Maksan vajaatoiminta*

Sotrovimabi hajoaa laajasti esiintyvien proteolyyttisten entsyymien avulla, joiden esiintyminen ei rajoitu maksakudokseen, joten maksatoiminnan muutokset eivät todennäköisesti vaikuta millään tavoin eliminaatioon. Populaatiofarmakokineettisissä analyyseissa ei myöskään havaittu eroa sotrovimabin farmakokinetiikassa potilailla, joilla ALAT-arvo oli lievästi tai keskivaikeasti koholla (1,25 – < 5 x viitealueen yläraja [ULN]).

### *Pediatriset potilaat*

Sotrovimabin farmakokinetiikkaa ei ole arvioitu alle 18-vuotiailla potilailla. Suositeltu annos nuorilla (ikä  $\geq$  12 vuotta ja paino  $\geq$  40 kg) johtaa arvioiden mukaan samanlaisiin sotrovimabipitoisuuksiin seerumissa kuin aikuisilla. Perusteena on allometrinen skaalaus, jossa tarkasteltiin ikään liittyvien painon muutosten vaikutusta puhdistumaan ja jakautumistilavuuteen.

## **5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta**

### Karsinogeneesi/mutageneesi

Sotrovimabilla ei ole tehty genotoksisuus- eikä karsinogeenisuustutkimuksia.

### Lisääntymistoksisuus

Sotrovimabilla ei ole tehty ei-kliinisiä lisääntymis- ja kehitystoksisuustutkimuksia.

### Eläintoksikologia ja farmakologia

Sotrovimabilla ei havaittu toksisuutta jaavanapinalla tehdyssä 2 viikkoa kestäneessä toistuvan annoksen iv infuusiotoksikologisessa tutkimuksessa. Toipumisaika oli 105 päivää enintään 500 mg/kg annoksilla, joka oli korkein annos, jolla ei havaittu toksisia haittavaikutuksia (NOAEL) sekä suurin testattu annos.  $C_{max}$ - ja kokonaisaltistuksen AUC- [AUC<sub>0-168h</sub> summa 1. annoksen jälkeen ja AUC<sub>0-viimeinen</sub> 2. annoksen jälkeen (päivä 8)] -arvot 500 mg/kg annoksella (NOAEL) olivat 13 500 µg/ml ja 216 000 päivä\* µg/ml, vastaavasti.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

Histidiini

Histidiinimonohydrokloridi

Sakkarosi

Polysorbaatti 80

Metioniini

Injektionesteisiin käytettävä vesi

## 6.2 Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

## 6.3 Kesto aika

### Avaamaton injektio pullo

18 kuukautta

### Laimennettu infuusioneste

Laimennettu liuos on tarkoitettu käytettäväksi välittömästi. Jos laimennettua liuosta ei voida antaa heti laimentamisen jälkeen, sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) enintään 6 tunnin ajan tai jääkaapissa (2 °C – 8 °C) enintään 24 tunnin ajan (aika laimentamisesta infuusion päättymiseen).

## 6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

## 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Tyypin I kirkkaasta borosilikaattilasista valmistettu, yhtä käyttökertaa varten tarkoitettu 10 ml:n injektio pullo, jossa on harmaa, fluoropolymeerillä päällystetty klorobutyylilastomeeritulppa ja joka on sinetöity alumiinisella repäisykorkilla.

Pakkauskoko: 1 injektio pullo.

## 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Vain pätevän terveydenhuollon ammattilaisen tulisi saattaa valmiste käyttökuntoon noudattamalla aseptista tekniikkaa.

### Laimentamista edeltävät valmistelut

1. Ota yksi sotrovimabi-injektio pullo jääkaapista (2 °C – 8 °C). Anna injektio pullon lämmetä huoneenlämpöiseksi valolta suojassa noin 15 minuutin ajan.
2. Tarkista silmämääräisesti, ettei injektio pullossa näy hiukkasia eikä pullo ole vaurioitunut. Jos injektio pullo on käyttökelvoton, hävitä se ja aloita valmistelut alusta uudella injektio pullolla.
3. Pyörittele injektio pulloa varovasti useita kertoja ennen käyttöä. Vältä ilmakuplia. Älä ravista äläkä sekoita injektio pulloa voimakkaasti.

### Laimennusohjeet

1. Vedä ruiskuun ja hävitä 8 ml nestettä infuusiopussista, joka sisältää 50 ml tai 100 ml injektio nestettä (NaCl 9 mg/ml [0,9 %] tai 5 % glukoosi).
2. Vedä injektio pullosta ruiskuun 8 ml sotrovimabia.
3. Ruiskuta 8 ml:n sotrovimabiannos infuusiopussiin kalvon läpi.
4. Hävitä injektio pulloon mahdollisesti käyttämättä jäänyt liuos. Injektio pullo on vain yhtä käyttökertaa varten ja vain yhden potilaan käyttöön.
5. Ennen infuusion aloittamista, kallistele infuusiopussia varovasti puolelta toiselle 3–5 kertaa. Älä käännä infuusiopussia ylösalaisin. Vältä ilmakuplia.

## Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

### **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
12 Riverwalk  
Citywest Business Campus  
Dublin 24  
Irlanti

### **8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

EU/1/21/1562/001

### **9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 17 joulukuuta 2021

### **10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla <http://www.ema.europa.eu>.

## **LIITE II**

- A. BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA**
- B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**
- C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET**
- D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ**

**A. BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA**

Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite

WuXi Biologics Co., Ltd.  
108 Meiliang Road  
Mashan, Binhu District  
WuXi, Jiangsu, 214092  
Kiina

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.  
Strada Provinciale Asolana No. 90  
43056 San Polo di Torrile, Parma  
Italia

**B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET**

Reseptilääke.

**C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET**

• **Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset**

Tämän lääkevalmisteen osalta velvoitteet määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisesta on määritelty Euroopan unionin viitepäivämäärät (EURD) ja toimittamisvaatimukset sisältävässä luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EY 107 c artiklan 7 kohdassa, ja kaikissa luettelon myöhemmissä päivityksissä, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla.

Myyntiluvan haltijan tulee toimittaa tälle valmisteelle ensimmäinen määräaikainen turvallisuuskatsaus kuuden kuukauden kuluessa myyntiluvan myöntämisestä.

**D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ**

• **Riskienhallintasuunnitelma (RMP)**

Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan modulissa 1.8.2 esitetyn sovitun riskienhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen riskienhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti.

Päivitetty RMP tulee toimittaa

- Euroopan lääkeviraston pyynnöstä
- kun riskienhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite (lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa).

**LIITE III**

**MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE**

## **A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT**

**ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT**

**INJEKTIOPULLON KOTELO**

**1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

Xevudy 500 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
sotrovimabi

**2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)**

Yksi injektiopullo sisältää 500 mg sotrovimabia 8 ml:ssa (62,5 mg/ml).

**3. LUETTELO APUAINEISTA**

Muut aineet: histidiini, histidiinimonohydrokloridi, sakkaroosi, polysorbaatti 80, metioniini,  
injektionesteisiin käytettävä vesi

**4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ**

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

1 injektiopullo

**5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)**

Laimennettuna laskimoon.  
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Avaa painamalla tästä

**6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN  
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

**7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN**

**8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP

**9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET**

**Säilytä jääkaapissa.**

Ei saa jäätyä.



Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

**10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN**

**11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
12 Riverwalk  
Citywest Business Campus  
Dublin 24  
Irlanti

**12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

EU/1/21/1562/001

**13. ERÄNUMERO**

Lot

**14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU**

**15. KÄYTTÖOHJEET**

**16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA**

Vapautettu pistekirjoituksesta.

**17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI**

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

**18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT**

PC  
SN  
NN

**PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT  
INJEKTIOPULLON ETIKETTI**

**1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)**

Xevudy 500 mg steriili konsentraatti  
sotrovimabi  
i.v.

**2. ANTOTAPA**

i.v.

**3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ**

EXP

**4. ERÄNUMERO**

Lot

**5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ**

**6. MUUTA**

## **B. PAKKAUSSELOSTE**

## Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

### Xevudy 500 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten sotrovimabi

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Xevudy on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Xevudy-valmistetta
3. Miten Xevudy-valmistetta annetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Xevudy-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Xevudy on ja mihin sitä käytetään

Xevudy-valmisteen vaikuttava aine on sotrovimabi. Sotrovimabi on *monoklonaalinen vasta-aine*, eli proteiini, joka on kehitetty tunnistamaan tietty kohde COVID-19-tautia (koronavirustauti 2019) aiheuttavassa SARS-CoV-2-viruksessa.

Xevudy on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12 vuoden ikäisten nuorten (paino  $\geq$  40 kg) COVID-19-taudin hoitoon. Valmisteen kohteena on piikkiproteiini, jonka avulla virus kiinnittyy soluihin. Xevudy estää virusta pääsemästä soluun ja monistumasta. Kun viruksen monistuminen elimistössä estyy, Xevudy voi auttaa elimistöä nujertamaan infektion ja ehkäistä vakavaa sairastumista.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Xevudy-valmistetta

**Älä käytä Xevudy-valmistetta**

- jos olet allerginen sotrovimabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- ➔ **Käänny lääkärin puoleen**, jos arvelet tämän koskevan sinua.

**Varoitukset ja varotoimet**

**Allergiset reaktiot**

Xevudy voi aiheuttaa allergisia reaktioita.  
➔ Ks. kohta 4, ”Allergiset reaktiot”.

**Infuusioreaktiot**

Xevudy voi aiheuttaa infuusioon liittyviä reaktioita.  
➔ Ks. kohta 4, ”Infuusioon liittyvät reaktiot”.

**Lapset ja nuoret**

Xevudy-valmistetta ei saa antaa alle 12 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille, jotka painavat alle 40 kg.

## Muut lääkevalmisteet ja Xevudy

**Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat,** olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

## Raskaus ja imetys

Jos olet **raskaana, epäilet olevasi raskaana** tai jos **suunnittelet** lapsen hankkimista, **kysy lääkäriltä** neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi kertoo sinulle, ovatko Xevudy-hoidon hyödyt suuremmat kuin sinuun tai lapseesi kohdistuvat todennäköiset riskit.

**Ei tiedetä,** erittyvätkö Xevudy-valmisteen sisältämät aineet rintamaitoon. **Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa** ennen tämän lääkkeen käyttöä.

## Ajaminen ja koneiden käyttö

Xevudy-valmisteen ei odoteta vaikuttavan ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

## 3. Miten Xevudy-valmistetta annetaan

**Suositteltu annos** aikuisille ja vähintään 12-vuotiaalle nuorille (paino vähintään 40 kg) on

- 500 mg (yksi injektio-pullo).

Lääkkeestä valmistetaan liuos, jonka lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tiputuksena (*infuusiona*) laskimoon. Koko lääkeannoksen antaminen vie puoli tuntia. Sinua seurataan koko infuusion ajan ja vähintään tunnin ajan hoidon jälkeen.

Jäljempänä olevassa osiossa ”Tietoa terveydenhuoltohenkilöstölle” annetaan ohjeet lääkärille, apteekkihenkilökunnalle ja sairaanhoitajalle Xevudy-infuusion valmistamiseen ja antoon.

## 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

### Allergiset reaktiot

Xevudy-valmisteseen liittyvät allergiset reaktiot ovat **yleisiä** ja niitä esiintyy enintään 1 henkilöllä 10:stä.

Nämä allergiset reaktiot ovat harvoin vaikeita (*anafylaksi*) ja niitä esiintyy enintään 1 henkilöllä 1 000:sta (esiintymistiheys **harvinainen**). Jos sinulla esiintyy Xevudy-valmisteen annon jälkeen jokin seuraavista oireista, sinulla saattaa olla allerginen reaktio ja **sinun tulee hakeutua välittömästi lääkärinhoitoon:**

- ihottuma, joka muistuttaa nokkosihottumaa, tai ihon punoitus
- kutina
- turvotus, joskus kasvojen tai suun alueen turpoaminen (*angioedeema*)
- voimakas hengityksen vinkuminen, yskä tai hengitysvaikeudet
- äkillinen heikotus tai pyöräytyks (joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen tai kaatumisen).

### Infuusioreaktiot

Infuusion yhteydessä allergisten reaktioiden kaltaiset reaktiot ovat **yleisiä** ja niitä esiintyy enintään 1 henkilöllä 10:stä. Ne kehittyvät yleensä muutamassa minuutissa tai tunnissa, mutta ne voivat kehittyä jopa 24 tunnin kuluttua hoidosta tai myöhemmin. Mahdolliset oireet ovat esitetty alla. Jos sinulla esiintyy Xevudy-hoidon jälkeen jokin seuraavista oireista, sinulla saattaa olla infuusioon liittyvä reaktio ja **sinun tulee hakeutua välittömästi lääkärinhoitoon:**

- punastuminen
- vilunväristykset
- kuume
- hengitysvaikeudet
- sydämen tiheälyöntisyys
- verenpaineen lasku.

### **Muut haittavaikutukset**

**Melko harvinaiset** (esiintyy enintään 1 henkilöllä 100:sta)

- hengenahdistus (*dyspnea*).

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan [liitteessä V](#) luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

## **5. Xevudy-valmisteen säilyttäminen**

Tämän lääkkeen säilyttäminen ja käyttämättä jääneen valmisteen asianmukainen hävittäminen ovat sinua hoitavan terveydenhuoltohenkilöstön vastuulla.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Ei saa jäätyä.

Ennen laimentamista:

- Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).
- Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennettu liuos on käytettävä välittömästi. Jos laimennettua liuosta ei voida antaa heti laimentamisen jälkeen, sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) enintään 6 tunnin ajan tai jääkaapissa (2 °C – 8 °C) enintään 24 tunnin ajan (aika laimentamisesta infuusion päättymiseen).

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Xevudy sisältää**

- Vaikuttava aine on sotrovimabi. Yksi injektiopullo sisältää 500 mg sotrovimabia 8 ml:ssa konsentraattia.
- Muut aineet ovat histidiini, histidiinimonohydrokloridi, sakkaroosi, polysorbaatti 80, metioniini ja injektioneiteisiin käytettävä vesi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)**

Xevudy on kirkas, väritön, kellertävä tai rusehtava neste, joka on saatavilla lasista valmistetussa, yhtä käyttökertaa varten tarkoitettussa injektiopullossa, jossa on kumitulppa ja alumiininen repäisyseinä. Yksi kotelo sisältää yhden injektiopullon.

**Myyntiluvan haltija**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
12 Riverwalk  
Citywest Business Campus  
Dublin 24  
Irlanti

**Valmistaja**

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.  
Strada Provinciale Asolana, 90,  
43056 San Polo di Torrile, Parma  
Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

**België/Belgique/Belgien**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

**Lietuva**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 370 80000334

**България**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Тел.: + 359 80018205

**Luxembourg/Luxemburg**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Belgique/Belgien  
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

**Česká republika**

GlaxoSmithKline, s.r.o.  
Tel: + 420 222 001 111  
cz.info@gsk.com

**Magyarország**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited.  
Tel: + 36 80088309

**Danmark**

GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Tlf: + 45 36 35 91 00  
dk-info@gsk.com

**Malta**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited.  
Tel: + 356 80065004

**Deutschland**

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701  
produkt.info@gsk.com

**Nederland**

GlaxoSmithKline BV  
Tel: + 31 (0)33 2081100

**Eesti**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited.  
Tel: + 372 8002640

**Norge**

GlaxoSmithKline AS  
Tlf: + 47 22 70 20 00

**Ελλάδα**

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Τηλ: + 30 210 68 82 100

**Österreich**

Novartis Pharma GmbH  
Tel: + 43 (0)1 97075 0  
at.info@gsk.com

**España**

GlaxoSmithKline, S.A.  
Tel: + 34 900 202 700  
es-ci@gsk.com

**Polska**

GSK Services Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

**France**

Laboratoire GlaxoSmithKline

**Portugal**

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44  
diam@gsk.com

**Hrvatska**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: +385 800787089

**Ireland**

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
Tel: + 353 (0)1 4955000

**Ísland**

Vistor hf.  
Sími: + 354 535 7000

**Italia**

GlaxoSmithKline S.p.A.  
Tel: + 39 (0)45 7741111

**Κύπρος**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Τηλ: + 357 80070017

**Latvija**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 371 80205045

Tel: + 351 21 412 95 00  
FI.PT@gsk.com

**România**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 40800672524

**Slovenija**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 386 80688869

**Slovenská republika**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 421 800500589

**Suomi/Finland**

GlaxoSmithKline Oy  
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

**Sverige**

GlaxoSmithKline AB  
Tel: + 46 (0)8 638 93 00  
info.produkt@gsk.com

**United Kingdom (Northern Ireland)**

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
Tel: + 44 (0)800 221441  
customercontactuk@gsk.com

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi**

**Muut tiedonlähteet**

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla  
<http://www.ema.europa.eu>.

**Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:**

Tarkemmat tiedot, ks. valmisteyhteenveto.

Vain pätevän terveydenhuollon ammattilaisen tulisi saattaa valmiste käyttökuntoon noudattamalla aseptista tekniikkaa.

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Laimentamista edeltävät valmistelut

1. Ota yksi sotrovimabi-injektiopullo jääkaapista (2 °C – 8 °C). Anna injektiopullon lämmetä huoneenlämpöiseksi valolta suojassa noin 15 minuutin ajan.
2. Tarkista silmämääräisesti, ettei injektiopullossa näy hiukkasia eikä pullo ole vaurioitunut. Jos injektiopullo on käyttökelvoton, hävitä se ja aloita valmistelut alusta uudella injektiopullolla.



3. Pyörittele injektiopulloa varovasti useita kertoja ennen käyttöä. Vältä ilmakuplia. Älä ravista äläkä sekoita injektiopulloa voimakkaasti.

#### Laimennusohjeet

1. Vedä ruiskuun ja hävitä 8 ml nestettä infuusiopussista, joka sisältää 50 ml tai 100 ml injektionestettä (NaCl 9 mg/ml [0,9 %] tai 5 % glukoosi).
2. Vedä injektiopullostas ruiskuun 8 ml sotrovimabia.
3. Ruiskuta 8 ml:n sotrovimabiannos infuusiopussiin kalvon läpi.
4. Hävitä injektiopulloon mahdollisesti käyttämättä jäänyt liuos. Injektiopullo on vain yhtä käyttökertaa varten ja vain yhden potilaan käyttöön.
5. Ennen infuusion aloittamista, kallistele infuusiopussia varovasti puolelta toiselle 3–5 kertaa. Älä käännä infuusiopussia ylösalaisin. Vältä ilmakuplia.

Laimennettu sotrovimabiliuos on käytettävä välittömästi. Jos laimennettua liuosta ei voida antaa heti laimentamisen jälkeen, sitä voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C) enintään 6 tunnin ajan tai jääkaapissa (2 °C – 8 °C) enintään 24 tunnin ajan (aika laimentamisesta infuusion päättymiseen).

#### Anto-ohjeet

1. Yhdistä infuusiosetti infuusiopussiin tavanomaisella letkustolla. Laskimon sisäisesti annosteltavan liuoksen annossa on suositeltavaa käyttää 0,2 mikrometrin i.v. letkuston suodatinta (in-line).
2. Esitäytä infuusiosetti.
3. Anna valmiste 30 minuutin infuusiona laskimoon huoneenlämmössä.

#### Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.