

ANNEX I

**LISTA TA' L-ISMIJET, GHAMLA FARMAĊEWTIKA , QAWWIET TAL-PRODOTTI
MEDIĊINALI, MNEJN JINGHATA, L-APPLIKANTI, ID-DETENTURI TA'
L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ FL-ISTATI MEMBRI**

<u>Stat Membru</u>	<u>Id-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq</u>	<u>L-Applikant</u>	<u>Isem Ivvintat</u>	<u>Qawwa</u>	<u>Għamla Farmaċewtika</u>	<u>Mnjen jinghata</u>	<u>Il-Kontenut (Koncentrat)</u>
Il-Ġermanja	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il-Ġermanja		Fentanyl- ratiopharm 25 µg/h Matrixpflaster	25 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn għol-għilda	użu transdermali	4.125 mg/7.5 cm ² li terħi 25 µg fentanyl fis-siegħa
Il-Ġermanja	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il-Ġermanja		Fentanyl- ratiopharm 50 µg/h Matrixpflaster	50 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn għol-għilda	użu transdermali	8.25 mg/15 cm ² li terħi 50 µg fentanyl fis-siegħa
Il-Ġermanja	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il-Ġermanja		Fentanyl- ratiopharm 75 µg/h Matrixpflaster	75 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn għol-għilda	użu transdermali	12.375 mg/22.5 cm ² li terħi 75 µg fentanyl fis-siegħa
Il-Ġermanja	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il-Ġermanja		Fentanyl- ratiopharm 100 µg/h Matrixpflaster	100 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn għol-għilda	użu transdermali	16.5 mg/30 cm ² li terħi 100 µg fentanyl fis-siegħa
L-Awstrija		ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer- Gasse 3, 1140 WIEN, L-Awstrija	Fentanyl- ratiopharm 25 µg/h transdermales Matrixpflaster	25 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn għol-għilda	użu transdermali	4.125 mg/7.5 cm ² li terħi 25 µg fentanyl fis-siegħa
L-Awstrija		ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer-	Fentanyl- ratiopharm 50 µg/h transdermales	50 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn	użu transdermali	8.25 mg/15 cm ² li terħi 50 µg fentanyl fis-siegħa

		Gasse 3, 1140 WIEN, L-Awstrija	Matrixpflaster		ġol-ġilda		
L-Awstrija		ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer- Gasse 3, 1140 WIEN, L-Awstrija	Fentanyl- ratiopharm 75 µg/h transdermales Matrixpflaster	75 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	12.375 mg/22.5 cm ² li terħi 75 µg fentanyl fis-sieġha
L-Awstrija		ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer- Gasse 3, 1140 WIEN, L-Awstrija	Fentanyl- ratiopharm 100 µg/h transdermales Matrixpflaster	100 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	16.5 mg/30 cm ² li terħi 100 µg fentanyl fis-sieġha
Franza		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Fentanyl ratiopharm 25 µg/h, dispositif transdermique	25 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	4.125 mg/7.5 cm ² li terħi 25 µg fentanyl fis-sieġha
Franza		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Fentanyl ratiopharm 50 µg/h, dispositif transdermique	50 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	8.25 mg/15 cm ² li terħi 50 µg fentanyl fis-sieġha
Franza		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Fentanyl ratiopharm 75 µg/h, dispositif transdermique	75 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	12.375 mg/22.5 cm ² li terħi 75 µg fentanyl fis-sieġha
Franza		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Fentanyl ratiopharm 100 µg/h, dispositif transdermique	100 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	16.5 mg/30 cm ² li terħi 100 µg fentanyl fis-sieġha

L-Olanda	ratiopharm Nederland bv Ronde Tocht 11, 1507 CC Zaandam, L- Olanda		Fentanyl ratiopharm 25 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik	25 µg/h	garża li tipprovdi medicína li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	4.125 mg/7.5 cm ² li terhi 25 µg fentanyl fis-sieġha
L-Olanda	ratiopharm Nederland bv Ronde Tocht 11, 1507 CC Zaandam, L- Olanda		Fentanyl ratiopharm 50 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik	50 µg/h	garża li tipprovdi medicína li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	8.25 mg/15 cm ² li terhi 50 µg fentanyl fis-sieġha
L-Olanda	ratiopharm Nederland bv Ronde Tocht 11, 1507 CC Zaandam, L- Olanda		Fentanyl ratiopharm 75 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik	75 µg/h	garża li tipprovdi medicína li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	12.375 mg/22.5 cm ² li terhi 75 µg fentanyl fis-sieġha
L-Olanda	ratiopharm Nederland bv Ronde Tocht 11, 1507 CC Zaandam, L- Olanda		Fentanyl ratiopharm 100 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik	100 µg/h	garża li tipprovdi medicína li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	16.5 mg/30 cm ² li terhi 100 µg fentanyl fis-sieġha
Spanja	ratiopharm España, S.A. Avenida de Burgos 16D, 5º Planta, 28036 Madrid, Spanja		Fentanilo Matrix ratiopharm 25 microgramos/h parches transdèrmicos EFG	25 µg/h	garża li tipprovdi medicína li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	4.125 mg/7.5 cm ² li terhi 25 µg fentanyl fis-sieġha
Spanja	ratiopharm España, S.A. Avenida de Burgos 16D, 5º Planta, 28036		Fentanilo Matrix ratiopharm 50 microgramos/h parches	50 µg/h	garża li tipprovdi medicína li tghaddi minn	użu transdermali	8.25 mg/15 cm ² li terhi 50 µg fentanyl fis-sieġha

	Madrid, Spanja		transdérnicos EFG		ġol-ġilda		
Spanja	ratiopharm España, S.A. Avenida de Burgos 16D, 5º Planta, 28036 Madrid, Spanja		Fentanilo Matrix ratiopharm 75 microgramos/h parches transdérnicos EFG	75 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	12.375 mg/22.5 cm ² li terħi 75 µg fentanyl fis-sieġha
Spanja	ratiopharm España, S.A. Avenida de Burgos 16D, 5º Planta, 28036 Madrid, Spanja		Fentanilo Matrix ratiopharm 100 microgramos/h parches transdérnicos EFG	100 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	16.5 mg/30 cm ² li terħi 100 µg fentanyl fis-sieġha
Ir-Renju Unit		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Telfanyl 25 microgram/hr Transdermal patch (pending)	25 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	4.125 mg/7.5 cm ² li terħi 25 µg fentanyl fis-sieġha
Ir-Renju Unit		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Telfanyl 50 microgram/hr Transdermal patch (pending)	50 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	8.25 mg/15 cm ² li terħi 50 µg fentanyl fis-sieġha
Ir-Renju Unit		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Telfanyl 75 microgram/hr Transdermal patch (pending)	75 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	12.375 mg/22.5 cm ² li terħi 75 µg fentanyl fis-sieġha
Ir-Renju Unit		ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Il- Ġermanja	Telfanyl 100 microgram/hr Transdermal patch (pending)	100 µg/h	garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn ġol-ġilda	użu transdermali	16.5 mg/30 cm ² li terħi 100 µg fentanyl fis-sieġha

ANNEX II

**KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIĊI U ARGUMENTI GHAL EMENDI TAS-SOMMARJU(I)
TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT, TIKKETTA U FULJETT TA' TAGHRIF
IPPREŻENTATI MILL-EMEA**

KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIĊI

SOMMARJU TOTALI TA' L-EVALWAZZJONI XJENTIFIKA TA' FENTANYL-RATIOPHARM U ISMIJIET ASSOĊJATI (ARA ANNESS I)

Il-punti tan-nuqqas ta' qbil li wasslu għal din il-proċedura ta' referenza taht l-Artikolu 29(4) tad-Direttiva 2001/83/KE kellhom x'jaqsmu ma':

- 1- L-indikazzjoni terapewtika li kellha tiġi estiża għal pazjenti li m'għandhomx kanċer li jsofru minn uġiġh kroniku qawwi
- 2- L-għażla ta' tabella(i) ta' konverżjoni li għandhom jiġu inklużi fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC)
- 3- Jekk it-treddiġh u l-ko-amministrazzjoni ma' agonisti parzjali ta' l-opiojdi għandhomx ikunu kontra-indikati
- 4- L-istudji tal-bijoeqwivalenza meħtieġa biex juru l-ekwivalenza mal-prodott ta' referenza

Fir-rigward ta' l-*indikazzjoni terapewtika*, id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ipprova stqarrija xjentifika, li tiġbor fil-qosor il-pubblikazzjonijiet relatati għat-trattament ta' uġiġh mhux tal-kanċer kroniku b'opiojdi qawwi u b'mod partikolari fentanyl transdermali.

Minbarra riżultati kontroversjali tal-letteratura fuq l-effikaċja u s-sigurtà ta' fentanyl transdermali f'uġiġh mhux tal-kanċer kroniku, il-CHMP irrikonossa li, f'ċirkostanzi speċjali, opiojdi qawwi jistgħu jkunu ta' għajjnuna fit-trattament ta' din il-kondizzjoni.

F'dan il-kuntest, il-CHMP aċċetta l-indikazzjoni "Uġiġh kroniku qawwi li jista' jkun adegwament immanigjat biss b'analgeziċi opiojdi".

Il-CHMP irrakkomanda wkoll iż-żieda ta' l-istqarrija segwenti f'sezzjoni 4.4 tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC):

"F'uġiġh kroniku mhux relatat mal-kanċer, jista' jkun preferibbli li tibda t-trattament b'opiojdi qawwi li jirrilaxxaw ruħhom minnufih (eż. morfina) u li tagħti b'riċetta roqgħa b'fentanyl transdermali wara d-determinazzjoni ta' l-effikaċja u d-dożaġġ ottimu ta' l-opiojdi qawwi."

Rigward l-*iskemi ta' konverżjoni tad-doži* ipprovduti fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC) minn morfina orali sa fentanyl transdermali, il-CHMP, abbażi tat-tagħrif disponibbli, huwa ta' l-opinjoni li iż-żewġ tabelli għandhom jissemmew fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC) (sezzjoni 4.2). L-iskema ta' konverżjoni konservattiva (150:1) kif speċifikata fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC) preżenti ta' Fentanyl ratiopharm hija għal pazjenti li għandhom bżonn rotazzjoni ta' l-opiojdi u l-iskema ta' konverżjoni 100:1 (tabella ta' Donner) hija għal pazjenti taht terapija bl-opiojdi stabbli u ittollerata sewwa.

Fir-rigward tat-*treddiġh*, is-sezzjoni 4.6 tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC) ipproponut tgħid:

"Fentanyl jiġi eskretat għal għol-ħalib tas-sider u jista' jikkaġuna sedazzjoni u dipressjoni respiratorja fit-tarbija li tkun qedgħa tiġi imreddgħa. Għaldaqstant, it-treddiġh għandu jitwaqqaf għal ta' l-anqas 72 siegħa wara t-tneħħija tar-roqgħa b'fentanyl transdermali".

Dan ifisser li huwa possibbli li tagħti l-prodott lin-nisa li jkunu qed iredgħu, imma t-treddiġh għandu jitwaqqaf waqt l-użu ta' l-irqajja' b'fentanyl u għal 72 siegħa wara.

Minhabba l-importanza ta' ġestjoni adegwata ta' l-uġiġh għall-omm, il-CHMP jaqbel, b'mod konformi mal-"linja gwida tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott", li t-test ipproponut jibqa' f'sezzjoni 4.6 u m'għandux ikun inkluż bħala kontra-indikazzjoni.

Barra minn hekk, il-CHMP jirrakkomanda li jiġi inkluż it-tagħrif segwenti f'sezzjoni 4.4 fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC):

....

Treddiġh

Minhabba li fentanyl huwa eskretat fil-ħalib tas-sider, it-treddiġh għandu jitwaqqaf waqt it-trattament b'fentanyl (ara ukoll sezzjoni 4.6)

....

Fir-rigward ta' l-*amministrazzjoni fl-istess hin ma' opijojdi ohra*, huwa rikonoxxut li r-riskju ta' l-ikkumbinar ta' fentanyl ma' agonist/antagonist imhallat bhal buprenorphine, nalbuphine u pentazocine, jikkonsisti l-ewwel f'analgiżja imxekkla, minhabba effetti antagonisti kompettitivi, u t-tieni fil-bidu ta' sindromu ta' irtirar, li ukoll jirrapprezenta thassib serju għas-sahha.

Madankollu, mil-lat kliniku, dan l-aspett jirrapprezenta biss riskju minuri għal pazjenti li qed jirreċievu terapija kontra l-uġiġħ b' fentanyl transdermal ta' dozi medji. Ma hemm l-ebda dejta disponibbli li turi sintomi ta' irtirar f'pazjenti ittrattati b' fentanyl transdermal wara injezzjoni ta' buprenorphine.

Għaldaqstant, is-CHMP jirakkomanda li, skond il-linja gwida msemmija hawn fuq, dan l-aspett għandu jkun imsemmi f' sezzjoni 4.5 tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodotti (SPC) b' referenza għalih f' sezzjoni 4.4, "użu fl-istess hin mhux irrakkomandat" aktar milli bhala kontra-indikazzjoni.

Fl-ahharnett, fir-rigward tal-*wiri ta' bijoekwivalenza*, id-diskussjonijiet kienu fuq id-devjazzjonijiet mil-linja gwida "Nota għal gwida fuq forum ta' dożaġġ b' rilaxx immodifikat orali u transdermal: sezzjoni II: evalwazzjoni farmakokinetika u evalwazzjoni klinika-(CPMP/EWP/280/96)". Għet diskussa l-htieġa li jsir studju ta' bijoekwivalenza bil-qawwa l-aktar għolja u studju validu b' disinn irreprikat.

Kien hemm dubbji dwar it-turija tal-bioekwivalenza bl-aktar doża baxxa, minhabba li fir-riżultati, input inizjali aktar għoli huwa issuġġerit għar-roqgħa riżerva ta' referenza (meta mqabbla mar-roqgħa tat-test) u huwa evidenzjat input finali aktar baxx (fit-tmiem ta' l-applikazzjoni tar-roqgħa). L-oxxilazzjonijiet mill-quċċata għall-aktar punt baxx tal-koncentrazzjonijiet fil-plażma huma aktar għoljin bil-prodott ta' referenza u m'humie x ta' daqs kbir.

Il-CHMP jikkunsidra li l-kriterji tal-linja gwida fuq forum ta' dożaġġ transdermal - CPMP/EWP/280/96- (jiġifieri proporzjonalità eżatta tal-formulazzjoni u test ta' rilaxx aċċettabbli *in vitro*) intlaqgħu bir-roqgħa ta' fentanyl ratiopharm transdermal kif ukoll bil-prodott mediċinali ta' referenza.

Barra dan, studju fl-aktar doża għolja (100 µg/sieġha) jkun possibbli biss fis-swali tal-kura intensiva u taht trattament konkomitanti b' antagonisti opijojdi (naltrexone) sabiex jiġu evitati effetti sekondarji li jipperikolaw il-ħajja. Għaldaqstant, minhabba raġunijiet etiċi u ta' sigurtà, ikun kwestjonabbli li jsiru studji bl-ogħla qawwa meta t-tagħrif neċessarju kollu jista' jinkiseb minn irqajja' ta' qawwiet aktar baxxi. Bhala regola ġenerali, fl-UE, jekk ikun irid isir studju bhal dan, il-qawwa ta' 50 µg/sieġha għandha tkun irrakkomandata.

L-evalwazzjoni bijostatistika ta' l-istudju b' doża waħda eżistenti b' disinn replika (izda ma turix bijoekwivalenza) tista' tkun ikkunsidrata tajba biex tevalwa l-varjabbilità ġo l-individwu u biex tiddetermina l-influwenza ta' l-eżekuzzjoni bijofarmaċewtika, fir-rigward tal-mekkanizmi ta' rilaxx differenti (riserva kontra matriċi).

Il-CHMP ikkunsidra wkoll illi l-bioekwivalenza bejn test u prodotti mediċinali ta' referenza għet ikkaratterizzata suffiċjentement f' 2 studji (doża waħda u multipla) magħmula b' roqgħa ta' daqs imnaqqas (7.5 cm²). Id-differenzi żgħar osservati m'humie x meqjusin li huma ta' importanza klinika u jissuġġerixxu li Fentanyl ratiopharm x'aktarx għandu profil ta' rilaxx fit-tul aktar fid-deher, li huwa mistenni għal roqgħa matriċi meta mqabbla ma' roqgħa riserva

Finalment, minhabba li Fentanyl ratiopharm huwa roqgħa matriċi għal liema, ir-rilaxx huwa proporzjonali għall-erja tal-wiċċ, hija mistennija proporzjonalità fid-doża u studju ta' bijoekwivalenza bl-aktar qawwa għolja ma jidherx neċessarju, lanqas studju ta' disinn replika addizzjonali.

ARGUMENTI GHAL EMENDI TAS-SOMMARJU(I) TAL-KARATTERISTIČI TAL- PRODOTT, TIKKETTA U FULJETT TA' TAGHRIF

Billi

- l-iskop tar-referenza kien it-tħassib potenzjali fir-rigward tas-saħħa pubblika rigward l-estensjoni ta' l-indikazzjoni klinika
- t-turija tal-bijoekwivalenza bil-prodott ta' referenza,
- u l-armonizzazzjoni tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, tikketta u fuljett ta' tagħrif,

fuq il-baži tad-dokumentazzjoni pprezentata mid-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u d-diskussjoni xjentifika fi hdan il-Kumitat,

il-CHMP irrakkomanda l-ghoti ta' l-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq u l-emenda tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, tikketta u fuljett ta' tagħrif li huma stabbiliti fl-Anness III għal Fentanyl-ratiopharm u ismijiet assoċjati (ara Anness I).

ANNEX III

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT,
TIKKETTA U FULJETT TA' TAGHRIF**

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull garża terhi 25 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 7.5 cm² fiha 4.125 mg fentanyl.

Għal lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Garża trasparenti u bla kulur b' sinjal kaħlani fuq il-fojl warrani: "fentanyl 25 µg/h".

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-prodott huwa indikat f' uġigh qawwi u kroniku li jista' jiġi immanigġjat adegwament biss bl-użu ta' analġesiċi tat-tip opjojdi.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Id-dożaġġ huwa addattat għal kull individwu u ibbażat fuq l-istorja ta' kura bl-opjojdi tal-pazjent u jitqies:

- Il-possibilita' li tiġi żviluppata tolleranza,
- Il-kundizzjoni ġenerali fil-preżent, l-istat mediku tal-pazjent, u
- Il-grad tas-severita' tal-kundizzjoni.

Id-doża ta' fentanyl hija mfassla individwalment u trid tiġi riveduta ta' spiss wara kull amministrazzjoni.

Pazjenti li jirċievu kura bl-opjojdi għall-ewwel darba

Garża li terhi 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u din għandha tintuża fid-dożaġġ tal-bidu . Fl-anzjani ta' eta' kbira hafna u f'pazjenti debboli hafna, mhux irrakkommandat illi tinbeda kura bl-opjojdi bil-*Fentanyl-ratiopharm*, minhabba is-suxxettibbilita' magħrufa li dawn il-pazjenti għandhom għal din it-tip ta' kura. F'każi bħal dawn, ikun aktar xieraq illi l-kura tinbeda b' doži zghar ta' morfina li tintreħa immedjatament u il-*Fentanyl-ratiopharm* jiġi preskritt biss wara li tiġi stabbilita d-doża ottimali.

Tibdil minn opjojdi oħrajn

F'każ ta' tibdil minn opjojdi orali jew parenterali għal kura bil-fentanyl, id-doża tal-bidu għandha tiġi kkalkulata skond li ġej:

1. Il-kwantita' ta' analġesiċi meħtieġa tul l-aħhar 24 siegħa trid tiġi ddeterminata.
2. It-total miksub għandu jiġi mibdul fid-doża ekwivalenti ta' morfina orali permezz ta' Tabella 1.
3. Id-doża ekwivalenti ta' fentanyl għandha tiġi determinata skond li ġej:
 - a) permezz ta' Tabella 2 għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn tibdil regolari fil-kura ta' l-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn fentanyl orali għal fentanyl transdermali huwa ta' 150:1)
 - b) permezz ta' Tabella 3 għal dawk il-pazjenti li qegħdin fuq kura stabbli u tollerata tajjeb bl-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn morfina għal fentanyl transdermali huwa ta' 100:1)

Tabella 1: Konverżjoni tad-doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti:

Id-dożi li jidhru f'din it-tabella għandhom l-effett analġesiku ekwivalenti ta' 10mg morfina parenterali

Sustanza Attiva	Doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti (mg)	
	Parenterali (im)	Orali
Morfina	10	30-40
Hydromorphone	1.5	7.5
Oxycodone	10-15	20-30
Methadone	10	20
Levorphanol	2	4
Oxymorphone	1	10 (rettali)
Diamorphine	5	60
Pethidine	75	-
Codeine	-	200
Buprenorphine	0.4	0.8 (taht l-ilsien)
Ketobemidone	10	20-30

Tabella 2: Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn ta' tibdil regolari fil-kura bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
<44	12.5
45-134	25
135-224	50
225-314	75
315-404	100
405-494	125
495-584	150
585-674	175
675-764	200
765-854	225
855-944	250
945-1034	275
1035-1124	300

Tabella 3: : Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li huma stabbli u jitolleraw tajjeb il-kura tagħhom bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
< 60	12.5
60-89	25
90-149	50
150-209	75
210-269	100
270-329	125
330-389	150
390-449	175
450-509	200
510-569	225
570-629	250
630-689	275
690-749	300

Bit-tahlit ta' bosta biċċiet ta' garża transdermali, tista' tinkiseb rata ta' irhir ta' fentanyl il fuq minn 100 mikrogramma fis-siegħa.

L-evalwazzjoni inizjali ta' l-effett analġesiku massimu ta' *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex issir qabel il-garża tintlibes għal mill-inqas 24 siegħa. Dan minhabba iż-żieda gradwali tal-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum matul l-ewwel 24 siegħa wara li l-garża tkun applikata.

Fl-ewwel 12-il siegħa wara bidla għall-*Fentanyl-ratiopharm*, il-pazjent għandu jibqa' jirċievi l-analġesiku ta' qabel u bl-istess doża; għat-12 il siegħa ta' wara, dan l-analġesiku għandu jiba' jinagħata skond il-bżonn.

Titrazzjoni tad-doża u d-dożaġġ ta' manteniment

Il-garża trid tinbidel kull 72 siegħa. Id-doża trid tiġi mibdula skond l-individwu sakemm l-effiċjenza analġesika tiġi stabbilita. F'pazjenti li jhossu tnaqqis sostanzjali tal-effett fil-perijodu bejn 48-72 siegħa wara l-applikazzjoni, tista' tinbidel il-garża ta' fentanyl wara 48 siegħa.

Garża b'rata ta' irhir ta' 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u hija adattata għat-titrazzjoni tad-doża meta l-livell tad-dożaġġ meħtieġ ikun baxx. Jekk it-tnaqqis fl-uġiġh sa l-aħħar tal-perjodu inizjali ma jkunx biżżejjed, id-doża tista' tizzied wara 3 ijiem, sakemm l-effett mixtieġ għal kull pazjent jintlaħaq. Tibdiliet oħrajn fid-doża normalment għandhom isiru b'żidiet ta' 25 mikrogramma/siegħa, iżda għandu jitqies ukoll il-bżonn ta' analġesici supplementari u l-istat ta' uġiġh tal-pazjent. Pazjenti jistgħu jkollhom bżonn ta' doži supplementari ta' analġesici kull tant żmien li jahdmu malajr biex jilqgħu kontra ħruġ ta' l-uġiġh. Metodi addizzjonali jew alternattivi ta' kura kontra l-uġiġh jew anke amministrazzjoni ta' opjojdi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati meta d-doża ta' *Fentanyl ratiopharm* taqbeż 300 mikrogramma/siegħa.

Sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura ġew irrapportati meta kura fit-tul b'morfina nbidlet f'wahda transdermali b'fentanyl, minkejja kura analġesika effikaċi u adegwata. Huwa rrakkomandat illi pazjenti li juru sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jingħataw doži żgħar ta' morfina b'effett qasir.

Tibdil jew waqfien tat-terapija

Jekk l-użu tal-garża jrid jiġi mwaqqaf, kull bidla għal opjojdi oħrajn għandha tkun gradwali, tibda b'doża baxxa u tizzied bil-mod. Dan għaliex il-livelli ta' fentanyl jinżlu gradwalment wara li tinneħħa il-garża; ikun hemm bżonn mill-inqas 17-il siegħa sabiex il-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum jaqa' b'50 %. Bħala regola ġenerali, it-twaqqif tal-kura analġesika b'opjojdi jrid ikun gradwali, sabiex jiġu evitati sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura (tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid muskolari). Tabella 2 u tabella 3 m'għandhomx jintużaw meta tinbidel il-kura minn garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda bil-fentanyl għal kura bil-morfina.

Metodu ta' l-mministrazzjoni

Hekk kif tinneħħa mill-pakkett u *r-release liner*, il-garża għandha tiġi applikata fuq parti tal-ġilda mingħajr pil lejn in-naħa ta' fuq tal-ġisem (sider, dahar, dirghajn). Bix jitneħħa l-pil għandu jintuża mqass u mhux xafr.

Qabel l-applikazzjoni, il-ġilda trid tinaddaf b'attenzjoni bl-użu ta' ilma safi (l-ebda aġenti ta' tindif) u titnixxef sewwa. Eżatt wara, il-garża transdermali tiġi applikata permezz ta' pressjoni hafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda. Il-parti tal-ġilda fejn ser tiġi applikata il-garża m'għandhiex ikollha qsim żgħar (eż. minhabba radjazzjoni jew tqaxxir) u l-ġilda m'għandhiex tkun irritata.

Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.

Xi drabi, il-garża jkollha titwahħal aħjar b'xi haġa oħra. .

Jekk isiru żidiet progressivi fid-doża, l-erja tas-superfiċje attiva meħtieġa tista' tilhaq il-punt illi aktar żidiet ma jkunux fiżikament possibbli.

Tul ta' l-amministrazzjoni

Il-garża għandha tinbidel kull 72 siegħa. Jekk għal xi raġuni jkun jinhtieg li tinbidel qabel il-waqt, l-ebda tibdil m'għandu jsir qabel ma jkunu għaddew 48 siegħa, inkella jista' jkun hemm żieda fil-koncentrazzjoni medja ta' fentanyl. Irid jintagħżel post ġdid fuq il-ġilda għal kull applikazzjoni,.

Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma titwahhal garża fuq l-istess parti tal-ġilda. L-effett analġesiku jista' jidm għal xi żmien wara li tkun tnehhiet il-garża transdermali. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun. M'għandhux jintuża l-alkohol jew solventi oħra biex titnaddaf il-ġilda, għaliex dawn jistgħu jippenetraw fil-ġilda minhabba l-effett tal-garża.

Tfal u addoloxxenti

L-esperjenza dwar l-użu fit-tfal ta' taħt it-12-il sena hija limitata. *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex tintuża f'din il-popolozzjoni ta' pazjenti

Anzjani

L-anzjani iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Indeboliment epatiku u renali

Pazjenti b'indeboliment epatiku jew renali iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

- Ipersensittività għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.
- Uġiegh akut jew ta' wara operazzjoni, għax titrazzjoni tad-doża mhix possibbli waqt kura qasira.
- Indeboliment sever tas-sistema nervuża ċentrali

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jintuża biss bħala parti minn kura integrali tal-uġiegh f'każi fejn il-pazjent jista' jiġi ikkontrollat b'mod mediku, soċjalment u psikoloġikalment kif inhu xieraq.

Kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* għandha tinbeda biss minn tabib espert u li hu mgħarref sew fil-farmakokinetika ta' garża transdermali ta' fentanyl u l-periklu ta' ipoventilazzjoni severa. Wara reazzjoni avversa u serja, il-pazjent irid jibqa' taħt osservazzjoni għal 24 siegħa wara li titneħħa il-garża minhabba il-*half life* ta' fentanyl (ara sezzjoni 5.2).

F'każ ta' uġiegh kroniku li mhux ġej minn kanċer, il-kura tista' tinbeda b'opjojd qawwi b'reħa immedjata (eż. morfina), u tiġi preskritta *Fentanyl-ratiopharm* wara li tiġi stabbilita l-effikaċja u l-aħjar dożaġġ ta' l-opjojd qawwi

Il-garża transdermali m'għandiex tinqata, għax m'hemm informazzjoni disponibbli fuq il-kwalità, l-effikaċja u s-sigurtà ta' garża hekk masquma.

Jekk ikun hemm bżonn ta' dozi 'l fuq mill-ekwivalenti ta' 500 mg morfina, huwa rrakkomandat illi t-terapija bl-opjojdi tiġi evalwata mill-ġdid.

Wara l-amministrazzjoni b'dozi rakkomandati, r-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni huma hedla, konfużjoni, tqalligh, rimettar u stitikezza. Dawn ta' l-ewwel huma ta' natura hafifa u għal żmien qasir u l-kawża tagħhom trid tiġi investigata jekk is-sintomi jippersistu. Mill-banda l-oħra, stitikezza ma' tiegħaf sakemm titkompla il-kura. Dawn l-effetti kollha huma mistennija u, għaldaqstant, għandha tittiehed azzjoni minn qabel, speċjalment fir-rigward tas-stitikezza, sabiex il-kura tkun l-aħjar possibbli. Ta' spiss, jista' jagħti l-każ li jkun hemm bżonn ta' kura korrettiva (ara sezzjoni 4.8).

L-użu konkomittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5)

Frug ta' uġiegh mhux mistenni

Minkejja kura b'garza ta' fentanyl, stharrig' wera li kwazi l-pazjenti kollha jkollhom bzonn ta' medicini qawwija u li jahdmu fil-pront sabiex jilqghu immedjatament kontra l-hrug ta' ugigh mhux mistenni.

Dipressjoni respiratorja

L-istess kif jigri bl-użu tal-opjojdi qawwijin kollha, xi pazjenti jistghu jbatu minn dipressjoni repiratorja meta jużaw *Fentanyl-ratiopharm* u l-pazjenti jridu jigu sorveljati sewwa li ma' jkollhomx dan l-effett. Id-dipressjoni respiratorja tista' tippersisti wkoll wara li titnehha l-garza. L-incidenza tad-dipressjoni respiratorja tizdied hekk kif tizdied id-doża ta' fentanyl. Sustanzi attivi li jaffettwaw is-CNS jistghu jaggravaw d-dipressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti fejn id-dipressjoni repiratorju digá' hija prezenti, il-fentanyl ghandu jintuża b'kawtela kbira u f'dozi baxxi.

Mard kroniku fil-pulmun

Fentanyl jista' jkollu iktar reazzjonijiet avversi u severi f'pazjenti li jbatu minn imblukkar kroniku jew mard iehor fil-pulmun. F'dawn il-pazjenti, l-opjojdi jistghu jbaxxu ir-ritmu respiratorju u jzidu r-resistenza ghall-arja fil-passaġġ respiratorju.

Dipendenza fuq id-droga

Tolleranza u dipendenza fisika u psikologika tista' tiżviluppa bl-amministrazzjoni ripetuta tal-opjojdi, izda huma rari fil-kura ta' l-ugigh relatat mal-kanċer .

Żieda tal-pressjoni ġol-kranju

Fentanyl-ratiopharm ghandu jintuża bil-prudenza f'pazjenti li jistghu jkunu iktar suxxettibli ghall-effetti ġewwa l-kranju ġejjin minhabba retenzjoni ta' CO₂, bhal ma huma dawk b'evidenza ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju, diffikulta' li jibqgħu konxji, jew koma.

Mard tal-qalb

L-opjojdi jistghu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn ipovolimja. Pazjenti li jbatu minn pressjoni baxxa u/jew pazjenti li jbatu minn ipovolimja jridu jkunu kkurati b'attenzjoni kbira. Fentanyl jista' jipproduċi bradikardja. *Fentanyl-ratiopharm* irid jigi amministrat bi prudenza f'pazjenti li jbatu minn bradiaritmija.

Indeboliment tal-fwied

Fentanyl jigi metabolizzat fil-fwied f'mataboliti inattivi; ghalhekk l-eliminazzjoni tista' tiehu iktar fit-tul f'pazjenti li jbatu minn mard tal-fwied. Pazjenti li jbatu minn indeboliment tal-fwied ghandhom jigu osservati b'attenzjoni u id-doża ghandha tigi mnaqqsa fejn ikun hemm bzonn.

Indeboliment renali

Inqas minn 10 % ta' fentanyl jigi eliminat bhala prodott mhux mibdul mill-kliewi u, kuntrarjament ghal morfina, m'hemm l-ebda metaboliti attivi maghrufa li jigu eliminati mill-kliewi. Taghrif miġbur wara l-amministrazzjoni tal-fentanyl ġol-vina f'pazjenti b'insufficjenza renali jindika li l-volum ta' distribuzzjoni tal-fentanyl jista' jinbidel bid-dijalizi. Dan jista' jaffetwa l-koncentrazzjonijiet fis-serum. Jekk pazjenti b'indeboliment renali jirċievu fentanyl transdermali, dawn ghandhom jigu osservati bir-reqqa ghal xi hjiel ta' tossicita' tal-fentanyl u d-doża ghandha tigi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bzonn.

Pazjenti b'deni/shana esterna

Żieda sostanzjali fit-temperatura tal-ġisem tista' tirrizulta f'żieda fir-rata ta' assorbiment ta' fentanyl. Ghalhekk, pazjenti li jkollhom id-deni jridu jkunu monitorjati ghal xi reazzjonijiet avversi tal-opjojdi. Il-post fejn tigi applikata il-garza m'ghandux jigi espost ghas-shana ġejja minn sorsi esterni eż. Sawna.

Pazjenti anzjani

Taghrif minn studji li saru bl-amministrazzjoni ta' fentanyl ġol-vina jindika li f'pazjenti anzjani jista' jkun hemm rata ta' eliminazzjoni mnaqqsa u *half-life* itwal. Barra minn hekk, l-anzjani jistghu ikunu aktar sensitivi ghas-sustanza attiva minn pazjenti iżgħar minnhom. Madankollu, minn studji li saru

bl-użu tal-*Fentanyl transdermal patch* f'pazjenti anzjani, irriżulta li ma kienx hemm differenza sinjifikanti fil-parametri farmakokinetiċi ħdejn pazjenti żgħar, għalkemm il-koncentrazzjonijiet fis-serum kellhom tendenza li jkunu oghla. Pazjenti anzjani jew kakesiċi għandhom jiġu osservati b'attenzjoni u id-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bżonn.

Pazjenti pedjatriċi

Minhabba l-użu limitat fit-tfal taħt it-12-il sena, *Fentanyl-ratiopharm* għandu jintuża f' din il-kategorija ta' pazjenti biss wara li jiġi stabbilit sewwa jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifikax ir-riskju potenzjali assoċjat mal-użu.

Treddiegh:

Peress illi fentanyl jiġi eliminat fil-halib tal-omm, it-treddiegh għandu jitwaqqaf waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* (ara sezzjoni 4.6)

Pazjenti b'majestinja gravis

Jista' jkun hemm reazzjonijiet mhux epilettiċi (mijo)kloniċi. Pazjenti b'majestinja gravis għandhom jiġu kkurati bil-prudenza.

Interazzjonijiet

Bhala regola, l-użu kkombinat ma derivattivi ta' barbituric acid, buprenorphine, nalbuphine u pentazocine għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5)

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess hin ta' derivattivi ta' barbituric acid għandu jiġi evitat, peress li l-effett ta' dipressjoni repiratorja kawżat mill-fentanyl jista' jżidied.

L-użu konkromittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux rakommandat. Dawn għandhom affinità għolja għal riċettaturi ta' l-opjojdi waqt li l-attività intrinsika tagħhom hija relittavament baxxa. Għaldaqstant jopponu parzjalment l-effett analġesiku ta' fentanyl u jistghu ikunu kawża ta' sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura f'pazjenti dipendenti fuq l-opjojdi (ara sezzjoni 4.4)

L-użu konkromittanti ta' dipressanti oħrajn tas-CNS jista' jikkawża żiieda fl-effetti dipressanti, u jista' jkun hemm ipoventilazzjoni, pressjoni baxxa kif ukoll sedazzjoni qawwija jew koma. Id-dipressanti tas-CNS imsemmija jinkludu:

- opjojdi
- ansjolitiċi u trankwillanti
- ipnotiċi
- anestetiki generali
- phenothiazines
- Rilassanti tal-muskoli skeletal
- antiistaminiċi b'effetti sedattivi
- xorb alkoholiku

Għalhekk, l-użu ta' xi wieħed mill-kombinazzjonijiet bejn medicini u sustanzi attivi hawn fuq imsemmija jirrikjedi sorveljanza stretta tal-pazjent.

Inibituri tal-MAO gew irrapurtati li jżidu l-effett tal-analġesiċi narkotiċi, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb. Għalhekk, fentanyl m'għandux jintuża qabel ma' jgħaddu 14-il ġurnata mill-waqfien ta' kura bl-inibituri tal-MAO.

Fentanyl, sustanza li għandha rata ta' tneħhija għolja, tiġi metabolizzata malajr u b'mod estensiv, l-aktar minn CYP3A4.

Itraconazole (inibitur qawwi ta' CYP3A4) mogħti f'doża orali ta' 200 mg/ġurnata għal erbat ijiem ma' kellu ebda effett sinjifikanti fuq il-farmakokinetika ta' fentanyl mogħti minn ġol-vina. Madankollu,

f'xi individwi, ġew osservati ziediet tal-koncentrazzjoni fil-plażma. L-amministrazzjoni orali ta' ritonavir (wiehed mill-inibituri l-iktar qawwi ta' CYP3A4) tbaxxi b'żewġ terzi r-rata tat-tnehhija ta' fentanyl moghti minn ġol-vina, u tirdoppja l-half-life. L-użu fl-istess hin ta' inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ez-ritonavir) ma użu transdermali ta' fentanyl jista' jirriżulta f'żieda fil-koncentrazzjoni fil-plażma ta' fentanyl. Dan jista' jzid jew itawwal, kemm l-effetti terapewtiċi, kif ukoll l-effetti avversari, b'riżultat ta' dipressjoni respiratorja qawwija. F'każi bħal dawn, hemm bżonn li l-pazjent jiġi kkurat u osservat b'aktar attenzjoni. L-użu fl-istess hin ta' ritonavir, jew inibituri qawwijin ta' CYP3A4 oħrajn, ma' l-użu transdermali ta' fentanyl m'huwiex irrakkomandat sakemm il-pazjent ma jiġix osservat bir-reqqa.

4.6 Tqala u effetti fuq il-halib tas-sider

Is-sigurta' fl-użu ta' fentanyl fit-tqala għada ma gietx stabbilita. Studji fuq annimali urew tossiċità fis-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem għadu mhux magħruf. Fentanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala hlief meta jkun hemm il-bżonn ċar. Kura fit-tul waqt it-tqala, tista' tikkawża sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura fit-tarbija. L-użu ta' fentanyl waqt it-tqala u il-ħlas (anke ħlas ċesarju) m'huwiex irrakkomandat għax il-fentanyl jgħaddi mill-plaċenta u jista' jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Fentanyl johroġ fil-ħalib tas-sider u għaldaqstant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li qed jerdghu. Għalhekk, it-treddiegħ irid jitwaqqaf waqt il-kura u sa mill-inqas 72 siegħa wara li titneħħa il-Fentanyl-ratiopharm (ara sezzjoni 4.4)

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila ta' sewqan u l-użu ta' magni. Dan għandu jkun mistenni speċjalment fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkohol jew agenti sedattivi. Dawn ir-restrizzjonijiet mhux bil-fors japplikaw għal daww il-pazjenti li jinsabu fl-istat fess fuq dożaġġ speċifiku. Għalhekk, pazjenti għandhom ifittxu l-parir tat-tabib biex jaraw jekk jistgħux isuqu u jhaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi huma kklassifikati taħt it-titlu tal-frekwenza, l-aktar frekwenti l-ewwel, bil-konvenzjoni li ġejja: komuni hafna ($\geq 10\%$), komuni ($\geq 1\%$ u $< 10\%$), mhux komuni ($\geq 0.1\%$ u $< 1\%$), rari ($\geq 0.01\%$ u $< 0.1\%$), rari hafna ($\leq 0.01\%$).

L-effett mhux mixtieq, l-iktar serju, kkawżat mill-fentanyl huwa d-dipressjoni respiratorja.

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: takikardija, bradikardija.

Rari: aritmija.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni hafna: uġiġħ ta' ras, sturdament.

Mhux komuni: tregħid, parasteżija, anormalitajiet fil-kliem u fil-lingwa.

Rari hafna: ataxia, aċċessjonijiet, (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal).

Disturbi fl-għajnejn

Rari hafna: ambliopija.

Disturbi respiratorji, toraċiċi, u medjastinali

Mhux komuni: qtugħ ta' nifs, rata baxxa tat-teħid tan-nifs.

Rari hafna: dipressjoni respiratorja, apneja.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni hafna: tqallieġħ, rimettar, stitikezza.

Komuni: gżerostomja, dispepsja.
Mhux komuni: dijarea
Rari: sulluzzu.
Rari hafna: gass fl-istonku bl-uġiġh, sadd fl-imsaren (ileju).

Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarka

Mhux komuni: żamma ta' l-awrina.
Rari hafna: uġiġh fil-bużżieqa ta' l-awrina, oligurja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Komuni hafna: żieda fl-ġharaq, hakk.
Komuni: reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahhal il-garża.
Mhux komuni: exantema, eritema
Ir-raxx, l-eritema u l-hakk is-soltu jisparrixxu f'inqas minn ġurnata wara li titneħħa l-garża.

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: pressjoni għolja, pressjoni baxxa.
Rari: vasodilatazzjoni.

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet fil-post tal-amministrazzjoni

Rari: edima, ksieħ.

Disturbi fis-sistema immunitarja

Rari hafna: anafilassi.

Disturbi psikjatriċi

Komuni hafna: nġhas.
Komuni: sedazzjoni, nervożita', nuqqas ta' aptit.
Mhux komuni: ewforja, amnesia, nuqqas ta' rqađ, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni.
Rari hafna: ħsibijiet delużjonali, eċċitament eċċessiv, astenja, dipressjoni, ansjeta', konfużjoni, anormalita' fil-funzjoni sesswali, sintomi assoċjati mal-waqfien mill-kura.

Effetti mhux mixtieqa oħrajn

Mhux magħrufa (ma jistgħux jiġu evalwati mit-tagħrif kurrenti): L-użu fit-tul ta' fentanyl jista' jwassal għal żvilupp ta' reżistenza u dipendenza kemm fiżika kif ukoll psikoloġika. Wara bidla minn analġesiċi opjojdi għall-*Fentanyl-ratiopharm* jew wara tmiem hesrem tat-terapija, il-pazjenti jistgħu jeżibixxu sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura tal-opjojdi (per eżempju: tqallieġh, rimettar, dijarea, anżjeta' u tregħid).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sintomi ta' doża eċċessiva ta' fentanyl huma estensjonijiet ta' l-attivita' farmakoloġika ez. letarġija, koma, dipressjoni respiratorja, b' respirazzjoni Cheyne-Stokes, u/jew *cyanosis*. Sintomi oħrajn jistgħu jkunu ipotermja, tnaqqis fit-ton tal-muskoli (ipotonija), bradikardija, pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċita' huma sedazzjoni qawwija, *ataxia*, *miosis*, konvulżjonijiet u dipressjoni respiratorja, b'dan ta' l-aħħar ikun is-sintomu ewlieni.

Trattament

Miżuri fil-pront għandhom jittieħdu kontra d-dipressjoni respiratorja, li jinkludu it-tneħħija tal-garża u t-tqanqil fiżiku u verbali tal-pazjent. Dan jista' jiġi segwit bl-amministrazzjoni ta' antagonista speċifika ta' l-opjojdi bħal ma' hu naloxone.

Id-doża inizjali rrakkomandata għall-adulti hi 0.4-2 mg naloxone hydrochloride mogħtija minn ġol-vina. Jekk ikun hemm il-bżonn, doża simili tista' tingħata kull 2-3 minuti, inkella tista' tiġi amministrata bħala infużjoni kontinwa ta' 2mg go 500ml sodium chloride 9mg/ml (0.9 %) soluzzjoni

ghall-injezzjoni jew ġo soluzzjoni ta' glucose 50mg/ml (5 %). Ir-rata ta' infużjoni trid tiġi aġġustata skond l-injezzjonijiet bolus mehuda qabel u r-rispons individwali tal-pazjent. Jekk l-amministrazzjoni minn ġol-vina ma tkunx possibli, naloxone hydrochloride jista' jingħata wkoll fil-muskolu jew taħt il-ġilda. L-effett, wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu jew taħt il-ġilda, idum iktar biex jibda jinħass meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. L-effett wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu idum iktar fit-tul meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. Dipressjoni respiratorja minhabba doża eċċessiva tista' ddum iktar mill-effett ta' l-antagonista ta' l-opjojdi. L-inverzjoni tal-effett narkotiku tista' tirriżulta f' uġiġh akut u l-liberazzjoni ta' *catecholamines*. Kura intensiva hija importanti jekk din tkun meħtieġa minhabba l-kundizzjoni klinika tal-pazjent. Jekk ikun hemm pressjoni baxxa qawwija jew persistenti, għandha tiġi kkunsidrata l-possibilita' ta' ipovolemija, u din il-kundizzjoni trid tiġi mmanegġjata bit-terapija fluwida u parenterali xierqa.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: opjojdi; derivattivi ta' Phenylpiperidine, Kodici ATC: N02AB03

Fentanyl huwa analġesiku tal-klassi opjojdi li jinteraġixxi l-aktar ma' l- μ -receptor. L-effetti prinċipali huma analġesija u sedazzjoni. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum, li tikkawża effett minimu ta' analġesija f'pazjenti li qed jirċievu opjojdi għall-ewwel darba, tvarja bejn 0.3-1.5ng/ml; isseħh żieda fl-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi meta l-livelli fis-serum jiskorru 2ng/ml.

Kemm l-inqas doża effettiva ta' fentanyl, kif ukoll il-konċentrazzjoni minima li tikkawża reazzjonijiet avversi, jiżiedu hekk kif tiżviluppa żieda fit-tolleranza. Hemm differenzi kbar fit-tendenza għal l-iżvilupp ta' tolleranza bejn pazjent u iehor.

5.2 Taghrif farmakokinetiku

Wara l-amministrazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, fentanyl jiġi assorbit kontinwament minn ġol-ġilda għal perijodu ta' 72 siegħa. Kawża tal- *polymer matrix* u d-diffużjoni ta' fentanyl mis-saffi tal-ġilda, ir-rata ta' rħir tibqa' relattivament kostanti.

Assorbiment

Wara l-ewwel applikazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiżdied b' mod gradwali, issir livell bejn 12 u 24 siegħa wara, u tibqa' relattivament kostanti għall-bqija tal-perijodu ta' l-applikazzjoni ta' 72 siegħa. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiddependi fuq id-daqs tal-garża ta' fentanyl. Fil-prattika, sat-tieni applikazzjoni ta' 72 siegħa, il-konċentrazzjoni fissa fis-serum diġa' tkun intlaħqet u din tiġi miżmuma tul l-applikazzjonijiet sussegwenti b'garża ta' l-istess daqs.

Distribuzzjoni

Il-perċentwal ta' fentanyl li jehel mal-proteini tad-demem huwa 84 %.

Biotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat primarjament fil-fwied minn CYP3A4. Il-metabolit prinċipali, norfentanyl, m'huwix attiv.

Eliminazzjoni

Meta titwaqqaf il-kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum taqa' gradwalment, u titbaxxa b'madwar 50 % fit-13 sa 22 siegħa fl-adulti jew fit-22 sa 25 siegħa fit-tfal, rispettivament. L-assorbiment ta' fentanyl li jissokta mill-ġilda jispjega għaliex ir-rata ta' tnaqqis tal-konċentrazzjoni fis-serum hija inqas minn dik osservata wara infużjoni minn ġol-vina.

Madwar 75 % ta' fentanyl jiġi eliminat fl-awrina, l-biċċa l-kbira bhala metaboliti, b'inqas minn 10 % mneħhi bhala prodott mhux mibul. Madwar 9 % mid-doża mogħtija tista' tiġi estratta mill-purgar, il-biċċa l-kbira bhala metaboliti.

Farmakokinetika f'popolazzjonijiet speċjali

L-anzjani u pazjenti debboli jistgħu ikollhom rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl baxxa li twassal għal *half life* terminali mtawwal. F'pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku, jista' jkun hemm tibdil fir-rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl, minnhabba bidliet fil-proteini tal-plażma u t-tneħħija metabolika, li jwassal għal zieda tal-koncentrazzjonijiet fis-serum.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku, bbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, ma' juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, l-ebda effett tossiku minn doži ripetuti u l-ebda effett tossiku fuq il-ġeni.

Studji fuq annimali urew fertilita' mnaqqsa u zieda fil-mortalita' tal-fetu tal-ġrieden. Mandankollu, effetti teratoġeniċi ma ġewx stabbiliti.

Studji fit-tul dwar attivita' karċinogenika ma twettqux.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Saff li jwahħal

Saff li jwahħal magħmul minn Polyacrylate

Fojl warrani

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Release liner

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kull garża transdermali hija ippakkjata għaliha ġo qartas separat. Il-fojl Composite huwa magħmul minn dawn is-saffi, minn barra għal ġewwa: karta Kraft miksiya, fojl ta' polyethylene b'densita' baxxa, fojl ta' l-aluminju, Surlyn (thermoplastic ethylene-methacrylic acid copolymer).

Pakketti li fihom 3, 5, 10 jew 20 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Kwantitajiet kbar ta' fentanyl jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara l-użu tagħha. Il-garża wżata trid tkun mitwija bin-naħat li jwahaħlu fuq il-parti ta' ġewwa u tintrema, jew meta jkun possibli, tittiehed lura għand is-spiżjar. Kull fdalijiet tal-prodott li ma jiġux użati għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispiżjar.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}

{fax}

{e-mail}

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

{XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull garża terhi 50 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 15 cm² fiha 8.25 mg fentanyl.

Għal lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Garża trasparenti u bla kulur b'sinjal kaħlani fuq il-fojl warrani: "fentanyl 50 µg/h".

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-prodott huwa indikat f'ugħigh qawwi u kroniku li jista' jiġi immaniġġjat adegwament biss bl-użu ta' analġesiċi tat-tip opjojdi.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Id-dożaġġ huwa addattat għal kull individwu u ibbażat fuq l-istorja ta' kura bl-opjojdi tal-pazjent u jitqies:

- Il-possibilita' li tiġi żviluppata tolleranza,
- Il-kundizzjoni ġenerali fil-preżent, l-istat mediku tal-pazjent, u
- Il-grad tas-severita' tal-kundizzjoni.

Id-doża ta' fentanyl hija mfassla individwalment u trid tiġi riveduta ta' spiss wara kull amministrazzjoni.

Pazjenti li jirċievu kura bl-opjojdi għall-ewwel darba

Garża li terhi 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u din għandha tintuża fid-dożaġġ tal-bidu . Fl-anzjani ta' eta' kbira hafna u f'pazjenti debboli hafna, mhux irrakkommandat illi tinbeda kura bl-opjojdi bil-*Fentanyl-ratiopharm*, minhabba is-suxxettibbilita' magħrufa li dawn il-pazjenti għandhom għal din it-tip ta' kura. F'każi bħal dawn, ikun aktar xieraq illi l-kura tinbeda b'doži zghar ta' morfina li tintreħa immedjatament u il-*Fentanyl-ratiopharm* jiġi preskritt biss wara li tiġi stabbilita d-doża ottimali.

Tibdil minn opjojdi oħrajn

F'każ ta' tibdil minn opjojdi orali jew parenterali għal kura bil-fentanyl, id-doża tal-bidu għandha tiġi kkalkulata skond li ġej:

1. Il-kwantita' ta' analġesiċi meħtieġa tul l-aħhar 24 siegħa trid tiġi ddeterminata.
2. It-total miksub għandu jiġi mibdul fid-doża ekwivalenti ta' morfina orali permezz ta' Tabella 1.
3. Id-doża ekwivalenti ta' fentanyl għandha tiġi determinata skond li ġej:
 - a) permezz ta' Tabella 2 għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn tibdil regolari fil-kura ta' l-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn fentanyl orali għal fentanyl transdermali huwa ta' 150:1)
 - b) permezz ta' Tabella 3 għal dawk il-pazjenti li qegħdin fuq kura stabbli u tollerata tajjeb bl-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn morfina għal fentanyl transdermali huwa ta' 100:1)

Tabella 1: Konverżjoni tad-doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti:

Id-doži li jidhru f'din it-tabella għandhom l-effett analġesiku ekwivalenti ta' 10mg morfina parenterali

Sustanza Attiva	Doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti (mg)	
	Parenterali (im)	Orali
Morfina	10	30-40
Hydromorphone	1.5	7.5
Oxycodone	10-15	20-30
Methadone	10	20
Levorphanol	2	4
Oxymorphone	1	10 (rettali)
Diamorphine	5	60
Pethidine	75	-
Codeine	-	200
Buprenorphine	0.4	0.8 (taht l-ilsien)
Ketobemidone	10	20-30

Tabella 2: Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn ta' tibdil regolari fil-kura bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
<44	12.5
45-134	25
135-224	50
225-314	75
315-404	100
405-494	125
495-584	150
585-674	175
675-764	200
765-854	225
855-944	250
945-1034	275
1035-1124	300

Tabella 3: : Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li huma stabbli u jitolleraw tajjeb il-kura tagħhom bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
< 60	12.5
60-89	25
90-149	50
150-209	75
210-269	100
270-329	125
330-389	150
390-449	175
450-509	200
510-569	225
570-629	250
630-689	275
690-749	300

Bit-tahlit ta' bosta biċċiet ta' garża transdermali, tista' tinkiseb rata ta' irhir ta' fentanyl il fuq minn 100 mikrogramma fis-siegħa.

L-evalwazzjoni inizjali ta' l-effett analġesiku massimu ta' *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex issir qabel il-garża tintlibes għal mill-inqas 24 siegħa. Dan minhabba iż-żieda gradwali tal-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum matul l-ewwel 24 siegħa wara li l-garża tkun applikata.

Fl-ewwel 12-il siegħa wara bidla għall-*Fentanyl-ratiopharm*, il-pazjent għandu jibqa' jirċievi l-analġesiku ta' qabel u bl-istess doża; għat-12 il siegħa ta' wara, dan l-analġesiku għandu jiba' jinagħata skond il-bżonn.

Titrazzjoni tad-doża u d-dożaġġ ta' manteniment

Il-garża trid tinbidel kull 72 siegħa. Id-doża trid tiġi mibdula skond l-individwu sakemm l-effiċjenza analġesika tiġi stabbilita. F'pazjenti li jhossu tnaqqis sostanzjali tal-effett fil-perijodu bejn 48-72 siegħa wara l-applikazzjoni, tista' tinbidel il-garża ta' fentanyl wara 48 siegħa.

Garża b'rata ta' irhir ta' 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u hija adattata għat-titrazzjoni tad-doża meta l-livell tad-dożaġġ meħtieġ ikun baxx. Jekk it-tnaqqis fl-uġiġh sa l-aħħar tal-perjodu inizjali ma jkunx biżżejjed, id-doża tista' tizzied wara 3 ijiem, sakemm l-effett mixtieġ għal kull pazjent jintlaħaq. Tibdiliet oħrajn fid-doża normalment għandhom isiru b'żidiet ta' 25 mikrogramma/siegħa, iżda għandu jitqies ukoll il-bżonn ta' analġesici supplementari u l-istat ta' uġiġh tal-pazjent. Pazjenti jistgħu jkollhom bżonn ta' doži supplementari ta' analġesici kull tant żmien li jahdmu malajr biex jilqgħu kontra ħruġ ta' l-uġiġh. Metodi addizzjonali jew alternattivi ta' kura kontra l-uġiġh jew anke amministrazzjoni ta' opjojdi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati meta d-doża ta' *Fentanyl ratiopharm* taqbeż 300 mikrogramma/siegħa.

Sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura ġew irrapportati meta kura fit-tul b'morfina nbidlet f'wahda transdermali b'fentanyl, minkejja kura analġesika effikaċi u adegwata. Huwa rrakkomandat illi pazjenti li juru sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jingħataw doži żgħar ta' morfina b'effett qasir.

Tibdil jew waqfien tat-terapija

Jekk l-użu tal-garża jrid tiġi mwaqqaf, kull bidla għal opjojdi oħrajn għandha tkun gradwali, tibda b'doża baxxa u tizzied bil-mod. Dan għaliex il-livelli ta' fentanyl jinżlu gradwalment wara li tinneħħa il-garża; ikun hemm bżonn mill-inqas 17-il siegħa sabiex il-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum jaqa' b'50 %. Bħala regola ġenerali, it-twaqqif tal-kura analġesika b'opjojdi jrid ikun gradwali, sabiex jiġu evitati sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura (tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid muskolari). Tabella 2 u tabella 3 m'għandhomx jintużaw meta tinbidel il-kura minn garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda bil-fentanyl għal kura bil-morfina.

Metodu ta' l-mministrazzjoni

Hekk kif tinneħħa mill-pakkett u *r-release liner*, il-garża għandha tiġi applikata fuq parti tal-ġilda mingħajr pil lejn in-naħa ta' fuq tal-ġisem (sider, dahar, dirgħajn). Bix jitneħħa l-pil għandu jintuża mqass u mhux xafr.

Qabel l-applikazzjoni, il-ġilda trid tinaddaf b'attenzjoni bl-użu ta' ilma safi (l-ebda aġenti ta' tindif) u titnixxef sewwa. Eżatt wara, il-garża transdermali tiġi applikata permezz ta' pressjoni hafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda. Il-parti tal-ġilda fejn ser tiġi applikata il-garża m'għandhiex ikollha qsim żgħar (eż. minhabba radjazzjoni jew tqaxxir) u l-ġilda m'għandhiex tkun irritata.

Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.

Xi drabi, il-garża jkollha titwahħal aħjar b'xi haġa oħra. .

Jekk isiru żidiet progressivi fid-doża, l-erġa tas-superfiċje attiva meħtieġa tista' tilhaq il-punt illi aktar żidiet ma jkunux fiżikament possibbli.

Tul ta' l-amministrazzjoni

Il-garża għandha tinbidel kull 72 siegħa. Jekk għal xi raġuni jkun jinhtieg li tinbidel qabel il-waqt, l-ebda tibdil m'għandu jsir qabel ma jkunu għaddew 48 siegħa, inkella jista' jkun hemm żieda fil-koncentrazzjoni medja ta' fentanyl. Irid jintagħżel post ġdid fuq il-ġilda għal kull applikazzjoni,.

Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma titwahhal garża fuq l-istess parti tal-ġilda. L-effett analġesiku jista' jidm għal xi żmien wara li tkun tnehhiet il-garża transdermali. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun. M'għandhux jintuża l-alkohol jew solventi oħra biex titnaddaf il-ġilda, għaliex dawn jistgħu jippenetraw fil-ġilda minhabba l-effett tal-garża.

Tfal u addoloxxenti

L-esperjenza dwar l-użu fit-tfal ta' taħt it-12-il sena hija limitata. *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex tintuża f'din il-popolozzjoni ta' pazjenti

Anzjani

L-anzjani iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Indeboliment epatiku u renali

Pazjenti b'indeboliment epatiku jew renali iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

- Ipersensittività għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.
- Uġiegh akut jew ta' wara operazzjoni, għax titrazzjoni tad-doża mhix possibbli waqt kura qasira.
- Indeboliment sever tas-sistema nervuża ċentrali

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jintuża biss bħala parti minn kura integrali tal-uġiegh f'każi fejn il-pazjent jista' jiġi ikkontrollat b'mod mediku, soċjalment u psikoloġikalment kif inhu xieraq.

Kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* għandha tinbeda biss minn tabib espert u li hu mgħarref sew fil-farmakokinetika ta' garża transdermali ta' fentanyl u l-periklu ta' ipoventilazzjoni severa. Wara reazzjoni avversa u serja, il-pazjent irid jibqa' taħt osservazzjoni għal 24 siegħa wara li titneħħa il-garża minhabba il-*half life* ta' fentanyl (ara sezzjoni 5.2).

F'każ ta' uġiegh kroniku li mhux ġej minn kanċer, il-kura tista' tinbeda b'opjojd qawwi b'reħa immedjata (eż. morfina), u tiġi preskritta *Fentanyl-ratiopharm* wara li tiġi stabbilita l-effikaċja u l-aħjar dożaġġ ta' l-opjojd qawwi

Il-garża transdermali m'għandiex tinqata, għax m'hemm informazzjoni disponibbli fuq il-kwalità, l-effikaċja u s-sigurtà ta' garża hekk masquma.

Jekk ikun hemm bżonn ta' dozi 'l fuq mill-ekwivalenti ta' 500 mg morfina, huwa rrakkomandat illi t-terapija bl-opjojdi tiġi evalwata mill-ġdid.

Wara l-amministrazzjoni b'dozi rakkomandati, r-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni huma hedla, konfużjoni, tqalligh, rimettar u stitikezza. Dawn ta' l-ewwel huma ta' natura hafifa u għal żmien qasir u l-kawża tagħhom trid tiġi investigata jekk is-sintomi jippersistu. Mill-banda l-oħra, stitikezza ma' tiegħaf sakemm titkompla il-kura. Dawn l-effetti kollha huma mistennija u, għaldaqstant, għandha tittiehed azzjoni minn qabel, speċjalment fir-rigward tas-stitikezza, sabiex il-kura tkun l-aħjar possibbli. Ta' spiss, jista' jagħti l-każ li jkun hemm bżonn ta' kura korrettiva (ara sezzjoni 4.8).

L-użu konkomittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5)

Frug ta' uġiegh mhux mistenni

Minkejja kura b'garza ta' fentanyl, stharrig' wera li kwazi l-pazjenti kollha jkollhom bzonn ta' medicini qawwija u li jahdmu fil-pront sabiex jilqghu immedjatament kontra l-hrug ta' ugigh mhux mistenni.

Dipressjoni respiratorja

L-istess kif jigri bl-użu tal-opjojdi qawwijin kollha, xi pazjenti jistghu jbatu minn dipressjoni repiratorja meta jużaw *Fentanyl-ratiopharm* u l-pazjenti jridu jigu sorveljati sewwa li ma' jkollhomx dan l-effett. Id-dipressjoni respiratorja tista' tippersisti wkoll wara li titnehha l-garza. L-incidenza tad-dipressjoni respiratorja tizdied hekk kif tizdied id-doża ta' fentanyl. Sustanzi attivi li jaffettwaw is-CNS jistghu jaggravaw d-dipressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti fejn id-dipressjoni repiratorju digá' hija prezenti, il-fentanyl ghandu jintuza b'kawtela kbira u f'dozi baxxi.

Mard kroniku fil- pulmon

Fentanyl jista' jkollu iktar reazzjonijiet avversi u severi f'pazjenti li jbatu minn imblukkar kroniku jew mard iehor fil-pulmun. F'dawn il-pazjenti, l-opjojdi jistghu jbaxxu ir-ritmu respiratorju u jzidu r-resistenza ghall-arja fil-passagġ respiratorju.

Dipendenza fuq id-droga

Tolleranza u dipendenza fisika u psikologika tista' tizviluppa bl-amministrazzjoni ripetuta tal-opjojdi, izda huma rari fil-kura ta' l-ugigh relatat mal-kanċer .

Żieda tal-pressjoni ġol-kranju

Fentanyl-ratiopharm ghandu jintuza bil-prudenza f'pazjenti li jistghu jkunu iktar suxxettibli ghall-effetti ġewwa l-kranju ġejjin minhabba retenzjoni ta' CO₂, bhal ma huma dawk b'evidenza ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju, diffikulta' li jibqgħu konxji, jew koma.

Mard tal-qalb

L-opjojdi jistghu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn ipovolimja. Pazjenti li jbatu minn pressjoni baxxa u/jew pazjenti li jbatu minn ipovolimja jridu jkunu kkurati b'attenzjoni kbira. Fentanyl jista' jipproduċi bradikardja. *Fentanyl-ratiopharm* irid jigi amministrat bi prudenza f'pazjenti li jbatu minn bradiaritmija.

Indeboliment tal-fwied

Fentanyl jigi metabolizzat fil-fwied f'mataboliti inattivi; ghalhekk l-eliminazzjoni tista' tiehu iktar fit-tul f'pazjenti li jbatu minn mard tal-fwied. Pazjenti li jbatu minn indeboliment tal-fwied ghandhom jigu osservati b'attenzjoni u id-doża ghandha tigi mnaqqsa fejn ikun hemm bzonn.

Indeboliment renali

Inqas minn 10 % ta' fentanyl jigi eliminat bhala prodott mhux mibdul mill-kliewi u, kuntrarjament ghal morfina, m'hemm l-ebda metaboliti attivi maghrufa li jigu eliminati mill-kliewi. Taghrif miġbur wara l-amministrazzjoni tal-fentanyl ġol-vina f'pazjenti b'insufficjenza renali jindika li l-volum ta' distribuzzjoni tal-fentanyl jista' jinbidel bid-djalizi. Dan jista' jaffetwa l-koncentrazzjonijiet fis-serum. Jekk pazjenti b'indeboliment renali jirċievu fentanyl transdermali, dawn ghandhom jigu osservati bir-reqqa ghal xi hjiel ta' tossicita' tal-fentanyl u d-doża ghandha tigi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bzonn.

Pazjenti b'deni/shana esterna

Żieda sostanzjali fit-temperatura tal-ġisem tista' tirrizulta f'żieda fir-rata ta' assorbiment ta' fentanyl. Ghalhekk, pazjenti li jkollhom id-deni jridu jkunu monitorjati ghal xi reazzjonijiet avversi tal-opjojdi. Il-post fejn tigi applikata il-garza m'ghandux jigi espost ghas-shana ġejja minn sorsi esterni eż. Sawna.

Pazjenti anzjani

Taghrif minn studji li saru bl-amministrazzjoni ta' fentanyl ġol-vina jindika li f'pazjenti anzjani jista' jkun hemm rata ta' eliminazzjoni mnaqqsa u *half-life* itwal. Barra minn hekk, l-anzjani jistghu ikunu aktar sensitivi ghas-sustanza attiva minn pazjenti iżgħar minnhom. Madankollu, minn studji li saru

bl-użu tal-*Fentanyl transdermal patch* f'pazjenti anzjani, irriżulta li ma kienx hemm differenza sinjifikanti fil-parametri farmakokinetiċi ħdejn pazjenti żgħar, għalkemm il-koncentrazzjonijiet fis-serum kellhom tendenza li jkunu oghla. Pazjenti anzjani jew kakesiċi għandhom jiġu osservati b'attenzjoni u id-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bżonn.

Pazjenti pedjatriċi

Minhabba l-użu limitat fit-tfal taħt it-12-il sena, *Fentanyl-ratiopharm* għandu jintuża f' din il-kategorija ta' pazjenti biss wara li jiġi stabbilit sewwa jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifikax ir-riskju potenzjali assoċjat mal-użu.

Treddiegh:

Peress illi fentanyl jiġi eliminat fil-halib tal-omm, it-treddiegh għandu jitwaqqaf waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* (ara sezzjoni 4.6)

Pazjenti b'majestinja gravis

Jista' jkun hemm reazzjonijiet mhux epilettiċi (mijo)kloniċi. Pazjenti b'majestinja gravis għandhom jiġu kkurati bil-prudenza.

Interazzjonijiet

Bhala regola, l-użu kkombinat ma derivattivi ta' barbituric acid, buprenorphine, nalbuphine u pentazocine għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5)

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess hin ta' derivattivi ta' barbituric acid għandu jiġi evitat, peress li l-effett ta' dipressjoni repiratorja kawżat mill-fentanyl jista' jżidied.

L-użu konkormittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux rakommandat. Dawn għandhom affinità għolja għal riċettaturi ta' l-opjojdi waqt li l-attività intrinsika tagħhom hija relittavament baxxa. Għaldaqstant jopponu parzjalment l-effett analġesiku ta' fentanyl u jistghu ikunu kawża ta' sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura f'pazjenti dipendenti fuq l-opjojdi (ara sezzjoni 4.4)

L-użu konkormittanti ta' dipressanti oħrajn tas-CNS jista' jikkawża żiieda fl-effetti dipressanti, u jista' jkun hemm ipoventilazzjoni, pressjoni baxxa kif ukoll sedazzjoni qawwija jew koma. Id-dipressanti tas-CNS imsemmija jinkludu:

- opjojdi
- ansjolitiċi u trankwillanti
- ipnotiċi
- anestetiki generali
- phenothiazines
- Rilassanti tal-muskoli skeletal
- antiistaminiċi b'effetti sedattivi
- xorb alkoholiku

Għalhekk, l-użu ta' xi wieħed mill-kombinazzjonijiet bejn medicini u sustanzi attivi hawn fuq imsemmija jirrikjedi sorveljanza stretta tal-pazjent.

Inibituri tal-MAO gew irrapurtati li jżidu l-effett tal-analġesiċi narkotiċi, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb. Għalhekk, fentanyl m'għandux jintuża qabel ma' jgħaddu 14-il ġurnata mill-waqfien ta' kura bl-inibituri tal-MAO.

Fentanyl, sustanza li għandha rata ta' tneħħija għolja, tiġi metabolizzata malajr u b'mod estensiv, l-aktar minn CYP3A4.

Itraconazole (inibitur qawwi ta' CYP3A4) mogħti f'doża orali ta' 200 mg/ġurnata għal erbat ijiem ma' kellu ebda effett sinjifikanti fuq il-farmakokinetika ta' fentanyl mogħti minn ġol-vina. Madankollu,

f'xi individwi, ġew osservati ziediet tal-koncentrazzjoni fil-plażma. L-amministrazzjoni orali ta' ritonavir (wiehed mill-inibituri l-iktar qawwi ta' CYP3A4) tbaxxi b'żewġ terzi r-rata tat-tnehhija ta' fentanyl moghti minn ġol-vina, u tirdoppja l-half-life. L-użu fl-istess hin ta' inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ez-ritonavir) ma użu transdermali ta' fentanyl jista' jirriżulta f'żieda fil-koncentrazzjoni fil-plażma ta' fentanyl. Dan jista' jzid jew itawwal, kemm l-effetti terapewtiċi, kif ukoll l-effetti avversari, b'riżultat ta' dipressjoni respiratorja qawwija. F'każi bħal dawn, hemm bżonn li l-pazjent jiġi kkurat u osservat b'aktar attenzjoni. L-użu fl-istess hin ta' ritonavir, jew inibituri qawwijin ta' CYP3A4 oħrajn, ma' l-użu transdermali ta' fentanyl m'huwiex irrakkomandat sakemm il-pazjent ma jiġix osservat bir-reqqa.

4.6 Tqala u effetti fuq il-halib tas-sider

Is-sigurta' fl-użu ta' fentanyl fit-tqala għada ma gietx stabbilita. Studji fuq annimali urew tossiċità fis-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem għadu mhux magħruf. Fentanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala hlief meta jkun hemm il-bżonn ċar. Kura fit-tul waqt it-tqala, tista' tikkawża sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura fit-tarbija. L-użu ta' fentanyl waqt it-tqala u il-hlas (anke hlas ċesarju) m'huwiex irrakkomandat għax il-fentanyl jgħaddi mill-plaċenta u jista' jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldaqstant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li qed jerdghu. Għalhekk, it-treddiegh irid jitwaqqaf waqt il-kura u sa mill-inqas 72 siegħa wara li titneħħa il-Fentanyl-ratiopharm (ara sezzjoni 4.4)

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila ta' sewqan u l-użu ta' magni. Dan għandu jkun mistenni speċjalment fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkohol jew agenti sedattivi. Dawn ir-restrizzjonijiet mhux bil-fors japplikaw għal dawk il-pazjenti li jinsabu fl-istat fiss fuq dożaġġ speċifiku. Għalhekk, pazjenti għandhom ifittxu l-parir tat-tabib biex jaraw jekk jistgħux isuqu u jhaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi huma kklassifikati taħt it-titlu tal-frekwenza, l-aktar frekwenti l-ewwel, bil-konvenzjoni li ġejja: komuni hafna ($\geq 10\%$), komuni ($\geq 1\%$ u $< 10\%$), mhux komuni ($\geq 0.1\%$ u $< 1\%$), rari ($\geq 0.01\%$ u $< 0.1\%$), rari hafna ($\leq 0.01\%$).

L-effett mhux mixtieq, l-iktar serju, kkawżat mill-fentanyl huwa d-dipressjoni respiratorja.

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: takikardija, bradikardija.

Rari: aritmija.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni hafna: uġiġh ta' ras, sturdament.

Mhux komuni: tregħid, parasteżija, anormalitajiet fil-kliem u fil-lingwa.

Rari hafna: ataxia, aċċessjonijiet, (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal).

Disturbi fl-għajnejn

Rari hafna: ambliopija.

Disturbi respiratorji, toraċiċi, u medjastinali

Mhux komuni: qtuġh ta' nifs, rata baxxa tat-tehid tan-nifs.

Rari hafna: dipressjoni respiratorja, apneja.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni hafna: tqallieġh, rimettar, stitikezza.

Komuni: gżerostomja, dispepsja.
Mhux komuni: dijarea
Rari: sulluzzu.
Rari hafna: gass fl-istonku bl-uġiġh, sadd fl-imsaren (ileju).

Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarka

Mhux komuni: żamma ta' l-awrina.
Rari hafna: uġiġh fil-bużżieqa ta' l-awrina, oligurja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda

Komuni hafna: żieda fl-ġharaq, hakk.
Komuni: reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahhal il-garża.
Mhux komuni: exantema, eritema
Ir-raxx, l-eritema u l-hakk is-soltu jisparraxxu f'inqas minn ġurnata wara li titneħħa l-garża.

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: pressjoni għolja, pressjoni baxxa.
Rari: vasodilatazzjoni.

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet fil-post tal-amministrazzjoni

Rari: edima, ksieħ.

Disturbi fis-sistema immunitarja

Rari hafna: anafilassi.

Disturbi psikjatriċi

Komuni hafna: nġhas.
Komuni: sedazzjoni, nervożita', nuqqas ta' aptit.
Mhux komuni: ewforja, amnesia, nuqqas ta' rqađ, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni.
Rari hafna: ħsibijiet delużjonali, eċċitament eċċessiv, astenja, dipressjoni, ansjeta', konfużjoni, anormalita' fil-funzjoni sesswali, sintomi assoċjati mal-waqfien mill-kura.

Effetti mhux mixtieqa oħrajn

Mhux magħrufa (ma jistgħux jiġu evalwati mit-tagħrif kurrenti): L-użu fit-tul ta' fentanyl jista' jwassal għal żvilupp ta' reżistenza u dipendenza kemm fiżika kif ukoll psikoloġika. Wara bidla minn analġesiċi opjojdi għall-*Fentanyl-ratiopharm* jew wara tmiem hesrem tat-terapija, il-pazjenti jistgħu jeżibixxu sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura tal-opjojdi (per eżempju: tqallieġh, rimettar, dijarea, anżjeta' u tregħid).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sintomi ta' doża eċċessiva ta' fentanyl huma estensjonijiet ta' l-attività farmakoloġika ez. letarġija, koma, dipressjoni respiratorja, b' respirazzjoni Cheyne-Stokes, u/jew *cyanosis*. Sintomi oħrajn jistgħu jkunu ipotermja, tnaqqis fit-ton tal-muskoli (ipotonija), bradikardija, pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċita' huma sedazzjoni qawwija, *ataxia*, *miosis*, konvulżjonijiet u dipressjoni respiratorja, b'dan ta' l-aħħar ikun is-sintomu ewlieni.

Trattament

Miżuri fil-pront għandhom jittieħdu kontra d-dipressjoni respiratorja, li jinkludu it-tneħħija tal-garża u t-taqnqil fiżiku u verbali tal-pazjent. Dan jista' jiġi segwit bl-amministrazzjoni ta' antagonista speċifika ta' l-opjojdi bħal ma' hu naloxone.

Id-doża inizjali rrakkomandata għall-adulti hi 0.4-2 mg naloxone hydrochloride mogħtija minn ġol-vina. Jekk ikun hemm il-bżonn, doża simili tista' tingħata kull 2-3 minuti, inkella tista' tiġi amministrata bħala infużjoni kontinwa ta' 2mg go 500ml sodium chloride 9mg/ml (0.9 %) soluzzjoni

ghall-injezzjoni jew ġo soluzzjoni ta' glucose 50mg/ml (5 %). Ir-rata ta' infużjoni trid tiġi aġġustata skond l-injezzjonijiet bolus mehuda qabel u r-rispons individwali tal-pazjent. Jekk l-amministrazzjoni minn ġol-vina ma tkunx possibli, naloxone hydrochloride jista' jingħata wkoll fil-muskolu jew taħt il-ġilda. L-effett, wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu jew taħt il-ġilda, idum iktar biex jibda jinħass meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. L-effett wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu idum iktar fit-tul meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. Dipressjoni respiratorja minhabba doża eċċessiva tista' ddum iktar mill-effett ta' l-antagonista ta' l-opjojdi. L-inverzjoni tal-effett narkotiku tista' tirriżulta f' uġiġh akut u l-liberazzjoni ta' *catecholamines*. Kura intensiva hija importanti jekk din tkun meħtieġa minhabba l-kundizzjoni klinika tal-pazjent. Jekk ikun hemm pressjoni baxxa qawwija jew persistenti, għandha tiġi kkunsidrata l-possibilita' ta' ipovolemija, u din il-kundizzjoni trid tiġi mmanegġjata bit-terapija fluwida u parenterali xierqa.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: opjojdi; derivattivi ta' Phenylpiperidine, Kodici ATC: N02AB03

Fentanyl huwa analġesiku tal-klassi opjojdi li jinteraġixxi l-aktar ma' l- μ -receptor. L-effetti prinċipali huma analġesija u sedazzjoni. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum, li tikkawża effett minimu ta' analġesija f'pazjenti li qed jirċievu opjojdi għall-ewwel darba, tvarja bejn 0.3-1.5ng/ml; isseħħ żieda fl-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi meta l-livelli fis-serum jiskorru 2ng/ml.

Kemm l-inqas doża effettiva ta' fentanyl, kif ukoll il-konċentrazzjoni minima li tikkawża reazzjonijiet avversi, jiżiedu hekk kif tiżviluppa żieda fit-tolleranza. Hemm differenzi kbar fit-tendenza għal l-iżvilupp ta' tolleranza bejn pazjent u iehor.

5.2 Taghrif farmakokinetiku

Wara l-amministrazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, fentanyl jiġi assorbit kontinwament minn ġol-ġilda għal perijodu ta' 72 siegħa. Kawża tal- *polymer matrix* u d-diffużjoni ta' fentanyl mis-saffi tal-ġilda, ir-rata ta' rħir tibqa' relattivament kostanti.

Assorbiment

Wara l-ewwel applikazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiżdied b' mod gradwali, issir livell bejn 12 u 24 siegħa wara, u tibqa' relattivament kostanti għall-bqija tal-perijodu ta' l-applikazzjoni ta' 72 siegħa. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiddependi fuq id-daqs tal-garża ta' fentanyl. Fil-prattika, sat-tieni applikazzjoni ta' 72 siegħa, il-konċentrazzjoni fissa fis-serum diġa' tkun intlaħqet u din tiġi miżmuma tul l-applikazzjonijiet sussegwenti b'garża ta' l-istess daqs.

Distribuzzjoni

Il-perċentwal ta' fentanyl li jehel mal-proteini tad-demem huwa 84 %.

Biotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat primarjament fil-fwied minn CYP3A4. Il-metabolit prinċipali, norfentanyl, m'huwix attiv.

Eliminazzjoni

Meta titwaqqaf il-kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum taqa' gradwalment, u titbaxxa b'madwar 50 % fit-13 sa 22 siegħa fl-adulti jew fit-22 sa 25 siegħa fit-tfal, rispettivament. L-assorbiment ta' fentanyl li jissokta mill-ġilda jispjega għaliex ir-rata ta' tnaqqis tal-konċentrazzjoni fis-serum hija inqas minn dik osservata wara infużjoni minn ġol-vina.

Madwar 75 % ta' fentanyl jiġi eliminat fl-awrina, l-biċċa l-kbira bhala metaboliti, b'inqas minn 10 % mneħhi bhala prodott mhux mibul. Madwar 9 % mid-doża mogħtija tista' tiġi estratta mill-purgar, il-biċċa l-kbira bhala metaboliti.

Farmakokinetika f'popolazzjonijiet speċjali

L-anzjani u pazjenti debboli jistgħu ikollhom rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl baxxa li twassal għal *half life* terminali mtawwal. F'pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku, jista' jkun hemm tibdil fir-rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl, minnhabba bidliet fil-proteini tal-plazma u t-tneħħija metabolika, li jwassal għal zieda tal-koncentrazzjonijiet fis-serum.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku, bbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, ma' juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, l-ebda effett tossiku minn doži ripetuti u l-ebda effett tossiku fuq il-ġeni.

Studji fuq annimali urew fertilita' mnaqqsa u zieda fil-mortalita' tal-fetu tal-ġrieden. Mandankollu, effetti teratoġeniċi ma ġewx stabbiliti.

Studji fit-tul dwar attivita' karċinogenika ma twettqux.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Saff li jwahħal

Saff li jwahħal magħmul minn Polyacrylate

Fojl warrani

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Release liner

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kull garża transdermali hija ippakkjata għaliha ġo qartas separat. Il-fojl Composite huwa magħmul minn dawn is-saffi, minn barra għal ġewwa: karta Kraft miksija, fojl ta' polyethylene b'densita' baxxa, fojl ta' l-aluminju, Surlyn (thermoplastic ethylene-methacrylic acid copolymer).

Pakketti li fihom 3, 5, 10 jew 20 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Kwantitajiet kbar ta' fentanyl jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara l-użu tagħha. Il-garża wżata trid tkun mitwija bin-naħat li jwahaħlu fuq il-parti ta' ġewwa u tintrema, jew meta jkun possibli, tittiehed lura għand is-spiżjar. Kull fdalijiet tal-prodott li ma jiġux użati għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispiżjar.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}

{fax}

{e-mail}

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

{XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull garża terhi 75 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 22.5 cm² fiha 12.375 mg fentanyl.

Għal lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Garża trasparenti u bla kulur b' sinjala kahlani fuq il-fojl warrani: "fentanyl 75 µg/h".

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-prodott huwa indikat f' uġiġh qawwi u kroniku li jista' jiġi immanigġjat adegwament biss bl-użu ta' analġesiċi tat-tip opjojdi.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Id-dożaġġ huwa addattat għal kull individwu u ibbażat fuq l-istorja ta' kura bl-opjojdi tal-pazjent u jitqies:

- Il-possibilita' li tiġi żviluppata tolleranza,
- Il-kundizzjoni ġenerali fil-preżent, l-istat mediku tal-pazjent, u
- Il-grad tas-severita' tal-kundizzjoni.

Id-doża ta' fentanyl hija mfassla individwalment u trid tiġi riveduta ta' spiss wara kull amministrazzjoni.

Pazjenti li jirċievu kura bl-opjojdi għall-ewwel darba

Garża li terhi 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u din għandha tintuża fid-dożaġġ tal-bidu . Fl-anzjani ta' eta' kbira hafna u f'pazjenti debboli hafna, mhux irrakkommandat illi tinbeda kura bl-opjojdi bil-*Fentanyl-ratiopharm*, minhabba is-suxxettibbilita' magħrufa li dawn il-pazjenti għandhom għal din it-tip ta' kura. F'każi bħal dawn, ikun aktar xieraq illi l-kura tinbeda b' doži zghar ta' morfina li tintreħa immedjatament u il-*Fentanyl-ratiopharm* jiġi preskritt biss wara li tiġi stabbilita d-doża ottimali.

Tibdil minn opjojdi oħrajn

F'każ ta' tibdil minn opjojdi orali jew parenterali għal kura bil-fentanyl, id-doża tal-bidu għandha tiġi kkalkulata skond li ġej:

1. Il-kwantita' ta' analġesiċi meħtieġa tul l-aħħar 24 siegħa trid tiġi ddeterminata.
2. It-total miksub għandu jiġi mibdul fid-doża ekwivalenti ta' morfina orali permezz ta' Tabella 1.
3. Id-doża ekwivalenti ta' fentanyl għandha tiġi determinata skond li ġej:
 - a) permezz ta' Tabella 2 għal daww il-pazjenti li jkollhom bżonn tibdil regolari fil-kura ta' l-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn fentanyl orali għal fentanyl transdermali huwa ta' 150:1)
 - b) permezz ta' Tabella 3 għal daww il-pazjenti li qegħdin fuq kura stabbli u tollerata tajjeb bl-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn morfina għal fentanyl transdermali huwa ta' 100:1)

Tabella 1: Konverżjoni tad-doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti:

Id-dożi li jidhru f'din it-tabella għandhom l-effett analġesiku ekwivalenti ta' 10mg morfina parenterali

Sustanza Attiva	Doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti (mg)	
	Parenterali (im)	Orali
Morfina	10	30-40
Hydromorphone	1.5	7.5
Oxycodone	10-15	20-30
Methadone	10	20
Levorphanol	2	4
Oxymorphone	1	10 (rettali)
Diamorphine	5	60
Pethidine	75	-
Codeine	-	200
Buprenorphine	0.4	0.8 (taht l-ilsien)
Ketobemidone	10	20-30

Tabella 2: Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn ta' tibdil regolari fil-kura bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
<44	12.5
45-134	25
135-224	50
225-314	75
315-404	100
405-494	125
495-584	150
585-674	175
675-764	200
765-854	225
855-944	250
945-1034	275
1035-1124	300

Tabella 3: : Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li huma stabbli u jitolleraw tajjeb il-kura tagħhom bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
< 60	12.5
60-89	25
90-149	50
150-209	75
210-269	100
270-329	125
330-389	150
390-449	175
450-509	200
510-569	225
570-629	250
630-689	275
690-749	300

Bit-tahlit ta' bosta biċċiet ta' garża transdermali, tista' tinkiseb rata ta' irhir ta' fentanyl il fuq minn 100 mikrogramma fis-siegħa.

L-evalwazzjoni inizjali ta' l-effett analġesiku massimu ta' *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex issir qabel il-garża tintlibes għal mill-inqas 24 siegħa. Dan minhabba iż-żieda gradwali tal-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum matul l-ewwel 24 siegħa wara li l-garża tkun applikata.

Fl-ewwel 12-il siegħa wara bidla għall-*Fentanyl-ratiopharm*, il-pazjent għandu jibqa' jirċievi l-analġesiku ta' qabel u bl-istess doża; għat-12 il siegħa ta' wara, dan l-analġesiku għandu jiba' jinagħata skond il-bżonn.

Titrazzjoni tad-doża u d-dożaġġ ta' manteniment

Il-garża trid tinbidel kull 72 siegħa. Id-doża trid tiġi mibdula skond l-individwu sakemm l-effiċjenza analġesika tiġi stabbilita. F'pazjenti li jhossu tnaqqis sostanzjali tal-effett fil-perijodu bejn 48-72 siegħa wara l-applikazzjoni, tista' tinbidel il-garża ta' fentanyl wara 48 siegħa.

Garża b'rata ta' irhir ta' 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u hija adattata għat-titrazzjoni tad-doża meta l-livell tad-dożaġġ meħtieġ ikun baxx. Jekk it-tnaqqis fl-uġiġh sa l-aħħar tal-perjodu inizjali ma jkunx biżżejjed, id-doża tista' tizzied wara 3 ijiem, sakemm l-effett mixtieġ għal kull pazjent jintlaħaq. Tibdiliet oħrajn fid-doża normalment għandhom isiru b'żidiet ta' 25 mikrogramma/siegħa, iżda għandu jitqies ukoll il-bżonn ta' analġesici supplementari u l-istat ta' uġiġh tal-pazjent. Pazjenti jistgħu jkollhom bżonn ta' doži supplementari ta' analġesici kull tant żmien li jahdmu malajr biex jilqgħu kontra ħruġ ta' l-uġiġh. Metodi addizzjonali jew alternattivi ta' kura kontra l-uġiġh jew anke amministrazzjoni ta' opjojdi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati meta d-doża ta' *Fentanyl ratiopharm* taqbeż 300 mikrogramma/siegħa.

Sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura ġew irrapportati meta kura fit-tul b'morfina nbidlet f'wahda transdermali b'fentanyl, minkejja kura analġesika effikaċi u adegwata. Huwa rrakkomandat illi pazjenti li juru sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jingħataw doži żgħar ta' morfina b'effett qasir.

Tibdil jew waqfien tat-terapija

Jekk l-użu tal-garża jrid tiġi mwaqqaf, kull bidla għal opjojdi oħrajn għandha tkun gradwali, tibda b'doża baxxa u tizzied bil-mod. Dan għaliex il-livelli ta' fentanyl jinżlu gradwalment wara li tinneħħa il-garża; ikun hemm bżonn mill-inqas 17-il siegħa sabiex il-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum jaqa' b'50 %. Bħala regola ġenerali, it-twaqqif tal-kura analġesika b'opjojdi jrid ikun gradwali, sabiex jiġu evitati sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura (tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid muskolari). Tabella 2 u tabella 3 m'għandhomx jintużaw meta tinbidel il-kura minn garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda bil-fentanyl għal kura bil-morfina.

Metodu ta' l-mministrazzjoni

Hekk kif tinneħħa mill-pakkett u *r-release liner*, il-garża għandha tiġi applikata fuq parti tal-ġilda mingħajr pil lejn in-naħa ta' fuq tal-ġisem (sider, dahar, dirgħajn). Bix jitneħħa l-pil għandu jintuża mqass u mhux xafr.

Qabel l-applikazzjoni, il-ġilda trid tinaddaf b'attenzjoni bl-użu ta' ilma safi (l-ebda aġenti ta' tindif) u titnixxef sewwa. Eżatt wara, il-garża transdermali tiġi applikata permezz ta' pressjoni hafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda. Il-parti tal-ġilda fejn ser tiġi applikata il-garża m'għandhiex ikollha qsim żgħar (eż. minhabba radjazzjoni jew tqaxxir) u l-ġilda m'għandhiex tkun irritata.

Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.

Xi drabi, il-garża jkollha titwahħal aħjar b'xi haġa oħra. .

Jekk isiru żidiet progressivi fid-doża, l-erġa tas-superfiċje attiva meħtieġa tista' tilhaq il-punt illi aktar żidiet ma jkunux fiżikament possibbli.

Tul ta' l-amministrazzjoni

Il-garża għandha tinbidel kull 72 siegħa. Jekk għal xi raġuni jkun jinhtieg li tinbidel qabel il-waqt, l-ebda tibdil m'għandu jsir qabel ma jkunu għaddew 48 siegħa, inkella jista' jkun hemm żieda fil-koncentrazzjoni medja ta' fentanyl. Irid jintagħżel post ġdid fuq il-ġilda għal kull applikazzjoni,.

Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma titwahhal garża fuq l-istess parti tal-ġilda. L-effett analġesiku jista' jidm għal xi żmien wara li tkun tnehhiet il-garża transdermali. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun. M'għandhux jintuża l-alkohol jew solventi oħra biex titnaddaf il-ġilda, għaliex dawn jistgħu jippenetraw fil-ġilda minhabba l-effett tal-garża.

Tfal u addoloxxenti

L-esperjenza dwar l-użu fit-tfal ta' taħt it-12-il sena hija limitata. *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex tintuża f'din il-popolozzjoni ta' pazjenti

Anzjani

L-anzjani iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Indeboliment epatiku u renali

Pazjenti b'indeboliment epatiku jew renali iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

- Ipersensittività għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.
- Uġiegh akut jew ta' wara operazzjoni, għax titrazzjoni tad-doża mhix possibbli waqt kura qasira.
- Indeboliment sever tas-sistema nervuża ċentrali

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jintuża biss bħala parti minn kura integrali tal-uġiegh f'każi fejn il-pazjent jista' jiġi ikkontrollat b'mod mediku, soċjalment u psikoloġikalment kif inhu xieraq.

Kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* għandha tinbeda biss minn tabib espert u li hu mgħarref sew fil-farmakokinetika ta' garża transdermali ta' fentanyl u l-periklu ta' ipoventilazzjoni severa. Wara reazzjoni avversa u serja, il-pazjent irid jibqa' taħt osservazzjoni għal 24 siegħa wara li titneħħa il-garża minhabba il-*half life* ta' fentanyl (ara sezzjoni 5.2).

F'każ ta' uġiegh kroniku li mhux ġej minn kanċer, il-kura tista' tinbeda b'opjojd qawwi b'reħa immedjata (eż. morfina), u tiġi preskritta *Fentanyl-ratiopharm* wara li tiġi stabbilita l-effikaċja u l-aħjar dożaġġ ta' l-opjojd qawwi

Il-garża transdermali m'għandiex tinqata, għax m'hemm informazzjoni disponibbli fuq il-kwalità, l-effikaċja u s-sigurtà ta' garża hekk masquma.

Jekk ikun hemm bżonn ta' dozi 'l fuq mill-ekwivalenti ta' 500 mg morfina, huwa rrakkomandat illi t-terapija bl-opjojdi tiġi evalwata mill-ġdid.

Wara l-amministrazzjoni b'dozi rakkomandati, r-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni huma hedla, konfużjoni, tqalligh, rimettar u stitikezza. Dawn ta' l-ewwel huma ta' natura hafifa u għal żmien qasir u l-kawża tagħhom trid tiġi investigata jekk is-sintomi jippersistu. Mill-banda l-oħra, stitikezza ma' tiegħaf sakemm titkompla il-kura. Dawn l-effetti kollha huma mistennija u, għaldaqstant, għandha tittiehed azzjoni minn qabel, speċjalment fir-rigward tas-stitikezza, sabiex il-kura tkun l-aħjar possibbli. Ta' spiss, jista' jagħti l-każ li jkun hemm bżonn ta' kura korrettiva (ara sezzjoni 4.8).

L-użu konkomittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5)

Frug ta' uġiegh mhux mistenni

Minkejja kura b'garza ta' fentanyl, stharrig' wera li kwazi l-pazjenti kollha jkollhom bzonn ta' medicini qawwija u li jahdmu fil-pront sabiex jilqghu immedjatament kontra l-hrug ta' ugigh mhux mistenni.

Dipressjoni respiratorja

L-istess kif jigri bl-użu tal-opjojdi qawwijin kollha, xi pazjenti jistghu jbatu minn dipressjoni respiratorja meta jużaw *Fentanyl-ratiopharm* u l-pazjenti jridu jigu sorveljati sewwa li ma' jkollhomx dan l-effett. Id-dipressjoni respiratorja tista' tippersisti wkoll wara li titnehha l-garza. L-incidenza tad-dipressjoni respiratorja tizdied hekk kif tizdied id-doża ta' fentanyl. Sustanzi attivi li jaffettwaw is-CNS jistghu jaggravaw d-dipressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti fejn id-dipressjoni respiratorju digá' hija prezenti, il-fentanyl ghandu jintuża b'kawtela kbira u f'dozi baxxi.

Mard kroniku fil-pulmun

Fentanyl jista' jkollu iktar reazzjonijiet avversi u severi f'pazjenti li jbatu minn imblukkar kroniku jew mard iehor fil-pulmun. F'dawn il-pazjenti, l-opjojdi jistghu jbaxxu ir-ritmu respiratorju u jzidu r-resistenza ghall-arja fil-passaġġ respiratorju.

Dipendenza fuq id-droga

Tolleranza u dipendenza fisika u psikologika tista' tiżviluppa bl-amministrazzjoni ripetuta tal-opjojdi, izda huma rari fil-kura ta' l-ugigh relatat mal-kanċer .

Żieda tal-pressjoni ġol-kranju

Fentanyl-ratiopharm ghandu jintuża bil-prudenza f'pazjenti li jistghu jkunu iktar suxxettibli ghall-effetti ġewwa l-kranju ġejjin minhabba retenzjoni ta' CO₂, bhal ma huma dawk b'evidenza ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju, diffikulta' li jibqgħu konxji, jew koma.

Mard tal-qalb

L-opjojdi jistghu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn ipovolimja. Pazjenti li jbatu minn pressjoni baxxa u/jew pazjenti li jbatu minn ipovolimja jridu jkunu kkurati b'attenzjoni kbira. Fentanyl jista' jipproduċi bradikardja. *Fentanyl-ratiopharm* irid jigi amministrat bi prudenza f'pazjenti li jbatu minn bradiaritmija.

Indeboliment tal-fwied

Fentanyl jigi metabolizzat fil-fwied f'mataboliti inattivi; ghalhekk l-eliminazzjoni tista' tiehu iktar fit-tul f'pazjenti li jbatu minn mard tal-fwied. Pazjenti li jbatu minn indeboliment tal-fwied ghandhom jigu osservati b'attenzjoni u id-doża ghandha tigi mnaqqsa fejn ikun hemm bzonn.

Indeboliment renali

Inqas minn 10 % ta' fentanyl jigi eliminat bhala prodott mhux mibdul mill-kliewi u, kuntrarjament ghal morfina, m'hemm l-ebda metaboliti attivi maghrufa li jigu eliminati mill-kliewi. Taghrif miġbur wara l-amministrazzjoni tal-fentanyl ġol-vina f'pazjenti b'insufficjenza renali jindika li l-volum ta' distribuzzjoni tal-fentanyl jista' jinbidel bid-djalizi. Dan jista' jaffetwa l-koncentrazzjonijiet fis-serum. Jekk pazjenti b'indeboliment renali jirċievu fentanyl transdermali, dawn ghandhom jigu osservati bir-reqqa ghal xi hjiel ta' tossicita' tal-fentanyl u d-doża ghandha tigi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bzonn.

Pazjenti b'deni/shana esterna

Żieda sostanzjali fit-temperatura tal-ġisem tista' tirrizulta f'żieda fir-rata ta' assorbiment ta' fentanyl. Ghalhekk, pazjenti li jkollhom id-deni jridu jkunu monitorjati ghal xi reazzjonijiet avversi tal-opjojdi. Il-post fejn tigi applikata il-garza m'ghandux jigi espost ghas-shana ġejja minn sorsi esterni eż. Sawna.

Pazjenti anzjani

Taghrif minn studji li saru bl-amministrazzjoni ta' fentanyl ġol-vina jindika li f'pazjenti anzjani jista' jkun hemm rata ta' eliminazzjoni mnaqqsa u *half-life* itwal. Barra minn hekk, l-anzjani jistghu ikunu aktar sensitivi ghas-sustanza attiva minn pazjenti iżgħar minnhom. Madankollu, minn studji li saru

bl-użu tal-*Fentanyl transdermal patch* f'pazjenti anzjani, irriżulta li ma kienx hemm differenza sinjifikanti fil-parametri farmakokinetiċi ħdejn pazjenti żgħar, għalkemm il-koncentrazzjonijiet fis-serum kellhom tendenza li jkunu oghla. Pazjenti anzjani jew kakesiċi għandhom jiġu osservati b'attenzjoni u id-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bżonn.

Pazjenti pedjatriċi

Minhabba l-użu limitat fit-tfal taħt it-12-il sena, *Fentanyl-ratiopharm* għandu jintuża f' din il-kategorija ta' pazjenti biss wara li jiġi stabbilit sewwa jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifikax ir-riskju potenzjali assoċjat mal-użu.

Treddiegh:

Peress illi fentanyl jiġi eliminat fil-halib tal-omm, it-treddiegh għandu jitwaqqaf waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* (ara sezzjoni 4.6)

Pazjenti b'majestinja gravis

Jista' jkun hemm reazzjonijiet mhux epilettiċi (mijo)kloniċi. Pazjenti b'majestinja gravis għandhom jiġu kkurati bil-prudenza.

Interazzjonijiet

Bhala regola, l-użu kkombinat ma derivattivi ta' barbituric acid, buprenorphine, nalbuphine u pentazocine għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5)

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess hin ta' derivattivi ta' barbituric acid għandu jiġi evitat, peress li l-effett ta' dipressjoni repiratorja kawżat mill-fentanyl jista' jżidied.

L-użu konkormittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux rakommandat. Dawn għandhom affinità għolja għal riċettaturi ta' l-opjojdi waqt li l-attività intrinsika tagħhom hija relittavament baxxa. Għaldaqstant jopponu parzjalment l-effett analġesiku ta' fentanyl u jistghu ikunu kawża ta' sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura f' pazjenti dipendenti fuq l-opjojdi (ara sezzjoni 4.4)

L-użu konkormittanti ta' dipressanti oħrajn tas-CNS jista' jikkawża żiieda fl-effetti dipressanti, u jista' jkun hemm ipoventilazzjoni, pressjoni baxxa kif ukoll sedazzjoni qawwija jew koma. Id-dipressanti tas-CNS imsemmija jinkludu:

- opjojdi
- ansjolitiċi u trankwillanti
- ipnotiċi
- anestetiki generali
- phenothiazines
- Rilassanti tal-muskoli skeletal
- antiistaminiċi b'effetti sedattivi
- xorb alkoholiku

Għalhekk, l-użu ta' xi wieħed mill-kombinazzjonijiet bejn medicini u sustanzi attivi hawn fuq imsemmija jirrikjedi sorveljanza stretta tal-pazjent.

Inibituri tal-MAO gew irrapurtati li jżidu l-effett tal-analġesiċi narkotiċi, speċjalment f' pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb. Għalhekk, fentanyl m'għandux jintuża qabel ma' jgħaddu 14-il ġurnata mill-waqfien ta' kura bl-inibituri tal-MAO.

Fentanyl, sustanza li għandha rata ta' tneħħija għolja, tiġi metabolizzata malajr u b'mod estensiv, l-aktar minn CYP3A4.

Itraconazole (inibitur qawwi ta' CYP3A4) mogħti f'doża orali ta' 200 mg/ġurnata għal erbat ijiem ma' kellu ebda effett sinjifikanti fuq il-farmakokinetika ta' fentanyl mogħti minn ġol-vina. Madankollu,

f'xi individwi, ġew osservati ziediet tal-koncentrazzjoni fil-plażma. L-amministrazzjoni orali ta' ritonavir (wiehed mill-inibituri l-iktar qawwi ta' CYP3A4) tbaxxi b'żewġ terzi r-rata tat-tnehhija ta' fentanyl moghti minn ġol-vina, u tirdoppja l-half-life. L-użu fl-istess hin ta' inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ez-ritonavir) ma użu transdermali ta' fentanyl jista' jirriżulta f'żieda fil-koncentrazzjoni fil-plażma ta' fentanyl. Dan jista' jzid jew itawwal, kemm l-effetti terapewtiċi, kif ukoll l-effetti avversari, b'riżultat ta' dipressjoni respiratorja qawwija. F'każi bħal dawn, hemm bżonn li l-pazjent jiġi kkurat u osservat b'aktar attenzjoni. L-użu fl-istess hin ta' ritonavir, jew inibituri qawwijin ta' CYP3A4 oħrajn, ma' l-użu transdermali ta' fentanyl m'huwiex irrakkomandat sakemm il-pazjent ma jiġix osservat bir-reqqa.

4.6 Tqala u effetti fuq il-halib tas-sider

Is-sigurta' fl-użu ta' fentanyl fit-tqala għada ma gietx stabbilita. Studji fuq annimali urew tossiċità fis-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem għadu mhux magħruf. Fentanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala hlief meta jkun hemm il-bżonn ċar. Kura fit-tul waqt it-tqala, tista' tikkawża sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura fit-tarbija. L-użu ta' fentanyl waqt it-tqala u il-hlas (anke hlas ċesarju) m'huwiex irrakkomandat għax il-fentanyl jgħaddi mill-plaċenta u jista' jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldaqstant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li qed jerdghu. Għalhekk, it-treddiegħ irid jitwaqqaf waqt il-kura u sa mill-inqas 72 siegħa wara li titneħħa il-Fentanyl-ratiopharm (ara sezzjoni 4.4)

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila ta' sewqan u l-użu ta' magni. Dan għandu jkun mistenni speċjalment fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkohol jew agenti sedattivi. Dawn ir-restrizzjonijiet mhux bil-fors japplikaw għal daww il-pazjenti li jinsabu fl-istat fiss fuq dożaġġ speċifiku. Għalhekk, pazjenti għandhom ifittxu l-parir tat-tabib biex jaraw jekk jistgħux isuqu u jhaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi huma kklassifikati taħt it-titlu tal-frekwenza, l-aktar frekwenti l-ewwel, bil-konvenzjoni li ġejja: komuni hafna ($\geq 10\%$), komuni ($\geq 1\%$ u $< 10\%$), mhux komuni ($\geq 0.1\%$ u $< 1\%$), rari ($\geq 0.01\%$ u $< 0.1\%$), rari hafna ($\leq 0.01\%$).

L-effett mhux mixtieq, l-iktar serju, kkawżat mill-fentanyl huwa d-dipressjoni respiratorja.

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: takikardija, bradikardija.

Rari: aritmija.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni hafna: uġiġħ ta' ras, sturdament.

Mhux komuni: tregħid, parasteżija, anormalitajiet fil-kliem u fil-lingwa.

Rari hafna: ataxia, aċċessjonijiet, (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal).

Disturbi fl-għajnejn

Rari hafna: ambliopija.

Disturbi respiratorji, toraċiċi, u medjastinali

Mhux komuni: qtugħ ta' nifs, rata baxxa tat-tehid tan-nifs.

Rari hafna: dipressjoni respiratorja, apneja.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni hafna: tqallieġħ, rimettar, stitikezza.

Komuni: gżerostomja, dispepsja.
Mhux komuni: dijarea
Rari: sulluzzu.
Rari hafna: gass fl-istonku bl-uġiġh, sadd fl-imsaren (ileju).

Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarka

Mhux komuni: żamma ta' l-awrina.
Rari hafna: uġiġh fil-bużżieqa ta' l-awrina, oligurja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda

Komuni hafna: żieda fl-ġharaq, hakk.
Komuni: reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahhal il-garża.
Mhux komuni: exantema, eritema
Ir-raxx, l-eritema u l-hakk is-soltu jisparraxxu f'inqas minn ġurnata wara li titneħħa l-garża.

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: pressjoni għolja, pressjoni baxxa.
Rari: vasodilatazzjoni.

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet fil-post tal-amministrazzjoni

Rari: edima, ksieħ.

Disturbi fis-sistema immunitarka

Rari hafna: anafilassi.

Disturbi psikjatriċi

Komuni hafna: nġhas.
Komuni: sedazzjoni, nervożita', nuqqas ta' aptit.
Mhux komuni: ewforja, amnesja, nuqqas ta' rqađ, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni.
Rari hafna: ħsibijiet delużjonali, eċċitament eċċessiv, astenja, dipressjoni, ansjeta', konfużjoni, anormalita' fil-funzjoni sesswali, sintomi assoċjati mal-waqfien mill-kura.

Effetti mhux mixtieqa oħrajn

Mhux magħrufa (ma jistgħux jiġu evalwati mit-tagħrif kurrenti): L-użu fit-tul ta' fentanyl jista' jwassal għal żvilupp ta' reżistenza u dipendenza kemm fiżika kif ukoll psikoloġika. Wara bidla minn analġesiċi opjojdi għall-*Fentanyl-ratiopharm* jew wara tmiem hesrem tat-terapija, il-pazjenti jistgħu jeżibixxu sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura tal-opjojdi (per eżempju: tqallieġh, rimettar, dijarea, anzjeta' u tregħid).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sintomi ta' doża eċċessiva ta' fentanyl huma estensjonijiet ta' l-attivita' farmakoloġika ez. letarġija, koma, dipressjoni respiratorja, b' respirazzjoni Cheyne-Stokes, u/jew *cyanosis*. Sintomi oħrajn jistgħu jkunu ipotermja, tnaqqis fit-ton tal-muskoli (ipotonija), bradikardija, pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċita' huma sedazzjoni qawwiya, *ataxia*, *miosis*, konvulżjonijiet u dipressjoni respiratorja, b' dan ta' l-aħħar ikun is-sintomu ewlieni.

Trattament

Miżuri fil-pront għandhom jittieħdu kontra d-dipressjoni respiratorja, li jinkludu it-tneħħija tal-garża u t-tqanqil fiżiku u verbali tal-pazjent. Dan jista' jiġi segwit bl-amministrazzjoni ta' antagonista speċifika ta' l-opjojdi bħal ma' hu naloxone.

Id-doża inizjali rrakkomandata għall-adulti hi 0.4-2 mg naloxone hydrochloride mogħtija minn ġol-vina. Jekk ikun hemm il-bżonn, doża simili tista' tingħata kull 2-3 minuti, inkella tista' tiġi amministrata bħala infużjoni kontinwa ta' 2mg go 500ml sodium chloride 9mg/ml (0.9 %) soluzzjoni

ghall-injezzjoni jew ġo soluzzjoni ta' glucose 50mg/ml (5 %). Ir-rata ta' infużjoni trid tiġi aġġustata skond l-injezzjonijiet bolus mehuda qabel u r-rispons individwali tal-pazjent. Jekk l-amministrazzjoni minn ġol-vina ma tkunx possibbli, naloxone hydrochloride jista' jingħata wkoll fil-muskolu jew taħt il-ġilda. L-effett, wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu jew taħt il-ġilda, idum iktar biex jibda jinħass meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. L-effett wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu idum iktar fit-tul meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. Dipressjoni respiratorja minhabba doża eċċessiva tista' ddum iktar mill-effett ta' l-antagonista ta' l-opjojdi. L-inverzjoni tal-effett narkotiku tista' tirriżulta f' uġiġh akut u l-liberazzjoni ta' *catecholamines*. Kura intensiva hija importanti jekk din tkun meħtieġa minhabba l-kundizzjoni klinika tal-pazjent. Jekk ikun hemm pressjoni baxxa qawwija jew persistenti, għandha tiġi kkunsidrata l-possibilita' ta' ipovolemija, u din il-kundizzjoni trid tiġi mmanegġjata bit-terapija fluwida u parenterali xierqa.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: opjojdi; derivattivi ta' Phenylpiperidine, Kodici ATC: N02AB03

Fentanyl huwa analġesiku tal-klassi opjojdi li jinteraġixxi l-aktar ma' l- μ -receptor. L-effetti prinċipali huma analġesija u sedazzjoni. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum, li tikkawża effett minimu ta' analġesija f'pazjenti li qed jirċievu opjojdi għall-ewwel darba, tvarja bejn 0.3-1.5ng/ml; isseħħ żieda fl-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi meta l-livelli fis-serum jiskorru 2ng/ml.

Kemm l-inqas doża effettiva ta' fentanyl, kif ukoll il-konċentrazzjoni minima li tikkawża reazzjonijiet avversi, jiżdiedu hekk kif tiżviluppa żieda fit-tolleranza. Hemm differenzi kbar fit-tendenza għal l-iżvilupp ta' tolleranza bejn pazjent u iehor.

5.2 Taghrif farmakokinetiku

Wara l-amministrazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, fentanyl jiġi assorbit kontinwament minn ġol-ġilda għal perijodu ta' 72 siegħa. Kawża tal- *polymer matrix* u d-diffużjoni ta' fentanyl mis-saffi tal-ġilda, ir-rata ta' rħir tibqa' relattivament kostanti.

Assorbiment

Wara l-ewwel applikazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiżdied b'mod gradwali, issir livell bejn 12 u 24 siegħa wara, u tibqa' relattivament kostanti għall-bqija tal-perijodu ta' l-applikazzjoni ta' 72 siegħa. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiddependi fuq id-daqs tal-garża ta' fentanyl. Fil-prattika, sat-tieni applikazzjoni ta' 72 siegħa, il-konċentrazzjoni fissa fis-serum diġa' tkun intlaħqet u din tiġi miżmuma tul l-applikazzjonijiet sussegwenti b'garża ta' l-istess daqs.

Distribuzzjoni

Il-perċentwal ta' fentanyl li jehel mal-proteini tad-demem huwa 84 %.

Biotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat primarjament fil-fwied minn CYP3A4. Il-metabolit prinċipali, norfentanyl, m'huwix attiv.

Eliminazzjoni

Meta titwaqqaf il-kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum taqa' gradwalment, u titbaxxa b'madwar 50 % fit-13 sa 22 siegħa fl-adulti jew fit-22 sa 25 siegħa fit-tfal, rispettivament. L-assorbiment ta' fentanyl li jissokta mill-ġilda jispjega għaliex ir-rata ta' tnaqqis tal-konċentrazzjoni fis-serum hija inqas minn dik osservata wara infużjoni minn ġol-vina.

Madwar 75 % ta' fentanyl jiġi eliminat fl-awrina, l-biċċa l-kbira bhala metaboliti, b'inqas minn 10 % mneħhi bhala prodott mhux mibul. Madwar 9 % mid-doża mogħtija tista' tiġi estratta mill-purgar, il-biċċa l-kbira bhala metaboliti.

Farmakokinetika f'popolazzjonijiet speċjali

L-anzjani u pazjenti debboli jistgħu ikollhom rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl baxxa li twassal għal *half life* terminali mtawwal. F'pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku, jista' jkun hemm tibdil fir-rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl, minnhabba bidliet fil-proteini tal-plażma u t-tneħħija metabolika, li jwassal għal zieda tal-koncentrazzjonijiet fis-serum.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku, bbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, ma' juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, l-ebda effett tossiku minn doži ripetuti u l-ebda effett tossiku fuq il-ġeni.

Studji fuq annimali urew fertilita' mnaqqsa u zieda fil-mortalita' tal-fetu tal-ġrieden. Mandankollu, effetti teratoġeniċi ma ġewx stabbiliti.

Studji fit-tul dwar attivita' karċinogenika ma twettqux.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Saff li jwahaħhal

Saff li jwahaħhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl warrani

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Release liner

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kull garża transdermali hija ippakkjata għaliha ġo qartas separat. Il-fojl Composite huwa magħmul minn dawn is-saffi, minn barra għal ġewwa: karta Kraft miksija, fojl ta' polyethylene b'densita' baxxa, fojl ta' l-aluminju, Surlyn (thermoplastic ethylene-methacrylic acid copolymer).

Pakketti li fihom 3, 5, 10 jew 20 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Kwantitajiet kbar ta' fentanyl jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara l-użu tagħha. Il-garża wżata trid tkun mitwija bin-naħat li jwahaħlu fuq il-parti ta' ġewwa u tintrema, jew meta jkun possibli, tittiehed lura għand is-spiżjar. Kull fdalijiet tal-prodott li ma jġugx użati għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispiżjar.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}

{fax}

{e-mail}

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

{XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull garża terhi 100 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 30 cm² fiha 16.5 mg fentanyl.

Għal lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Garża trasparenti u bla kulur b' sinjal kaħlani fuq il-fojl warrani: "fentanyl 100 µg/h".

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-prodott huwa indikat f' uġiegh qawwi u kroniku li jista' jiġi immanigġjat adegwament biss bl-użu ta' analġesiċi tat-tip opjojdi.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Id-dożaġġ huwa addattat għal kull individwu u ibbażat fuq l-istorja ta' kura bl-opjojdi tal-pazjent u jitqies:

- Il-possibilita' li tiġi żviluppata tolleranza,
- Il-kundizzjoni ġenerali fil-preżent, l-istat mediku tal-pazjent, u
- Il-grad tas-severita' tal-kundizzjoni.

Id-doża ta' fentanyl hija mfassla individwalment u trid tiġi riveduta ta' spiss wara kull amministrazzjoni.

Pazjenti li jirċievu kura bl-opjojdi għall-ewwel darba

Garża li terhi 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u din għandha tintuża fid-dożaġġ tal-bidu . Fl-anzjani ta' eta' kbira hafna u f'pazjenti debboli hafna, mhux irrakkommandat illi tinbeda kura bl-opjojdi bil-*Fentanyl-ratiopharm*, minhabba is-suxxettibbilita' magħrufa li dawn il-pazjenti għandhom għal din it-tip ta' kura. F'każi bħal dawn, ikun aktar xieraq illi l-kura tinbeda b' doži zghar ta' morfina li tintreħa immedjatament u il-*Fentanyl-ratiopharm* jiġi preskritt biss wara li tiġi stabbilita d-doża ottimali.

Tibdil minn opjojdi oħrajn

F'każ ta' tibdil minn opjojdi orali jew parenterali għal kura bil-fentanyl, id-doża tal-bidu għandha tiġi kkalkulata skond li ġej:

1. Il-kwantita' ta' analġesiċi meħtieġa tul l-aħħar 24 siegħa trid tiġi ddeterminata.
2. It-total miksub għandu jiġi mibdul fid-doża ekwivalenti ta' morfina orali permezz ta' Tabella 1.
3. Id-doża ekwivalenti ta' fentanyl għandha tiġi determinata skond li ġej:
 - a) permezz ta' Tabella 2 għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn tibdil regolari fil-kura ta' l-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn fentanyl orali għal fentanyl transdermali huwa ta' 150:1)
 - b) permezz ta' Tabella 3 għal dawk il-pazjenti li qegħdin fuq kura stabbli u tollerata tajjeb bl-opjojdi (ir-ratio tal-konverżjoni minn morfina għal fentanyl transdermali huwa ta' 100:1)

Tabella 1: Konverżjoni tad-doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti:

Id-dożi li jidhru f'din it-tabella għandhom l-effett analġesiku ekwivalenti ta' 10mg morfina parenterali

Sustanza Attiva	Doża li ttiprovdi effett analġesiku ekwivalenti (mg)	
	Parenterali (im)	Orali
Morfina	10	30-40
Hydromorphone	1.5	7.5
Oxycodone	10-15	20-30
Methadone	10	20
Levorphanol	2	4
Oxymorphone	1	10 (rettali)
Diamorphine	5	60
Pethidine	75	-
Codeine	-	200
Buprenorphine	0.4	0.8 (taht l-ilsien)
Ketobemidone	10	20-30

Tabella 2: Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn ta' tibdil regolari fil-kura bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
<44	12.5
45-134	25
135-224	50
225-314	75
315-404	100
405-494	125
495-584	150
585-674	175
675-764	200
765-854	225
855-944	250
945-1034	275
1035-1124	300

Tabella 3: : Doża inizjali rakkomandata ta' fentanyl transdermal bbażata fuq doża ta' ġurnata ta' morfina orali (għal dawk il-pazjenti li huma stabbli u jitolleraw tajjeb il-kura tagħhom bl-opjojdi)

Doża ta' morfina orali (milligramma/24 siegħa)	Irħir ta' fentanyl transdermal (mikrogramma/siegħa)
< 60	12.5
60-89	25
90-149	50
150-209	75
210-269	100
270-329	125
330-389	150
390-449	175
450-509	200
510-569	225
570-629	250
630-689	275
690-749	300

Bit-tahlit ta' bosta biċċiet ta' garża transdermali, tista' tinkiseb rata ta' irhir ta' fentanyl il fuq minn 100 mikrogramma fis-siegħa.

L-evalwazzjoni inizjali ta' l-effett analġesiku massimu ta' *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex issir qabel il-garża tintlibes għal mill-inqas 24 siegħa. Dan minhabba iż-żieda gradwali tal-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum matul l-ewwel 24 siegħa wara li l-garża tkun applikata.

Fl-ewwel 12-il siegħa wara bidla għall-*Fentanyl-ratiopharm*, il-pazjent għandu jibqa' jirċievi l-analġesiku ta' qabel u bl-istess doża; għat-12 il siegħa ta' wara, dan l-analġesiku għandu jiba' jinagħata skond il-bżonn.

Titrazzjoni tad-doża u d-dożaġġ ta' manteniment

Il-garża trid tinbidel kull 72 siegħa. Id-doża trid tiġi mibdula skond l-individwu sakemm l-effiċjenza analġesika tiġi stabbilita. F'pazjenti li jhossu tnaqqis sostanzjali tal-effett fil-perijodu bejn 48-72 siegħa wara l-applikazzjoni, tista' tinbidel il-garża ta' fentanyl wara 48 siegħa.

Garża b'rata ta' irhir ta' 12.5 mikrogramma/siegħa hija disponibbli u hija adattata għat-titrazzjoni tad-doża meta l-livell tad-dożaġġ meħtieġ ikun baxx. Jekk it-tnaqqis fl-uġiġh sa l-aħħar tal-perjodu inizjali ma jkunx biżżejjed, id-doża tista' tizzied wara 3 ijiem, sakemm l-effett mixtieġ għal kull pazjent jintlaħaq. Tibdiliet oħrajn fid-doża normalment għandhom isiru b'żidiet ta' 25 mikrogramma/siegħa, iżda għandu jitqies ukoll il-bżonn ta' analġesici supplementari u l-istat ta' uġiġh tal-pazjent. Pazjenti jistgħu jkollhom bżonn ta' doži supplementari ta' analġesici kull tant żmien li jahdmu malajr biex jilqgħu kontra ħruġ ta' l-uġiġh. Metodi addizzjonali jew alternattivi ta' kura kontra l-uġiġh jew anke amministrazzjoni ta' opjojdi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati meta d-doża ta' *Fentanyl ratiopharm* taqbeż 300 mikrogramma/siegħa.

Sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura ġew irrapportati meta kura fit-tul b'morfina nbidlet f'wahda transdermali b'fentanyl, minkejja kura analġesika effikaċi u adegwata. Huwa rrakkomandat illi pazjenti li juru sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jingħataw doži żgħar ta' morfina b'effett qasir.

Tibdil jew waqfien tat-terapija

Jekk l-użu tal-garża jrid tiġi mwaqqaf, kull bidla għal opjojdi oħrajn għandha tkun gradwali, tibda b'doża baxxa u tizzied bil-mod. Dan għaliex il-livelli ta' fentanyl jinżlu gradwalment wara li tinneħħa il-garża; ikun hemm bżonn mill-inqas 17-il siegħa sabiex il-koncentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum jaqa' b'50 %. Bħala regola ġenerali, it-twaqqif tal-kura analġesika b'opjojdi jrid ikun gradwali, sabiex jiġu evitati sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura (tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid muskolari). Tabella 2 u tabella 3 m'għandhomx jintużaw meta tinbidel il-kura minn garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda bil-fentanyl għal kura bil-morfina.

Metodu ta' l-mministrazzjoni

Hekk kif tinneħħa mill-pakkett u *r-release liner*, il-garża għandha tiġi applikata fuq parti tal-ġilda mingħajr pil lejn in-naħa ta' fuq tal-ġisem (sider, dahar, dirghajn). Bix jitneħħa l-pil għandu jintuża mqass u mhux xafra.

Qabel l-applikazzjoni, il-ġilda trid tinaddaf b'attenzjoni bl-użu ta' ilma safi (l-ebda aġenti ta' tindif) u titnixxef sewwa. Eżatt wara, il-garża transdermali tiġi applikata permezz ta' pressjoni hafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda. Il-parti tal-ġilda fejn ser tiġi applikata il-garża m'għandhiex ikollha qsim żgħar (eż. minhabba radjazzjoni jew tqaxxir) u l-ġilda m'għandhiex tkun irritata.

Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflaħ għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.

Xi drabi, il-garża jkollha titwahħal aħjar b'xi haġa oħra. .

Jekk isiru żidiet progressivi fid-doża, l-erja tas-superfiċje attiva meħtieġa tista' tilhaq il-punt illi aktar żidiet ma jkunux fiżikament possibbli.

Tul ta' l-amministrazzjoni

Il-garża għandha tinbidel kull 72 siegħa. Jekk għal xi raġuni jkun jinhtieg li tinbidel qabel il-waqt, l-ebda tibdil m'għandu jsir qabel ma jkunu għaddew 48 siegħa, inkella jista' jkun hemm żieda fil-koncentrazzjoni medja ta' fentanyl. Irid jintagħżel post ġdid fuq il-ġilda għal kull applikazzjoni,.

Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma titwahhal garża fuq l-istess parti tal-ġilda. L-effett analġesiku jista' jidm għal xi żmien wara li tkun tnehhiet il-garża transdermali. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun. M'għandhux jintuża l-alkohol jew solventi oħra biex titnaddaf il-ġilda, għaliex dawn jistgħu jippenetraw fil-ġilda minhabba l-effett tal-garża.

Tfal u addoloxxenti

L-esperjenza dwar l-użu fit-tfal ta' taħt it-12-il sena hija limitata. *Fentanyl-ratiopharm* m'għandiex tintuża f'din il-popolozzjoni ta' pazjenti

Anzjani

L-anzjani iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Indeboliment epatiku u renali

Pazjenti b'indeboliment epatiku jew renali iridu jkunu osservati mill-qrib u d-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm bżonn (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

- Ipersensittività għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.
- Uġiegh akut jew ta' wara operazzjoni, għax titrazzjoni tad-doża mhix possibbli waqt kura qasira.
- Indeboliment sever tas-sistema nervuża ċentrali

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jintuża biss bħala parti minn kura integrali tal-uġiegh f'każi fejn il-pazjent jista' jiġi ikkontrollat b'mod mediku, soċjalment u psikoloġikalment kif inhu xieraq.

Kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* għandha tinbeda biss minn tabib espert u li hu mgħarref sew fil-farmakokinetika ta' garża transdermali ta' fentanyl u l-periklu ta' ipoventilazzjoni severa. Wara reazzjoni avversa u serja, il-pazjent irid jibqa' taħt osservazzjoni għal 24 siegħa wara li titneħħa il-garża minhabba il-*half life* ta' fentanyl (ara sezzjoni 5.2).

F'każ ta' uġiegh kroniku li mhux ġej minn kanċer, il-kura tista' tinbeda b'opjojd qawwi b'reħa immedjata (eż. morfina), u tiġi preskritta *Fentanyl-ratiopharm* wara li tiġi stabbilita l-effikaċja u l-aħjar dożaġġ ta' l-opjojd qawwi

Il-garża transdermali m'għandiex tinqata, għax m'hemm informazzjoni disponibbli fuq il-kwalità, l-effikaċja u s-sigurtà ta' garża hekk masquma.

Jekk ikun hemm bżonn ta' dozi 'l fuq mill-ekwivalenti ta' 500 mg morfina, huwa rrakkomandat illi t-terapija bl-opjojdi tiġi evalwata mill-ġdid.

Wara l-amministrazzjoni b'dozi rakkomandati, r-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni huma hedla, konfużjoni, tqalligh, rimettar u stitikezza. Dawn ta' l-ewwel huma ta' natura hafifa u għal żmien qasir u l-kawża tagħhom trid tiġi investigata jekk is-sintomi jippersistu. Mill-banda l-oħra, stitikezza ma' tiegħaf sakemm titkompla il-kura. Dawn l-effetti kollha huma mistennija u, għaldaqstant, għandha tittiehed azzjoni minn qabel, speċjalment fir-rigward tas-stitikezza, sabiex il-kura tkun l-aħjar possibbli. Ta' spiss, jista' jagħti l-każ li jkun hemm bżonn ta' kura korrettiva (ara sezzjoni 4.8).

L-użu konkomittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux irrakkomandat (ara sezzjoni 4.5)

Frug ta' uġiegh mhux mistenni

Minkejja kura b'garza ta' fentanyl, stharrig' wera li kwazi l-pazjenti kollha jkollhom bzonn ta' medicini qawwija u li jahdmu fil-pront sabiex jilqghu immedjatament kontra l-hrug ta' ugigh mhux mistenni.

Dipressjoni respiratorja

L-istess kif jigri bl-użu tal-opjojdi qawwijin kollha, xi pazjenti jistghu jbatu minn dipressjoni repiratorja meta jużaw *Fentanyl-ratiopharm* u l-pazjenti jridu jigu sorveljati sewwa li ma' jkollhomx dan l-effett. Id-dipressjoni respiratorja tista' tippersisti wkoll wara li titnehha l-garza. L-incidenza tad-dipressjoni respiratorja tizdied hekk kif tizdied id-doża ta' fentanyl. Sustanzi attivi li jaffettwaw is-CNS jistghu jaggravaw d-dipressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti fejn id-dipressjoni repiratorju digá' hija prezenti, il-fentanyl ghandu jintuża b'kawtela kbira u f'doži baxxi.

Mard kroniku fil-pulmun

Fentanyl jista' jkollu iktar reazzjonijiet avversi u severi f'pazjenti li jbatu minn imblukkar kroniku jew mard iehor fil-pulmun. F'dawn il-pazjenti, l-opjojdi jistghu jbaxxu ir-ritmu respiratorju u jzidu r-resistenza ghall-arja fil-passaġġ respiratorju.

Dipendenza fuq id-droga

Tolleranza u dipendenza fisika u psikologika tista' tiżviluppa bl-amministrazzjoni ripetuta tal-opjojdi, izda huma rari fil-kura ta' l-ugigh relatat mal-kanċer .

Żieda tal-pressjoni ġol-kranju

Fentanyl-ratiopharm ghandu jintuża bil-prudenza f'pazjenti li jistghu jkunu iktar suxxettibli ghall-effetti ġewwa l-kranju ġejjin minhabba retenzjoni ta' CO₂, bhal ma huma dawk b'evidenza ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju, diffikulta' li jibqgħu konxji, jew koma.

Mard tal-qalb

L-opjojdi jistghu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn ipovolimja. Pazjenti li jbatu minn pressjoni baxxa u/jew pazjenti li jbatu minn ipovolimja jridu jkunu kkurati b'attenzjoni kbira. Fentanyl jista' jipproduċi bradikardja. *Fentanyl-ratiopharm* irid jigi amministrat bi prudenza f'pazjenti li jbatu minn bradiaritmija.

Indeboliment tal-fwied

Fentanyl jigi metabolizzat fil-fwied f'mataboliti inattivi; ghalhekk l-eliminazzjoni tista' tiehu iktar fit-tul f'pazjenti li jbatu minn mard tal-fwied. Pazjenti li jbatu minn indeboliment tal-fwied ghandhom jigu osservati b'attenzjoni u id-doża ghandha tigi mnaqqsa fejn ikun hemm bzonn.

Indeboliment renali

Inqas minn 10 % ta' fentanyl jigi eliminat bhala prodott mhux mibdul mill-kliewi u, kuntrarjament ghal morfina, m'hemm l-ebda metaboliti attivi maghrufa li jigu eliminati mill-kliewi. Taghrif miġbur wara l-amministrazzjoni tal-fentanyl ġol-vina f'pazjenti b'insufficjenza renali jindika li l-volum ta' distribuzzjoni tal-fentanyl jista' jinbidel bid-djalizi. Dan jista' jaffetwa l-koncentrazzjonijiet fis-serum. Jekk pazjenti b'indeboliment renali jirċievu fentanyl transdermali, dawn ghandhom jigu osservati bir-reqqa ghal xi hjiel ta' tossicita' tal-fentanyl u d-doża ghandha tigi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bzonn.

Pazjenti b'deni/shana esterna

Żieda sostanzjali fit-temperatura tal-ġisem tista' tirrizulta f'żieda fir-rata ta' assorbiment ta' fentanyl. Ghalhekk, pazjenti li jkollhom id-deni jridu jkunu monitorjati ghal xi reazzjonijiet avversi tal-opjojdi. Il-post fejn tigi applikata il-garza m'ghandux jigi espost ghas-shana ġejja minn sorsi esterni eż. Sawna.

Pazjenti anzjani

Taghrif minn studji li saru bl-amministrazzjoni ta' fentanyl ġol-vina jindika li f'pazjenti anzjani jista' jkun hemm rata ta' eliminazzjoni mnaqqsa u *half-life* itwal. Barra minn hekk, l-anzjani jistghu ikunu aktar sensitivi ghas-sustanza attiva minn pazjenti iżgħar minnhom. Madankollu, minn studji li saru

bl-użu tal-*Fentanyl transdermal patch* f'pazjenti anzjani, irriżulta li ma kienx hemm differenza sinjifikanti fil-parametri farmakokinetiċi ħdejn pazjenti żgħar, għalkemm il-koncentrazzjonijiet fis-serum kellhom tendenza li jkunu oghla. Pazjenti anzjani jew kakesiċi għandhom jiġu osservati b'attenzjoni u id-doża għandha tiġi mnaqqsa jekk ikun hemm il-bżonn.

Pazjenti pedjatriċi

Minhabba l-użu limitat fit-tfal taħt it-12-il sena, *Fentanyl-ratiopharm* għandu jintuża f' din il-kategorija ta' pazjenti biss wara li jiġi stabbilit sewwa jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifikax ir-riskju potenzjali assoċjat mal-użu.

Treddiegh:

Peress illi fentanyl jiġi eliminat fil-halib tal-omm, it-treddiegh għandu jitwaqqaf waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* (ara sezzjoni 4.6)

Pazjenti b'majestinja gravis

Jista' jkun hemm reazzjonijiet mhux epilettiċi (mijo)kloniċi. Pazjenti b'majestinja gravis għandhom jiġu kkurati bil-prudenza.

Interazzjonijiet

Bhala regola, l-użu kkombinat ma derivattivi ta' barbituric acid, buprenorphine, nalbuphine u pentazocine għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5)

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistghu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess hin ta' derivattivi ta' barbituric acid għandu jiġi evitat, peress li l-effett ta' dipressjoni repiratorja kawżat mill-fentanyl jista' jżidied.

L-użu konkormittanti ta' buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine mhux rakommandat. Dawn għandhom affinità għolja għal riċettaturi ta' l-opjojdi waqt li l-attività intrinsika tagħhom hija relittavament baxxa. Għaldaqstant jopponu parzjalment l-effett analġesiku ta' fentanyl u jistghu ikunu kawża ta' sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura f'pazjenti dipendenti fuq l-opjojdi (ara sezzjoni 4.4)

L-użu konkormittanti ta' dipressanti oħrajn tas-CNS jista' jikkawża żiieda fl-effetti dipressanti, u jista' jkun hemm ipoventilazzjoni, pressjoni baxxa kif ukoll sedazzjoni qawwija jew koma. Id-dipressanti tas-CNS imsemmija jinkludu:

- opjojdi
- ansjolitiċi u trankwillanti
- ipnotiċi
- anestetiki generali
- phenothiazines
- Rilassanti tal-muskoli skeletal
- antiistaminiċi b'effetti sedattivi
- xorb alkoholiku

Għalhekk, l-użu ta' xi wieħed mill-kombinazzjonijiet bejn medicini u sustanzi attivi hawn fuq imsemmija jirrikjedi sorveljanza stretta tal-pazjent.

Inibituri tal-MAO gew irrapurtati li jżidu l-effett tal-analġesiki narkotiċi, speċjalment f'pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb. Għalhekk, fentanyl m'għandux jintuża qabel ma' jgħaddu 14-il ġurnata mill-waqfien ta' kura bl-inibituri tal-MAO.

Fentanyl, sustanza li għandha rata ta' tneħhija għolja, tiġi metabolizzata malajr u b'mod estensiv, l-aktar minn CYP3A4.

Itraconazole (inibitur qawwi ta' CYP3A4) mogħti f'doża orali ta' 200 mg/ġurnata għal erbat ijiem ma' kellu ebda effett sinjifikanti fuq il-farmakokinetika ta' fentanyl mogħti minn ġol-vina. Madankollu,

f'xi individwi, ġew osservati ziediet tal-koncentrazzjoni fil-plażma. L-amministrazzjoni orali ta' ritonavir (wiehed mill-inibituri l-iktar qawwi ta' CYP3A4) tbaxxi b'żewġ terzi r-rata tat-tnehhija ta' fentanyl moghti minn ġol-vina, u tirdoppja l-half-life. L-użu fl-istess hin ta' inibituri qawwijin ta' CYP3A4 (ez-ritonavir) ma użu transdermali ta' fentanyl jista' jirriżulta f'żieda fil-koncentrazzjoni fil-plażma ta' fentanyl. Dan jista' jzid jew itawwal, kemm l-effetti terapewtiċi, kif ukoll l-effetti avversari, b'riżultat ta' dipressjoni respiratorja qawwija. F'każi bħal dawn, hemm bżonn li l-pazjent jiġi kkurat u osservat b'aktar attenzjoni. L-użu fl-istess hin ta' ritonavir, jew inibituri qawwijin ta' CYP3A4 oħrajn, ma' l-użu transdermali ta' fentanyl m'huwiex irrakkomandat sakemm il-pazjent ma jiġix osservat bir-reqqa.

4.6 Tqala u effetti fuq il-halib tas-sider

Is-sigurta' fl-użu ta' fentanyl fit-tqala għada ma gietx stabbilita. Studji fuq annimali urew tossiċità fis-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem għadu mhux magħruf. Fentanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala hlief meta jkun hemm il-bżonn ċar. Kura fit-tul waqt it-tqala, tista' tikkawża sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura fit-tarbija. L-użu ta' fentanyl waqt it-tqala u il-hlas (anke hlas ċesarju) m'huwiex irrakkomandat għax il-fentanyl jgħaddi mill-plaċenta u jista' jikkawża dipressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldaqstant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li qed jerdghu. Għalhekk, it-treddiegħ irid jitwaqqaf waqt il-kura u sa mill-inqas 72 siegħa wara li titneħħa il-Fentanyl-ratiopharm (ara sezzjoni 4.4)

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila ta' sewqan u l-użu ta' magni. Dan għandu jkun mistenni speċjalment fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkohol jew agenti sedattivi. Dawn ir-restrizzjonijiet mhux bil-fors japplikaw għal daww il-pazjenti li jinsabu fl-istat fess fuq dożaġġ speċifiku. Għalhekk, pazjenti għandhom ifittxu l-parir tat-tabib biex jaraw jekk jistgħux isuqu u jhaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi huma kklassifikati taħt it-titlu tal-frekwenza, l-aktar frekwenti l-ewwel, bil-konvenzjoni li ġejja: komuni hafna ($\geq 10\%$), komuni ($\geq 1\%$ u $< 10\%$), mhux komuni ($\geq 0.1\%$ u $< 1\%$), rari ($\geq 0.01\%$ u $< 0.1\%$), rari hafna ($\leq 0.01\%$).

L-effett mhux mixtieq, l-iktar serju, kkawżat mill-fentanyl huwa d-dipressjoni respiratorja.

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: takikardija, bradikardija.

Rari: aritmija.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni hafna: uġiġħ ta' ras, sturdament.

Mhux komuni: tregħid, parasteżija, anormalitajiet fil-kliem u fil-lingwa.

Rari hafna: ataxia, aċċessjonijiet, (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal).

Disturbi fl-għajnejn

Rari hafna: ambliopija.

Disturbi respiratorji, toraċiċi, u medjastinali

Mhux komuni: qtugħ ta' nifs, rata baxxa tat-teħid tan-nifs.

Rari hafna: dipressjoni respiratorja, apneja.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni hafna: tqallieġħ, rimettar, stitikezza.

Komuni: gżerostomja, dispepsja.
Mhux komuni: dijarea
Rari: sulluzzu.
Rari hafna: gass fl-istonku bl-uġiġh, sadd fl-imsaren (ileju).

Disturbi fil-kliwi u fis-sistema urinarka

Mhux komuni: żamma ta' l-awrina.
Rari hafna: uġiġh fil-bużżieqa ta' l-awrina, oligurja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Komuni hafna: żieda fl-ġharaq, ħakk.
Komuni: reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahhal il-garża.
Mhux komuni: exantema, eritema
Ir-raxx, l-eritema u l-ħakk is-soltu jisparrixxu f'inqas minn ġurnata wara li titneħħa l-garża.

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: pressjoni għolja, pressjoni baxxa.
Rari: vasodilatazzjoni.

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet fil-post tal-amministrazzjoni

Rari: edima, ksieħ.

Disturbi fis-sistema immunitarka

Rari hafna: anafilassi.

Disturbi psikjatriċi

Komuni hafna: nġhas.
Komuni: sedazzjoni, nervożita', nuqqas ta' aptit.
Mhux komuni: ewforja, amnesia, nuqqas ta' rqađ, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni.
Rari hafna: ħsibijiet delużjonali, eċċitament eċċessiv, astenja, dipressjoni, ansjeta', konfużjoni, anormalita' fil-funzjoni sesswali, sintomi assoċjati mal-waqfien mill-kura.

Effetti mhux mixtieqa oħrajn

Mhux magħrufa (ma jistgħux jiġu evalwati mit-tagħrif kurrenti): L-użu fit-tul ta' fentanyl jista' jwassal għal żvilupp ta' reżistenza u dipendenza kemm fiżika kif ukoll psikoloġika. Wara bidla minn analġesiċi opjojdi għall-*Fentanyl-ratiopharm* jew wara tmiem hesrem tat-terapija, il-pazjenti jistgħu jeżibixxu sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura tal-opjojdi (per eżempju: tqallieġh, rimettar, dijarea, anzjeta' u tregħid).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sintomi ta' doża eċċessiva ta' fentanyl huma estensjonijiet ta' l-attivita' farmakoloġika ez. letarġija, koma, dipressjoni respiratorja, b' respirazzjoni Cheyne-Stokes, u/jew *cyanosis*. Sintomi oħrajn jistgħu jkunu ipotermja, tnaqqis fit-ton tal-muskoli (ipotonija), bradikardija, pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċita' huma sedazzjoni qawwiya, *ataxia*, *miosis*, konvulżjonijiet u dipressjoni respiratorja, b'dan ta' l-aħħar ikun is-sintomu ewlieni.

Trattament

Miżuri fil-pront għandhom jittieħdu kontra d-dipressjoni respiratorja, li jinkludu it-tneħħija tal-garża u t-tqanqil fiżiku u verbali tal-pazjent. Dan jista' jiġi segwit bl-amministrazzjoni ta' antagonista speċifika ta' l-opjojdi bħal ma' hu naloxone.

Id-doża inizjali rrakkomandata għall-adulti hi 0.4-2 mg naloxone hydrochloride mogħtija minn ġol-vina. Jekk ikun hemm il-bżonn, doża simili tista' tingħata kull 2-3 minuti, inkella tista' tiġi amministrata bħala infużjoni kontinwa ta' 2mg go 500ml sodium chloride 9mg/ml (0.9 %) soluzzjoni

ghall-injezzjoni jew ġo soluzzjoni ta' glucose 50mg/ml (5 %). Ir-rata ta' infużjoni trid tiġi aġġustata skond l-injezzjonijiet bolus mehuda qabel u r-rispons individwali tal-pazjent. Jekk l-amministrazzjoni minn ġol-vina ma tkunx possibli, naloxone hydrochloride jista' jingħata wkoll fil-muskolu jew taħt il-ġilda. L-effett, wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu jew taħt il-ġilda, idum iktar biex jibda jinħass meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. L-effett wara l-amministrazzjoni ġol-muskolu idum iktar fit-tul meta mqabbel ma' dak ta' wara l-amministrazzjoni minn ġol-vina. Dipressjoni respiratorja minhabba doża eċċessiva tista' ddum iktar mill-effett ta' l-antagonista ta' l-opjojdi. L-inverzjoni tal-effett narkotiku tista' tirriżulta f' uġiġh akut u l-liberazzjoni ta' *catecholamines*. Kura intensiva hija importanti jekk din tkun meħtieġa minhabba l-kundizzjoni klinika tal-pazjent. Jekk ikun hemm pressjoni baxxa qawwija jew persistenti, għandha tiġi kkunsidrata l-possibilita' ta' ipovolemija, u din il-kundizzjoni trid tiġi mmanegġjata bit-terapija fluwida u parenterali xierqa.

5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: opjojdi; derivattivi ta' Phenylpiperidine, Kodici ATC: N02AB03

Fentanyl huwa analġesiku tal-klassi opjojdi li jinteraġixxi l-aktar ma' l- μ -receptor. L-effetti prinċipali huma analġesija u sedazzjoni. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum, li tikkawża effett minimu ta' analġesija f'pazjenti li qed jirċievu opjojdi għall-ewwel darba, tvarja bejn 0.3-1.5ng/ml; isseħħ żieda fl-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi meta l-livelli fis-serum jiskorru 2ng/ml.

Kemm l-inqas doża effettiva ta' fentanyl, kif ukoll il-konċentrazzjoni minima li tikkawża reazzjonijiet avversi, jiżiedu hekk kif tiżviluppa żieda fit-tolleranza. Hemm differenzi kbar fit-tendenza għal l-iżvilupp ta' tolleranza bejn pazjent u iehor.

5.2 Taghrif farmakokinetiku

Wara l-amministrazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, fentanyl jiġi assorbit kontinwament minn ġol-ġilda għal perijodu ta' 72 siegħa. Kawża tal- *polymer matrix* u d-diffużjoni ta' fentanyl mis-saffi tal-ġilda, ir-rata ta' rħir tibqa' relattivament kostanti.

Assorbiment

Wara l-ewwel applikazzjoni ta' *Fentanyl-ratiopharm*, il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiżdied b' mod gradwali, issir livell bejn 12 u 24 siegħa wara, u tibqa' relattivament kostanti għall-bqija tal-perijodu ta' l-applikazzjoni ta' 72 siegħa. Il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum tiddependi fuq id-daqs tal-garża ta' fentanyl. Fil-prattika, sat-tieni applikazzjoni ta' 72 siegħa, il-konċentrazzjoni fissa fis-serum diġa' tkun intlaħqet u din tiġi miżmuma tul l-applikazzjonijiet sussegwenti b'garża ta' l-istess daqs.

Distribuzzjoni

Il-perċentwal ta' fentanyl li jehel mal-proteini tad-demem huwa 84 %.

Biotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat primarjament fil-fwied minn CYP3A4. Il-metabolit prinċipali, norfentanyl, m'huwix attiv.

Eliminazzjoni

Meta titwaqqaf il-kura bil-*Fentanyl-ratiopharm* il-konċentrazzjoni ta' fentanyl fis-serum taqa' gradwalment, u titbaxxa b'madwar 50 % fit-13 sa 22 siegħa fl-adulti jew fit-22 sa 25 siegħa fit-tfal, rispettivament. L-assorbiment ta' fentanyl li jissokta mill-ġilda jispjega għaliex ir-rata ta' tnaqqis tal-konċentrazzjoni fis-serum hija inqas minn dik osservata wara infużjoni minn ġol-vina.

Madwar 75 % ta' fentanyl jiġi eliminat fl-awrina, l-biċċa l-kbira bhala metaboliti, b'inqas minn 10 % mneħhi bhala prodott mhux mibul. Madwar 9 % mid-doża mogħtija tista' tiġi estratta mill-purgar, il-biċċa l-kbira bhala metaboliti.

Farmakokinetika f'popolazzjonijiet speċjali

L-anzjani u pazjenti debboli jistgħu ikollhom rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl baxxa li twassal għal *half life* terminali mtawwal. F'pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku, jista' jkun hemm tibdil fir-rata ta' eliminazzjoni ta' fentanyl, minnhabba bidliet fil-proteini tal-plażma u t-tneħħija metabolika, li jwassal għal zieda tal-koncentrazzjonijiet fis-serum.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku, bbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, ma' juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin, l-ebda effett tossiku minn doži ripetuti u l-ebda effett tossiku fuq il-ġeni.

Studji fuq annimali urew fertilita' mnaqqsa u zieda fil-mortalita' tal-fetu tal-ġrieden. Mandankollu, effetti teratoġeniċi ma ġewx stabbiliti.

Studji fit-tul dwar attivita' karċinogenika ma twettqux.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Saff li jwahħhal

Saff li jwahħhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl warrani

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Release liner

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kull garża transdermali hija ippakkjata għaliha ġo qartas separat. Il-fojl Composite huwa magħmul minn dawn is-saffi, minn barra għal ġewwa: karta Kraft miksija, fojl ta' polyethylene b'densita' baxxa, fojl ta' l-aluminju, Surlyn (thermoplastic ethylene-methacrylic acid copolymer).

Pakketti li fihom 3, 5, 10 jew 20 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Kwantitajiet kbar ta' fentanyl jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara l-użu tagħha. Il-garża wżata trid tkun mitwija bin-naħat li jwahaħlu fuq il-parti ta' ġewwa u tintrema, jew meta jkun possibli, tittiehed lura għand is-spiżjar. Kull fdalijiet tal-prodott li ma jġugx użati għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispiżjar.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}

{fax}

{e-mail}

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

{XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 25 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 7.5 cm² fiha 4.125 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwahhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

3 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

10 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

20 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Jekk jogħġbok niżżel d-data u l-hin meta tilbes il-garża.

[3 garża transdermali:]

Data	Hin

[5 garża transdermali:]

Data	Hin

[10 garża transdermali:]

Data	Ħin

[20 garża transdermali:]

Data	Ħin	Data	Ħin

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha, jew hudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}
{telefon}
{fax}
{e-mail}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 25 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 7.5 cm² fiha 4.125 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwajhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn gol-gilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha jew ħudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 50 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 15 cm² fiha 8.25 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwahhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

3 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

10 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

20 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Jekk jogħġbok niżżel d-data u l-hin meta tilbes il-garża.

[3 garża transdermali:]

Data	Hin

[5 garża transdermali:]

Data	Hin

[10 garza transdermali:]

Data	Ħin

[20 garza transdermali:]

Data	Ħin	Data	Ħin

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha, jew hudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}
{telefon}
{fax}
{e-mail}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 50 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 15 cm² fiha 8.25 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwahhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn gol-gilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha jew ħudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 75 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 22.5 cm² fiha 12.375 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwahhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

3 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

10 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

20 garża li ttiprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Jekk jogħġbok niżżel d-data u l-hin meta tilbes il-garża.

[3 garża transdermali:]

Data	Hin

[5 garża transdermali:]

Data	Hin

[10 garża transdermali:]

Data	Ħin

[20 garża transdermali:]

Data	Ħin	Data	Ħin

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha, jew hudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}
{telefon}
{fax}
{e-mail}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 75 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 22.5 cm² fiha 12.375 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwajhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn gol-gilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha jew ħudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 100 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 30 cm² fiha 16.5 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwahhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

3 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

10 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

20 garża li tipprovdi mediċina li tghaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Jekk jogħġbok niżżel d-data u l-hin meta tilbes il-garża.

[3 garża transdermali:]

Data	Hin

[5 garża transdermali:]

Data	Hin

[10 garża transdermali:]

Data	Ħin

[20 garża transdermali:]

Data	Ħin	Data	Ħin

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha, jew hudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}
{telefon}
{fax}
{e-mail}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]>

fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull garża terhi 100 mikrogramma fentanyl fis-siegħa. Kull garża ta' 30 cm² fiha 16.5 mg fentanyl.

3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi mhux attivi:

Saff li jwahhal magħmul minn Polyacrylate

Fojl magħmul minn Polypropylene

Linka għall-istampar kahlanija

Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 garża li tipprovdi medicina li tghaddi minn gol-gilda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu transdermali

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

8. DATA TA' META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Itwi l-garża wżata u armiha jew ħudha lura għand l-ispizjar.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

FULJETT TA' TAGHRIF

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina giet mogħtija lilek. M'ghandekx tghaddiha lil persuni ohra. Tista' tagħmlilhom il-hsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu *Fentanyl-ratiopharm* u għalxiex jintuża
2. Qabel ma tuża *Fentanyl-ratiopharm*
3. Kif għandek tuża *Fentanyl-ratiopharm*
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen *Fentanyl-ratiopharm*
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU *FENTANYL-RATIOPHARM* U GħALXIEX JINTUŻA

Fentanyl jappartjeni għall-grupp ta' analġesiċi qawwijin li jissejġu opjojdi. L-analġesiku, fentanyl, jgħaddi bil-mod mill-garża, minn ġol-ġilda u għal ġol-ġisem.

Fentanyl-ratiopharm jintuża għall-kura ta' uġiġh qawwi w dewmieni li jista' jiġi mmanegġġat adegwament biss permezz ta' analġesiċi qawwijin

2. QABEL MA TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Tużax *Fentanyl-ratiopharm*

- jekk inti allergiku/a (tbatu minn sensitività eċċessiva) għal fentanyl jew sustanzi ohra tal-prodott
- jekk tbatu minn uġiġh illi ma' jdumx fit-tul, eż. wara proċedura kirurġica.
- jekk is-sistema nervuża ċentrali tiegħek hija dgħajfa hafna bħal, per eżempju, wara ferita fil-mohħ

Oqgħod attent hafna b' *Fentanyl-ratiopharm*:

TWISSIJA:

Fentanyl-ratiopharm huwa prodott mediċinali li jista' jkun ta' theddida għall-hajja fit-tfal. Dan japplika wkoll għal garża transdermali użata.

Dejjem żomm f' mohħok illi l-għamla tal-prodott tista' tidher attraġenti fl-għajnejn tat-tfal.

Fentanyl-ratiopharm jista' jkollu effetti mhux mixtieqa ta' theddida għall-hajja f'persuni li mhux qed jieħdu mediċini tat-tip opjojdi fuq bażi regolari.

Qabel tibda l-kura b' *Fentanyl-ratiopharm* għandek tgharraf lit-tabib tiegħek jekk tbatu minn kundizzjonijiet imsemmijin hawn taht, peress li r-riskju ta' effetti mhux mixtieqa huwa oghla u għaldaqstant it-tabib jista' jiktiblek doża inqas ta' fentanyl.

- aźma, dipressjoni respiratorja jew xi mard fil-pulmun
- pressjoni baxxa
- indeboliment tal-fwied
- indeboliment tal-kliewi
- jekk kellek xi ferita f'rasek, tumur ġo mohħok, sinjali ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju (eż. uġiġħ ta' ras, tibdil fil-vista), tibdil fl-isstat konxju jew tintilef minn sensik jew koma
- rata baxxa u irregolari tat-taħbit tal-qalb (bradiarritmija)
- Majastenja gravis (marda li tikkawza għejja u indeboliment fil-muskoli)

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk jaqbdok id-deni waqt il-kura, għax zieda fit-temperatura tal-ġisem tista' twassal għal assorbiment żejjed tal-mediċina minn ġol-ġilda. Għall-istess raġuni, għandek tevita li tesponi l-garża mwahhla fuq il-ġilda għal sorsi ta' shana esterna bħal kutri tal-elettriku, hot water bottles, sawna, solarium jew banju shun. Tista' toqgħod barra fix-xemx, iżda trid tgħatti l-garża b'xi hwejjeġ fil-granet shan tas-sajf.

Tolleranza, kif ukoll dipendenza fiżika jew psikoloġika, tista' tirriżulta jekk tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal medda twila ta' żmien. Madankollu, dawn rament li jsehhu waqt il-kura tal-uġiġħ tal-kanċer.

Jekk inti pazjent anzjan, jew jekk tinstab f'kundizzjoni fisika hażina hafna (kakesiku), it-tabib tiegħek ser josservak b'iktar attenzjoni, għax jista' jkun hemm il-bżonn li d-doża preskritta tiġi mnaqqa.

Il-garża m'għandiex tinqasam f'biċċiet iżgħar, għax m'hemmx informazzjoni disponibbli fuq il-kwalita', l-effikaċja u s-sigurta' ta' garża hekk masqsuma.

Tfal

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża fit-tfal taħt it-12-il senġha għaliex it-tagħrif disponibbli dwar l-użu fit-tfal huwa limitat. Tista' ssir eċċezzjoni meta t-tabib ikun ippreskriva espressivament *Fentanyl-ratiopharm*.

Meta tuża mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu barbiturates (jintużaw għal problemi ta' rqad), buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine (analġesiċi qawwijin oħrajn). Mhux irrakkommandat li dawn jittiehdu waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk qed tuża, fl-istess ħin, mediċini oħrajn li jistgħu jaffetwaw il-funzjoni tal-moħħ, ir-riskju ta' effetti sekondarji, speċjalment id-diffikultà biex tiehu n-nifs, jizdied. Per eżempju, dan japplika għal:

- mediċini li jtaffu l-ansjeta' (kalmanti)
- mediċini għal kura tad-dipressjoni (antidipressivi)
- mediċini għal kura ta' disturbi psikoloġiċi (newroleptiċi)
- anestetiki, jekk taħseb li ser tiehu anestetiku, għarraf lit-tabib jew id-dentist illi qed tuża *Fentanyl-ratiopharm*
- mediċini għal kura ta' disturbi tal-irqad (ipnotiċi, aġenti sedattivi, barbiturates)
- mediċini kontra l-allergiji jew id-dardir tas-safar (Antihistaminiċi/anti-emetiċi)
- analġesiċi qawwijin oħrajn (opjojdi)
- l-alkoħol

M'għandekx tuża l-mediċini li ġejjin flimkien ma' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm ma' tkunx osservat mill-viċin mit-tabib tiegħek.

Dawn il-mediċini jistgħu iżidu l-effetti kif ukoll l-effetti sekondarji ta' *Fentanyl-ratiopharm*. Dan japplika għal, per eżempju:

- ritonavir (użat fil-kura tal-marda t' AIDS)
- ketoconazole, itraconazole (użati għall-kura ta' infezzjonijiet tal-fungu)
- diltiazem (użat għall-kura ta' mard fil-qalb)
- cimetidine (użat għall-kura ta' mard gastro-intestinali)

- antibiotiċi makrolidi (użati għall-kura ta' infezzjonijiet)

Jekk jogħġbok, għarraf lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu xi inibituri ta' MAO (ez. Moclobemide, jintuża kontra d-dipressjoni, jew selegiline, jintuża fil-kura tal-marda ta' Parkinson) jew jekk tkun hadthom fl-aħħar ġimgħatejn. Jekk dawn il-mediċini jittiehdu flimkien, tista' tiżdied it-tossiċità tagħhom.

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Meta tuża *Fentanyl-ratiopharm* ma' l-ikel u max-xorb:

L-użu fl-istess hin ta' *Fentanyl-ratiopharm* u x-xorb alkoħoliku jżid ir-riskju ta' reazzjonijiet avversi severi, u jista' jikkawża diffikultà fin-nifs, tnaqqis fil-pressjoni tad-dem, sedazzjoni profonda u koma.

Tqala u Treddigh

Itlob il-parir tat-tabib jew ta' l-ispizjar tiegħek qabel tiehu xi mediċina.

L-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm* waqt it-tqala u il-hlas (anki hlas ċesarju) mhux rakkommandat, peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tan-nifs fit-tarbija tat-twelid.

Jekk toħroġ tqila waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm*, fittex il-parir tat-tabib tiegħek.

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża waqt it-tqala u r-treddiegh hlief meta jkun hemm bżonn ċar.

Is-sigurta' waqt it-tqala għada ma gietx stabbilita. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldastant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li għadhom qed jerdgħu. Il-halib tas-sider li tipproduċi l-omm waqt il-kura, jew sa 72 siegħa wara li titnehha l-aħħar garża, għandu jintrema.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila tas-sewqan u l-użu ta' magni. Dan ikun iktar mistenni fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkoħol jew aġenti sedattivi. Jeqq kont qed tuża l-istess doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* għal zmien twil, it-tabib tiegħek jista' jtik permess biex issuq jew thaddem magni perikolużi. M'għandekx issuq jew thaddem magni perikolużi waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx speċifikament illi dan huwa permess.

3. KIF GħANDEK TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Dejjem uża *Fentanyl-ratiopharm* eżattament kif ikun qallek it-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruhek mat-tabib jew ma' l-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jiddeċidi liema doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* hi l-iktar addatata għalik. It-tabib tiegħek jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq: kemm qed thoss uġiġh, il-kundizzjoni generali tiegħek u it-tip ta' kura għall-uġiġh li tkun irċevejt s'issa.

Skond ir-rispons tiegħek, jista' jkun hemm bżonn illi d-doża tal-garża jew in-numru tagħhom jiġumibdula. L-effett analġesiku massimu jintlaħaq sa 24 siegħa wara li tkun ingħatat l-ewwel garża u jiddgħajjef gradwalment wara li din titnehha. Twaqqafx il-kura qabel ma tfittex il-parir tat-tabib tiegħek

L-ewwel garża tibda taħdem bil-mod, u l-effett jista' jdum biex jinħass anki ġurnata, u għaldaqstant it-tabib tiegħek jista' jippreskrivilek analġesiċi oħrajn, sakemm l-effett tal-*Fentanyl-ratiopharm* jibda jinħass kif meħtieġ. Wara, il- *Fentanyl-ratiopharm* għandu jgħin biex itaffi l-uġiġh kontinwament u jista' jkun possibli li tieqaf tiehu dawn l-analġesiċi żejda. Madankollu, xorta waħda jista' jkollok bżonn ta' analġesiċi miżjuda kull tant zmien..

Kif tapplika l-*Fentanyl-ratiopharm*

- Sib post ċatt fuq il-parti ta' fuq ta' ġismek (il-fuq mil-qadd) (jew il-parti ta' fuq ta' dirghajk fejn m'hemmx pil, qsim, ponot jew xi difett iehor. Il-parti tal-ġisem ma tridx tkun irritata minhabba trattament bir-raġġi.
- Jekk il-ġilda għandha l-pil, neħhieh bl-użu ta' mqass. Tqaxxarx, għax it-tqaxxir jirrita il-ġilda. Jekk il-ġilda għandha bżonn tiġi maħsula, inħasel bl-ilma. Tużax sapun, żejt, fwejjah, alkohol, jew xi likwidu għall-ħasil tal-ġisem iehor li jista' jirrita l-ġilda. Il-ġilda trid tkun kompletament niexfa qabel ma' titwahhal il-garża.
- Il-garża trid titwahhal immedjatement wara li l-pakkett jinfetah. Wara li jitneħħa r-*release liner*, il-garża tiġi applikata fuq il-ġilda permezz ta' pressjoni ħafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda sabiex ikun assigurat li l-garża tehel sewwa mal-ġilda. Oqghod attent li l-ġnub tal-garża jehlu sewwa.
- Garża ta' *Fentanyl-ratiopharm* is-soltu tintuża għal 72 siegħa (3 ijiem). Tista' tnizzel id-data u il-hin ta' meta applikajt il-garża fuq il-kaxxa ta' barra. Dan jista' jgħinek biex tiftakar meta l-garża għandha tinbidel.
- Il-post fejn titwahhal il-garża ma' jridx ikun espost għas-shana li ġejja minn sorsi esterni (ara "Oqghod attent ħafna bil-*Fentanyl-ratiopharm*")
- Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.
- Fit-tfal, in-naħa ta' fuq tad-dar huwa il-post preferibbli fejn titwahhal il-garża, biex b'hekk jitnaqqas ir-riskju li it-tifel/tifla i/tneħħi l-garża.

Kif tibdel il-garża transdermali

- Neħhi l-garża wara l-perijodu li jkun speċifikalek it-tabib. Fl-aktar każi, dan huwa wara 72 siegħa (3 ijiem), f'xi pazjenti wara 48 siegħa (2 ijiem). Is-soltu, il-garża ma' tinqalax waħedha. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun.
- Itwi l-garża wżata b'mod illi l-ġnub li jwahhlu jehlu ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, jekk ikun possibli, ħudha lura għand l-ispizjar.
- Applika garża ġdida kif spjegat qabel iżda fuq parti oħra tal-ġilda. Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma' tkun tista' tintuża l-istess parti tal-ġisem.

Jekk tuża *Fentanyl-ratiopharm* aktar milli suppost

Jekk waħhalt numru ta' garzi iktar milli suppost, neħhihom u fittex il-parir tat-tabib tiegħek jew ċempel l-isptar biex tara x'inhu r-riskju.

Is-sinjal l-aktar komuni ta' doża eċċessiva huwa abilita' mnaqqsa biex tieħu n-nifs. Is-sintomi huma t-teħid tan-nifs ikun bil-mod ħafna jew in-nifs ikun dgħajef. Jekk dan isehh, neħhi il-garża u kkuntattja t-tabib minnufih. Waqt li qed tistenna l-wasla tat-tabib, zomm il-pazjent imqajjem billi tkellmu jew iċċaqalqu minn hin għall-iehor.

Sinjali u sintomi oħrajn ta' doża eċċessiva huma hedla, temperatura baxxa, rata baxxa tat-tahbit tal-qalb, tnaqqis fit-ton tal-muskoli, sedazzjoni profonda, telf ta' koordinazzjoni fil-muskoli, djuq fil-pupilla tal-għajnejn u konvulzjonijiet.

Jekk tinsa tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Taht l-ebda ċirkostanzi ma trid tieħu doża doppja biex tpatti għal xi doża li tkun insejt tieħu. Għandek tbiddel il-garża darba kull tlett ijiem (kull 72 siegħa) fl-istess hin, sakemm it-tabib tiegħek ma' jgħidlekx mod iehor. Jekk tinsa', biddel il-garża fil-mument li tiftakar. Jekk tkun bdilt il-garża tard ħafna, tkellem mat-tabib tiegħek għax jista' jkollok bżonn ta' xi analġesiċi oħrajn.

Jekk tieqaf tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk tixtieq tinterrompi jew twaqqaf il-kura, dejjem għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek dwar ir-raġunijiet għaliex trid tieqaf mill-kura u hu parir dwar il-kura sussegwenti tiegħek. L-użu fit-tul ta' *Fentanyl-ratiopharm* jista' jirriżulta f' dipendenza fiżika. Jekk tieqaf tuża l-garża, jista' ma tħossokx sewwa.

Peress li r-riskju tal-effetti assoċjati mal-waqfien mill-kura huwa ikbar meta tiġi mwaqqfa hesrem, qatt m'għandek tieqaf mill-kura minn jeddek, imma għandek dejjem l-ewwel tfitteż il-parir tat-tabib tiegħek

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicċina oħra, *Fentanyl-ratiopharm* jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm jistgħu ma' jidhrux f' kulhadd.

It-termini li ġejjin jintużaw biex jiddeskrivu kemm il darba ġew irrapurtati l-effetti sekondarji:

Komuni hafna	isehħu f' iktar minn pazjent minn kull 10
Komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 10, iżda f' iktar minn 1 minn kull 100 pazjenti
Mhux komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 100, iżda f' iktar minn 1 minn kull 1,000 pazjenti
Rari	isehħu f' inqas minn 1 kull 1000, iżda f' iktar minn 1 minn kull 10000 pazjenti
Rari hafna	isehħu f' inqas minn 1 kull 10000 pazjenti, rapporti iżolati inklużi

Jekk iġġarrab xi effetti sekondarji minn dawn li ġejjin li huma serji, imma rari hafna, , minnufiġ għandek twaqqaf il-kura u tmur għand it-tabib tiegħek jew lejn l-isptar: dipressjoni respiratorja qawwija (qtuġh ta' nifs qawwi, hsejjes fin-nifs) jew blukkaġġ kompletament tas-sistema diġestiva (uġiġh konvulsiv, rimettar, uġiġh minhabba gass fl-istonku).

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna: Nghas, uġiġh ta' ras, sturdament, tqallieġh, rimettar, stitikezza, zieda fl-għaraq, ħakk. Is-soltu, il-ħakk jispiċċa fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Komuni: Nghas jew ghejja kbira (effett dipressanti fuq il-moħh), nervożismu, nuqqas ta' aptit, ħalq xott, uġiġh ta' żaqq, reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahħal il-garża

Mhux komuni: Ferħ bla ebda raġuni , telf tal- memorja, problemi ta' rqad, alluċinazzjonijiet, aġitazzjoni, tregħid, disturbi tas-sensi, disturbi fil-kliem u fil-lingwa, inzul jew zieda fil-pressjoni u t-thabbit tal-qalb, problemi fin-nifs, dijarea, problemi biex tġhaddi l-awrina, raxx, ħmura (eritema). Is-soltu, ir-raxx u l-ħmura jisparixxu fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Rari: Thabbit tal-qalb irregolari, vini u arterji imwessghin, sulluzzu, akkumulazzjoni ta' ilma fil-ġisem, kesha.

Rari hafna: Rejjazzjonijiet allergiċi generali b' inzul fil-pressjoni tad-demmu u/jew problemi fin-nifs (rejjazzjonijiet anafilattiċi), hsbijiet mhux normali, eċċitament eċċessiv, debbolezza, dipressjoni, ansjeta', confużjoni, funzjoni sesswali anormali, sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura, problemi fil-koordinazzjoni, aċċessjonijiet (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal), vista mnaqqsa, indeboliment tas-sistema respiratorja (dipressjoni

respiratorja), waqfien tas-sistema respiratorja (apneja), nefha fl-istonku bl-uġiġh, blukkaġġ tas-sistema diġestiva, uġiġh fil-bużżieqa tal-awrina, produzzjoni mnaqqsa ta' awrina (eskrezzjoni mnaqqsa tal-awrina).

Jekk ilek tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal żmien twil, jita' jagħti l-każ li l-effett tiegħu jibda' jinħass inqas, tant illi d-doża trid tiġi rranġata (jista' tkun żviluppata rezistenza). Tista' tiżviluppa dipendenza fiżika wkoll u tista' tbatu minn sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jekk tiegħaf hesrem mill-kura tiegħek. Dawn is-sintomi jinkludu tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid.

Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN *FENTANYL-RATIOPHARM*

Żomm il-medicina fejn ma tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal, ukoll wara li tispicċa minnha. Kwantitajiet kbar tas-sustanza attiva jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara li tkun spicċajt mill-użu tagħha.

Tużax *Fentanyl-ratiopharm* wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett. Id-data ta' skadenza tirreferi għal l-aħhar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Għall-protezzjoni ta' l-ambjent u minhabba raġunijiet ta' sigurta', il-garża wżata kif ukoll dawk mhux użati jew skaduti għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispizjar. Il-garża wżata trid tiġi mitwija fi tnejn biż-żewġ naħat li jwahnli mwanhlin ma' xulxin. Pogġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, meta jkun possibli, hudha lura għand l-ispizjar.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih *Fentanyl-ratiopharm*

- Is-sustanza attiva hi fentanyl.
Kull garża terhi 25 mikrogramma fentanyl fis-sieġha. Kull garża ta' 7.5 cm² fiha 4.125 mg
- Is-sustanzi l-oħra huma :
Saff li jwahnhal: Saff li jwahnhal magħmul minn Polyacrylate
Fojl warrani: Fojl magħmul minn Polypropylene, Linka għall-istampar kaħlanija
Release liner: Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

Id-Dehra ta' *Fentanyl-ratiopharm* u d-daqs tal-pakkett:

Fentanyl-ratiopharm hija garża trasparenti li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda bil-parti ta' wara li twahnhal biex b'hekk tkun tista' titwahnhal mal-ġilda. Il-garża transdermali għandha is-qawwa partikolari tagħha stampata b'linka kaħlanija fuq il-parti ta' wara.

Fentanyl-ratiopharm huwa disponibbli f'paketti ta' 3, 5, 10 jew 20 il-garża li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

Id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}
{telefon}

{fax}
{e-mail}

Manifattur:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Il-Ġermanja

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet :

<DE/H/0739/01/MR>

L-Awstrija	Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h transdermales Matrixpflaster
Il-Ġermanja	Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h Matrixpflaster
Spanja	Fentanilo Matrix ratiopharm 25 microgramos/h parches transdémicos EFG
Franza	Fentanyl ratiopharm 25 µg/h, dispositif transdermique
L-Olanda	Fentanyl ratiopharm 25 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Ir-Renju Unit	Telfanyl 25 microgram/hr Transdermal patch

Dan il-fuljett kien approvat l-ahhar f' {XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina giet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu *Fentanyl-ratiopharm* u għalxiex jintuża
2. Qabel ma tuża *Fentanyl-ratiopharm*
3. Kif għandek tuża *Fentanyl-ratiopharm*
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen *Fentanyl-ratiopharm*
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU *FENTANYL-RATIOPHARM* U GħALXIEX JINTUŻA

Fentanyl jappartjeni għall-grupp ta' analġesiċi qawwijin li jissejġu opjojdi. L-analġesiku, fentanyl, jgħaddi bil-mod mill-garża, minn ġol-ġilda u għal ġol-ġisem.

Fentanyl-ratiopharm jintuża għall-kura ta' uġiġh qawwi w dewmieni li jista' jiġi mmanegġġat adegwatament biss permezz ta' analġesiċi qawwijin

2. QABEL MA TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Tużax *Fentanyl-ratiopharm*

- jekk inti allergiku/a (tbatu minn sensitività eċċessiva) għal fentanyl jew sustanzi oħra tal-prodott
- jekk tbatu minn uġiġh illi ma' jdumx fit-tul, eż. wara proċedura kirurġica.
- jekk is-sistema nervuża ċentrali tiegħek hija dgħajfa hafna bħal, per eżempju, wara ferita fil-moħħ

Oqgħod attent hafna b' *Fentanyl-ratiopharm*:

TWISSIJA:

Fentanyl-ratiopharm huwa prodott mediċinali li jista' jkun ta' theddida għall-hajja fit-tfal. Dan japplika wkoll għal garża transdermali użata. Dejjem żomm f'moħħok illi l-għamla tal-prodott tista' tidher attraġenti fl-għajnejn tat-tfal. *Fentanyl-ratiopharm* jista' jkollu effetti mhux mixtieqa ta' theddida għall-hajja f'persuni li mhux qed jieħdu mediċini tat-tip opjojdi fuq bażi regolari.

Qabel tibda l-kura b' *Fentanyl-ratiopharm* għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk tbatu minn kundizzjonijiet imsemmijin hawn taht, peress li r-riskju ta' effetti mhux mixtieqa huwa oghla u għaldaqstant it-tabib jista' jiktiblek doża inqas ta' fentanyl.

- aźma, dipressjoni respiratorja jew xi mard fil-pulmun
- pressjoni baxxa
- indeboliment tal-fwied
- indeboliment tal-kliewi
- jekk kellek xi ferita f'rasek, tumor ġo mohħok, sinjali ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju (eż. uġiġħ ta' ras, tibdil fil-vista), tibdil fl-isstat konxju jew tintilef minn sensik jew koma
- rata baxxa u irregolari tat-taħbit tal-qalb (bradiarritmija)
- Majastenja gravis (marda li tikkawza għejja u indeboliment fil-muskoli)

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk jaqbdok id-deni waqt il-kura, għax zieda fit-temperatura tal-ġisem tista' twassal għal assorbiment żejjed tal-medicina minn ġol-ġilda. Għall-istess raġuni, għandek tevita li tesponi l-garża mwahhla fuq il-ġilda għal sorsi ta' shana esterna bħal kutri tal-elettriku, hot water bottles, sawna, solarium jew banju shun. Tista' toqgħod barra fix-xemx, iżda trid tgħatti l-garża b'xi hwejjeġ fil-granet shan tas-sajf.

Tolleranza, kif ukoll dipendenza fiżika jew psikoloġika, tista' tirriżulta jekk tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal medda twila ta' żmien. Madankollu, dawn rament li jsehhu waqt il-kura tal-uġiġħ tal-kanċer.

Jekk inti pazjent anzjan, jew jekk tinstab f'kundizzjoni fisika hażina hafna (kakesiku), it-tabib tiegħek ser josservak b'iktar attenzjoni, għax jista' jkun hemm il-bżonn li d-doża preskritta tiġi mnaqqa.

Il-garża m'għandiex tinqasam f'biċċiet iżgħar, għax m'hemmx informazzjoni disponibbli fuq il-kwalita', l-effikaċja u s-sigurta' ta' garża hekk masqsuma.

Tfal

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża fit-tfal taħt it-12-il senġha għaliex it-tagħrif disponibbli dwar l-użu fit-tfal huwa limitat. Tista' ssir eċċezzjoni meta t-tabib ikun ippreskriva espressivament *Fentanyl-ratiopharm*.

Meta tuża medicini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu barbiturates (jintużaw għal problemi ta' rqad), buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine (analġesiċi qawwijin oħrajn). Mhux irrakkommandat li dawn jittiehdu waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk qed tuża, fl-istess ħin, medicini oħrajn li jistgħu jaffetwaw il-funzjoni tal-moħħ, ir-riskju ta' effetti sekondarji, speċjalment id-diffikultà biex tiehu n-nifs, jizdied. Per eżempju, dan japplika għal:

- medicini li jtaffu l-ansjeta' (kalmanti)
- medicini għal kura tad-dipressjoni (antidipressivi)
- medicini għal kura ta' disturbi psikoloġiċi (newroleptiċi)
- anestetiki, jekk taħseb li ser tiehu anestetiku, għarraf lit-tabib jew id-dentist illi qed tuża *Fentanyl-ratiopharm*
- medicini għal kura ta' disturbi tal-irqad (ipnotiċi, aġenti sedattivi, barbiturates)
- medicini kontra l-allergiji jew id-dardir tas-safar (Antihistaminiċi/anti-emetiċi)
- analġesiċi qawwijin oħrajn (opjojdi)
- l-alkoħol

M'għandekx tuża l-medicini li ġejjin flimkien ma' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm ma' tkunx osservat mill-viċin mit-tabib tiegħek.

Dawn il-medicini jistgħu iżidu l-effetti kif ukoll l-effetti sekondarji ta' *Fentanyl-ratiopharm*. Dan japplika għal, per eżempju:

- ritonavir (użat fil-kura tal-marda t' AIDS)
- ketoconazole, itraconazole (użati għall-kura ta' infezzjonijiet tal-fungu)
- diltiazem (użat għall-kura ta' mard fil-qalb)
- cimetidine (użat għall-kura ta' mard gastro-intestinali)

- antibiotiċi makrolidi (użati għall-kura ta' infezzjonijiet)

Jekk jogħġbok, għarraf lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu xi inibituri ta' MAO (ez. Moclobemide, jintuża kontra d-dipressjoni, jew selegiline, jintuża fil-kura tal-marda ta' Parkinson) jew jekk tkun hadthom fl-aħħar ġimgħatejn. Jekk dawn il-mediċini jittiehdu flimkien, tista' tiżdied it-tossiċità tagħhom.

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Meta tuża *Fentanyl-ratiopharm* ma' l-ikel u max-xorb:

L-użu fl-istess hin ta' *Fentanyl-ratiopharm* u x-xorb alkoħoliku jżid ir-riskju ta' reazzjonijiet avversi severi, u jista' jikkawża diffikultà fin-nifs, tnaqqis fil-pressjoni tad-dem, sedazzjoni profonda u koma.

Tqala u Treddigh

Itlob il-parir tat-tabib jew ta' l-ispizjar tiegħek qabel tiehu xi mediċina.

L-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm* waqt it-tqala u il-hlas (anki hlas ċesarju) mhux rakkommandat, peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tan-nifs fit-tarbija tat-twelid.

Jekk toħroġ tqila waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm*, fittex il-parir tat-tabib tiegħek.

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża waqt it-tqala u r-treddiegh hlief meta jkun hemm bżonn ċar. Is-sigurta' waqt it-tqala għada ma gietx stabbilita. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldastant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li għadhom qed jerdgħu. Il-halib tas-sider li tipproduċi l-omm waqt il-kura, jew sa 72 siegħa wara li titnehha l-aħħar garża, għandu jintrema.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila tas-sewqan u l-użu ta' magni. Dan ikun iktar mistenni fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkoħol jew aġenti sedattivi. Jeqq kont qed tuża l-istess doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* għal zmien twil, it-tabib tiegħek jista' jtik permess biex issuq jew thaddem magni perikolużi. M'għandekx issuq jew thaddem magni perikolużi waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx speċifikament illi dan huwa permess.

3. KIF GħANDEK TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Dejjem uża *Fentanyl-ratiopharm* eżattament kif ikun qallek it-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruhek mat-tabib jew ma' l-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jiddeċidi liema doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* hi l-iktar addatata għalik. It-tabib tiegħek jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq: kemm qed thoss uġiġh, il-kundizzjoni generali tiegħek u it-tip ta' kura għall-uġiġh li tkun irċevejt s'issa.

Skond ir-rispons tiegħek, jista' jkun hemm bżonn illi d-doża tal-garża jew in-numru tagħhom jiġumibdula. L-effett analġesiku massimu jintlaħaq sa 24 siegħa wara li tkun ingħatat l-ewwel garża u jiddgħajjef gradwalment wara li din titnehha. Twaqqafx il-kura qabel ma tfittex il-parir tat-tabib tiegħek

L-ewwel garża tibda taħdem bil-mod, u l-effett jista' jdum biex jinħass anki ġurnata, u għaldaqstant it-tabib tiegħek jista' jippreskrivilek analġesiċi oħrajn, sakemm l-effett tal-*Fentanyl-ratiopharm* jibda jinħass kif meħtieġ. Wara, il- *Fentanyl-ratiopharm* għandu jgħin biex itaffi l-uġiġh kontinwament u jista' jkun possibli li tieqaf tiehu dawn l-analġesiċi żejda. Madankollu, xorta waħda jista' jkollok bżonn ta' analġesiċi miżjuda kull tant zmien..

Kif tapplika l-*Fentanyl-ratiopharm*

- Sib post ċatt fuq il-parti ta' fuq ta' ġismek (il-fuq mil-qadd) (jew il-parti ta' fuq ta' dirghajk fejn m'hemmx pil, qsim, ponot jew xi difett iehor. Il-parti tal-ġisem ma tridx tkun irritata minhabba trattament bir-raġġi.
- Jekk il-ġilda għandha l-pil, neħhieh bl-użu ta' mqass. Tqaxxarx, għax it-tqaxxir jirrita il-ġilda. Jekk il-ġilda għandha bżonn tiġi maħsula, inħasel bl-ilma. Tużax sapun, żejt, fwejjah, alkohol, jew xi likwidu għall-ħasil tal-ġisem iehor li jista' jirrita l-ġilda. Il-ġilda trid tkun kompletament niexfa qabel ma' titwahhal il-garża.
- Il-garża trid titwahhal immedjatement wara li l-pakkett jinfetah. Wara li jitneħħa r-*release liner*, il-garża tiġi applikata fuq il-ġilda permezz ta' pressjoni ħafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda sabiex ikun assigurat li l-garża tehel sewwa mal-ġilda. Oqghod attent li l-ġnub tal-garża jehlu sewwa.
- Garża ta' *Fentanyl-ratiopharm* is-soltu tintuża għal 72 siegħa (3 ijiem). Tista' tniżżel id-data u il-hin ta' meta applikajt il-garża fuq il-kaxxa ta' barra. Dan jista' jgħinek biex tiftakar meta l-garża għandha tinbidel.
- Il-post fejn titwahhal il-garża ma' jridx ikun espost għas-shana li ġejja minn sorsi esterni (ara "Oqghod attent ħafna bil-*Fentanyl-ratiopharm*")
- Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.
- Fit-tfal, in-naħa ta' fuq tad-dar huwa il-post preferibbli fejn titwahhal il-garża, biex b'hekk jitnaqqas ir-riskju li it-tifel/tifla i/tneħħi l-garża.

Kif tibdel il-garża transdermali

- Neħħi l-garża wara l-perijodu li jkun speċifikalek it-tabib. Fl-aktar każi, dan huwa wara 72 siegħa (3 ijiem), f'xi pazjenti wara 48 siegħa (2 ijiem). Is-soltu, il-garża ma' tinqalax waħedha. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun.
- Itwi l-garża wżata b'mod illi l-ġnub li jwahhlu jehlu ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, jekk ikun possibli, ħudha lura għand l-ispizjar.
- Applika garża ġdida kif spjegat qabel iżda fuq parti oħra tal-ġilda. Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma' tkun tista' tintuża l-istess parti tal-ġisem.

Jekk tuża *Fentanyl-ratiopharm* aktar milli suppost

Jekk waħhalt numru ta' garzi iktar milli suppost, neħħihom u fittex il-parir tat-tabib tiegħek jew ċempel l-isptar biex tara x'inhu r-riskju.

Is-sinjali l-aktar komuni ta' doża eċċessiva huwa abilita' mnaqqsa biex tieħu n-nifs. Is-sintomi huma t-teħid tan-nifs ikun bil-mod ħafna jew in-nifs ikun dgħajjef. Jekk dan isehh, neħħi il-garża u kkuntattja t-tabib minnufih. Waqt li qed tistenna l-wasla tat-tabib, zomm il-pazjent imqajjem billi tkellmu jew iċċaqalqu minn hin għall-iehor.

Sinjali u sintomi oħrajn ta' doża eċċessiva huma hedla, temperatura baxxa, rata baxxa tat-tahbit tal-qalb, tnaqqis fit-ton tal-muskoli, sedazzjoni profonda, telf ta' koordinazzjoni fil-muskoli, djuq fil-pupilla tal-għajnejn u konvulzjonijiet.

Jekk tinsa tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Taht l-ebda ċirkostanzi ma trid tieħu doża doppja biex tpatti għal xi doża li tkun insejt tieħu. Għandek tbiddel il-garża darba kull tlett ijiem (kull 72 siegħa) fl-istess hin, sakemm it-tabib tiegħek ma' jgħidlekx mod iehor. Jekk tinsa', biddel il-garża fil-mument li tiftakar. Jekk tkun bdilt il-garża tard ħafna, tkellem mat-tabib tiegħek għax jista' jkollok bżonn ta' xi analġesiċi oħrajn.

Jekk tieqaf tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk tixtieq tinterrompi jew twaqqaf il-kura, dejjem għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek dwar ir-raġunijiet għaliex trid tieqaf mill-kura u hu parir dwar il-kura sussegwenti tiegħek. L-użu fit-tul ta' *Fentanyl-ratiopharm* jista' jirriżulta f' dipendenza fiżika. Jekk tieqaf tuża l-garża, jista' ma tħossokx sewwa.

Peress li r-riskju tal-effetti assoċjati mal-waqfien mill-kura huwa ikbar meta tiġi mwaqqfa hesrem, qatt m'għandek tieqaf mill-kura minn jeddek, imma għandek dejjem l-ewwel tfitteż il-parir tat-tabib tiegħek

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina oħra, *Fentanyl-ratiopharm* jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm jistgħu ma' jidhrux f' kulhadd.

It-termini li ġejjin jintużaw biex jiddeskrivu kemm il darba ġew irrapurtati l-effetti sekondarji:

Komuni hafna	isehħu f' iktar minn pazjent minn kull 10
Komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 10, iżda f' iktar minn 1 minn kull 100 pazjenti
Mhux komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 100, iżda f' iktar minn 1 minn kull 1,000 pazjenti
Rari	isehħu f' inqas minn 1 kull 1000, iżda f' iktar minn 1 minn kull 10000 pazjenti
Rari hafna	isehħu f' inqas minn 1 kull 10000 pazjenti, rapporti iżolati inklużi

Jekk iġġarrab xi effetti sekondarji minn dawn li ġejjin li huma serji, imma rari hafna, , minnufih għandek twaqqaf il-kura u tmur għand it-tabib tiegħek jew lejn l-isptar: dipressjoni respiratorja qawwija (qtuġh ta' nifs qawwi, hsejjes fin-nifs) jew blukkaġġ kompletament tas-sistema diġestiva (uġiġh konvulsiv, rimettar, uġiġh minhabba gass fl-istonku).

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna: Nghas, uġiġh ta' ras, sturdament, tqallieġh, rimettar, stitikezza, zieda fl-għaraq, ħakk. Is-soltu, il-ħakk jispiċċa fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Komuni: Nghas jew ghejja kbira (effett dipressanti fuq il-moħh), nervożismu, nuqqas ta' aptit, ħalq xott, uġiġh ta' żaqq, reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahħal il-garża

Mhux komuni: Ferħ bla ebda raġuni , telf tal- memorja, problemi ta' rqad, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni, tregħid, disturbi tas-sensi, disturbi fil-kliem u fil-lingwa, inzul jew zieda fil-pressjoni u t-thabbit tal-qalb, problemi fin-nifs, dijarea, problemi biex tghaddi l-awrina, raxx, ħmura (eritema). Is-soltu, ir-raxx u l-ħmura jisparixxu fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Rari: Thabbit tal-qalb irregolari, vini u arterji imwessghin, sulluzzu, akkumulazzjoni ta' ilma fil-ġisem, kesha.

Rari hafna: Rejjazzjonijiet allergiċi generali b' inzul fil-pressjoni tad-demem u/jew problemi fin-nifs (rejjazzjonijiet anafilattiċi), hsbijiet mhux normali, eċċitament eċċessiv, debbolezza, dipressjoni, ansjeta', confużjoni, funzjoni sesswali anormali, sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura, problemi fil-koordinazzjoni, aċċessjonijiet (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal), vista mnaqqsa, indeboliment tas-sistema respiratorja (dipressjoni

respiratorja), waqfien tas-sistema respiratorja (apneja), nefha fl-istonku bl-uġiġh, blukkaġġ tas-sistema diġestiva, uġiġh fil-bużżieqa tal-awrina, produzzjoni mnaqqsa ta' awrina (eskrezzjoni mnaqqsa tal-awrina).

Jekk ilek tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal żmien twil, jita' jagħti l-każ li l-effett tiegħu jibda' jinħass inqas, tant illi d-doża trid tiġi rranġata (jista' tkun żviluppata rezistenza). Tista' tiżviluppa dipendenza fiżika wkoll u tista' tbatu minn sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jekk tiegħaf hesrem mill-kura tiegħek. Dawn is-sintomi jinkludu tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid.

Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN *FENTANYL-RATIOPHARM*

Żomm il-medicina fejn ma tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal, ukoll wara li tispicċa minnha. Kwantitajiet kbar tas-sustanza attiva jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara li tkun spicċajt mill-użu tagħha.

Tużax *Fentanyl-ratiopharm* wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett. Id-data ta' skadenza tirreferi għal l-aħhar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Għall-protezzjoni ta' l-ambjent u minhabba raġunijiet ta' sigurta', il-garża wżata kif ukoll dawk mhux użati jew skaduti għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispizjar. Il-garża wżata trid tiġi mitwija fi tnejn biż-żewġ naħat li jwahnlu mwahnlin ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, meta jkun possibli, hudha lura għand l-ispizjar.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih *Fentanyl-ratiopharm*

- Is-sustanza attiva hi fentanyl.
Kull garża terhi 50 mikrogramma fentanyl fis-sieġha. Kull garża ta' 15 cm² fiha 8.25 mg fentanyl.
- Is-sustanzi l-oħra huma :
Saff li jwahnhal: Saff li jwahnhal magħmul minn Polyacrylate
Fojl warrani: Fojl magħmul minn Polypropylene, Linka għall-istampar kaħlanija
Release liner: Fojl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

Id-Dehra ta' *Fentanyl-ratiopharm* u d-daqs tal-pakkett:

Fentanyl-ratiopharm hija garża trasparenti li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda bil-parti ta' wara li twahnhal biex b'hekk tkun tista' titwahnhal mal-ġilda. Il-garża transdermali għandha is-qawwa partikolari tagħha stampata b'linka kaħlanija fuq il-parti ta' wara.

Fentanyl-ratiopharm huwa disponibbli f'pakketti ta' 3, 5, 10 jew 20 il-garża li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

Id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}
{fax}
{e-mail}

Manifattur:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Il-Ġermanja

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet :

<DE/H/0739/02/MR>

L-Awstrija	Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h transdermales Matrixpflaster
Il-Ġermanja	Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h Matrixpflaster
Spanja	Fentanilo Matrix ratiopharm 50 microgramos/h parches transdémicos EFG
Franza	Fentanyl ratiopharm 50 µg/h, dispositif transdermique
L-Olanda	Fentanyl ratiopharm 50 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Ir-Renju Unit	Telfanyl 50 microgram/hr Transdermal patch

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina giet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni ohra. Tista' tagħmlilhom il-hsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu *Fentanyl-ratiopharm* u għalxiex jintuża
2. Qabel ma tuża *Fentanyl-ratiopharm*
3. Kif għandek tuża *Fentanyl-ratiopharm*
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen *Fentanyl-ratiopharm*
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU *FENTANYL-RATIOPHARM* U GħALXIEX JINTUŻA

Fentanyl jappartjeni għall-grupp ta' analġesiċi qawwijin li jissejġhu opjojdi. L-analġesiku, fentanyl, jgħaddi bil-mod mill-garża, minn ġol-ġilda u għal ġol-ġisem.

Fentanyl-ratiopharm jintuża għall-kura ta' uġiġh qawwi w dewmieni li jista' jiġi mmanegġġat adegwatament biss permezz ta' analġesiċi qawwijin

2. QABEL MA TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Tużax *Fentanyl-ratiopharm*

- jekk inti allergiku/a (tbatu minn sensitività eċċessiva) għal fentanyl jew sustanzi ohra tal-prodott
- jekk tbatu minn uġiġh illi ma' jdumx fit-tul, eż. wara proċedura kirurġica.
- jekk is-sistema nervuża ċentrali tiegħek hija dgħajfa hafna bħal, per eżempju, wara ferita fil-moħħ

Oqgħod attent hafna b' *Fentanyl-ratiopharm*:

TWISSIJA:

Fentanyl-ratiopharm huwa prodott mediċinali li jista' jkun ta' theddida għall-hajja fit-tfal. Dan japplika wkoll għal garża transdermali użata.

Dejjem żomm f' moħħok illi l-għamla tal-prodott tista' tidher attraġenti fl-għajnejn tat-tfal.

Fentanyl-ratiopharm jista' jkollu effetti mhux mixtieqa ta' theddida għall-hajja f'persuni li mhux qed jieħdu mediċini tat-tip opjojdi fuq bażi regolari.

Qabel tibda l-kura b' *Fentanyl-ratiopharm* għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk tbatu minn kundizzjonijiet imsemmijin hawn taht, peress li r-riskju ta' effetti mhux mixtieqa huwa oghla u għaldaqstant it-tabib jista' jiktiblek doża inqas ta' fentanyl.

- aźma, dipressjoni respiratorja jew xi mard fil-pulmun
- pressjoni baxxa
- indeboliment tal-fwied
- indeboliment tal-kliewi
- jekk kellek xi ferita f'rasek, tumur ġo mohħok, sinjali ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju (eż. uġiġħ ta' ras, tibdil fil-vista), tibdil fl-isstat konxju jew tintilef minn sensik jew koma
- rata baxxa u irregolari tat-taħbit tal-qalb (bradiarritmija)
- Majastenja gravis (marda li tikkawza għejja u indeboliment fil-muskoli)

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk jaqbdok id-deni waqt il-kura, għax zieda fit-temperatura tal-ġisem tista' twassal għal assorbiment żejjed tal-medicina minn ġol-ġilda. Għall-istess raġuni, għandek tevita li tesponi l-garża mwahhla fuq il-ġilda għal sorsi ta' shana esterna bħal kutri tal-elettriku, hot water bottles, sawna, solarium jew banju shun. Tista' toqgħod barra fix-xemx, iżda trid tgħatti l-garża b'xi hwejjeġ fil-granet shan tas-sajf.

Tolleranza, kif ukoll dipendenza fiżika jew psikoloġika, tista' tirriżulta jekk tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal medda twila ta' żmien. Madankollu, dawn rament li jsehhu waqt il-kura tal-uġiġħ tal-kanċer.

Jekk inti pazjent anzjan, jew jekk tinstab f'kundizzjoni fisika hażina hafna (kakesiku), it-tabib tiegħek ser josservak b'iktar attenzjoni, għax jista' jkun hemm il-bżonn li d-doża preskritta tiġi mnaqqa.

Il-garża m'għandiex tinqasam f'biċċiet iżgħar, għax m'hemmx informazzjoni disponibbli fuq il-kwalita', l-effikaċja u s-sigurta' ta' garża hekk masqsuma.

Tfal

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża fit-tfal taħt it-12-il senġha għaliex it-tagħrif disponibbli dwar l-użu fit-tfal huwa limitat. Tista' ssir eċċezzjoni meta t-tabib ikun ippreskriva espressivament *Fentanyl-ratiopharm*.

Meta tuża medicini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu barbiturates (jintużaw għal problemi ta' rqad), buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine (analġesiċi qawwijin oħrajn). Mhux irrakkommandat li dawn jittiehdu waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk qed tuża, fl-istess ħin, medicini oħrajn li jistgħu jaffetwaw il-funzjoni tal-moħħ, ir-riskju ta' effetti sekondarji, speċjalment id-diffikultà biex tiehu n-nifs, jizdied. Per eżempju, dan japplika għal:

- medicini li jtaffu l-ansjeta' (kalmanti)
- medicini għal kura tad-dipressjoni (antidipressivi)
- medicini għal kura ta' disturbi psikoloġiċi (newroleptiċi)
- anestetiki, jekk taħseb li ser tiehu anestetiku, għarraf lit-tabib jew id-dentist illi qed tuża *Fentanyl-ratiopharm*
- medicini għal kura ta' disturbi tal-irqad (ipnotiċi, aġenti sedattivi, barbiturates)
- medicini kontra l-allergiji jew id-dardir tas-safar (Antihistaminiċi/anti-emetiċi)
- analġesiċi qawwijin oħrajn (opjojdi)
- l-alkoħol

M'għandekx tuża l-medicini li ġejjin flimkien ma' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm ma' tkunx osservat mill-viċin mit-tabib tiegħek.

Dawn il-medicini jistgħu iżidu l-effetti kif ukoll l-effetti sekondarji ta' *Fentanyl-ratiopharm*. Dan japplika għal, per eżempju:

- ritonavir (użat fil-kura tal-marda t'AIDS)
- ketoconazole, itraconazole (użati għall-kura ta' infezzjonijiet tal-fungu)
- diltiazem (użat għall-kura ta' mard fil-qalb)
- cimetidine (użat għall-kura ta' mard gastro-intestinali)

- antibiotiċi makrolidi (użati għall-kura ta' infezzjonijiet)

Jekk jogħġbok, għarraf lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu xi inibituri ta' MAO (ez. Moclobemide, jintuża kontra d-dipressjoni, jew selegiline, jintuża fil-kura tal-marda ta' Parkinson) jew jekk tkun hadthom fl-aħħar ġimgħatejn. Jekk dawn il-mediċini jittiehdu flimkien, tista' tiżdied it-tossiċità tagħhom.

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Meta tuża *Fentanyl-ratiopharm* ma' l-ikel u max-xorb:

L-użu fl-istess hin ta' *Fentanyl-ratiopharm* u x-xorb alkoħoliku jżid ir-riskju ta' reazzjonijiet avversi severi, u jista' jikkawża diffikultà fin-nifs, tnaqqis fil-pressjoni tad-dem, sedazzjoni profonda u koma.

Tqala u Treddigh

Itlob il-parir tat-tabib jew ta' l-ispizjar tiegħek qabel tiehu xi mediċina.

L-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm* waqt it-tqala u il-hlas (anki hlas ċesarju) mhux rakkommandat, peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tan-nifs fit-tarbija tat-twelid.

Jekk toħroġ tqila waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm*, fittex il-parir tat-tabib tiegħek.

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża waqt it-tqala u r-treddiegh hlief meta jkun hemm bżonn ċar. Is-sigurta' waqt it-tqala għada ma gietx stabbilita. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldastant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li għadhom qed jerdgħu. Il-halib tas-sider li tipproduċi l-omm waqt il-kura, jew sa 72 siegħa wara li titnehha l-aħħar garża, għandu jintrema.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila tas-sewqan u l-użu ta' magni. Dan ikun iktar mistenni fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkoħol jew aġenti sedattivi. Jeqq kont qed tuża l-istess doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* għal zmien twil, it-tabib tiegħek jista' jtik permess biex issuq jew thaddem magni perikolużi. M'għandekx issuq jew thaddem magni perikolużi waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx speċifikament illi dan huwa permess.

3. KIF GħANDEK TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Dejjem uża *Fentanyl-ratiopharm* eżattament kif ikun qallek it-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruhek mat-tabib jew ma' l-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jiddeċidi liema doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* hi l-iktar addatata għalik. It-tabib tiegħek jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq: kemm qed thoss uġiġh, il-kundizzjoni generali tiegħek u it-tip ta' kura għall-uġiġh li tkun irċevejt s'issa.

Skond ir-rispons tiegħek, jista' jkun hemm bżonn illi d-doża tal-garża jew in-numru tagħhom jiġumibdula. L-effett analġesiku massimu jintlaħaq sa 24 siegħa wara li tkun ingħatat l-ewwel garża u jiddgħajjef gradwalment wara li din titnehha. Twaqqafx il-kura qabel ma tfittex il-parir tat-tabib tiegħek

L-ewwel garża tibda taħdem bil-mod, u l-effett jista' jdum biex jinħass anki ġurnata, u għaldaqstant it-tabib tiegħek jista' jippreskrivilek analġesiċi oħrajn, sakemm l-effett tal-*Fentanyl-ratiopharm* jibda jinħass kif meħtieġ. Wara, il- *Fentanyl-ratiopharm* għandu jgħin biex itaffi l-uġiġh kontinwament u jista' jkun possibli li tieqaf tiehu dawn l-analġesiċi żejda. Madankollu, xorta waħda jista' jkollok bżonn ta' analġesiċi miżjuda kull tant zmien..

Kif tapplika l-*Fentanyl-ratiopharm*

- Sib post ċatt fuq il-parti ta' fuq ta' ġismek (il-fuq mil-qadd) (jew il-parti ta' fuq ta' dirghajk fejn m'hemmx pil, qsim, ponot jew xi difett iehor. Il-parti tal-ġisem ma tridx tkun irritata minhabba trattament bir-raġġi.
- Jekk il-ġilda għandha l-pil, neħhieh bl-użu ta' mqass. Tqaxxarx, għax it-tqaxxir jirrita il-ġilda. Jekk il-ġilda għandha bżonn tiġi maħsula, inħasel bl-ilma. Tużax sapun, żejt, fwejjah, alkohol, jew xi likwidu għall-ħasil tal-ġisem iehor li jista' jirrita l-ġilda. Il-ġilda trid tkun kompletament niexfa qabel ma' titwahhal il-garża.
- Il-garża trid titwahhal immedjatement wara li l-pakkett jinfetah. Wara li jitneħħa r-*release liner*, il-garża tiġi applikata fuq il-ġilda permezz ta' pressjoni ħafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda sabiex ikun assigurat li l-garża tehel sewwa mal-ġilda. Oqghod attent li l-ġnub tal-garża jehlu sewwa.
- Garża ta' *Fentanyl-ratiopharm* is-soltu tintuża għal 72 siegħa (3 ijiem). Tista' tnizzel id-data u il-hin ta' meta applikajt il-garża fuq il-kaxxa ta' barra. Dan jista' jgħinek biex tiftakar meta l-garża għandha tinbidel.
- Il-post fejn titwahhal il-garża ma' jridx ikun espost għas-shana li ġejja minn sorsi esterni (ara "Oqghod attent ħafna bil-*Fentanyl-ratiopharm*")
- Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.
- Fit-tfal, in-naħa ta' fuq tad-dar huwa il-post preferibbli fejn titwahhal il-garża, biex b'hekk jitnaqqas ir-riskju li it-tifel/tifla i/tneħħi l-garża.

Kif tibdel il-garża transdermali

- Neħhi l-garża wara l-perijodu li jkun speċifikalek it-tabib. Fl-aktar każi, dan huwa wara 72 siegħa (3 ijiem), f'xi pazjenti wara 48 siegħa (2 ijiem). Is-soltu, il-garża ma' tinqalax waħedha. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun.
- Itwi l-garża wżata b'mod illi l-ġnub li jwahħlu jehlu ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, jekk ikun possibli, ħudha lura għand l-ispizjar.
- Applika garża ġdida kif spjegat qabel iżda fuq parti oħra tal-ġilda. Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma' tkun tista' tintuża l-istess parti tal-ġisem.

Jekk tuża *Fentanyl-ratiopharm* aktar milli suppost

Jekk waħħalt numru ta' garzi iktar milli suppost, neħhihom u fittex il-parir tat-tabib tiegħek jew ċempel l-isptar biex tara x'inhu r-riskju.

Is-sinjali l-aktar komuni ta' doża eċċessiva huwa abilita' mnaqqsa biex tieħu n-nifs. Is-sintomi huma t-teħid tan-nifs ikun bil-mod ħafna jew in-nifs ikun dgħajjef. Jekk dan isehh, neħhi il-garża u kkuntattja t-tabib minnufih. Waqt li qed tistenna l-wasla tat-tabib, zomm il-pazjent imqajjem billi tkellmu jew iċċaqalqu minn hin għall-iehor.

Sinjali u sintomi oħrajn ta' doża eċċessiva huma hedla, temperatura baxxa, rata baxxa tat-tahbit tal-qalb, tnaqqis fit-ton tal-muskoli, sedazzjoni profonda, telf ta' koordinazzjoni fil-muskoli, djuq fil-pupilla tal-għajnejn u konvulzjonijiet.

Jekk tinsa tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Taħt l-ebda ċirkostanzi ma trid tieħu doża doppja biex tpatti għal xi doża li tkun insejt tieħu. Għandek tbiddel il-garża darba kull tlett ijiem (kull 72 siegħa) fl-istess hin, sakemm it-tabib tiegħek ma' jgħidlekx mod iehor. Jekk tinsa', biddel il-garża fil-mument li tiftakar. Jekk tkun bdilt il-garża tard ħafna, tkellem mat-tabib tiegħek għax jista' jkollok bżonn ta' xi analġesiċi oħrajn.

Jekk tieqaf tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk tixtieq tinterrompi jew twaqqaf il-kura, dejjem għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek dwar ir-raġunijiet għaliex trid tieqaf mill-kura u hu parir dwar il-kura sussegwenti tiegħek. L-użu fit-tul ta' *Fentanyl-ratiopharm* jista' jirriżulta f' dipendenza fiżika. Jekk tieqaf tuża l-garża, jista' ma tħossokx sewwa.

Peress li r-riskju tal-effetti assoċjati mal-waqfien mill-kura huwa ikbar meta tiġi mwaqqfa hesrem, qatt m'għandek tieqaf mill-kura minn jeddek, imma għandek dejjem l-ewwel tfitteż il-parir tat-tabib tiegħek

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina oħra, *Fentanyl-ratiopharm* jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm jistgħu ma' jidhrux f' kulhadd.

It-termini li ġejjin jintużaw biex jiddeskrivu kemm il darba ġew irrapurtati l-effetti sekondarji:

Komuni hafna	isehħu f' iktar minn pazjent minn kull 10
Komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 10, iżda f' iktar minn 1 minn kull 100 pazjenti
Mhux komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 100, iżda f' iktar minn 1 minn kull 1,000 pazjenti
Rari	isehħu f' inqas minn 1 kull 1000, iżda f' iktar minn 1 minn kull 10000 pazjenti
Rari hafna	isehħu f' inqas minn 1 kull 10000 pazjenti, rapporti iżolati inklużi

Jekk iġġarrab xi effetti sekondarji minn dawn li ġejjin li huma serji, imma rari hafna, , minnufih għandek twaqqaf il-kura u tmur għand it-tabib tiegħek jew lejn l-isptar: dipressjoni respiratorja qawwija (qtuġh ta' nifs qawwi, hsejjes fin-nifs) jew blukkaġġ kompletament tas-sistema diġestiva (uġiġh konvulsiv, rimettar, uġiġh minhabba gass fl-istonku).

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna: Nghas, uġiġh ta' ras, sturdament, tqallieġh, rimettar, stitikezza, zieda fl-għaraq, ħakk. Is-soltu, il-ħakk jispiċċa fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Komuni: Nghas jew ghejja kbira (effett dipressanti fuq il-moħh), nervożismu, nuqqas ta' aptit, ħalq xott, uġiġh ta' żaqq, reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahħal il-garża

Mhux komuni: Ferħ bla ebda raġuni , telf tal- memorja, problemi ta' rqad, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni, tregħid, disturbi tas-sensi, disturbi fil-kliem u fil-lingwa, inzul jew zieda fil-pressjoni u t-thabbit tal-qalb, problemi fin-nifs, dijarea, problemi biex tghaddi l-awrina, raxx, ħmura (eritema). Is-soltu, ir-raxx u l-ħmura jisparixxu fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Rari: Thabbit tal-qalb irregolari, vini u arterji imwessghin, sulluzzu, akkumulazzjoni ta' ilma fil-ġisem, kesha.

Rari hafna: Rejazzjonijiet allergiċi generali b' inzul fil-pressjoni tad-demem u/jew problemi fin-nifs (rejazzjonijiet anafilattiċi), hsiċijiet mhux normali, eċċitament eċċessiv, debbolezza, dipressjoni, ansjeta', confużjoni, funzjoni sesswali anormali, sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura, problemi fil-koordinazzjoni, aċċessjonijiet (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal), vista mnaqqsa, indeboliment tas-sistema respiratorja (dipressjoni

respiratorja), waqfien tas-sistema respiratorja (apneja), nefha fl-istonku bl-uġiġh, blukkaġġ tas-sistema diġestiva, uġiġh fil-bużżieqa tal-awrina, produzzjoni mnaqqsa ta' awrina (eskrezzjoni mnaqqsa tal-awrina).

Jekk ilek tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal żmien twil, jita' jagħti l-każ li l-effett tiegħu jibda' jinħass inqas, tant illi d-doża trid tiġi rranġata (jista' tkun żviluppata rezistenza). Tista' tiżviluppa dipendenza fiżika wkoll u tista' tbatu minn sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jekk tiegħaf hesrem mill-kura tiegħek. Dawn is-sintomi jinkludu tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid.

Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN *FENTANYL-RATIOPHARM*

Żomm il-medicina fejn ma tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal, ukoll wara li tispicċa minnha. Kwantitajiet kbar tas-sustanza attiva jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara li tkun spicċajt mill-użu tagħha.

Tużax *Fentanyl-ratiopharm* wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett. Id-data ta' skadenza tirreferi għal l-aħhar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Għall-protezzjoni ta' l-ambjent u minhabba raġunijiet ta' sigurta', il-garża wżata kif ukoll dawk mhux użati jew skaduti għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispizjar. Il-garża wżata trid tiġi mitwija fi tnejn biż-żewġ naħat li jwahaħlu mwahaħlin ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, meta jkun possibli, hudha lura għand l-ispizjar.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih *Fentanyl-ratiopharm*

- Is-sustanza attiva hi fentanyl.
Kull garża terhi 75 mikrogramma fentanyl fis-sieġha. Kull garża ta' 22.5 cm² fiha 12.375 mg fentanyl.
- Is-sustanzi l-oħra huma :
Saff li jwahaħhal: Saff li jwahaħhal magħmul minn Polyacrylate
Foġl warrani: Foġl magħmul minn Polypropylene, Linka għall-istampar kaħlanija
Release liner: Foġl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

Id-Dehra ta' *Fentanyl-ratiopharm* u d-daqs tal-pakkett:

Fentanyl-ratiopharm hija garża trasparenti li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda bil-parti ta' wara li twahaħhal biex b'hekk tkun tista' titwahaħhal mal-ġilda. Il-garża transdermali għandha is-qawwa partikolari tagħha stampata b'linka kaħlanija fuq il-parti ta' wara.

Fentanyl-ratiopharm huwa disponibbli f'pakketti ta' 3, 5, 10 jew 20 il-garża li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

Id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}
{fax}
{e-mail}

Manifattur:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Il-Ġermanja

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet :

<DE/H/0739/03/MR>

L-Awstrija	Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h transdermales Matrixpflaster
Il-Ġermanja	Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h Matrixpflaster
Spanja	Fentanilo Matrix ratiopharm 75 microgramos/h parches transdémicos EFG
Franza	Fentanyl ratiopharm 75 µg/h, dispositif transdermique
L-Olanda	Fentanyl ratiopharm 75 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Ir-Renju Unit	Telfanyl 75 microgram/hr Transdermal patch

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h Matrixpflaster u ismijiet assoċjati miegħu (Ara Anness I)

[Ara Anness I - Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina giet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-hsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m'humiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu *Fentanyl-ratiopharm* u għalxiex jintuża
2. Qabel ma tuża *Fentanyl-ratiopharm*
3. Kif għandek tuża *Fentanyl-ratiopharm*
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen *Fentanyl-ratiopharm*
6. Aktar tagħrif

1. X'INHU *FENTANYL-RATIOPHARM* U GħALXIEX JINTUŻA

Fentanyl jappartjeni għall-grupp ta' analġesiċi qawwijin li jissejġhu opjojdi. L-analġesiku, fentanyl, jgħaddi bil-mod mill-garża, minn ġol-ġilda u għal ġol-ġisem.

Fentanyl-ratiopharm jintuża għall-kura ta' uġiġh qawwi w dewmieni li jista' jiġi mmanegġġat adegwatament biss permezz ta' analġesiċi qawwijin

2. QABEL MA TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Tużax *Fentanyl-ratiopharm*

- jekk inti allergiku/a (tbatu minn sensitività eċċessiva) għal fentanyl jew sustanzi oħra tal-prodott
- jekk tbatu minn uġiġh illi ma' jdumx fit-tul, eż. wara proċedura kirurġica.
- jekk is-sistema nervuża ċentrali tiegħek hija dgħajfa hafna bħal, per eżempju, wara ferita fil-moħħ

Oqgħod attent hafna b' *Fentanyl-ratiopharm*:

TWISSIJA:

Fentanyl-ratiopharm huwa prodott mediċinali li jista' jkun ta' theddida għall-hajja fit-tfal. Dan japplika wkoll għal garża transdermali użata.

Dejjem żomm f'moħħok illi l-għamla tal-prodott tista' tidher attrajenti fl-għajnejn tat-tfal.

Fentanyl-ratiopharm jista' jkollu effetti mhux mixtieqa ta' theddida għall-hajja f'persuni li mhux qed jieħdu mediċini tat-tip opjojdi fuq bażi regolari.

Qabel tibda l-kura b' *Fentanyl-ratiopharm* għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk tbatu minn kundizzjonijiet imsemmijin hawn taht, peress li r-riskju ta' effetti mhux mixtieqa huwa oghla u għaldaqstant it-tabib jista' jiktiblek doża inqas ta' fentanyl.

- aźma, dipressjoni respiratorja jew xi mard fil-pulmun
- pressjoni baxxa
- indeboliment tal-fwied
- indeboliment tal-kliewi
- jekk kellek xi ferita f'rasek, tumor ġo mohħok, sinjali ta' zieda tal-pressjoni ġol-kranju (eż. uġiġħ ta' ras, tibdil fil-vista), tibdil fl-isstat konxju jew tintilef minn sensik jew koma
- rata baxxa u irregolari tat-taħbit tal-qalb (bradiarritmija)
- Majastenja gravis (marda li tikkawza għejja u indeboliment fil-muskoli)

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk jaqbdok id-deni waqt il-kura, għax zieda fit-temperatura tal-ġisem tista' twassal għal assorbiment żejjed tal-medicina minn ġol-ġilda. Għall-istess raġuni, għandek tevita li tesponi l-garża mwahhla fuq il-ġilda għal sorsi ta' shana esterna bħal kutri tal-elettriku, hot water bottles, sawna, solarium jew banju shun. Tista' toqgħod barra fix-xemx, iżda trid tgħatti l-garża b'xi hwejjeġ fil-granet shan tas-sajf.

Tolleranza, kif ukoll dipendenza fiżika jew psikoloġika, tista' tirriżulta jekk tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal medda twila ta' żmien. Madankollu, dawn rarament li jsehhu waqt il-kura tal-uġiġħ tal-kanċer.

Jekk inti pazjent anzjan, jew jekk tinstab f'kundizzjoni fisika hażina hafna (kakesiku), it-tabib tiegħek ser josservak b'iktar attenzjoni, għax jista' jkun hemm il-bżonn li d-doża preskritta tiġi mnaqqa.

Il-garża m'għandiex tinqasam f'biċċiet iżgħar, għax m'hemmx informazzjoni disponibbli fuq il-kwalita', l-effikaċja u s-sigurta' ta' garża hekk masqsuma.

Tfal

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża fit-tfal taħt it-12-il senġha għaliex it-tagħrif disponibbli dwar l-użu fit-tfal huwa limitat. Tista' ssir eċċezzjoni meta t-tabib ikun ippreskriva espressivament *Fentanyl-ratiopharm*.

Meta tuża medicini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu barbiturates (jintużaw għal problemi ta' rqad), buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine (analġesiċi qawwijin oħrajn). Mhux irrakkommandat li dawn jittiehdu waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk qed tuża, fl-istess ħin, medicini oħrajn li jistgħu jaffetwaw il-funzjoni tal-moħħ, ir-riskju ta' effetti sekondarji, speċjalment id-diffikultà biex tiehu n-nifs, jizdied. Per eżempju, dan japplika għal:

- medicini li jtaffu l-ansjeta' (kalmanti)
- medicini għal kura tad-dipressjoni (antidipressivi)
- medicini għal kura ta' disturbi psikoloġiċi (newroleptiċi)
- anestetiki, jekk taħseb li ser tiehu anestetiku, għarraf lit-tabib jew id-dentist illi qed tuża *Fentanyl-ratiopharm*
- medicini għal kura ta' disturbi tal-irqad (ipnotiċi, aġenti sedattivi, barbiturates)
- medicini kontra l-allergiji jew id-dardir tas-safar (Antihistaminiċi/anti-emetiċi)
- analġesiċi qawwijin oħrajn (opjojdi)
- l-alkoħol

M'għandekx tuża l-medicini li ġejjin flimkien ma' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm ma' tkunx osservat mill-viċin mit-tabib tiegħek.

Dawn il-medicini jistgħu iżidu l-effetti kif ukoll l-effetti sekondarji ta' *Fentanyl-ratiopharm*. Dan japplika għal, per eżempju:

- ritonavir (użat fil-kura tal-marda t' AIDS)
- ketoconazole, itraconazole (użati għall-kura ta' infezzjonijiet tal-fungu)
- diltiazem (użat għall-kura ta' mard fil-qalb)
- cimetidine (użat għall-kura ta' mard gastro-intestinali)

- antibiotiċi makrolidi (użati għall-kura ta' infezzjonijiet)

Jekk jogħġbok, għarraf lit-tabib tiegħek jekk qed tiehu xi inibituri ta' MAO (ez. Moclobemide, jintuża kontra d-dipressjoni, jew selegiline, jintuża fil-kura tal-marda ta' Parkinson) jew jekk tkun hadthom fl-aħħar ġimgħatejn. Jekk dawn il-mediċini jittiehdu flimkien, tista' tiżdied it-tossiċità tagħhom.

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Meta tuża *Fentanyl-ratiopharm* ma' l-ikel u max-xorb:

L-użu fl-istess hin ta' *Fentanyl-ratiopharm* u x-xorb alkoħoliku jżid ir-riskju ta' reazzjonijiet avversi severi, u jista' jikkawża diffikultà fin-nifs, tnaqqis fil-pressjoni tad-dem, sedazzjoni profonda u koma.

Tqala u Treddigh

Itlob il-parir tat-tabib jew ta' l-ispizjar tiegħek qabel tiehu xi mediċina.

L-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm* waqt it-tqala u il-hlas (anki hlas ċesarju) mhux rakkommandat, peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tan-nifs fit-tarbija tat-twelid.

Jekk toħroġ tqila waqt kura bil-*Fentanyl-ratiopharm*, fittex il-parir tat-tabib tiegħek.

Fentanyl-ratiopharm m'għandux jintuża waqt it-tqala u r-treddiegh hlief meta jkun hemm bżonn ċar.

Is-sigurta' waqt it-tqala għada ma gietx stabbilita. Fentanyl johroġ fil-halib tas-sider u għaldastant jista' jkollu effetti sedattivi u jikkawża dipressjoni respiratorja fit-trabi li għadhom qed jerdgħu. Il-halib tas-sider li tipproduċi l-omm waqt il-kura, jew sa 72 siegħa wara li titnehha l-aħħar garża, għandu jintrema.

Sewqan u thaddim ta' magni:

Fentanyl-ratiopharm għandu effett qawwi hafna fuq il-hila tas-sewqan u l-użu ta' magni. Dan ikun iktar mistenni fil-bidu tal-kura, meta tinbidel id-doża, kif ukoll meta jintuża flimkien mal-alkoħol jew aġenti sedattivi. Jeqq kont qed tuża l-istess doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* għal zmien twil, it-tabib tiegħek jista' jtik permess biex issuq jew thaddem magni perikolużi. M'għandekx issuq jew thaddem magni perikolużi waqt l-użu ta' *Fentanyl-ratiopharm*, sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx speċifikament illi dan huwa permess.

3. KIF GHANDEK TUŻA *FENTANYL-RATIOPHARM*

Dejjem uża *Fentanyl-ratiopharm* eżattament kif ikun qallek it-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruhek mat-tabib jew ma' l-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek jiddeċidi liema doża ta' *Fentanyl-ratiopharm* hi l-iktar addatata għalik. It-tabib tiegħek jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq: kemm qed thoss uġiġh, il-kundizzjoni generali tiegħek u it-tip ta' kura għall-uġiġh li tkun irċevejt s'issa.

Skond ir-rispons tiegħek, jista' jkun hemm bżonn illi d-doża tal-garża jew in-numru tagħhom jiġumibdula. L-effett analġesiku massimu jintlaħaq sa 24 siegħa wara li tkun ingħatat l-ewwel garża u jiddgħajjef gradwalment wara li din titnehha. Twaqqafx il-kura qabel ma tfittex il-parir tat-tabib tiegħek

L-ewwel garża tibda taħdem bil-mod, u l-effett jista' jdum biex jinħass anki ġurnata, u għaldaqstant it-tabib tiegħek jista' jippreskrivilek analġesiċi oħrajn, sakemm l-effett tal-*Fentanyl-ratiopharm* jibda jinħass kif meħtieġ. Wara, il- *Fentanyl-ratiopharm* għandu jgħin biex itaffi l-uġiġh kontinwament u jista' jkun possibli li tieqaf tiehu dawn l-analġesiċi żejda. Madankollu, xorta waħda jista' jkollok bżonn ta' analġesiċi miżjuda kull tant zmien..

Kif tapplika l-*Fentanyl-ratiopharm*

- Sib post ċatt fuq il-parti ta' fuq ta' ġismek (il-fuq mil-qadd) (jew il-parti ta' fuq ta' dirghajk fejn m'hemmx pil, qsim, ponot jew xi difett iehor. Il-parti tal-ġisem ma tridx tkun irritata minhabba trattament bir-raġġi.
- Jekk il-ġilda għandha l-pil, neħhieh bl-użu ta' mqass. Tqaxxarx, għax it-tqaxxir jirrita il-ġilda. Jekk il-ġilda għandha bżonn tiġi maħsula, inħasel bl-ilma. Tużax sapun, żejt, fwejjah, alkohol, jew xi likwidu għall-ħasil tal-ġisem iehor li jista' jirrita l-ġilda. Il-ġilda trid tkun kompletament niexfa qabel ma' titwahhal il-garża.
- Il-garża trid titwahhal immedjatement wara li l-pakkett jinfetah. Wara li jitneħħa r-*release liner*, il-garża tiġi applikata fuq il-ġilda permezz ta' pressjoni ħafifa bil-pala tal-id għal madwar 30 sekonda sabiex ikun assigurat li l-garża tehel sewwa mal-ġilda. Oqghod attent li l-ġnub tal-garża jehlu sewwa.
- Garża ta' *Fentanyl-ratiopharm* is-soltu tintuża għal 72 siegħa (3 ijiem). Tista' tniżżel id-data u il-hin ta' meta applikajt il-garża fuq il-kaxxa ta' barra. Dan jista' jgħinek biex tiftakar meta l-garża għandha tinbidel.
- Il-post fejn titwahhal il-garża ma' jridx ikun espost għas-shana li ġejja minn sorsi esterni (ara "Oqghod attent ħafna bil-*Fentanyl-ratiopharm*")
- Peress li l-garża transdermali hija protetta b'film estern fuq in-naħa ta' wara li jiflah għall-ilma, tista' tintlibes wkoll waqt id-doċċa.
- Fit-tfal, in-naħa ta' fuq tad-dar huwa il-post preferibbli fejn titwahhal il-garża, biex b'hekk jitnaqqas ir-riskju li it-tifel/tifla i/tneħħi l-garża.

Kif tibdel il-garża transdermali

- Neħħi l-garża wara l-perijodu li jkun speċifikalek it-tabib. Fl-aktar każi, dan huwa wara 72 siegħa (3 ijiem), f'xi pazjenti wara 48 siegħa (2 ijiem). Is-soltu, il-garża ma' tinqalax waħedha. Jekk jibqgħu xi biċċiet tal-garża fuq il-ġilda wara li din titneħħa, dawn jistgħu jitneħħew bl-użu ta' ammonti kbar ta' ilma u sapun.
- Itwi l-garża wżata b'mod illi l-ġnub li jwahr jehlu ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, jekk ikun possibli, ħudha lura għand l-ispizjar.
- Applika garża ġdida kif spjegat qabel iżda fuq parti oħra tal-ġilda. Mill-inqas 7 ijiem iridu jkunu għaddew qabel ma' tkun tista' tintuża l-istess parti tal-ġisem.

Jekk tuża *Fentanyl-ratiopharm* aktar milli suppost

Jekk waħħalt numru ta' garzi iktar milli suppost, neħħihom u fittex il-parir tat-tabib tiegħek jew ċempel l-isptar biex tara x'inhu r-riskju.

Is-sinjali l-aktar komuni ta' doża eċċessiva huwa abilita' mnaqqsa biex tieħu n-nifs. Is-sintomi huma t-teħid tan-nifs ikun bil-mod ħafna jew in-nifs ikun dgħajef. Jekk dan isehh, neħħi il-garża u kkuntattja t-tabib minnufih. Waqt li qed tistenna l-wasla tat-tabib, zomm il-pazjent imqajjem billi tkellmu jew iċċaqalqu minn hin għall-iehor.

Sinjali u sintomi oħrajn ta' doża eċċessiva huma hedla, temperatura baxxa, rata baxxa tat-tahbit tal-qalb, tnaqqis fit-ton tal-muskoli, sedazzjoni profonda, telf ta' koordinazzjoni fil-muskoli, djuq fil-pupilla tal-għajnejn u konvulzjonijiet.

Jekk tinsa tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Taħt l-ebda ċirkostanzi ma trid tieħu doża doppja biex tpatti għal xi doża li tkun insejt tieħu. Għandek tbiddel il-garża darba kull tlett ijiem (kull 72 siegħa) fl-istess hin, sakemm it-tabib tiegħek ma' jgħidlekx mod iehor. Jekk tinsa', biddel il-garża fil-mument li tiftakar. Jekk tkun bdilt il-garża tard ħafna, tkellem mat-tabib tiegħek għax jista' jkollok bżonn ta' xi analġesiċi oħrajn.

Jekk tieqaf tuża *Fentanyl-ratiopharm*

Jekk tixtieq tinterrompi jew twaqqaf il-kura, dejjem għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek dwar ir-raġunijiet għaliex trid tieqaf mill-kura u hu parir dwar il-kura sussegwenti tiegħek. L-użu fit-tul ta' *Fentanyl-ratiopharm* jista' jirriżulta f' dipendenza fiżika. Jekk tieqaf tuża l-garża, jista' ma tħossokx sewwa.

Peress li r-riskju tal-effetti assoċjati mal-waqfien mill-kura huwa ikbar meta tiġi mwaqqfa hesrem, qatt m'għandek tieqaf mill-kura minn jeddek, imma għandek dejjem l-ewwel tfitteż il-parir tat-tabib tiegħek

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU

Bhal kull medicina oħra, *Fentanyl-ratiopharm* jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm jistgħu ma' jidhrux f' kulhadd.

It-termini li ġejjin jintużaw biex jiddeskrivu kemm il darba ġew irrapurtati l-effetti sekondarji:

Komuni hafna	isehħu f' iktar minn pazjent minn kull 10
Komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 10, iżda f' iktar minn 1 minn kull 100 pazjenti
Mhux komuni	isehħu f' inqas minn 1 kull 100, iżda f' iktar minn 1 minn kull 1,000 pazjenti
Rari	isehħu f' inqas minn 1 kull 1000, iżda f' iktar minn 1 minn kull 10000 pazjenti
Rari hafna	isehħu f' inqas minn 1 kull 10000 pazjenti, rapporti iżolati inklużi

Jekk iġġarrab xi effetti sekondarji minn dawn li ġejjin li huma serji, imma rari hafna, , minnufih għandek twaqqaf il-kura u tmur għand it-tabib tiegħek jew lejn l-isptar: dipressjoni respiratorja qawwija (qtuġh ta' nifs qawwi, hsejjes fin-nifs) jew blukkaġġ kompletament tas-sistema diġestiva (uġiġh konvulsiv, rimettar, uġiġh minhabba gass fl-istonku).

Effetti sekondarji oħrajn:

Komuni hafna: Nghas, uġiġh ta' ras, sturdament, tqallieġh, rimettar, stitikezza, zieda fl-għaraq, ħakk. Is-soltu, il-ħakk jispiċċa fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Komuni: Nghas jew ghejja kbira (effett dipressanti fuq il-moħh), nervożismu, nuqqas ta' aptit, halq xott, uġiġh ta' żaqq, reazzjonijiet tal-ġilda fil-post fejn titwahħal il-garża

Mhux komuni: Ferħ bla ebda raġuni , telf tal- memorja, problemi ta' rqad, allucinazzjonijiet, aġitazzjoni, tregħid, disturbi tas-sensi, disturbi fil-kliem u fil-lingwa, inzul jew zieda fil-pressjoni u t-thabbit tal-qalb, problemi fin-nifs, dijarea, problemi biex tghaddi l-awrina, raxx, ħmura (eritema). Is-soltu, ir-raxx u l-ħmura jisparixxu fiżmien ġurnata wara li titnehħa l-garża.

Rari: Thabbit tal-qalb irregolari, vini u arterji imwessghin, sulluzzu, akkumulazzjoni ta' ilma fil-ġisem, kesha.

Rari hafna: Rejjazzjonijiet allergiċi generali b' inzul fil-pressjoni tad-demem u/jew problemi fin-nifs (rejjazzjonijiet anafilattiċi), hsbijiet mhux normali, eċċitament eċċessiv, debbolezza, dipressjoni, ansjeta', confużjoni, funzjoni sesswali anormali, sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura, problemi fil-koordinazzjoni, aċċessjonijiet (kemm tat-tip kloniku kif ukoll grand mal), vista mnaqqsa, indeboliment tas-sistema respiratorja (dipressjoni

respiratorja), waqfien tas-sistema respiratorja (apneja), nefha fl-istonku bl-uġiġh, blukkaġġ tas-sistema diġestiva, uġiġh fil-bużżieqa tal-awrina, produzzjoni mnaqqsa ta' awrina (eskrezzjoni mnaqqsa tal-awrina).

Jekk ilek tuża l-*Fentanyl-ratiopharm* għal żmien twil, jita' jagħti l-każ li l-effett tiegħu jibda' jinħass inqas, tant illi d-doża trid tiġi rranġata (jista' tkun żviluppata rezistenza). Tista' tiżviluppa dipendenza fiżika wkoll u tista' tbatu minn sintomi assoċjati mal-waqfien tal-kura jekk tiegħaf hesrem mill-kura tiegħek. Dawn is-sintomi jinkludu tqallieġh, rimettar, dijarea, ansjeta' u tregħid.

Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnotta xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN *FENTANYL-RATIOPHARM*

Żomm il-medicina fejn ma tintlaħaqx u ma tidhirx mit-tfal, ukoll wara li tispicċa minnha. Kwantitajiet kbar tas-sustanza attiva jibqgħu fil-garża transdermali wkoll wara li tkun spicċajt mill-użu tagħha.

Tużax *Fentanyl-ratiopharm* wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-pakkett. Id-data ta' skadenza tirreferi għal l-aħhar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

Għall-protezzjoni ta' l-ambjent u minhabba raġunijiet ta' sigurta', il-garża wżata kif ukoll dawk mhux użati jew skaduti għandhom jintremew jew jittiehdu lura għand l-ispizjar. Il-garża wżata trid tiġi mitwija fi tnejn biż-żewġ naħat li jwahaħlu mwahaħlin ma' xulxin. Poġġi l-garża wżata lura fil-pakkett ta' barra u armiha, jew, meta jkun possibli, hudha lura għand l-ispizjar.

6. AKTAR TAGHRIF

X'fih *Fentanyl-ratiopharm*

- Is-sustanza attiva hi fentanyl.
Kull garża terhi 100 mikrogramma fentanyl fis-sieġha. Kull garża ta' 30 cm² fiha 16.5 mg fentanyl.
- Is-sustanzi l-oħra huma :
Saff li jwahaħhal: Saff li jwahaħhal magħmul minn Polyacrylate
Foġl warrani: Foġl magħmul minn Polypropylene, Linka għall-istampar kaħlanija
Release liner: Foġl magħmul minn Polyethylene terephthalate (bis-silicone)

Id-Dehra ta' *Fentanyl-ratiopharm* u d-daqs tal-pakkett:

Fentanyl-ratiopharm hija garża trasparenti li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda bil-parti ta' wara li twahaħhal biex b'hekk tkun tista' titwahaħhal mal-ġilda. Il-garża transdermali għandha is-qawwa partikolari tagħha stampata b'linka kaħlanija fuq il-parti ta' wara.

Fentanyl-ratiopharm huwa disponibbli f'pakketti ta' 3, 5, 10 jew 20 il-garża li tipprovdi medicina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

Id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

[Ara Anness I – Biex timtela mill-pajjiż partikolari]

{Isem u indirizz}

{telefon}
{fax}
{e-mail}

Manifattur:

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Il-Ġermanja

Dan il-prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-istati membri ta' l-EEA b'dawn l-ismijiet :

<DE/H/0739/04/MR>

L-Awstrija	Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h transdermales Matrixpflaster
Il-Ġermanja	Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h Matrixpflaster
Spanja	Fentanilo Matrix ratiopharm 100 microgramos/h parches transdémicos EFG
Franza	Fentanyl ratiopharm 100 µg/h, dispositif transdermique
L-Olanda	Fentanyl ratiopharm 100 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Ir-Renju Unit	Telfanyl 100 microgram/hr Transdermal patch

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f' {XX/SSSS}

[Biex timtela mill-pajjiż partikolari]