

<u>Número de autorización en la UE</u>	<u>Nombre de fantasía</u>	<u>Concen-tración</u>	<u>Forma farmacéutica</u>	<u>Espe-cies de destino</u>	<u>Vía de administra-ción</u>	<u>Tipo de envase</u>	<u>Conteni-do</u>	<u>Formato</u>	<u>Tiempo de espera</u>
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y equino	Bovino: vía subcutánea o intravenosa Porcino: vía intramuscular Equino: vía intravenosa	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Bovino Carne: 15 días Leche: 5 días Porcino y equino Carne: 5 días
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y equino	Bovino: vía subcutánea o intravenosa Porcino: vía intramuscular Equino: vía intravenosa	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Bovino Carne: 15 días Leche: 5 días Porcino y equino Carne: 5 días
EMA/V/C/002283	Emdocam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y equino	Bovino: vía subcutánea o intravenosa Porcino: vía intramuscular Equino: vía intravenosa	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Bovino Carne: 15 días Leche: 5 días Porcino y equino Carne: 5 días
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Oral	Vial (polietileno)	125 ml	1 vial	Carne: 3 días
EMA/V/C/002283/X/013	Emdocam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Oral	Vial (polietileno)	336 ml	1 vial	Carne: 3 días
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solución inyectable	Perros y gatos	Perros: vía subcutánea o intravenosa Gatos: vía subcutánea	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	No procede

EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solución inyectable	Perros y gatos	Perros: vía subcutánea o intravenosa Gatos: vía subcutánea	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	No procede
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y porcino	Bovino: vía subcutánea o intravenosa Porcino: vía intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Bovino: Carne: 15 días Porcino: Carne: 5 días
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y porcino	Bovino: vía subcutánea o intravenosa Porcino: vía intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Bovino: Carne: 15 días Porcino: Carne: 5 días
EMA/V/C/002283/X/012	Emdocam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y porcino	Bovino: vía subcutánea o intravenosa Porcino: vía intramuscular	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Bovino: Carne: 15 días Porcino: Carne: 5 días