

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos)	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (polietileno)	10 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (polietileno)	32 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (polietileno)	100 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Perros y gatos	Vía subcutánea o intravenosa (perros), vía subcutánea (gatos)	Vial (vidrio)	10 ml	1 vial	No procede
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Vía oral	Frasco (polietileno)	100 ml	1 frasco	Carne: 3 días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos)	Vial (vidrio)	100 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Perros y gatos	Vía subcutánea o intravenosa (perros), vía subcutánea (gatos)	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	No procede
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (polietileno)	15 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (polietileno)	30 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97004/014	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	50 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	100 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos, cobayas	Vía oral	Polietileno frasco	15 ml	1 frasco	No procede

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	20 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (polietileno)	180 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Vía oral	Frasco (polietileno)	250 ml	1 frasco	Carne: 3 días
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, cerdos y equino	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos), vía intravenosa (equino)	Vial (vidrio)	250 ml	6 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos/ equino) Leche: 5 días
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos, cobayas	Vía oral	Polietileno frasco	10 ml	1 frasco	No procede

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos, cobayas	Vía oral	Polietileno frasco	3 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea o intravenosa (bovino); vía intramuscular (cerdos)	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos)	Vial (vidrio)	20 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos)	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea o intravenosa (bovino), vía intramuscular (cerdos)	Vial (vidrio)	50 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Solución inyectable	Gatos	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	10 ml	1 vial	No procede
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Solución inyectable	Gatos	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	No procede
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspensión oral	Cerdos	Vía oral	Frasco (polietileno)	100 ml	1 frasco	Carne: 5 días
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspensión oral	Cerdos	Vía oral	Frasco (polietileno)	250 ml	1 frasco	Carne: 5 días
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Vía oral	Blisters (Alu/Alu)	7 comprimidos	1 blister (7 comprimidos)	No procede

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Vía oral	Blisters (Alu/Alu)	7 comprimidos	12 blisters (84 comprimidos)	No procede
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Vía oral	Blisters (Alu/Alu)	7 comprimidos	36 blisters (252 comprimidos)	No procede
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Vía oral	Blisters (Alu/Alu)	7 comprimidos	1 blister (7 comprimidos)	No procede
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Vía oral	Blisters (Alu/Alu)	7 comprimidos	12 blisters (84 comprimidos)	No procede
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Vía oral	Blisters (Alu/Alu)	7 comprimidos	36 blisters (252 comprimidos)	No procede
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos, cobayas	Vía oral	Polietileno frasco	30 ml	1 frasco	No procede
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y equino	Vía intravenosa (bovino y equino), vía subcutánea (bovino)	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (equino) Leche: 5 días (bovino)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y equino	Vía intravenosa (bovino y equino), vía subcutánea (bovino)	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (equino) Leche: 5 días (bovino)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y equino	Vía intravenosa (bovino y equino), vía subcutánea (bovino)	Vial (vidrio)	50 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (equino) Leche: 5 días (bovino)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y equino	Vía intravenosa (bovino y equino), vía subcutánea (bovino)	Vial (vidrio)	100 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (equino) Leche: 5 días (bovino)