

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/04/042/001	Novem	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos)
EU/2/04/042/002	Novem	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos)
EU/2/04/042/003	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/004	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/005	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/006	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/007	Novem	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/04/042/008	Novem	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	20 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/04/042/009	Novem	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)
EU/2/04/042/010	Novem	5 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovino), 5 días (cerdos)

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/04/042/011	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	20 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/012	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/013	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	12 viales	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/014	Novem	20 mg/ml	Solución inyectable	Bovino y cerdos	Vía subcutánea; vía intramuscular	Vial (vidrio)	250 ml	6 viales	Carne: 15 días (bovinos), 5 días (cerdos) Leche: 5 días
EU/2/04/042/015	Novem	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 15 días Leche: 5 días
EU/2/04/042/016	Novem	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 15 días Leche: 5 días
EU/2/04/042/017	Novem	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	50 ml	12 viales	Carne: 15 días Leche: 5 días
EU/2/04/042/018	Novem	40 mg/ml	Solución inyectable	Bovino	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	100 ml	12 viales	Carne: 15 días Leche: 5 días