

<u>Número de autorización de comercialización de la UE</u>	<u>Denominación (de fantasía)</u>	<u>Dosis</u>	<u>Forma farmacéutica</u>	<u>Vía de administración</u>	<u>Acondicionamiento primario</u>	<u>Contenido (concentración)</u>	<u>Tamaño del envase</u>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- ¹	Suspensión inyectable	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0,5 ml	1 jeringa precargada
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- ¹	Suspensión inyectable	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0,5 ml	1 jeringa precargada + 1 aguja
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- ¹	Suspensión inyectable	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0,5 ml	10 jeringas precargadas
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- ¹	Suspensión inyectable	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0,5 ml	10 jeringas precargadas + 10 agujas
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- ¹	Suspensión inyectable	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0,5 ml	50 jeringas precargadas
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- ¹	Suspensión inyectable	Vía intramuscular	jeringa precargada (vidrio)	0,5 ml	50 jeringas precargadas + 50 agujas

--¹ --¹

Una dosis (0,5 ml) contiene:

Polisacárido del serotipo neumocócico 1 ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 3 ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 4 ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 5 ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 6A ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 6B ^{1 2}	4,4 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 7F ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 8 ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 9V ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 10A ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 11A ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 12F ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 14 ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 15B ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 18C ^{1 2}	2,2 µg
Polisacárido del serotipo neumocócico 19A ^{1 2}	2,2 µg
Pneumococcal polysaccharide serotype 19F ^{1 2}	2.2 µg

<u>Número de autorización de comercialización de la UE</u>	<u>Denominación (de fantasía)</u>	<u>Dosis</u>	<u>Forma farmacéutica</u>	<u>Vía de administración</u>	<u>Acondicionamiento primario</u>	<u>Contenido (concentración)</u>	<u>Tamaño del envase</u>
	Pneumococcal polysaccharide serotype 22F ^{1 2}					2.2 µg	
	Pneumococcal polysaccharide serotype 23F ^{1 2}					2.2 µg	
	Pneumococcal polysaccharide serotype 33F ^{1 2}					2.2 µg	

¹ Conjugado con la proteína transportadora CRM₁₉₇ (aproximadamente 51 µg por dosis)

² Adsorbido en fosfato de aluminio (0,125 mg de aluminio por dosis)