



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/206131/2014
EMA/V/C/002746

Vectra Felis (*dinotefuran / piriproxifeno*)

Información general sobre Vectra Felis y sobre los motivos por los que se autoriza su uso en la UE

¿Qué es Vectra Felis y para qué se utiliza?

Vectra Felis es un medicamento veterinario que se utiliza para tratar y prevenir las infestaciones por pulgas en gatos. También evita la eclosión y el desarrollo de las pulgas en el entorno del gato.

¿Cómo se usa Vectra Felis?

Vectra Felis se presenta en solución para unción dorsal puntual en una pipeta y puede obtenerse sin receta. Se administra el contenido de un aplicador completo de Vectra Felis sobre la piel del gato, tras apartar el pelo, en la base de la cabeza. Se recomienda tratar a los gatos por la noche. Después de un tratamiento único, Vectra Felis evita que haya pulgas durante un mes y bloquea el ciclo de vida de las pulgas, evitando así la infestación en el entorno del gato durante tres meses. La necesidad de volver a tratar a los gatos y el intervalo de tiempo entre los tratamientos requiere una evaluación veterinaria.

¿Cómo actúa Vectra Felis?

Vectra Felis actúa como un ectoparasiticida, lo que significa que mata los parásitos que aparecen en la piel o en el pelo de los animales, como las pulgas que se alimentan en la piel del animal.

El dinotefuran es un insecticida que mata a los insectos actuando sobre los receptores (diana) en su sistema nervioso, los denominados «receptores nicotínicos de la acetilcolina». El piriproxifeno es un regulador del crecimiento de insectos que detiene el ciclo de vida de la pulga al provocar la producción de huevos infecundos, y bloqueando el desarrollo de la pulga en sus etapas inmaduras.

¿Qué beneficios ha demostrado tener Vectra Felis en los estudios realizados?

La eficacia de Vectra Felis contra las pulgas se ha investigado en un amplio número de estudios de laboratorio y en un estudio de campo.

El estudio de campo incluyó a 129 gatos con infestación por pulgas, que fueron tratados una vez al mes durante tres meses consecutivos con Vectra Felis u otro producto en pipeta que contenía dos principios activos diferentes, fipronil y (S)-metopreno, que controlan las pulgas. El estudio de campo

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



demostró que Vectra Felis fue tan eficaz como el producto de comparación y redujo los recuentos de pulgas un 91 % durante el periodo de estudio de 84 días.

¿Cuáles son los riesgos asociados a Vectra Felis?

Los efectos adversos más frecuentes observados con Vectra Felis (que pueden afectar a uno de cada 1000 gatos) son una descamación ligera de la piel, enrojecimiento temporal y picor o pérdida temporal de pelo en el punto de aplicación. Estos signos suelen desaparecer al interrumpir el tratamiento.

Vectra Felis no debe utilizarse en gatos o gatitos que pesen menos de 0,6 kg.

Para consultar la lista completa de efectos adversos notificados sobre Vectra Felis, ver el prospecto.

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o entra en contacto con el animal?

Deberá lavarse las manos inmediatamente después del uso.

Debe evitarse el contacto con la piel, los ojos o la boca.

En caso de vertido accidental en la piel, la zona debe lavarse inmediatamente con agua y jabón.

Si se produce una exposición accidental en los ojos, deberán enjuagarse con agua con los párpados abiertos y durante un período de tiempo suficiente.

Si la irritación de los ojos o la piel persisten, o si se ingiere por accidente el medicamento de uso veterinario, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta del medicamento.

Las personas con hipersensibilidad (alergia) conocida a cualquiera de los componentes deben evitar todo contacto con el producto.

No se debe tener contacto con los gatos tratados durante al menos ocho horas tras la administración del medicamento de uso veterinario. El día del tratamiento no debe permitirse que los gatos tratados duerman con sus dueños, especialmente con niños.

Los aplicadores utilizados deberán ser retirados inmediatamente y no se dejarán al alcance o la vista de los niños.

¿Por qué se ha autorizado Vectra Felis en la UE?

La Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Vectra Felis son mayores que sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE.

Otras informaciones sobre Vectra Felis:

Vectra Felis recibió una autorización de comercialización válida en toda la UE el 6 de junio de 2014.

Puede encontrar información adicional sobre Vectra Felis en la página web de la Agencia: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vectra-felis.

Fecha de la última actualización de este resumen: septiembre de 2019.