

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Vahetu sisepakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/20/262/001	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lüofilisaat ja süstesuspensioon	Sead	Intramuskulaarne kasutamine	Lüofilisaat: viaal (klaas); suspensioon : viaal (klaas)	Lüofilisaat: 10 annust (10 ml); suspensioon: 20 ml	Lüofilisaat: 1 viaal; suspensioon : 1 viaal	Nullpäevad
EU/2/20/262/002	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lüofilisaat ja süstesuspensioon	Sead	Intramuskulaarne kasutamine	Lüofilisaat: viaal (klaas); suspensioon : viaal (PET)	Lüofilisaat: 10 annust (10 ml); suspensioon: 20 ml	Lüofilisaat: 1 viaal; suspensioon : 1 viaal	Nullpäevad
EU/2/20/262/003	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lüofilisaat ja süstesuspensioon	Sead	Intramuskulaarne kasutamine	Lüofilisaat: viaal (klaas); suspensioon : viaal (klaas)	Lüofilisaat: 25 annust (10 ml); suspensioon: 50 ml	Lüofilisaat: 1 viaal; suspensioon : 1 viaal	Nullpäevad
EU/2/20/262/004	Enteroporc Coli AC	-- ¹	Lüofilisaat ja süstesuspensioon	Sead	Intramuskulaarne kasutamine	Lüofilisaat: viaal (klaas); suspensioon : viaal (PET)	Lüofilisaat: 25 annust (10 ml); suspensioon: 50 ml	Lüofilisaat: 1 viaal; suspensioon : 1 viaal	Nullpäevad

--¹ *C. perfringens*'i komponendid:

- A-tüüpi alfatoksoid ≥ 125 rU/ml*
- C-tüüpi beeta1-toksoid ≥ 3354 rU/ml*
- A-tüüpi beeta2-toksoid ≥ 794 rU/ml*

E. coli komponendid:

- fimbriaalne adhesiin F4ab ≥ 23 rU/ml*
- fimbriaalne adhesiin F4ac ≥ 19 rU/ml*
- fimbriaalne adhesiin F5 ≥ 13 rU/ml*
- fimbriaalne adhesiin F6 ≥ 37 rU/ml*

* Toksoidi ja fimbriaalse adhesiini sisaldus suhtelistes ühikutes (*relative unit*, rU) milliliitri kohta, määratud ELISA abil sisestandardi alusel.