

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Veis ja siga	Subkutaanne või intravenoosne (veis); intramuskulaarne (siga)	Viaal (klaasist)	100 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Koer	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	10 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Koer	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	32 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Koer	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	100 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Koer ja kass	Subkutaanne või intravenoosne (koer); subkutaanne (kass)	Viaal (klaasist)	10 ml	1 viaal	Ei rakendata
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	50 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	100 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Hobune	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	100 ml	1 pudel	Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Veis ja siga	Subkutaanne või intravenoosne (veis); intramuskulaarne (siga)	Viaal (klaasist)	100 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veis), 5 päeva (siga)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Koer ja kass	Subkutaanne või intravenoosne (koer), subkutaanne (kass)	Viaal (klaasist)	20 ml	1 viaal	Ei rakendata
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Koer	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	15 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Koer	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	30 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	50 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	100 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Kass, merisiga	Suukaudne	Polüetüleen pudel	15 ml	1 pudel	Ei rakendata

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	20 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	20 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Koer	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	180 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Hobune	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	250 ml	1 pudel	Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	250 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga ja hobune	Subkutaanne või intravenoosne (veis), intramuskulaarne (siga), intravenoosne (hobune)	Viaal (klaasist)	250 ml	6 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel/hobustel) Piimale: 5 päeva
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Kass, merisiga	Suukaudne	Polüetüleen pudel	10 ml	1 pudel	Ei rakendata

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Kass, merisiga	Suukaudne	Polüetüleen pudel	3 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Veis ja siga	Subkutaanne või intravenoosne (veis); intramuskulaarne (siga)	Viaal (klaasist)	20 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Veis ja siga	Subkutaanne või intravenoosne (veis); intramuskulaarne (siga)	Viaal (klaasist)	20 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Veis ja siga	Subkutaanne või intravenoosne (veis); intramuskulaarne (siga)	Viaal (klaasist)	50 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Süstelahus	Veis ja siga	Subkutaanne või intravenoosne (veis); intramuskulaarne (siga)	Viaal (klaasist)	50 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (sigadel)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Süstelahus	Kass	Subkutaanne	Viaal (klaasist)	10 ml	1 viaal	Ei rakendata
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Süstelahus	Kass	Subkutaanne	Viaal (klaasist)	20 ml	1 viaal	Ei rakendata
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Siga	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	100 ml	1 pudel	Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Siga	Suukaudne	Pudel (polüetüleen)	250 ml	1 pudel	Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Närimistabletid	Koer	Suukaudne	Blistrid (alu/alu)	7 tabletti	1 blister (7 tabletti)	Ei rakendata

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Närimistabletid	Koer	Suukaudne	Blistrid (alu/alu)	7 tabletti	12 blisterid (84 tabletti)	Ei rakendata
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Närimistabletid	Koer	Suukaudne	Blistrid (alu/alu)	7 tabletti	36 blisterid (252 tabletti)	Ei rakendata
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Närimistabletid	Koer	Suukaudne	Blistrid (alu/alu)	7 tabletti	1 blister (7 tabletti)	Ei rakendata
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Närimistabletid	Koer	Suukaudne	Blistrid (alu/alu)	7 tabletti	12 blisterid (84 tabletti)	Ei rakendata
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Närimistabletid	Koer	Suukaudne	Blistrid (alu/alu)	7 tabletti	36 blisterid (252 tabletti)	Ei rakendata
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Suukaudne suspensioon	Kass, merisiga	Suukaudne	Polüetüleen pudel	30 ml	1 pudel	Ei rakendata
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Süstelahus	Veis ja hobune	Intravenoosne (veis ja hobune); subkutaanne (vais)	Viaal (klaasist)	50 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (hobustel) Piimale: 5 päeva (veistel)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Süstelahus	Veis ja hobune	Intravenoosne (veis ja hobune); subkutaanne (vais)	Viaal (klaasist)	100 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (hobustel) Piimale: 5 päeva (veistel)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Süstelahus	Veis ja hobune	Intravenoosne (veis ja hobune); subkutaanne (vais)	Viaal (klaasist)	50 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (hobustel) Piimale: 5 päeva (veistel)

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Süstelahus	Veis ja hobune	Intravenoosne (veis ja hobune); subkutaanne (vais)	Viaal (klaasist)	100 ml	12 viaali	Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva (veistel), 5 päeva (hobustel) Piimale: 5 päeva (veistel)