

**Artikli 127a alusel vastu võetud lisa
Ravimpreparaadi ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused ja piirangud liikmesriikides
rakendamiseks**

Ravimpreparaadi ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused ja piirangud liikmesriikides rakendamiseks

Liikmesriik peab tagama, et kõik järgnevalt loetletud ravimpreparaadi ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused ja piirangud on rakendatud:

1. Müügiloo hoidja peab vastava riikliku pädeva asutusega kooskõlastama kontrollitud juurdepääsu programmi üksikasjad ja rakendama selle programmi üleriigiliselt, tagamaks et:
 - enne ravimi väljakirjutamist (kui see on asjakohane ja vastab kokkuleppele riikliku pädeva asutusega – enne ravimi väljastamist) saavad kõik Pomalidomide Krka't välja kirjutada (ja väljastada) kavatsevad tervishoiutöötajad tervishoiutöötaja teabepaketi, milles on:
 - tervishoiutöötaja koolitusbrošüür;
 - patsientide koolitusbrošüürid;
 - patsiendikaart;
 - riskiteadlikkuse vormid;
 - teave uusima ravimi omaduste kokkuvõtte (SPC) leidmiseks.
2. Müügiloo hoidja peab igas liikmesriigis rakendama raseduse ennetusprogrammi (*Pregnancy Prevention Programme*; PPP). Raseduse ennetusprogrammi üksikasjad peavad olema kooskõlastatud iga liikmesriigi riikliku pädeva asutusega ja paika pandud enne ravimi turuletoomist.
3. Müügiloo hoidja peab enne ravimi turuletoomist kooskõlastama tervishoiutöötajate teabepaketi sisu iga liikmesriigi pädeva asutusega ja tagama, et need materjalid sisaldavad allpool kirjeldatud põhielemente.
4. Müügiloo hoidja peab kokku leppima kontrollitud juurdepääsu programmi elluviimise igas liikmesriigis.

Kohustuslikud põhielemendid

Tervishoiutöötaja teabepakett

Tervishoiutöötaja teabepakett peab sisaldama järgmisi elemente:

Tervishoiutöötaja koolitusbrošüür

- Lühike taustateave pomalidomiidi kohta.
- Määratud ravikuuri maksimaalne kestus:
 - Rasestumisvõimelistel naistel 4 nädalat
 - Meestel ja rasestumisvõimetutel naistel 12 nädalat
- Vajadus vältida kokkupuudet lootegea pomalidomiidi teratogeensuse tõttu loomadele ning pomalidomiidi eeldatava teratogeense toime tõttu inimestele.
- Suunised tervishoiutöötajatele ja hooldajatele Pomalidomide Krka blistri või kapsli käsitlemiseks.
- Tervishoiutöötaja kohustused Pomalidomide Krka väljakirjutamisel või väljastamisel:
 - Kindlustada patsientide kõikehõlmav teavitamine ja nõustamine
 - Veenduda, et patsient on suuteline järgima Pomalidomide Krka ohutu kasutamise nõudeid
 - Varustada patsient vastava koolitusbrošüüri, patsiendikaardi ja/või samaväärse vahendiga
- Ohutusteave kõikidele patsientidele
 - Trombotsütoopenia kirjeldus ja ravijuhised, sh kliinilistes uuringutes ilmnunud esinemissagedused
 - Südamepuudulikkuse kirjeldus ja ravi
 - Riiklikud erinõuded pomalidomiidi väljakirjutamisele
 - Nõue tagastada kõik kasutamata kapslid ravi lõpus apteekrile
 - Patsient ei tohi ravi ajal (ega ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast Pomalidomide Krka kasutamise lõpetamist verd annetada
- Raseduse ennetusprogrammi (PPP) kirjeldus ning patsientide rühmitamine soo ja rasestumisvõime alusel
 - Raseduse ennetusprogrammi rakendamise algoritm
 - Rasestumisvõimelise naise määratlus ja toimingud, mida ravimi väljakirjutaja peab tegema, kui ta ei ole kindel
- Ohutusteave rasestumisvõimelistele naistele
 - Vajadus vältida loote kokkupuudet
 - Raseduse ennetusprogrammi kirjeldus
 - Tõhusa rasestumisvastase meetodi kasutamise vajadus (isegi kui naisel on amenorröa) ja tõhusa rasestumisvastase meetodi määratlus
 - Et ta peab oma rasestumisvastase meetodi vahetamise või selle kasutamise lõpetamise vajaduse korral teavitama:
 - Rasestumisvastast vahendit väljakirjutavat arsti pomalidomiidi kasutamisest
 - Pomalidomiidi väljakirjutavat arsti rasestumisvastase meetodi vahetamisest või selle

- kasutamise lõpetamisest
 - Rasedustestide tegemise kord
 - Teave sobivate testide kohta
 - Enne ravi alustamist
 - Ravi ajal rasestumisvastase meetodi põhjal
 - Pärast ravi lõppu
 - Vajadus raseduse kahtluse korral ravi Pomalidomide Krka'ga kohe lõpetada
 - Vajadus võtta raseduse kahtluse korral kohe ühendust raviarstiga
- Ohutusteave meestele
 - Vajadus vältida loote kokkupuudet
 - Vajadus kasutada kondoomi, kui seksuaalpartner on rase või rasestumisvõimeline naine, kes ei kasuta tõhusat rasestumisvastast vahendit (isegi juhul, kui mehele on tehtud vasektoomia)
 - Ravi ajal Pomalidomide Krka'ga
 - Vähemalt 7 päeva jooksul pärast viimast annust
 - Ravi ajal Pomalidomide Krka'ga (sh ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist ei ole lubatud annetada spermat
 - Kui meessoost patsiendi partner rasestub patsiendi ravi ajal Pomalidomide Krka'ga või varsti pärast ravi Pomalidomide Krka'ga, peab mees sellest kohe teatama oma raviarstile
- Nõuded rasestumise korral
 - Korraldus naispatsiendi raseduse kahtluse korral lõpetada kohe ravi Pomalidomide Krka'ga
 - Patsient tuleb suunata teratoloogiale spetsialiseerunud või vastava pädevusega arsti konsultatsioonile diagnostiliseks hindamiseks ja nõustamiseks
 - Kohalikud kontaktandmed viivitamatuks teatamiseks raseduse kahtlusest
 - Rasedusest teavitamise vorm
- Kohalikud kontaktandmed kõrvaltoimetest teatamiseks

Patsientide koolitusbrošüürid

Patsientide koolitusbrošüürid peavad olema 3 tüüpi:

- Brošüür rasestumisvõimelistele naispatsientidele ja nende partneritele
- Brošüür rasestumisvõimetutele naispatsientidele
- Brošüür meespatsientidele

Kõik patsientide koolitusbrošüürid peavad sisaldama järgmisi elemente:

- Pomalidomiid on teratogeenne loomadele ja on eeldatavalt teratogeenne inimestele
- Pomalidomiid võib põhjustada trombotsütopeeniat ning vajalikud on regulaarsed vereanalüüsid
- Patsiendikaardi kirjeldus ja selle vajalikkuse põhjendus
- Juhised Pomalidomide Krka käsitlemiseks patsientidele, hooldajatele ja pereliikmetele
- Riiklikud või muud erinõuded Pomalidomide Krka väljastamiseks väljakirjutamisel
- Patsient ei tohi anda Pomalidomide Krka't kellelegi teisele
- Patsient ei tohi ravi ajal Pomalidomide Krka'ga (sh ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist olla veredoonor
- Patsient peab oma arstile teatama kõigist kõrvaltoimetest
- Pärast ravi lõppu tuleb kõik kasutamata kapslid tagastada apteekrile

Lisaks peab vastavates brošüürides olema järgmine teave.

Brošüür rasestumisvõimelistele naispatsientidele

- Vajadus vältida loote kokkupuudet
- Raseduse ennetusprogrammi kirjeldus
- Tõhusa rasestumisvastase vahendi kasutamise vajadus ja tõhusa rasestumisvastase vahendi määratlus
- Et ta peab oma rasestumisvastase meetodi vahetamise või selle kasutamise lõpetamise vajaduse korral teavitama:
 - Rasestumisvastast vahendit väljakirjutavat arsti pomalidomiidi kasutamisest
 - Pomalidomiidi väljakirjutavat arsti rasestumisvastase meetodi vahetamisest või selle kasutamise lõpetamisest
- Rasedustestide tegemise kord
 - Enne ravi alustamist
 - Ravi ajal (sh ravikatkestuste ajal) vähemalt iga 4 nädala järel, välja arvatud juhul kui on kinnitatud munajuhade kirurgiline sulgemine
 - Pärast ravi lõpetamist

- Vajadus raseduse kahtluse korral ravi Pomalidomide Krka'ga kohe lõpetada
- Vajadus raseduse kahtluse korral sellest kohe oma arstile teatada

Brošüür meessoost patsientidele

- Vajadus vältida loote kokkupuudet
- Vajadus kasutada kondoomi, kui seksuaalpartner on rase või rasestumisvõimeline naine, kes ei kasuta tõhusat rasestumisvastast vahendit (isegi juhul, kui mehele on tehtud vasektoomia)
 - Ravi ajal Pomalidomide Krka'ga (sh ravikatkestuste ajal)
 - Vähemalt 7 päeva jooksul pärast viimast annust
- Vajadus partneri rasestumisest kohe oma raviarstile teatada
- Ravi ajal Pomalidomide Krka'ga (sh ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist ei ole lubatud annetada spermat ehk seemnevedelikku

Patsiendikaart või samaväärne vahend

Patsiendikaart peab sisaldama järgmisi elemente:

- Kinnitus, et vastav nõustamine on toimunud
- Dokumenteeritud rasestumisvõime staatus
- Vastav kastike, mille arst märgib ristiga kinnitades, et patsient kasutab efektiivset rasestumisvastast vahendit (kui on rasestumisvõimeline naine)
- Rasedustestide kuupäevad ja tulemused

Riskiteadlikkuse vormid

Riskiteadlikkuse vorme peab olema 3 tüüpi:

- Rasestumisvõimelistele naistele
- Rasestumisvõimetutele naistele
- Meessoost patsiendile

Kõik riskiteadlikkuse vormid peavad sisaldama järgmisi elemente:

- hoiatus teratogeensuse riskist;
- patsiendid on saanud vastava nõustamise enne ravi alustamist;
- patsiendi kinnitus, et ta saab aru pomalidomiidi riskist ja raseduse ennetusprogrammi meetmetest;
- nõustamise kuupäev;
- patsiendi andmed, allkiri ja kuupäev;
- ravimi väljakirjutaja nimi, allkiri ja kuupäev;
- selle dokumendi eesmärk on (vastavalt raseduse ennetusprogrammis kirjeldatule): „Riskiteadlikkuse vormi eesmärk on kaitsta patsiente ja potentsiaalset loodet, tagades, et patsiendid on täielikult informeeritud ja mõistavad teratogeensuse ja muude pomalidomiidi kasutamisega seotud kõrvaltoimete riski. Tegemist ei ole lepinguga ja see ei vabasta kedagi tema kohustustest seoses ravimi ohutu kasutamise ja loote kokkupuute vältimisega.“

Rasestumisvõimeliste naiste riskiteadlikkuse vorm peab sisaldama lisaks:

- Kinnitust, et arst on patsienti teavitanud järgmisest:
 - vajadus vältida loote kokkupuudet;
 - kui ta on rase või planeerib rasedust, ei tohi ta pomalidomiidi võtta;
 - ta saab aru vajadusest vältida pomalidomiidi kasutamist raseduse ajal ning kasutada katkestusteta efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid vähemalt 4 nädalat enne ravi alustamist, kogu ravi ajal ja vähemalt 4 nädalat pärast ravi lõppu;
 - ta peab oma rasestumisvastase meetodi vahetamise või selle kasutamise lõpetamise vajaduse korral teavitama:
 - rasestumisvastast vahendit väljakirjutavat arsti Pomalidomide Krka kasutamisest
 - Pomalidomide Krka't väljakirjutavat arsti rasestumisvastase meetodi vahetamisest või selle kasutamise lõpetamisest;
 - rasedustestide tegemise vajadus, st enne ravi, ravi ajal vähemalt iga 4 nädala järel ja pärast ravi;
 - vajadus raseduse kahtluse korral ravi Pomalidomide Krka'ga kohe lõpetada;
 - vajadus võtta raseduse kahtluse korral kohe ühendust oma arstiga;
 - ta ei tohi anda oma ravimit mitte ühelegi teisele inimesele;
 - ta ei tohi loovutada verd ravi ajal (sh ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast Pomalidomide Krka'ga ravi lõpetamist;
 - ta peab kasutamata kapslid pärast ravi lõpetamist tagastama apteekrile.

Rasestumisvõimetute naiste riskiteadlikkuse vorm peab sisaldama lisaks:

- kinnitust, et arst on patsienti teavitanud järgmisest:

- ta ei tohi anda oma ravimit mitte ühelegi teisele inimesele;
- ta ei tohi loovutada verd ravi ajal (sh ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast Pomalidomide Krka'ga ravi lõpetamist;
- ta peab kasutamata kapslid pärast ravi lõpetamist tagastama apteekrile.

Meessoost patsientide riskiteadlikkuse vorm peab sisaldama lisaks:

- kinnitust, et tervishoiutöötaja on patsienti teavitanud järgmisest:

- vajadus vältida loote kokkupuudet;
- pomalidomiid eritub spermasse ning seksuaalvahekorra ajal raseda või rasestumisvõimelise naispartneriga, kes ei kasuta efektiivset rasestumisvastast vahendit, on vaja kasutada kondoomi (isegi juhul, kui mehele on tehtud vasektoomia);
- tema partneri rasestumisel peab ta oma raviarsti kohe teavitama ja kasutama alati kondoomi;
- ta ei tohi anda oma ravimit mitte ühelegi teisele inimesele;
- ravi ajal Pomalidomide Krka'iga (sh ravikatkestuste ajal) ja vähemalt 7 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist ei tohi ta annetada verd ega spermat;
- ta peab kasutamata kapslid pärast ravi lõpetamist tagastama apteekrile.