

I LISA
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erivedge 150 mg kõvakapslid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg vismodegiibi.

Teadaolevat toimet omav abiaine

Üks kõvakapsel sisaldab 71,5 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Kõvakapsel (kapsel).

Roosal läbipaistmatul kapsli kehal on märgistus „150 mg“ ja hallil läbipaistmatul kaanel on musta tindiga märgistus „VISMO“. Kapsel (mõõtmatega 19,0 x 6,6 mm) vastab 'suurusele 1'.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Erivedge on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on:

- sümptomaatiline metastaatiline basaalrakk-kartsinoom
- lokaalselt kaugelearenenud basaalrakk-kartsinoom, mille puhul on kirurgiline ravi või kiiritusravi sobimatu (vt lõik 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Erivedge't tohib määrata ja ravi peab toimuma ainult vastava haiguse ravikogemusega spetsialisti järelevalve all.

Annustamine

Soovitav annus on üks 150 mg kapsel üks kord ööpäevas.

Vahelejäänud annused

Kui annus jääb manustamata, tuleb patsiente juhendada, et nad jätaksid unustatud annuse võtmata ning võtaksid järgmise annuse selleks ettenähtud ajal.

Ravi kestus

Kliinilistes uuringutes jätkati ravi Erivedge'ga kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni. Lubatud olid kuni 4nädalased ravi katkestused individuaalsest taluvusest lähtuvalt.

Regulaarselt tuleb hinnata ravi jätkamisest saadavat kasu; optimaalne ravi kestus on iga patsiendi puhul erinev.

Patsientide erirühmad

Eakad

65aastastel ja vanematel patsientidel ei ole vaja annust muuta (vt lõik 5.2). Kokku 138 patsiendist, kes said Erivedge't kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi raviks neljas kliinilises uuringus, ligikaudu 40 % olid 65aastased ja vanemad ning nende ja nooremate patsientide vahel ei täheldatud ohutuse ja efektiivsuse üldisi erinevusi.

Neerukahjustus

Kerge ja mõõduka neerukahjustuse korral ei ole oodata mõju vismodegiibi eliminatsioonile ning annuse kohandamine ei ole vajalik. Raske neerukahjustusega patsientide kohta saadud andmeid on väga piiratud hulgal. Raske neerukahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida kõrvaltoimete suhtes.

Maksakahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik NCIODWG (*National Cancer Institute Organ Dysfunction Working Group*, Riikliku Vähiinstituudi organfunktsiooni häirete töörühma) maksakahjustuse kriteeriumide alusel määratletud kerge, mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel (vt lõik 5.2):

- kerge: üldbilirubiin (*total bilirubin*, TB) $\leq$ normivahemiku ülempiirist (*upper limit of normal*, ULN), aspartaat aminotransferaas (ASAT) $>$ ULN või $ULN < TB \leq 1,5 \times ULN$, igasugune ASAT
- mõõdukas: $1,5 \times ULN < TB < 3 \times ULN$, igasugune ASAT
- raske: $3 \times ULN < TB < 10 \times ULN$, igasugune ASAT

Lapsed

Erivedge ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta ei ole tõestatud.

Ohutuskalutlustel (vt lõigud 4.4 ja 5.3) ei tohi seda ravimit kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta.

Manustamisviis

Erivedge on ette nähtud suukaudseks manustamiseks. Kapslid tuleb neelata tervelt koos veega, koos toiduga või ilma (vt lõik 5.2). Kapsleid ei tohi avada, vältimaks patsientide ja tervishoiutöötajate tahtmatut kokkupuudet ravimiga.

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Rasedus või imetamine (vt lõigud 4.4 ja 4.6).
- Rasestuda võivad naised, kes ei järgi Erivedge raseduse vältimise programmi (vt lõigud 4.4 ja 4.6).
- Lihtnaistepuna (*Hypericum perforatum*) samaaegne manustamine (vt lõik 4.5).

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Embrüo-loote surm või rasked väärarengud

Rasedale manustatuna võib Erivedge põhjustada embrüo-loote surma või raskeid väärarenguid (vt lõik 4.6). Hedgehogi raja inhibiitorid (vt lõik 5.1), nagu vismodegiib on paljudel loomaliikidel olnud embrüotoksilised ja/või teratogeensed ning võivad põhjustada raskeid väärarenguid, kaasa arvatud näo- ja kehahäireid, neuraaltoru sulgumise defekte ja jäsemete väärarenguid (vt lõik 5.3). Erivedge't ei tohi kasutada raseduse ajal (vt lõik 4.3).

Rasestuda võiva naise kriteeriumid

Erivedge raseduse vältimise programmis määratletakse rasestuda võivat naist kui:

- seksuaalselt küpset naist,
- kellel on menstruatsioonid esinenud mis tahes ajal eelneva 12 järjestikuse kuu jooksul,
- kellele ei ole tehtud hüsterektoomiat või kahepoolset ooforektoomiat või kellel ei esine meditsiiniliselt kinnitatud püsivat enneaegset munasarjade puudulikkust,
- kellel ei ole XY-genotüüpi, Turneri sündroomi või emaka ageneesi,
- kellel tekib amenorröa vähiravi, sh Erivedge ravi järgselt.

Nõustamine

Rasestuda võivale naisele

Erivedge on vastunäidustatud rasestuda võival naisel, kes ei järgi Erivedge raseduse vältimise programmi.

Rasestuda võiv naine peab mõistma, et:

- Erivedge raviga kaasneb risk teratogeenseks toimeks veel sündimata lapsele ;
- ta ei tohi kasutada Erivedge't, kui ta on rase või kavatseb rasestuda ;
- 7 päeva jooksul enne Erivedge'ga ravi alustamist tervishoiutöötaja poolt tehtud rasedustest peab andma negatiivse vastuse ;
- ravi jooksul kord kuus tehtav rasedustest peab andma negatiivse vastuse, isegi kui on tekkinud amenorröa ;
- ta ei tohi rasestuda Erivedge kasutamise ajal ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist ;
- ta peab olema võimeline järgima efektiivseid rasestumisvastaseid meetmeid;
- ta peab Erivedge võtmise ajal kasutama kahte soovitatud rasestumisvastast meetodit (vt lõik „Kontratseptsioon“ allpool ja lõik 4.6), välja arvatud juhul, kui ta loobub täielikult seksuaalelust (abstinents);
- ta peab oma tervishoiutöötajat teavitama sellest, kui ravi ajal või 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist leiab aset midagi järgnevalt loetletust:
- kui ta rasestub või arvab mis tahes põhjusel, et võib olla rase;
- kui oodatav menstruatsioon jääb vahele;
- kui ta lõpetab kontratseptsiooni kasutamise, välja arvatud juhul, kui ta loobub täielikult seksuaalelust (abstinents);
- kui tal on vaja ravi ajal muuta rasestumisvastaseid meetodeid;
- ta ei tohi last rinnaga toita ravi ajal Erivedge'ga ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist.

Meestele

Vismodegiibi leidub spermas. Vältimaks loote võimalikku kokkupuudet ravimiga raseduse ajal, peab meespatsient mõistma, et:

- Erivedge kasutamisega kaasneb risk teratogeenseks toimeks veel sündimata lapsele, kui ta on kaitsmata seksuaalvahekorras raseda naisele;
- ta peab alati kasutama soovitatud rasestumisvastast kaitset (vt lõik „Kontratseptsioon“ allpool ja lõik 4.6);
- ta teavitab oma tervishoiutöötajat sellest, kui tema naispartner rasestub ajal, mil ta saab ravi Erivedge'ga, või 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist.

Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajad peavad patsiente teavitama, et nad saaksid aru ja nõustuksid Erivedge raseduse vältimise programmi kõikide tingimustega.

Kontratseptsioon

Rasestuda võivad naised

Naissoost patsiendid peavad ravi ajal Erivedge'ga ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist kasutama kahte soovitatud rasestumisvastast meetodit, sealhulgas ühte väga efektiivset meetodit ja barjäärimeetodit (vt lõik 4.6).

Mehed

Meessoost patsiendid peavad ravi ajal Erivedge'ga ja 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist kasutama alati kondoomi (võimalusel koos spermitsiidiga), isegi pärast vasektoomiat, kui on seksuaalvahekorras naispartneriga (vt lõik 4.6).

Rasedustestid

Rasestuda võivale naisele tuleb tervishoiutöötaja poolt tehtav meditsiiniliselt kontrollitud rasedustest teha 7 päeva jooksul enne ravi alustamist ja ravi ajal üks kord kuus. Rasedustesti minimaalne tundlikkus peab olema 25 mIU/ml vastavalt kohalikule kättesaadavusele. Patsiendid, kellel esineb ravi ajal Erivedge'ga amenorröa, peavad ravi käigus jätkama igakuiste rasedustestide tegemist.

Ravimi rasestuda võivale naisele väljakirjutamise ja väljastamise piirangud

Erivedge esmane väljakirjutamine ja väljastamine peab toimuma maksimaalselt 7 päeva jooksul pärast rasedustesti negatiivse tulemuse saamist (rasedustesti tegemise päev = 1. päev). Erivedge't tohib korraga välja kirjutada 28 ravipäevaks ning ravi jätkamiseks tuleb välja kirjutada uus retsept.

Teavitusmaterjal

Aitamaks tervishoiutöötajatel ja patsientidel vältida embrüo ja loote kokkupuudet Erivedge'ga, koostab müügiloa hoidja teavitusmaterjalid (Erivedge raseduse vältimise programm), et vähendada ravimi kasutamisega seotud võimalikke riske.

Toime postnataalsele arengule

Erivedge't saanud lastel on kirjeldatud epifüüside enneaegset sulgumist ja enneaegset puberteeti. Ravimi pika eliminatsiooni poolväärtusaja tõttu võivad need sündmused tekkida või jätkuda pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Loomaliikidel on vismodegiib põhjustanud raskeid pöördumatuid muutusi kasvavates hammastes (odontoblastide degeneratsioon/nekroos, vedelikuga täidetud tsüstide moodustumine hambasäsis, juurekanali luustumine ja verejooks) ning epifüüsi kasvuplaadi sulgumist. Need epifüüside enneaegse sulgumise leiud näitavad võimalikku lühikese kasvu ja hammaste väärarengute tekke riski imikutel ja lastel (vt lõik 5.3).

Doonorina vere loovutamine

Patsiendid ei tohi doonorina verd anda ravi ajal Erivedge'ga ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist.

Doonorina sperma loovutamine

Meespatsiendid ei tohi doonorina spermat loovutada ravi ajal Erivedge'ga ja 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist.

Koostoimed

Vältida tuleb samaaegset ravi tugevate CYP indutseerijatega (nt rifampitsiin, karbamasepiin või fenütoiin), sest ei saa välistada vismodegiibi plasmakontsentratsiooni languse ja toime vähenemise riski (vt ka lõik 4.5).

Masked nahareaktsioonid

Turuletulekujärgsel kasutamisel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (*severe cutaneous adverse reactions*, SCAR-id), sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroomi/toksilise epidermaalse nekrolüüsi (SJS/TEN), eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsiooni (*drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*, DRESS) ja ägeda generaliseerunud eksantematoosse pustuloosi (*acute generalised exanthematous pustulosis*, AGEP) juhtudest, mis võivad olla eluohtlikud (vt

lõik 4.8). Kui patsiendil tekib vismodegiibi kasutamisel mõni neist reaktsioonidest, ei tohi sellel patsiendil ravi vismodegiibiga enam kunagi taaslustada.

Abiained

Erivedge kapslid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoosgalaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegselt kasutatavate ravimite toime vismodegiibile

Vismodegiibi ja pH-taset tõstvate ainete vahel ei ole kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi (FK) koostoimeid oodata. Kliinilisest uuringust saadud tulemused näitasid seondumata vismodegiibi kontsentratsiooni 33% vähenemist pärast 7päevast samaaegset ravi 20 mg rabeprasooliga (prootonpumba inhibiitor), mida manustati 2 tundi enne igakordset vismodegiibi manustamist. See koostoime ei tohiks olla kliiniliselt oluline.

Vismodegiibi ja CYP450 inhibiitorite vahel ei ole kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid oodata. Kliinilisest uuringust saadud tulemused näitasid seondumata vismodegiibi kontsentratsiooni 57% suurenemist 7. päeval pärast samaaegset ravi 400 mg flukonasooliga (mõõdukas CYP2C9 inhibiitor) ööpäevas, kuid see koostoime ei tohiks olla kliiniliselt oluline. Itrakonasool (tugev CYP3A4 inhibiitor) 200 mg ööpäevas ei mõjutanud vismodegiibi AUC_{0...24h} väärtusi pärast 7päevast samaaegset ravi tervetel vabatahtlikel.

Vismodegiibi ja P-gp inhibiitorite vahel ei ole kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid oodata. Kliinilisest uuringust saadud tulemused näitasid kliiniliselt olulise farmakokineetilise koostoime puudumist vismodegiibi ja itrakonasooli (tugev P-glükoproteiini inhibiitor) vahel tervetel vabatahtlikel.

Vismodegiibi manustamisel koos CYP indutseerijatega (rifampitsiin, karbamasepiin, fenütoiin, liht-naistepuna) võib väheneda vismodegiibi ekspositsioon (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Vismodegiibi toime samaaegselt kasutatavatele ravimitele

Hormonaalsed kontratseptiivid

Vähihaigetel läbi viidud ravimite koostoimeuuringud näitasid, et koos vismodegiibiga manustamisel ei muutunud et ünüülöstradioli ja noretindrooni süsteemne kontsentratsioon. Kuid koostoimeuuring kestis vaid 7 päeva ning ei saa välistada, et vismodegiib on pikemaajalise ravi korral hormonaalseid kontratseptiive metaboliseerivate ensüümide indutseerija. Induktsioon võib viia hormonaalsete kontratseptiivide süsteemse kontsentratsiooni ja seeläbi rasestumisvastase toime vähenemiseni.

Toime spetsiifilistele ensüümidele ja transporteritele

In vitro uuringud näitavad, et vismodegiib võib toimida rinnavähi resistentsusvalgu (BCRP) inhibiitorina. *In vivo* koostoimete kohta andmed puuduvad. Ei ole välistatud, et vismodegiib võib põhjustada selle valgu poolt transporditavate ravimite (nt rosuvastatiin, topotekaan ja sulfasalasiin) kontsentratsiooni suurenemist. Samaaegsel manustamisel peab olema ettevaatlik ning vajadusel tuleb korrigeerida annust.

Vismodegiibi ja CYP450 substraatide vahel ei ole kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid oodata. *In vitro* oli CYP2C8 vismodegiibi inhibeerimise suhtes kõige tundlikum CYP isovorm. Kuid vähihaigetel läbi viidud ravimite koostoimeuuringu tulemused näitasid, et koos vismodegiibiga

manustamisel ei muutunud rosiglitasooni (CYP2C8 substraat) süsteemne kontsentratsioon. Seega võib välistada CYP ensüümide inhibeerimise vismodegiibi poolt *in vivo*.

In vitro on vismodegiib OATP1B1 inhibiitor. Ei saa välistada, et vismodegiib võib põhjustada OATP1B1 substraatide, nt bosentaani, esetimiibi, glibenklamiidi, repagliniidi, valsartaani ja statiinide ekspositsiooni suurenemist. Eriti ettevaatlik peab olema vismodegiibi manustamisel koos ükskõik millise statiiniga.

4.6 Fertiliisus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised

Vismodegiibiga seotud embrüo-loote surma või raskete väärarengute riski tõttu ei tohi Erivedge'ga ravi saavad naised olla rasedad ega rasestuda ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Erivedge on vastunäidustatud rasestuda võivatel naistel, kes ei järgi Erivedge raseduse vältimise programmi.

Rasestumise või menstruatsiooni vahelejäämise korral

Kui patsient rasestub, tal jääb menstruatsioon vahele või ta kahtlustab mis tahes põhjusel, et võib olla rase, tuleb sellest otsekohe teavitada raviarsti.

Menstruatsioonide püsiva puudumise korral ravi ajal Erivedge'ga tuleb eeldada rasedust kuni vastava meditsiinilise hindamise ja kinnituse saamiseni.

Kontratseptsioon meestel ja naistel

Rasestuda võivad naised

Rasestuda võib naine peab olema võimeline järgima efektiivseid rasestumisvastaseid meetmeid. Ta peab ravi ajal Erivedge'ga ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist kasutama kahte soovitatud rasestumisvastast meetodit, sealhulgas ühte väga efektiivset meetodit ja barjäärimeetodit. Rasestuda võivad naised, kelle menstruatsioonid on ebakorrapärased või lõppenud peavad järgima kõiki efektiivse kontratseptsiooniga seotud nõuandeid.

Mehed

Vismodegiibi leidub spermas. Vältimaks loote võimalikku kokkupuudet ravimiga raseduse ajal, peavad meessoost patsiendid ravi ajal Erivedge'ga ja 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist kasutama alati kondoomi (võimalusel koos spermitsiidiga), isegi pärast vasektoomiat, kui on seksuaalvahekorras naispartneriga.

Järgnevalt on loetletud soovitatud väga efektiivsed rasestumisvastased meetodid:

- hormonaalne depoopreparaat;
- munajuhade ligeerimine;
- vasektoomia;
- emakasisene vahend.

Järgnevalt on loetletud soovitatud barjäärimeetodid:

- mehe kondoom (võimalusel koos spermitsiidiga);
- pessaar (võimalusel koos spermitsiidiga).

Rasedus

Rasedale manustatuna võib Erivedge põhjustada embrüo-loote surma või raskeid väärarenguid (vt lõik 4.4). Hedgehogi raja inhibiitorid (vt lõik 5.1), nagu vismodegiib on paljudel loomaliikidel olnud embrüotoksilised ja/või teratogeensed ning võivad põhjustada raskeid väärarenguid, kaasa arvatud näokolju arenguhäireid, neuraaltoru sulgumise defekte ja jäsemete väärarenguid (vt lõik 5.3). Kui Erivedge'ga ravi saav naine rasestub, tuleb ravi otsekohe lõpetada.

Imetamine

Vismodegiibi rinnapiima eritumise ulatus ei ole teada. Ravimi raskeid arenguhäireid põhjustava toime tõttu ei tohi naised last rinnaga toita ravi ajal Erivedge'ga ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist (vt lõigud 4.3 ja 5.3).

Fertiilsus

Ravi Erivedge'ga võib põhjustada naistel fertiilsuse häireid (vt lõik 5.3). Fertiilsuse häirete pöördumus on teadmata. Lisaks on kliinilistes uuringutes täheldatud rasestuda võivatel naistel amenorröad (vt lõik 4.8). Enne Erivedge'ga ravi alustamist tuleb rasestuda võiva naisega arutada fertiilsuse säilitamise võimalusi.

Meestel ei ole fertiilsuse häireid oodata (vt lõik 5.3).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Erivedge ei mõjuta või mõjutab ebaolulisi sümptomeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Kõige sagedamad kõrvaltoimed, mida esines $\geq 30\%$ patsientidest, olid lihasspasmid (74,6 %), alopeetsia (65,9 %), düsgeusia (58,7 %), kaalulangus (50,0 %), väsimus (47,1 %), iiveldus (34,8 %) ja kõhulahtisus (33,3 %).

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Tabelis 1 on kõrvaltoimed toodud organsüsteemi klassi ja absoluutse esinemissageduse järgi.

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

Väga sage ($\geq 1/10$)

Sage ($\geq 1/100$ kuni $< 1/10$)

Aeg-ajalt ($\geq 1/1000$ kuni $< 1/100$)

Harv ($\geq 1/10\,000$ kuni $< 1/1000$)

Väga harv ($< 1/10\,000$)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Erivedge ohutust on hinnatud kliinilistes uuringutes, mille käigus said kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi (mis hõlmab nii metastaatilist kui lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi) ravi 138 patsienti. Neljas avatud I ja II faasi kliinilises uuringus said patsiendid vähemalt ühe Erivedge monoterapia annuse suuruses ≥ 150 mg. Annused > 150 mg ei põhjustanud kliinilistes uuringutes suuremaid plasmakontsentratsioone ning 150 mgst suuremaid annuseid saanud patsiendid on kaasatud analüüsi. Lisaks hinnati ohutust müügiloo saamise järgses uuringus, kus osales 1215 kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomiga ohutuspopulatsiooni patsienti, kes said ravi 150 mgga. Üldiselt täheldati nii metastaatilise kui lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomiga patsientidel ning uuringute lõikes ühesugust ohutusprofiili, nagu on kirjeldatud allpool.

Tabel 1 Erivedge'ga ravitud patsientidel täheldatud kõrvaltoimed

MedDRA organsüsteemi klass	Väga sage	Sage	Esinemissagedus teadmata
Endokriinsüsteemi häired			enneaegne puberteet****
Ainevahetus- ja toitumishäired	söögiisu vähenemine	dehüdratsioon	

Närvisüsteemi häired	düsgeusia a geusia	hüpogeusia	
Seedetrakti häired	iveldus kõhulahtisus kõhukinnisus oksendamise düspepsia	ülakõhuvalu kõhuvalu	
Maksa ja sapiteede häired		maksaensüümide aktiivsuse suurenemine**	ravimite põhjustatud maksakahjustus *****
Naha ja nahaaluskoe kahjustused	allergeenia sügelus lööve	riipsmete kadu ebanormaalne karvakasv	Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS)/ toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) ning äge generaliseerunud eksantemaatiline pustuloos (AGEP)*****
Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused	lihasspasmid liigesevalu jäsemevalu	seljavalu lihaste ja luustiku valu rinnus lihasevalu kõlbevalu lihaste ja luustiku valu vere kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemine***	epifüüside enneaegne sulgumine****
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired	amenorröa*		

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid	k ehakaalu langus v äsimus v alu	asteenia	
--	--	----------	--

Erineva raskusega kõrvaltoimed põhinevad Riikliku Vähiinstituudi kõrvaltoimete üldistel terminoloogilistel kriteeriumidel (v 3.0), kui ei ole teisiti märgitud.

*138st kaugelearenenud basaalkartsinoomiga patsiendist 10 olid rasestuda võivad naised. Nende naiste seas täheldati amenorröad 3 patsiendil (30 %).

MedDRA = *Medical Dictionary for Regulatory Activities*.

**Hõlmab eelistatud termineid: kõrvalekalded maksafunktsiooni testides, vere bilirubiinisalduse suurenemine, gammaglutamüültransferaasi aktiivsuse suurenemine, aspartaataminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, alkaalse fosfataasi aktiivsuse suurenemine, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

***Täheldati 1215 ohutuspopulatsiooni patsiendi osalusega müügiloo saamise järgse uuringus.

****Turuletulekujärgselt on teatatud üksikjuhtudest medulloblastoomiga patsientidel (vt lõik 4.4).

*****Turuletulekujärgselt on teatatud ravimi poolt põhjustatud maksakahjustuse juhtudest.

*****Turuletulekujärgselt on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (SCAR) (sealhulgas SJS/TEN, DRESS ja AGEF).

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teada ka pärast ravimi müügiloo väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest kõrvaltoimetest teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt [V lisa](#)) kaudu.

4.9 Üleannustamine

Erivedge't on manustatud annustes, mis on 3,6 korda suuremad soovitatavast 150 mg ööpäevasest annusest. Nendes kliinilistes uuringutes ei täheldatud vismodegiibi plasmakontsentratsiooni suurenemist ega toksilisust.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: a kasvajavastased ained, teised kasvajavastased ained, ATC-kood: L01XJ01.

Toimemehhanism

Vismodegiib on suu kaudu manustatav Hedgehogi raja väikesemolekuliline inhibiitor. Hedgehogi raja signaali ülekande SMO (*Smoothed*) transmembraanse valguga viib glioomiga seotud onkogeeni (GLI) transkriptsioonifaktorite aktivatsiooni ja tuuma lokaliseerumise ning Hedgehogi sihtmärkgeenide induktioonini. Paljud nendest geenidest osalevad rakkude proliferatsioonis, elulemises ja diferentseerumises. Vismodegiib seondub SMO valguga ja inhibeerib seda, blokeerides sel viisil Hedgehogi signaali ülekande.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Keskne uuring ERIVANCE BCC (SHH4476g) oli rahvusvaheline, ühe uuringuharuga, mitmekeskuseline, 2 kohordiga uuring. Metastaatilist basaalkarsinoomi määratleti kui karsinoomi, mis on levinud nahast teistesse kehaosadesse, kaasa arvatud lümfisõlmedesse, kopsu, luudesse ja/või siseelunditesse. Lokaalselt kaugelearenenud basaalkarsinoomiga patsientidel esinesid nahakolded, mille puhul oli kirurgiline ravi sobimatu (mitteopereeritav, lokaalselt retsidiveerunud kasvaja, mille puhul kuratiivset resektiooni peeti ebatõenäoliseks või kellel operatsiooni tulemuseks oleks märkimisväärne deformatsioon või haigusseisund) ning kiiritusravi ebaedukas või vastunäidustatud või sobimatu. Enne uuringusse kaasamist kinnitati basaalkarsinoomi diagnoos histoloogiliselt. Uuringusse sobisid Gorlini sündroomiga patsiendid, kellel oli vähemalt üks kaugelearenenud basaalkarsinoomi haiguskoht ja kes vastasid uuringusse kaasamise kriteeriumidele. Patsiendid said ravi Erivedge'ga suukaudses ööpäevasest annuses 150 mg.

Keskmine vanus efektiivsuse hindamiseks sobivas populatsioonis oli 62 aastat (46 % olid vähemalt 65aastased), 61 % olid mehed ja 100 % valge rassi esindajad. Metastaatilise basaarakulise kartsinoomi kohordis olid 97 % patsientidest saanud eelnevat ravi, sh kirurgilist ravi (97 %), kiiritusravi (58 %) ja süsteemset ravi (30 %). Lokaalselt kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomi kohordis (n = 63) olid 94 % patsientidest saanud eelnevat ravi, sh kirurgilist ravi (89 %), kiiritusravi (27 %) ja süsteemset/paikset ravi (11 %). Ravi keskmine kestus oli 12,9 kuud (vahemik 0,7...47,8 kuud).

Esmane tulemusnäitaja oli objektiivse ravivastuse määr (*objective response rate*, ORR), mida hindas sõltumatu hindamiskogu (*independent review facility*, IRF), nagu on kokku võetud tabelis 2. Objektiivset ravivastust defineeriti kui täielikku või osalist ravivastust, määratuna kahel järjestikusel hindamisel vähemalt 4nädalase vahega. Metastaatilise basaarakulise kartsinoomi kohordis hinnati kasvaja ravile reageerimist RECIST kriteeriumide järgi (*Response Evaluation Criteria in Solid Tumours*, soliidtuumorite korral ravivastuse hindamise kriteeriumid, versioon 1.0). Lokaalselt kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomi kohordis hinnati kasvaja ravile reageerimist välise tuumori ja haavandumise visuaalse hindamise, kasvaja piltdiagnostika (võimalusel) ja biopsia alusel. Lokaalselt kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomi kohordis loeti patsient ravile reageerinuks, kui täidetud oli vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest ja patsiendil ei esinenud progresseerumist: (1) haiguskolde suuruse [pikimate läbimõõtude summa (*sum of the longest diameter*, SLD)] vähenemine ≥ 30 % võrra algtulemusest valitud haiguskollete puhul radioloogiliselt; (2) valitud haiguskollete väliselt nähtava suuruse [SLD] vähenemine ≥ 30 % võrra algtulemusest; (3) haavandite täielik kadumine kõikides valitud haiguskolletes. Põhiandmete kokkuvõte on toodud tabelis 2:

Tabel 2 SHH4476g Erivedge efektiivsuse tulemused (sõltumatu hindamiskogu hinnatud järelkontroll 21 kuud ja uurija hinnatud järelkontroll 39 kuud pärast viimase patsiendi uuringusse kaasamist): efektiivsuse hindamiseks sobivad patsiendid^{*,†}

	IRF-i hinnatud mBCC (n = 33)		Uurija hinnatud mBCC (n = 33)	
	laBCC** (n = 63)		laBCC** (n = 63)	
Ravile reageerinuid	11 (33,3 %)	30 (47,6%)	16 (48,5 %)	38 (60,3 %)
Üldise ravivastuse	(19,2 %;	(35,5 %;	(30,8 %;	(47,2 %;
95 %	51,8 %)	60,6 %)	66,2 %)	71,7 %)
usaldusvahemik (CI)				
Täielik ravivastus	0	14 (22,2 %)	0	20 (31,7 %)
Osaline ravivastus	11 (33,3 %)	16 (25,4 %)	16 (48,5 %)	18 (28,6 %)
Stabiilne haigus	20	22	14	15
Haiguse	1	8	2	6
progresseerumine ‡				
Ravivastuse	7,6	9,5	14,8	26,2
mediaanne kestus				
(kuud)				
(95 % CI)	(5,5; 9,4)	(7,4; 21,4)	(5,6; 17,0)	(9,0; 37,6)
Mediaanne	9,5	9,5	9,3	12,9
progressioonivaba				
elulemus (kuud)				
(95 % CI)	(7,4; 11,1)	(7,4; 14,8)	(7,4; 16,6)	(10,2; 28,0)
Mediaanne üldine			33,4	NE
elulemus (kuud)			(18,1; NE)	(NE; NE)
(95 % CI)				
1 aasta elulemuse			78,7 %	93,2 %
määr			(64,7; 92,7)	(86,8; 99,6)
(95 % CI)				

NE = mittehinnatav

* Efektiivsuse hindamiseks sobivate patsientide populatsiooni määratleti kui kõiki uuringusse kaasatud patsiente, kes said mis tahes koguses Erivedge't ning kelle puhul oli säilitatud koe või uuringu alguses võetud biopsia sõltumatu patoloogi poolne tõlgendus kooskõlas basaarakulise kartsinoomi leiuga.


† Mittehinnatavad/puuduvad andmed hõlmasid 1 metastaatilise (mBCC) ja 4 lokaalselt kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomiga (laBCC) patsienti.

‡ Lokaalselt kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomi kohordis defineeriti progresseerumist kui vastavust mõnele järgmistest kriteeriumidest: (1) pikimate mõõtude summa (SLD) suurenemine ≥ 20 % halvimast tulemusest valitud haiguskollete osas (kas radioloogiliselt või väliselt nähtava suuruse järgi), (2) uute haavandite teke valitud haiguskolletes, mis püsisid ilma paranemise tunnusteta vähemalt 2 nädalat, (3) uued haiguskolded radioloogiliselt või läbivaatusel, (4) mittevalitud haiguskollete progresseerumine RECIST alusel.

**54 %-l lokaalselt kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomiga patsientidest puudusid 24. nädalal basaarakulise kartsinoomi patohistoloogilised tunnused.


Nagu on näidatud joonistel 1 ja 2 toodud graafikutel, kus on näha valitud haiguskolde (kollete) suuruse maksimaalne vähenemine iga patsiendi kohta, tekkis enamikul mõlema kohordi patsientidest kasvaja kahanemine, hinnatuna IRF-i poolt.

Joonis 1 SHH4476g metastaatiline basaalkulise kartsinoomi kohort



Märkus: Kasvaja suuruse aluseks on valitud haiguskollete pikimate mõõtude summa. PD = progresseeruv haigus, SD = stabiilne haigus, PR = osaline ravivastus. Kolmel patsiendil oli kasvaja suuruse parim protsentuaalne muutus 0; seda näitavad väikseimad positiivsed tulbad joonisel. Neli patsienti arvati jooniselt välja: kolmel stabiilse haigusega patsiendil hinnati ainult mittevalitud haiguskoldeid ja üks patsient ei olnud hinnatav.

Joonis 2 SHH4476g lokaalselt kauglearenenud basaalkulise kartsinoomi kohort



Märkus: Kasvaja suuruse aluseks on valitud haiguskollete pikimate mõõtude summa. PD = progresseeruv haigus, SD = stabiilne haigus, R = ravivastus, * = haavandi(te) täielik paranemine. Ravivastuse hindamine põhines

eespool määratletud kombineeritud tulemusnäitajal. Nelja patsiendi kohta puudusid haiguskolde mõõtmised ja neid ei kaasatud graafikusse.

Aeg kasvaja suuruse maksimaalse vähenemiseni

Kasvaja vähenemise saavutanud patsientide seas oli keskmine aeg kasvaja suuruse maksimaalse vähenemiseni 5,6 ja 5,5 kuud vastavalt lokaalselt kaugelearenenud ja metastaatilise basaalarakulise kartsinoomiga patsientidel IRF-i hinnangu alusel. Uurija hinnangul oli keskmine aeg kasvaja suuruse maksimaalse vähenemiseni 6,7 ja 5,5 kuud vastavalt lokaalselt kaugelearenenud ja metastaatilise basaalarakulise kartsinoomiga patsientidel.

Südame elektrofüsioloogia

QTc uuringus, kus osales 60 tervet isikut, ei täheldatud Erivedge terapeutiliste annuste toimet QTc-intervallile.

Müügiloo saamise järgse uuringu tulemused

Müügiloo saamise järgses avatud mittevõrdlevas mitmekeskuselises II faasi kliinilises uuringus (MO25616) osales 1232 kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomiga patsienti, kellest 1215 patsienti kuulus efektiivsuse ja ohutuse hindamise populatsiooni (lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoom $n = 1119$ ja metastaatiline basaalarakk-kartsinoom $n = 96$). Lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi määratleti kui nahakoldeid, mille puhul oli kirurgiline ravi sobimatu (mitteopereeritav haigus või mille puhul operatsiooni tulemuseks oleks märkimisväärne deformatsioon) ning kiiritusravi ebaedukas või vastunäidustatud. Metastaatilist basaalarakk-kartsinoomi määratleti kui histoloogiliselt kinnitatud kaugmetastaasidega haigust. Enne uuringusse kaasamist kinnitati basaalarakk-kartsinoomi diagnoos histoloogiliselt. Erivedge ravi suukaudne ööpäevane annus oli 150 mg. Kõikide patsientide mediaanne vanus oli 72 aastat. Enamik patsiente olid mehed (57%); 8%l patsientidest oli metastaatiline basaalarakk-kartsinoom ja 92%l lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoom. Metastaatilise basaalarakk-kartsinoomi kohordis oli enamus patsientidest saanud eelnevat ravi, sh kirurgilist ravi (91%), kiiritusravi (62%) ja süsteemset ravi (16%). Lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi kohordis oli enamus patsientidest saanud eelnevat ravi, sh kirurgilist ravi (85%), kiiritusravi (28%) ja süsteemset ravi (7%). Ravi mediaanne kestus kõikidel patsientidel oli 8,6 kuud (vahemik 0...44,1).

Mõõdetava ja histoloogiliselt kinnitatud haigusega efektiivsuse hindamiseks sobiva populatsiooni patsientidest saavutas RECIST v1.1 põhjal ravivastuse 68,5% ja 36,9% vastavalt lokaalselt kaugelearenenud ja metastaatilise basaalarakk-kartsinoomi kohordis. Kinnitatud (osalise või täieliku) ravivastusega patsientidel oli ravivastuse kestuse mediaan 23,0 kuud (95% CI: 20,4; 26,7) lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi kohordis ja 13,9 kuud (95% CI: 9,2; NE) metastaatilise basaalarakk-kartsinoomi kohordis. Täieliku ravivastuse saavutas 4,8% patsientidest metastaatilise basaalarakk-kartsinoomi kohordis ja 33,4% patsientidest lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi kohordis. Osalise ravivastuse saavutas 32,1% patsientidest metastaatilise basaalarakk-kartsinoomi kohordis ja 35,1% patsientidest lokaalselt kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomi kohordis.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Erivedge'ga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta basaalarakulise kartsinoomi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Erivedge on suure permeaablusega ühend, mille lahustuvus vees on väike (BCS klass 2). Erivedge ühekordse annuse keskmine (CV %) absoluutne biosaadavus on 31,8 (14,5) %. Imendumine on küllastuv, mida näitab kontsentratsiooni annusega proportsionaalse suurenemise puudumine pärast Erivedge 270 mg ja 540 mg ühekordse annuse manustamist. Kliinilisele olukorrale vastavates tingimustes (tasakaalu seisund) ei mõjuta toit vismodegiibi farmakokineetikat. Seetõttu võib ravimit manustada söögiaegadest sõltumatult.

Jaotumine

Vismodegiibi jaotusruumala on väike vahemikus 16,4...26,6 l. Kliiniliselt oluliste kontsentratsioonide puhul on vismodegiibi *in vitro* seonduvus inimese plasmavalkudega suur (97 %). Vismodegiib seondub nii inimese seerumi albumiini kui alfa₁-happelise glükoproteiiniga (AAG). *In vitro* seonduvus AAG-ga on küllastuv kliiniliselt oluliste kontsentratsioonide puhul. *Ex vivo* seonduvus plasmavalkudega inimestel on > 99 %. Vismodegiibi kontsentratsioon on tugevas korrelatsioonis AAG tasemega, mida näitavad AAG ja vismodegiibi üldkontsentratsiooni paralleelsed kõikumised aja jooksul ja püsivalt madal seondumata vismodegiibi tase.

Biotransformatsioon

Vismodegiibi eliminatsioon on aeglane, toimudes metabolismi ja muutumatul kujul ravimi eritumise teel. Vismodegiib esineb plasmas peamiselt muutumatul kujul, moodustades üle 98 % kogu tsirkuleerivast kontsentratsioonist (sh seotud metaboliidid). Inimestel toimub vismodegiibi metabolism oksüdatsiooni, glükuronisatsiooni ja püridiinringi lõhustamise teel. CYP2C9 näib osalevat vismodegiibi metabolismis *in vivo*.

Eritumine

Pärast radioloogiliselt märgistatud annuse suukaudset manustamist vismodegiib imendub ja toimub aeglane eliminatsioon metabolismi ja muutumatul kujul ravimi eritumise teel. Suurem osa eritub roojaga (82 % manustatud annusest) ja 4,4 % uriiniga. Vismodegiib ja sellega seotud metabolismi produktid elimineeruvad peamiselt maksa kaudu.

Pärast pidevat üks kord ööpäevas manustamist on vismodegiibi farmakokineetika mittelineaarne küllastuva imendumise ja küllastuva valkudega seonduvuse tõttu. Pärast ühekordse suukaudse annuse manustamist on vismodegiibi terminaalne poolväärtusaeg ligikaudu 12 päeva.

Ravimi pideval igapäevasel manustamisel on vismodegiibi poolväärtusaeg tasakaaluseisundi tingimustes hinnanguliselt 4 päeva. Ravimi pideval igapäevasel manustamisel esineb vismodegiibi kogu plasmakontsentratsiooni 3kordne kuhjumine.

Vismodegiib inhibeerib UGT2B7 *in vitro* ning ei ole välistatud, et inhibeerimine võib *in vivo* aset leida sooles.

Patsientide erirühmad

Eakad

Vanemate inimeste kohta saadud andmeid on piiratud hulgal. Kaugelearenenud basaarakulise kartsinoomi kliinilistes uuringutes olid ligikaudu 40 % patsientidest eakad (65aastased või vanemad). Populatsiooni farmakokineetilised analüüsid näitavad, et vanusel ei olnud kliiniliselt olulist mõju vismodegiibi tasakaalu kontsentratsioonile.

Sugu

121 mehelt ja 104 naiselt saadud kombineeritud andmete populatsiooni farmakokineetilise analüüsi põhjal ei avaldanud sugu mõju vismodegiibi farmakokineetikale.

Rass

Mitte valge rassi esindajate kohta saadud andmeid on piiratud hulgal. Kuna uuritavate arv, kes ei olnud valge rassi esindajad, moodustas vaid alla 3 % kõikidest uuritavatest (6 mustanahalist, 219 valge rassi esindajat), siis populatsiooni farmakokineetilises analüüsis ei hinnatud rassi kui muutujat.

Neerukahjustus

Suu kaudu manustatud vismodegiib eritub neerude kaudu vähesel määral. Seetõttu ei ole kergel ja mõõdukal neerukahjustusel tõenäoliselt kliiniliselt olulist mõju vismodegiibi farmakokineetikale. Populatsiooni farmakokineetilise analüüsi põhjal, mis hõlmas kerge (kehapiinna suuruse [BSA] järgi kohandatud kreatiniini kliirens [CrCl] 50...80 ml/min, n = 58) ja mõõduka (BSA järgi kohandatud CrCl 30...50 ml/min, n = 16) neerukahjustusega patsiente, ei olnud kergel ja mõõdukatel neerufunktsiooni häiretel kliiniliselt olulist mõju vismodegiibi farmakokineetikale (vt lõik 4.2). Raske neerukahjustusega patsientide kohta saadud andmeid on väga piiratud hulgal.

Maksakahjustus

Vismodegiibi põhilised eliminatsiooni teed on maksas toimuv metabolism ja sekretsioon sappi/soolde. Maksakahjustusega (maksakahjustuse raskus põhines uuritava isiku ASAT ja üldbilirubiini väärtustel) patsientide kliinilises uuringus demonstreeriti pärast vismodegiibi korduvate annuste manustamist, et kerge (NCIOWG kriteeriumide järgi, $n = 8$), mõõduka (NCIOWG kriteeriumide järgi, $n = 6$) ja raske (NCIOWG kriteeriumide järgi, $n = 3$) maksakahjustusega patsientidel oli vismodegiibi farmakokineetiline profiil võrreldav normaalse maksafunktsiooniga uuritavatel ($n = 9$) täheldatuga (vt lõik 4.2).

Lapsed

Lastelt saadud farmakokineetilisi andmeid on ebapiisaval hulgal.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Vismodegiibi prekliinilist ohutusprofiili on hinnatud hiirtel, rottidel ja koertel.

Korduvtoksilisus

Üldiselt piirasid rottide ja koertega läbi viidud korduvtoksilisuse uuringutes Erivedge talu vust mittespetsiifilised toksilisuse ilmingud, sh vähenenud kaalutõus ja toidu tarbimine. Kliiniliselt oluliste kontsentratsiooni väärtuste puhul täheldatud täiendavad leiud olid väljaheite muutused; skeletilihaste tõmbused või värinad; alopeetsia; tursed, follikulaarne hüperkeratoos ja käpapadjakeste põletik; ning LDL- ja HDL-kolesterooli tõus. Hematokriti või trombotsüütide arvu langust täheldati mõnedel koertel kliiniliselt oluliste kontsentratsiooni väärtuste puhul; samas puudusid nendel loomadel esmase luuüdile avaldatava toime ilmingud.

Kartsinogeensus

Kartsinogeensusuuringud viidi läbi hiirte ja rottidega. Kartsinogeenne potentsiaal tuvastati ainult rottidel ja see piirdus healoomuliste karvafolliikuli kasvajatega, sealhulgas pilomatrikoomide ja keratoakantoomidega tasakaalu seisundi $AUC_{0...24h}$ väärtuste juures, mis olid vastavalt $\geq 0,1$ korda ja $\geq 0,6$ korda suuremad inimestele soovitatava annuse manustamisel täheldatust. Kummalgi uuritud loomaliigil pahaloomulisi kasvajaid ei tuvastatud. Healoomulisi karvafolliikuli kasvajaid ei ole kirjeldatud Erivedge kliinilistes uuringutes ning selle leiu tähtsus inimestele on teadmata.

Mutageensus

In vitro testides (bakteriaalse mutageneesi [Ames] ja inimese lümfotsüütide kromosoomi aberratsiooni testid) ning *in vivo* rottide luuüdi mikrotoomade testis ei täheldatud genotoksilisuse ilminguid.

Fertiilsus

Vismodegiibiga rottidel läbi viidud spetsiaalses 26nädalases fertiilsusuuringus täheldati seemnepõiekest absoluutkaalu olulist suurenemist ja eesnäärme absoluutkaalu vähenemist. Lisaks oli organi kaalu ja lõpliku kehakaalu suhe oluliselt suurenenud munandimanuse, munandimanusesaba, munandite ja seemnepõiekestes puhul. Samas uuringus ei täheldatud 100 mg/kg ööpäevas manustamisel (mille puhul saavutatud tasakaaluseisundi $AUC_{0...24h}$ väärtused olid 1,3 korda suuremad inimestele soovitatava annuse kasutamisel saavutatust) annustamis- või taastumisperioodi lõpus patohistoloogilisi leide isasloomade reproduktiivorganites ega toimeid isasloomade fertiilsuse tulemusnäitajatele, sh liikumisvõimeliste spermatoosoidide protsendile. Lisaks ei täheldatud vismodegiibi kuni 26nädalase kestusega üldise toksilisuse uuringutes seksuaalselt küpsetel rottidel ja koertel toimeid isasloomade reproduktiivorganitele. 4nädalases üldise toksilisuse uuringus täheldati ≥ 50 mg/kg ööpäevas manustamisel seksuaalselt mitteküpsetele koertele idurakkude degeneratsiooni suurenemist ja hüpospermiat, mille seost vismodegiibiga ei ole kindlaks tehtud.

Vismodegiibiga rottidel läbi viidud spetsiaalses 26nädalases fertiilsusuuringus täheldati 100 mg/kg ööpäevas kasutamisel vahetult pärast ravi lõpetamist vismodegiibiga seotud toimeid emasloomade reproduktiivorganitele, sealhulgas implantatsioonide vähenemist, implantatsioonieelse loote kaotuse protsentuaalset suurenemist ja elujõuliste embrüotega emasloomade arvu vähenemist. Sarnaseid leide ei täheldatud pärast 16nädalast taastumisperioodi. Ei täheldatud ka seotud patohistoloogilisi muutusi.

Emasloomadel oli 100 mg/kg ööpäevas manustamisel ravimi ekspositsioon 1,2 korda suurem inimestele soovitatava annuse kasutamisel saavutatavatest tasakaaluseisundi $AUC_{0...24h}$ väärtustest . Lisaks täheldati vismodegiibi 26nädalases üldise toksilisuse uuringus 100 mg/kg ööpäevas manustamisel kollaskehade arvu langust; see toime ei olnud 8nädalase taastumisperioodi lõpuks pöördunud.

Teratogeensus

Embrüo-loote arengu uuringus, kus tiinetele rottidele manustati vismodegiibi igapäevaselt organogeneesi perioodil, läbis vismodegiib platsentat ja oli lootele tugevalt toksiline. Emasloomadele manustatud annuse puhul, mis vastas 20%-le tüüpilisest tasakaalu kontsentratsioonist patsientidel, täheldati loodetel väärarenguid, sh näokolju arenguhäireid, avatud perineumi ning puuduvaid ja/või kokkukasvanud sõrmi. Suuremate annuste puhul täheldati embrüoletaalsust 100% esinemissagedusega.

Postnataalne areng

Vismodegiibi postnataalset arengut mõjutavat toimet hindavaid uuringuid ei ole läbi viidud. Kuid ohtu postnataalsele arengule näitavad kasvavate hammaste pöördumatud defektid ja reieluu epifüüsiplaadi enneaegne sulgumine, mida täheldati rottide toksilisuse uuringutes kliiniliselt oluliste kontsentratsioonide väärtuste puhul.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapsli sisu

Mikrokristalliline tselluloos
Laktoosmonohüdraat
Naatriumlauryülsulfaat
Povidoon (K29/32)
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)
Talk
Magneesiumstearaat

Kapsli kest

Must raudoksiid (E172)
Punane raudoksiid (E172)
Titaandioksiid (E171)
Želatiin

Trükitint

Šellaki glasuur
Must raudoksiid (E172)

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

28 kõvakapslit sisaldav lastekindla korgiga HDPE pudel. Pudeli korgi materjal on polüpropüleen. Korgi sees on alumiiniumfooliumiga kaetud vahatatud lehtselluloosist ketas. Igas pakendis on üks pudel.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat tuleb ravi lõppedes otsekohe hävitada vastavalt kohalikele nõuetele (nt võimalusel peab patsient tagastama kapslid apteekrile või arstile).

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/848/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12. juuli 2013
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01. juuli 2021

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Raviameti kodulehel:
<http://www.ema.europa.eu>

II LISA

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Roche Pharma AG
EmilBarellStrasse 1
D79639 GrenzachWyhlen
Saksamaa

B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt I lisa: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2).

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

• Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

• Riskijuhtimiskava

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt müügiloa moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:

- Euroopa Ravimiameti nõudel;
- kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk.

Kui perioodilise ohutusaruande esitamise ja riskijuhtimiskava ajakohastamise kuupäevad kattuvad, võib need esitada samal ajal.

• Riski minimeerimise lisameetmed

Enne toote turustamise algust igas liikmesriigis kooskõlastab müügiloa hoidja riikliku pädeva asutusega järgmised materjalid:

- Tervishoiutöötajatele suunatud kirja rahvuslik osa
- Metoodika andmete kogumiseks Erivedge kasutamise ja rasedusega seotud ravimiohutuse järelevalve programmi järgimise ja selle efektiivsuse kohta
- Tervishoiutöötajale ja patsiendile suunatud materjali formaat ja sisu

Alustades toote turustamist saadab müügiloa hoidja laiali tervishoiutöötajatele suunatud kirja, mis sisaldab järgmist:

- Raportööri kooskõlastatud teksti põhiosa
- Riikliku pädeva asutusega kooskõlastatud rahvuslikud erinõuded järgneva kohta:
- Toote turustamine
- Meetmed tagamaks, et enne Erivedge väljakirjutamist ja väljastamist on läbi viidud kõik vajalikud toimingud

Müügiloa hoidja tagab pidevalt, et kõikidele arstidele, kes võivad Erivedge't määrata, on antud järgmised materjalid:

Ravimiteave
Tervishoiutöötaja meelespeakaart
Patsiendi teabematerjal st brošüür
Patsiendi nõustamisjuhend

Tervishoiutöötaja meelespeakaart peab sisaldama järgmisi põhielemente

- Tervishoiutöötaja kohustused seoses Erivedge määramisega
- Vajadus tagada patsientidele igakülgset nõuandest ja nõustamist
- Tagada, et patsiendid on võimelised järgima Erivedge ohutu kasutamise nõudeid
- Vajadus anda patsientidele patsiendi teabematerjal
- Teave rasestumisvõimelistele naistele
- Vajadus teha igakuise rasedustest, isegi kui patsiendil on amenorröa
- Vajadus kasutada piisavaid rasestumisvastaseid meetmeid ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast ravi Erivedge'ga
- Keelatud on imetamine ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast ravi Erivedge'ga
- Teave meestele
- Vajadus kasutada kondoomi, kui on seksuaalvahekorras naispartneriga, ravi ajal ja 2 kuu jooksul pärast ravi Erivedge'ga
- Keelatud on doonorina sperma loovutamine ravi ajal ja 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist
- Vajadus juhendada patsiente, et nad teataksid otsekohe raviarstile, kui naispatsiendil või meespatsiendi naissoost partneril kahtlustatakse rasedust
- Tervishoiutöötaja peab hindama raseduse seisundit, nõustama patsienti teratogeense riski osas ja suunama patsiendi spetsialisti konsultatsioonile
- Tervishoiutöötaja peab kinnitatud rasedustest teatama müügiloa hoidjale
- Tuletada patsientidele meelde, et ravi lõppedes tuleb kasutamata kapslid tagastada (hävitamine sõltub kohalikest nõuetest)
- Tuletada patsientidele meelde, et nad ei loovutaks doonorina verd ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist

Patsiendi nõustamisjuhend

- Patsiendi nõustamisjuhendit saavad arstid kasutada suunisena, kui teavitavad patsienti Erivedge'ga seotud teratogeensetest riskidest

Erivedge patsiendi teabematerjal st brošüür peab sisaldama järgmisi põhielemente

- Teave patsientidele Erivedge'ga seotud teratogeensete riskide ja vajaduse kohta vältida loote kokkupuudet ravimiga
- Vajadus kasutada piisavat rasestumisvastast kaitset ja piisava rasestumisvastase kaitse määratlus
- Riiklikud ja muud asjakohased erikorraldused Erivedge retsepti väljastamise kohta
- Erivedge't ei tohi anda ühelegi teisele inimesele
- Teave allesjäänud ravimpreparaadi hävitamise kohta
- Vajadus hoida Erivedge kapsleid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas
- Patsient ei tohi doonorina verd anda ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist
- Patsient ei tohi last imetada ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist
- Patsient peab teavitama tervishoiutöötajat võimalikest kõrvaltoimetest
- Teave rasestuda võivatele naistele
- Raseduse vältimise programmi kirjeldus
- Vajadus kasutada piisavaid rasestumisvastaseid meetmeid ravi ajal ja 24 kuu jooksul pärast ravi Erivedge'ga
- Rasedustest maksimaalselt 7 päeva jooksul enne ravi alustamist ja ravi ajal igakuise lt meditsiiniliselt kontrollitud rasedustestid
- Raseduse kahtluse korral vajadus lõpetada otsekohe Erivedge kasutamine
- Patsiendi kohustus teatada raseduse kahtlusest otsekohe raviarstile
- Teave meestele
- Vajadus kasutada kondoomi (isegi kui mehele on tehtud vasektoomia), kui tema seksuaalpartner on rase või rasestuda võib naine, ravi ajal ja 2 kuu jooksul pärast ravi Erivedge'ga
- Partneri rasestumisest tuleb otsekohe teavitada raviarsti
- Keelatud on doonorina sperma loovutamine ravi ajal ja 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist

III LISA
PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**KARP****1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Erivedge 150 mg kõvakapslid
vismodegiib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg vismodegiibi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.
Lisateavet vt pakendi infolehest

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA - TEE(D)

Kapslit ei tohi purustada, avada ega närida.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Raskete väärengute risk.
Mitte kasutada raseduse või imetamise ajal.
Järgida tuleb Erivedge raseduse vältimise programmi.

8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIM PREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata kapslid tuleb ravi lõppedes tagastada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/848/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

erivedge

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC
SN
NN

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**PUDELI ETIKETT****1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Erivedge 150 mg kõvakapslid
vismodegiib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg vismodegiibi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.
Lisateavet vt pakendi infolehest

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA - TEE(D)

Kapslit ei tohi purustada, avada ega närida.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Raskete väärengute risk.
Mitte kasutada raseduse või imetamise ajal.
Järgida tuleb Erivedge raseduse vältimise programmi.

8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIM PREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata kapslid tuleb ravi lõppedes tagastada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/848/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Erivedge 150 mg kõvakapslid vismodegiib

Erivedge võib põhjustada raskeid väärenguid. See võib põhjustada lapse surma enne sündimist või vahetult pärast seda . Te ei tohi selle ravimi võtmise ajal rasestuda. Te peate järgima selles infolehes toodud raseduse vältimise nõuandeid.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Erivedge ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Erivedge võtmist
3. Kuidas Erivedge't võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Erivedge't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Erivedge ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Erivedge

Erivedge on vähivastane ravim, mis sisaldab toimeainena vismodegiibi.

Milleks Erivedge't kasutatakse

Erivedge't kasutatakse täiskasvanutel teatud tüüpi nahavähi raviks, mida nimetatakse kaugelearenenud basaalarakk-kartsinoomiks. Seda kasutatakse siis, kui vähk:

- on levinud teistesse kehaosadesse (nimetatakse „metastaatiliseks“ basaalarakk-kartsinoomiks)
- on levinud lähedal asuvasse piirkondadesse (nimetatakse „lokaalselt kaugelearenenud“ basaalarakk-kartsinoomiks) ja teie arst otsustab, et operatsioon või kiiritusravi on sobimatu

Kuidas Erivedge toimib

Basaalarakk-kartsinoom tekib siis, kui tervetes naharakkudes paiknev DNA saab kahjustada ja organism ei suuda kahjustust parandada. Kahjustus võib muuta seda, kuidas teatud valgud nendes rakkudes toimivad. Kahjustatud rakud muutuvad vähirakkudeks ning hakkavad kasvama ja jagunema. Erivedge on vähivastane ravim, mis kontrollib ühte põhilist basaalarakk-kartsinoomi tekkes osalevat valku. See võib aeglustada või peatada vähirakkude kasvu või rakud surmata. Selle tulemusena võib nahavähk kahaneda.

2. Mida on vaja teada enne Erivedge võtmist

Lugege arstilt saadud erijuhiseid, eriti Erivedge toime kohta veel sündimata lapsele.

Lugege hoolikalt ja järgige arstilt saadud patsiendi brošüüris sisalduvaid juhiseid.

Erivedge't ei tohi võtta

- kui olete vismodegiibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes **allergiline**.
- kui te olete **rased**, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda ravi ajal või 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist. See on vajalik sellepärast, et Erivedge võib kahjustada teie veel sündimata last või põhjustada tema surma.
- kui te **imetate** või kavatsete last imetada ravi ajal või 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist. See on vajalik sellepärast, et ei ole teada, kas Erivedge võib erituda rinnapiima ja kahjustada teie last.
- kui te võite rasestuda, kuid ei ole võimeline või ei soovi järgida vajalikke raseduse vältimise meetmeid, mis on loetletud **Erivedge raseduse vältimise programmis**.
- kui te võtate ka lihtnaistepuna (*Hypericum perforatum*), mis on depressiooni korral kasutatav taimne preparaat (vt „Muud ravimid ja Erivedge“).

Lisateave ülaltoodud teemade kohta sisaldub lõikudes „Rasedus“, „Imetamine“ ja „Viljakus“ ning „Rasestumisvastane kaitse – meestele ja naistele“.

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge seda ravimit võtke. Kui te ei ole kindel, pidage enne Erivedge võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Erivedge kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on küsimusi selles lõigus sisalduva teabe kohta:

- Te ei tohi doonorina verd anda mis tahes ajal ravi jooksul ja 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist.
- Kui te olete mees, ei tohi te doonorina spermat loovutada mis tahes ajal ravi jooksul ja 2 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist.
- Seoses Erivedge raviga on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Lõpetage Erivedge kasutamine ja otsige kohe arstiabi, kui märkate mis tahes sümptomit, mida on kirjeldatud lõigus 4.
- Ärge kunagi andke seda ravimit kellelegi teisele. Tagastage kasutamata kapslid ravi lõppedes. Pidage kapslite tagastamise osas nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Erivedge't ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta, sest ei ole teada, kas ravim on selles vanusegrupis ohutu ja tõhus. Erivedge võib põhjustada luude kasvu peatumist ja põhjustada enneaegset puberteedi (enne 8 aasta vanuseks saamist tüdrukutel või 9 aasta vanuseks saamist poistel). See võib tekkida isegi pärast Erivedge'ga ravi lõpetamist. Selle ravimi loomkatsetes on täheldatud kasvavate hammaste ja luude kahjustusi.

Muud ravimid ja Erivedge

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite, vitamiinide ja taimsete ravimite kohta.

Mõned ravimid võivad mõjutada Erivedge toimet või suurendada kõrvaltoimete tekke tõenäosust. Ka Erivedge võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet.

Eriti peab arstile rääkima sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

- rifampitsiin – kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks
- karbamasepiin, fenütoiin – epilepsiaravimid
- esetiimiib ja statiinid nagu atorvastatiin, fluvastatiin, pravastatiin, rosuvastatiin, simvastatiin – kasutatakse kõrge kolesteroolisisalduse langetamiseks
- bosentaan, glibenklamiid, repagliniid, valsartaan
- topotekaan – kasutatakse teatud tüüpi vähivormide raviks
- sulfasalasiin – kasutatakse teatud põletikuliste haiguste raviks, ja eriti
- lihtnaistepuna (*Hypericum perforatum*) – taimne preparaat, mida kasutatakse depressiooni raviks, sest seda ei tohi kasutada samal ajal Erivedge'ga

Rasedus

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, ärge võtke Erivedge't ravi ajal ega 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist.

Te peate otsekohe lõpetama ravi ja teavitama oma arsti, kui: teil jääb või te arvate, et teil on jäänud menstruatsioon vahele või teil tekib ebaharilik menstruaalverejooks või te kahtlustate rasedust. Kui te rasestute ravi ajal Erivedge'ga, peate otsekohe lõpetama ravi ja teatama sellest oma arstile.

Erivedge võib põhjustada raskeid vääraseid. Ravim võib põhjustada ka veel sündimata lapse surma. Arstilt saadud erijuhised (Erivedge raseduse vältimise programm) sisaldavad teavet eriti Erivedge toime kohta veel sündimata lastele.

Imetamine

Ärge imetage last ravi ajal ega 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist, sest ei ole teada, kas Erivedge võib erituda rinnapiima ja kahjustada teie last.

Viljakus

Erivedge võib naistel mõjutada laste saamise võimet. Mõnel Erivedge't võtval naisel on menstruatsioonid lõppenud. Kui see juhtub teiega, siis ei ole teada, kas menstruatsioonid algavad uuesti. Kui soovite edaspidi lapsi saada, pidage nõu oma arstiga.

Rasestumisvastane kaitse – meestele ja naistele

Erivedge't võtvatele naistele

Enne ravi alustamist küsige oma arstilt, kas te olete võimeline rasestuma. Isegi kui menstruatsioonid on lõppenud, on hädavajalik küsida oma arstilt, kas teil esineb risk rasestuda .

Kui te olete võimeline rasestuma:

- peate rakendama ettevaatusabinõusid, vältimaks rasestumist Erivedge võtmise ajal
- kasutage kahte rasestumisvastast meetodit – ühte väga tõhusat meetodit ja ühte barjäärimeetodit (palun vt näited allpool)
- te peate jätkama rasestumisvastaste meetodite kasutamist 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist, sest Erivedge võib püsida teie organismis kuni 24 kuud pärast viimast annust

Soovitatud rasestumisvastane meetod: pidage nõu oma arstiga, millised on kaks teile kõige sobivamat rasestumisvastast meetodit.

Kasutage ühte väga tõhusat meetodit, näiteks:

- rasestumisvastased depoosüstid
- emakasisene vahend (spiraal)
- kirurgiline steriliseerimine

Samuti peate kasutama ühte barjäärimeetodit, näiteks:

- kondoom (võimalusel koos spermitsiidiga)
- pessaar (võimalusel koos spermitsiidiga)

Arst teeb teile rasedustesti:

- maksimaalselt 7 päeva jooksul enne ravi alustamist – veendumaks, et te ei ole juba rase
- ravi ajal üks kord kuus

Te peate ravi ajal või 24 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist teavitama oma arsti otsekohe sellest, kui:

- arvate, et rasedumisvastane kaitse ei ole mingil põhjusel olnud tõhus
- teie menstruatsioonid lõpevad
- te lõpetate rasedumisvastaste vahendite kasutamise
- te peate muutma rasedumisvastaseid vahendeid

Erivedge't võtvatele meestele

Erivedge võib jõuda spermasse. Kui olete seksuaalvahekorras naispartneriga, kasutage alati kondoomi (võimalusel koos spermitsiidiga), isegi pärast vasektomiat. See on vajalik ravi ajal ja 2 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist.

Te ei tohi doonorina spermat loovutada ravi ajal ning 2 kuu jooksul pärast selle ravimi viimase annuse manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Erivedge ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga.

Erivedge sisaldab laktoosi ja naatriumi

Erivedge sisaldab teatud tüüpi suhkrut, mida nimetatakse laktoosiks. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi kapslis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Erivedge't võtta

Võtke Erivedge't alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Selle ravimi manustamine

Soovitatav annus on üks kapsel iga päev.

- Neelake kapsel tervelt koos veega.
- Kapslit ei tohi purustada, avada ega närida, vältimaks tahtmatut kokkupuudet kapsli sisuga.
- Erivedge't võib võtta söögiaegadest sõltumatult.

Kui te võtate Erivedge't rohkem, kui ette nähtud

Kui te võtate Erivedge't rohkem, kui ette nähtud, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Erivedge't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, vaid võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Erivedge võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata, sest selle tulemusena võib ravi olla vähem tõhus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Erivedge põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Erivedge võib põhjustada raskeid väärenguid. See võib põhjustada ka lapse surma enne või vahetult pärast sündimist. Te ei tohi selle ravimi võtmise ajal rasestuda (vt lõik 2 „Ärge võtke Erivedge’t“ ning „Rasedus“, „Imetamine“ ja „Viljakus“).

Muud kõrvaltoimed on loetletud raskuse ja esinemissageduse järjekorras:

Kui mis tahes mõni neist kõrvaltoimet nendest muutub raskeks, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10st):

- menstruatsioonide lõppemine rasestumisvõimelises eas naistel
- isutus ja kaalulangus
- väsimus
- lihasspasmid
- kõhulahtisus
- juuste väljalangemine (alopecia)
- lööve
- maitsetundlikkuse muutused või maitsetundlikkuse täielik kadu
- kõhukinnisus
- oksendamine või iiveldus
- maoärritus või seedehäired
- liigesevalu
- valu (üldine) või valu kätes, jalgades
- sügelus

Sage (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st):

- valu rinnakeres, seljas või küljes
- energiapuudus või nõrkus (asteenia)
- organismi vedelikupuudus (dehüdratsioon)
- lihas-, kõõlus-, sideme-, luuvalu
- kõhuvalu
- maitsetundlikkuse kadu
- ebanormaalne karvakasv
- ripsmete väljalangemine (madaroos)
- muutused vereanalüüsides – maksanäitajate või kreatiinfosfokinaasi (lihasensüümi) väärtuste tõus

Esinemissagedus teadmata

- luude kasvu peatumine (epifüüside enneaegne sulgumine)
- enneaegne puberteet
- maksakahjustus
- tõsised nahareaktsioonid:
 - punakad märklaualaadsed või ümmargused laigud (mille keskel on tihti vill) kehatüvel, naha koorumine, haavandid suus, kurgus, ninas, suguelunditel ja silmades. Nahareaktsioonidele eelnevad tihti palavik ja gripilaadsed sümptomid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs)
 - ulatuslik lööve, palavik ja laienenud lümfisõlmed (DRESS-sündroom või ravimiülitundlikkuse sündroom)
 - ravi alustamisel tekkiv ulatuslik punane ketendav lööve nahaaluste kühmudega ja villidega, millega kaasneb palavik (äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos)

Kõrvaltoimetest tea tamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise tea tada riikliku teavitussüsteemi (vt [V lisa](#)) kaudu. Tea tades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Erivedge't säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
- Hoida temperatuuril kuni 30 °C.
- Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.
- Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.
- Ravi lõppedes peate tagastama kõik kasutamata jäänud kapslid. See väldib ravimi väärkasutamist ja aitab kaitsta keskkonda. Ravimi tagastamise osas pidage nõu oma apteekri või arstiga.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Erivedge sisaldab

- Toimeaine on vismodegiib. Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg vismodegiibi.
- Teised koostisosad on (vt ka lõik 2, teave naatriumi- või laktoosisisalduse kohta):
- Kapsli sisu: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, naatriumlaaurüülsulfaat, povidoon (K29/32), naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), talk ja magneesiumstearaat (vt lõik 2 „Erivedge sisaldab laktoosi ja naatriumi“)
- Kapsli kest: punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), titaandioksiid ja želatiin
- Trükitint: šellaki glasuur ja must raudoksiid (E172)

Kuidas Erivedge välja näeb ja pakendi sisu

Roosal läbipaistmatul kapsli kehal on märgistus „150 mg“ ja hallil kaanel on musta söödava tindiga märgistus „VISMO“. Lastekindla korgiga pudelis on 28 kapslit. Igas pakendis on üks pudel.

Müügiloa hoidja

Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Tootja

Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB "Roche Lietuva"

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche Pharmaceuticals A/S

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche Pharmaceuticals A/S

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Ατδ.
Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB
Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA
Tel: +371 - 6 7 039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Infoleht on viimati uuendatud**Muud teabeallikad**

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: <http://www.ema.europa.eu>.
See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Osana Erivedge raseduse vältimise programmist antakse kõikidele patsientidele
patsiendi brošüür.

Lisateabe saamiseks tutvuge palun selle dokumendiga.