

Medicinal product no longer authorised

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris 160 mg täpilahus väikestele kassidele

ProMeris 320 mg täpilahus suurtele kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine: Üks ml sisaldab metaflumisooni 200 mg

Igas ProMeris'e doosis (pipetis) sisaldub:

	Maht (ml)	Metaflumisoon (mg)
ProMeris väikestele kassidele (≤ 4 kg)	0,80 ml	160 mg
ProMeris suurtele kassidele (> 4 kg)	1,60 ml	320 mg

Abiaine(d):

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Täpilahus

Läbipaistev, kollakas kuni merevaiguvärvi vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid

Üle 8 nädala vanused kassid

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kirbuinvasiooni (*Ctenocephalides canis* ja *C. felis*) raviks ja tõrjeks kassidel. Ravimit võib kasutada komponendina kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis.

4.3 Vastunäidustused

Mitte manustada all 8 nädala vanustele kassipoegadele.

4.4 Erihoiatused loomaliigi kohta

Hoiduda ravimi kokkupuutest kassi silmadega ja ravimi suukaudsest sattumisest looma organismi.

Mitme lemmikloomaga majapidamistes tuleks kirbuprobleemi optimaalseks kontrolli alla saamiseks ravida insektitsiididega kõiki loomi. Lisaks on soovitatav töödelda keskkonda sobiva insektitsiidiga.

4.5 Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Haigetel või nõrkadel loomadel kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

See veterinaarravim on ainult välispidiseks manustamiseks täpilahusena. Mitte manustada suukaudselt või mingil muul viisil.

Oluline on manustada doos nahale piirkonnas, kus looma ei saa seda ise ära lakkuda. Loomadel tuleb manustamise järel takistada üksteise lakkumist.

Tuleb jälgida, et pipeti sisu ega manustatav doos ei satuks ravitava looma ja/või teiste loomade silma või suhu.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Hoiduda otsekontaktist naha, silmade ja suuga. Pärast kasutamist pesta käed. Ravimi sattumisel nahale pesta koheselt vee ja seebiga. Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silma põhjalikult veega.

Veterinaarpreparaadiga töötamise ajal on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Hoiduda otsekontaktist ravitud loomadega, kuni manustamiskoht on kuiv.

Lastel ei tohi lubada mängida ravitud loomadega kuni manustamiskoht on kuivanud. Seetõttu soovitatakse manustada ravimit loomadele õhtul. Hiljuti ravitud loomadel ei tohiks lubada magada koos omanikega, eriti lastega.

ProMerise lahusti võib jätta plekke teatud materjalidele, kaasaarvatud nahale, riidele, plastikule ja lõppviimistletud pindadele. Laske manustamiskohal kuivada, enne kui võimaldate kokkupuudet selliste materjalidega.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist, võib esineda hüpersalivatsiooni. See ei ole mürgistusnäht ja kaob mõne minuti jooksul täiendava ravita. Õige manustamismetoodika minimeerib manustamiskoha lakkumist.

Veterinaarpreparaadi manustamine võib põhjustada karvastiku lokaalset, ajutist kokkukleepumist ja õlist väljanägemist manustamiskohal. Samuti võib täheldada kuiva ravimjäägi esinemist. See on normaalne ja kaob tavaliselt 1-4 päeva jooksul pärast manustamist. Need muutused ei mõjuta veterinaarpreparaadi ohutust või efektiivsust. Harvadel juhtudel võib esineda preparaadi manustamise kohal mööduvat ärritust. Väga harvadel juhtudel võib esineda ajutist lokaalset karva kadu.

* - Väga sageli (ühe ravimise käigus ilmneb kõrvalnähte rohkem kui 1 loomal 10-st)

- Sageli (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

- Mitte sageli (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st)

- Harva (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st)

- Väga harva (vähem kui 1 loomal 1000-st. sealhulgas isoleeritud teated)

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Võib kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

4.9 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine:

Minimaalne soovituslik doos on 40 mg metaflumisooni/kg kehamassi kohta, mis võrdub 0,20ml/kg kehamassi kohta. Järgnev tabel toob ära kasutatava pipeti suuruse vastavalt kassi kehamassile.

Kassi kehamass (kg)	Kasutatava pipeti suurus	Maht (ml)
≤ 4	ProMeris väikestele kassidele	0,80
> 4	ProMeris suurtele kassidele	1,60

Manustamisviis:


Ainult kutaaneks kasutamiseks. Täpilahusena nahale manustamine.

Eemaldada pipett pakendist. Hoides pipetti püstiasendis, painutada pipeti otsa, et murda ots mööda märgistatud joont. Pipetiotsa tipp paindub tagasi vastu pipetti.

Manustada pipeti sisu ühele kohale kassi kuklal koljubaasi juures.

Lükata karv koljubaasi juures laiali, kuni nahk on nähtav. Asetada pipeti ots vastu nahka ja tühjendada vajutades kogu pipeti sisu nahale.

Mitte manustada veterinaarpreparaati kassi karvastiku pinnale.



Raviskeem:

Kirbuinvasiooni optimaalseks kontrolliks tuleks veterinaarpreparaati manustada 4 kuni 6 nädalaste intervallidega kogu kirbuhooaja vältel või tugineda raviskeemi koostamisel kohalikule epidemioloogilisele olukorrale.

Veterinaarpreparaat hoiab kirbuinvasiooni ära kuni 6 nädala vältel pärast ühekordset manustamist, sõltuvalt keskkonna kirbuinvasiooni intensiivsusest.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

8 nädala vanustel ja vanematel kassidel, kellele manustati 3- kuni 5-kordne soovituslik doos 7 korda kahe nädalaste intervallidega, ei täheldatud mingeid kõrvaltoimeid.

4.11 Keeluaeg

Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: ATCvet kood QP 53AX25

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Metaflumisoon on semikarbasoonide hulka kuuluv ektoparasiititsiid. Metaflumisoon on naatriumikanalite antagonist ja pärsib närvifunktsioone, kutsudes selle tulemusena esile parasiidi halvatus ja surma. Metaflumisoon toimib kirpudesse mittesüsteemse kokkupuute kaudu parasiitidega nahal ja karvadel. Maksimaalne toime saavutatakse 48 tunni vältel.

5.2 Farmakokineetilised andmed

Pärast lokaalset manustamist ühele kohale kassi kuklal koljubaasi juures jaotub metaflumisoon kiiresti üle kogu nahapinna. Maksimaalsed kontsentratsioonid karvastikus saavutati tavaliselt 1 kuni 2 päeva jooksul pärast manustamist ja need langesid järk-järgult 56 manustamisjärgse päeva vältel. Metaflumisooni oli karvades võimalik määrata 56 päeva pärast manustamist. Need tulemused on kooskõlas laboratoorsete toimeuuringutega, mis näitasid toimet kuni 56 päeva vältel pärast manustamist.

Pärast lokaalset manustamist ühele kohale kassi kuklal koljubaasi juures olid metaflumisooni plasmakontsentratsioonid liiga madalad, et võimaldada standardsete farmakokineetiliste parameetrite arvutamist.

5.3 Keskkonnaomadused

Vaata punkt 6.6

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Synperonic NCA 830
Dimetüülsulfoksiid
Gamma-heksalaktoon

6.2 Sobimatus

Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Veterinaarpreparaat on pakendatud üksikdoosi sisaldavatesse läbipaistvatesse plastikpipettidesse, mis on omakorda pakendatud alumiiniumfooliumisse. Ühel pappkaardil asetseb kolm pipetti, pappkarbis sisaldub üks või kaks kolmepipetilist pappkaarti. Kõik pipetid pappkarbis on sama suurusega. Pappkarp 1 või 2 blisterkaardiga, millel on 3 x 0,80 ml pipetti. Pappkarp 1 või 2 blisterkaardiga, millel on 3 x 1,60 ml pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Kasutatud pipetid kohe pärast kasutamist hoolikalt ära visata.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/064/001-004

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV

19/12/2006

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Raviameti koduleheküljelt aadressil <http://www.ema.europa.eu>

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei kohaldata

LISA II

- A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA**
- B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD**
- C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID**
- D. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE**

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
Itaalia

B. HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Veterinaarne retseptiravim.

Selle müügiloa hoidja on kohustatud Euroopa Nõukogu teavitama antud otsusega heaks kiidetud ravimi turustamisplaanidest.

C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

D. MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Ravimiohutuse järelevalve süsteem

Müügiloa hoidja peab tagama, et müügiloa taotluse I osas kirjeldatud ravimiohutuse järelevalve süsteem on olemas ja toimib enne veterinaarravimi turule toomist ja turustamise ajal.

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

Medicinal product no longer authorised

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 1 blisterkaardiga -Pappkarp 2 blisterkaardiga

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris 160 mg Spot-on
Täpilahus väikestele kassidele {≤ 4 kg}

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 0,80 ml pipett sisaldab:
Toimeaine: 160 mg metaflumisooni

3. RAVIMVORM

Täpilahus

4. PAKENDI SUURUS

Pappkarp, milles on 1 blisterkaart 3 x 0,80 ml pipetiga
Pappkarp, milles on 2 blisterkaarti 3 x 0,80 ml pipetiga

5. LOOMALIIGID

Üle 8 nädala vanused kassid.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbuinvasiooni raviks ja tõrjeks.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult kutaaneks manustamiseks.
Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte manustada alla 8 nädala vanustele kassipoegadele. Enne veterinaarpreparaadi manustamist haigetele ja nõrkadele kassidele pidada nõu loomaarstiga.

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaaravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/064/001 – 1 blisterkaart 3 x 0,80 ml pipetiga
EU/2/06/064/002 – 2 blisterkaarti 3 x 0,80 ml pipetiga

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

{Pappkarp 1 blisterkaardiga -Pappkarp 2 blisterkaardiga}

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris 320 mg Spot-on
Täpilahus suurtele kassidele {> 4 kg}

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 1,60 ml pipett sisaldab:
Toimeaine: 320 mg metaflumisooni

3. RAVIMVORM

Täpilahus

4. PAKENDI SUURUS

Pappkarp, milles on 1 blisterkaartl 3 x 1,60 ml pipetiga
Pappkarp, milles on 2 blisterkaarti 3 x 1,60 ml pipetiga

5. LOOMALIIGID

Üle 8 nädala vanused kassid.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbuinvasiooni raviks ja tõrjeks.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult kutaaneks manustamiseks.
Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte manustada alla 8 nädala vanustele kassipoegadele. Enne veterinaarpreparaadi manustamist haigetele ja nõrkadele kassidele pidada nõu loomaarstiga.

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaaravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/064/003 – 1 blisterkaart 3 x 1,60 ml pipetiga
EU/2/06/064/004 – 2 blisterkaarti 3 x 1,60 ml pipetiga

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Fooliumpakend 0,80 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris S
Täpilahus

2. MÜÜGILOAHOIDJA

PFIZER

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {month/year}

4. PARTII NUMBER

Lot {number}

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Fooliumpakend 1.60 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris L
Täpilahus

2. MÜÜGILOAHOIDJA

PFIZER

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {month/year}

4. PARTII NUMBER

Lot {number}

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
PIPETIL**

Väikestele kassidele

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris S

Täpilahus

2. MÜÜGILOAHOIDJA

PFIZER

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

160 mg

4. KÕLBLIKUSAEG

EXP

5. PARTII NUMBER

LOT

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
PIPETIL**

Suurtele kassidele

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris L

Täpilahus

2. MÜÜGILOAHOIDJA

PFIZER

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

320 mg

4. KÕLBLIKUSAEG

EXP

5. PARTII NUMBER

LOT

Medicinal product no longer authorised

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT
ProMeris täpilahus kassidele

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII
VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja:

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
Itaalia

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ProMeris 160 mg täpilahus väikestele kassidele
ProMeris 320 mg täpilahus suurtele kassidele

3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Toimeaine: Üks ml sisaldab metaflumisooni 200 mg

Igas ProMeris'e doosis (pipetis) sisaldub:

	Maht (ml)	Metaflumisoon (mg)
ProMeris väikestele kassidele (≤ 4 kg)*	0,80 ml	160 mg
ProMeris suurtele kassidele (> 4 kg)*	1,60 ml	320 mg

Seoses piiratud ruumiga pakendil kasutatakse blisteritel ja aplikaatorpipettidel lühendeid „S“, ja „L“, mis tähendavad vastavalt „väikestele“ ja „suurtele“.

4. NÄIDUSTUS(ED)

Kirbuinvasiooni (*Ctenocephalides canis* ja *C. felis*) raviks ja tõrjeks kassidel. Ravimit võib kasutada komponendina kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada all 8 nädala vanustele kassipoegadele.

Haigetel või nõrkadel loomadel kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

6. KÕRVALTOIMED

Kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist, võib esineda hüpersalivatsiooni. See ei ole mürgistusnäht ja kaob mõne minuti jooksul täiendava ravita. Õige manustamismetoodika minimeerib manustamiskoha lakkumist.

Veterinaarpreparaadi manustamine võib põhjustada karvastiku lokaalset, ajutist kokkukleepumist ja õlist väljanägemist manustamiskohal. Samuti võib täheldada kuiva ravimjäägi esinemist. See on normaalne ja kaob tavaliselt 1-4 päeva jooksul pärast manustamist. Need muutused ei mõjuta veterinaarpreparaadi ohutust või efektiivsust. Harvadel juhtudel võib esineda preparaadi manustamise kohal mööduvat ärritust. Väga harvadel juhtudel võib esineda ajutist lokaalset karya kadu.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest veterinaararsti.

* - Väga sageli (ühe ravimise käigus ilmneb kõrvalnähte rohkem kui 1 loomal 10-st)

- Sageli (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

- Mitte sageli (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st)

- Harva (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st)

- Väga harva (vähem kui 1 loomal 1000-st. sealhulgas isoleeritud teated)

7. LOOMALIIGID

Üle 8 nädala vanused kassid.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Annustamine:

Minimaalne soovituslik doos on 40 mg metaflumisooni/kg kehamassi kohta, mis võrdub 0.20ml/kg kehamassi kohta. Järgnev tabel toob ära kasutatava pipeti suuruse vastavalt kassi kehamassile.

Kassi kehamass (kg)	Kasutatava pipeti suurus	Maht (ml)
≤ 4	ProMeris for Small Cats	0,80
> 4	ProMeris for Large Cats	1,60

Manustamisviis:


Ainult kutaaneks kasutamiseks. Täpilahusena nahale manustamine.

Eemaldada pipett pakendist. Hoides pipetti püstiasendis, painutada pipeti otsa, et murda ots mööda märgistatud joont. Pipetiotsa tipp paindub tagasi vastu pipetti.

Manustada pipeti sisu ühele kohale kassi kuklal koljubaasi juures.

Lükata karv koljubaasi juures laiali, kuni nahk on nähtav. Asetada pipeti ots vastu nahka ja tühjendada vajutades kogu pipeti sisu nahale.

Mitte manustada veterinaarpreparaati kassi karvastiku pinnale.



Raviskeem:

Kirbuinvasiooni optimaalseks kontrolliks tuleks veterinaarpreparaati manustada 4 kuni 6 nädalaste intervallidega kogu kirbuhooja vältel või tugineda raviskeemi koostamisel kohalikule epidemioloogilisele olukorrale.

Veterinaarpreparaat hoiab kirbuinvasiooni ära kuni 6 nädala vältel pärast ühekordset manustamist, sõltuvalt keskkonna kirbuinvasiooni intensiivsusest.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Kasutamiseks ainult veterinaarse järelevalve all.

See veterinaarravim on ainult välispidiseks manustamiseks täpilahusena. Mitte manustada suukaudselt ega mingil muul viisil.

Oluline on manustada doos nahale piirkonnas, kus looma ei saa seda ise ära lakkuda. Loomadel tuleb manustamise järel ajal takistada üksteise lakkumist.

Tuleb jälgida, et pipeti sisu ega manustatav doos ei satuks ravitava looma ja/või teiste loomade silmae või suhu.

Mitme lemmikloomaga majapidamistes tuleks kirbuprobleemi optimaalseks kontrolli alla saamiseks ravida insektitsiididega kõiki loomi. Lisaks on soovitatav töödelda keskkonda sobiva insektitsiidiga.

10. KEELUAJAD

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C . Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12. ERIHOIATUSED

Hoiduda ravimi kokkupuutest kassi silmadega ja ravimi suukaudsest sattumisest looma organismi.

Haigetel või nõrkadel loomadel kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Võib kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

8 nädala vanustel ja vanematel kassidel, kellele manustati 3- kuni 5-kordne soovituslik doos 7 korda kahenädalaste intervallidega, ei täheldatud mingeid kõrvaltoimeid.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Hoiduda otsekontaktist naha, silmade ja suuga. Pärast kasutamist pesta käed. Ravimi sattumisel nahale pesta koheselt vee ja seebiga. Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silma põhjalikult veega.

Veterinaarpreparaadiga töötamise ajal on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Hoiduda otsekontaktist ravitud loomadega, kuni manustamiskoht on kuiv.

Lastel ei tohi lubada mängida ravitud loomadega kuni manustamiskoht on kuivanud. Seetõttu soovitatakse manustada ravimit loomadele õhtul, samuti mitte lubada hiljuti ravitud loomadel magada koos omanikega, eriti lastega.

ProMerise lahusti võib jätta plekke teatud materjalidele, kaasaarvatud nahale, riidele, plastikule ja lõppviimistletud pindadele. Laske manustamiskohal kuivada, enne kui võimaldate kokkupuudet selliste materjalidega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Kasutatud pipetid tuleb kohe pärast kasutamist hoolikalt ära visata.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil <http://www.ema.europa.eu>

15. LISAINFO

Iga veterinaarpreparaadi tugevus on saadaval ühte ja kahte 3 pipetiga blisterkaarti sisaldavas pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: +32 (0)2 554 62 11

Република България

Pfizer Luxembourg SARL
Тел.: + 359 2 970 41 71

Česká republika

Pfizer Animal Health
Tel: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Deutschland

Pfizer GmbH
Tel: +49 30-5500 5501

Eesti

Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

España

Pfizer S.L.
Tel: +34 91 4909900

France

Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, trading as:
Pfizer Animal Health
Tel: +353 (0) 1 467 6500

Ísland

Pfizer Oy Animal Health
Sími: +358 (0)9 4300 40

Italia

Pfizer Italia S.r.l.,
Tel: +39 06 3318 2933

Κύπρος

Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

Luxembourg

Pfizer Animal Health s.a.,
Tél/Tel.: + 32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.
Tel: +361 488 3695

Malta

Agirmed Limited
Tel: +356 21 465 797

Nederland

Pfizer Animal Health B.V.,
Tel: +31 (0)10 4064 600

Norge

Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

Polska

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00

Romania

Pfizer Romania SRL
Tel: + 0040 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL
Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL o.z.
Tel: + 421 2 3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy Animal Health,
Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Sverige

Pfizer Oy Animal Health
Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000

United Kingdom

Pfizer Ltd
Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Animal Health
Tel: +370 525 14000

Medicinal product no longer authorised